

臟建侯小腸每同肝臟勝
脾胃脾胃脾胃脾胃
三焦百病主治十

常盤屋

低書治

捷徑醫圖卷一

氣味化源和氣味能引經按經
外降逆氣治三焦虛位便分而四根各末四
差陳新宜四條制法五七方之解六
十劑辨六湯散丸丹治七前八服藥七八
去瘀生新去瘀生新去瘀生新去瘀生新
涼藥丸九百病主治本三本單金機大
治風門治氣治熱門治濕門
治下門治燥門治寒門治暑門
治瘧門治癰門治瘡門治毒門
治瘡門治癰門治瘡門治毒門

泊煉門

學子七十遠遊

寒門寒子寒

73

[illegible]

三

捷徑醫筌卷之一

本草總括

氣味化源

愛四時溫轉涼寒之天氣而以爲藥氣之溫熱寒寒溫熱者天之陽也涼寒天之陰也陽則升陰則降受五行生化收藏之地氣以爲藥味之酸苦辛鹹者地之陰也則浮則沉生於東方木應春氣溫入肝苦生於南方火應夏氣熱入心辛生於中央土應四季氣溫涼寒熱味酸辛鹹酸苦辛平其味入脾酸生於西方金應秋氣涼入肺鹹生於北方水應冬氣寒入腎淡爲五味之故本草不言淡藥有左木味化耳大味化辛土味化

寒入腎

漢為五球

100

足太陽膀胱 黃芩 羌活 行

手太陽肺 白芷 升麻 行

手陽明大腸 葛根 升麻 行

足太陽脾 葛根 白芷 行

足陽明胃 葛根 升麻 行

手厥陰心包 葛根 升麻 行

手少陽三焦 連翹 柴胡 行

足厥陰肝 柴胡 升麻 行

足少陽膽 柴胡 升麻 行

△升降浮沉法

肝主春於時自子至巳為陽中之
之陽氣應之如防風羌活升
麻葛根之類自地而升天味溫
薄者是也味辛補酸瀉氣溫

至午為陽中之陽熱氣應之如
附子烏頭姜桂紅豆之類

火之氣應之如浮散下氣之
厚者是也味鹹補耳滋氣熱補

寒為 ●肺主秋於時自午至

自為陽中之陰燥氣應之如荻
荻指蒼澤瀉木通之類自天

而降地氣之薄者是也味酸補
辛潤氣收補濕潤 ●冬主腎

於時自巳至子為陽中之陰寒
氣應之如木黃芩連實柏防已

之類正寒水之氣應之如厚化
浮沉味之厚者是也味苦補鹹

濕氣寒補熱瀉 ●脾主長夏

濕化味耳補苦瀉氣寒熱濕氣
各從其宜詳後論類証經曰補

瀉在味隨其氣足言補以
幸耳濕熱之劑皆助春夏之升

浮在人身乃肝心之氣言瀉以
以酸苦寒家及淡瀉之劑皆助

秋冬之降沉在人身乃脾腎之

氣

白薇半夏瓜蒌貝母射干烏頭烏
嘔相友大戟芫花海藻等遠
与耳草相友案竈与葱相友

石坡明与雲母相友

又硃黃原是火之精朴硝下見
便相爭水銀莫与砒相見已具
性烈最爲上偏与牽牛不與情
丁亥莫与鬱金見牙痛難食家
三棱川烏草烏不須
單人參又忌五吳脂

△藥陳新之宜

藥宜陳者惟麻黃荊芥香茹陳
皮半夏枳實枳殼吳茱萸蘇合
其餘味薄之藥俱用近新有
力若陳腐輕微者皆不可用

△修製之法

詩曰芫花李利水無醋不能過
菜豆木解毒帶壳不見切草藥
瀉膨効速壳及服胸黑生利
水速去幽毒速消黃生通血利

補血藥過地榆醫爲菜連梢不
法錫礬皮藥理氣連白補胃也

附云殺陰藥生用走皮風草

解風藥生用使人寒人官統選

用諸石火煨紅入醋能爲末製

瘦瘠須工用草炒去油生用氣

痺癰凡藥入醋蜜製入脾養製

入腎用鹽入肝用醋入心用童

便凡藥用水地湯泡煨炒者製

其藥也醋浸蜜製炙者行經

滿血也且如知母桑白皮天麥

閉多生熱地黃何首烏屈臣歸

用竹刀銅刀切之犯誤以藥三

消速者已破門多連于烏莖之

類如不去心金人頭燥損於藥

等厚朴桑白皮之類如不去皮

林人元氣槓子半麻茸智芩散

之類如不去皮金人頭燥損於藥

地黃龍齒酒洗去土生精法血

無余滿細桃仁杏仁雙仁有毒

佛入用去皮尖不生疔瘡者水

半是陳皮用湯洗去其燥性

赤黃濁去頭汁痛不煩人參
掃提常山去脂黃連不煩人參
水浸木槵醋洗淨便另研苦瓠
皮連古法好煙餅奇凡瘡癰腫
面及手諸皮膚毒瘡用油炒
其土購也病在下脘下脘上脘
酒洗洗病在下脘下脘上脘
與打者生半雞柳木槵如相
飲用酒製者恐生燥月也費知
特厚者生用伴薄者煨用為妙
製燒肉沐瘡水煎用之
隨炒隨用以火助久

△七方之解

本方君一臣二佐九病有兼症
者用之或病在肝腎之下而
者分兩支而脾腹之亦本方也
小方君一臣二病無兼症者
用之或病在心肺之上而直者
令兩支而脾腹之亦小方也
緩方有五有耳以緩之之緩方
如雞蜜木冬耳聾取其餌能藥

屬也有九以緩之之緩方氣行
通也有無毒治事之緩方功
緩也有助性群衆之緩方或表
裏藥同則或外解藥同則更相
拘制是得其能而不得其氣
也有補上消上之緩方心脾
不煩煩而少是也急方有五
有急病急攻之急方如中風牙
關緊急用續命是也有兼性急
烈之急方如濕便閉塞俱用備
急丸是也有渴散渴滌之急方
下咽發散汗吐下劑是也有補
標之急方汗吐下劑是也有補
下消下之急方肝腎之病不煩
煩而多是也奇方有二有單
方之奇方用一物是也有數合
陽數之奇方一三五七九皆屬
陽數也陰奇方宜下不宜上凡入
陽之奇亦謂之奇偶方有二
有吉之緩方之偶方有數合即
數之偶方二四六八十皆屬數
也故偶方宜汗不宜下凡八開

之說亦謂之湯 種支有二者
二方三方之樣方有舍兩均齊
之樣
方也

△十劑之辨

宜劑可以去逆養攝之屬驚而不
不識者用之 驅劑可以行去滯
通草防已之屬而不可行去滯
之 抽劑可以去弱人參黃芪
之屬氣弱血弱皆用之 津劑
可以去稠草薢大黃之屬閉而
有餘者用之 輕劑可以去寒
麻黃葛根之屬氣寒痰壅閉
皆用之 重劑可以去法磁石
鎮粉之屬氣躁神志不定者用
之 滑劑可以去澀冬葵榆皮
之屬氣著經澀二便澀者用之
滋劑可以去脫牡蠣龍骨之
屬氣脫燥明遺精遺精亡血者
用之 藥劑可以去濕桑白皮
赤小豆之屬分利去濕者用之

劑可以去枯紫石英白石英之
屬氣枯血枯者用之 又寒劑
可以去熱消黃之屬熱劑
可以去寒桂附之屬是也

△湯散丸丹之法

藥有宜實散者宜水煮酒漬者
宜丸宜散者到散亦宜丸有人
受明者也使藥水清汁然於腹
中循行經絡易於散者一藥
為細末不食清濁矣如治至元
之病細末酒煎去濕如治至元
氣細末煎藥散風寒細末煎去
腸上病細末煎散者如末也
不惟細末止去腸上病及腸腹
之病氣味厚者白濁調服氣味
薄者水煎和查服九者治下
部之疾其九極大而光且圓治
中焦者以之治上焦者極小細
粒細丸者取其造化直至下焦
或酒或醋或水或去濕者以生
地用半是南星或去濕者以生

空心頓服之，以送下也。病在四肢，中脘者，宜飽食而寢，蓋病在脾胃，宜飽食而寢，若病在四肢，則宜少食而寢。此是四逆不可太過也。又少服則滋榮抄占參服則較補抄下凡服藥後，三時久方可食，病亦不可斷服，金藥氣行也。

△五禁

鹹走血，血病服多食鹹，故走骨。骨病服多食，骨辛走氣，氣病服多食辛，酸走筋，肝病服多食酸，耳走肉，肉病服多食辛。

△服藥禁忌

有米勿食糯米及粟肉胡荽太蒜青蔥酥等物，有蒜薑勿食蝦肉有巴豆勿食蘿蔔及野豬肉有黃連枳梗勿食豬肉有黃芩勿食雞夷有半夏勿食滑芩食飽枳及雞肉有細辛勿食生菜

在耳辛勿食蒜菜及海藻有牡丹勿食半胡荽有商陸勿食牛肉有常山勿食生葱生菜有亞青砂勿食生血物有扶芩勿食醋物有常山勿食苧菜有食門各勿食鯉魚服藥不可多食生胡荽及蒜雜生菜又不可食諸滑物果實等又不可多食肥猪犬肉油膩肥魚鱸膠膠等物通忌見死尸及產婦淹穢事

△雄雞禁服

蛇斑水蛭及蠱虫烏頭附子配天雄野葛水銀并巴豆牛膝慈波與蜈蚣三錢花代醋腐木戟蛇蛇黃雄雞牙硝芒硝非用桂根花牽牛皂角同半夏南星與通草覆麥乾姜桃仁通礪砂乾漆蠟水甲地騰茅根都不中。

△臍脂補瀉溫涼藥

心臓

補用酸枣仁天生黄金銀屑

麥門冬遠志山茱萸花川

瀉用枳實葶藶子參貝母半

夏杏仁鬱金玄胡索前胡

溫用石菖蒲

涼用竹葉丹砂礬石玄明粉牛

黃珍珠麥門冬鬱金黃連

小腸

補壯氣

瀉用海金沙荔枝枝

溫用巴戟小茴

涼用大黃烏藥

肝臓

補用木瓜阿膠川芎黃芪人參

沙參薏苡仁五加皮酸棗

瀉用連草龍膽

吳茱萸青皮芍藥柴胡前胡青

溫用桑皮

涼用豆蔻陳皮檳榔草梔

膽

補用胡黃連草

龍膽木通

瀉膏皮紫

溫胡黃連

涼生薑川芎

脾臟

補人參黃芪茯苓白朮手草

蒼朮陳皮半夏連肉芡實

山查扁豆麥芽滑石山藥

白芍乾姜大腹皮升麻

胡枳

瀉巴豆三棱枳殼赤芍

溫應桑白皮青皮

肉桂肉豆蔻川芎益智仁

附子良姜紅豆蔻

涼黃連滑石山梔羚羊角耳

草白芍連翹升麻澤瀉

胃

粒仙

靈皮

補白朮山藥蓮肉芡實山查

陳皮扁豆麥芽神麩滑石

黃芪半夏

瀉石礞連翹巴豆大

溫黃枳殼芒硝硝石

丁香肉豆蔻白豆蔻草豆

蔻良姜香附生薑木香川

芎藭香厚朴益智仁

涼具莖辛黃胡椒香茹

石燕連翹王芎玄明粉滑

石麥水石白朮石斛第根

黃連黃芩乾葛天花粉升

肺臟

本草綱目

十一

補

人參黃芪阿膠五味子山藥紫苑陳皮白朮

前子百部白朮

瀉

子枳殼通草澤瀉赤茯苓

琥珀冬

溫

陳皮半夏乾姜款冬花生薑白豆蔻肉桂木香杏仁

涼

知母瓜蒌仁桔梗沙參天門冬玄參貝母馬兜鈴

薤白麥冬瓜子麻黃子厚角百部山梔枇杷葉人溺

石羔

大腸

補

藥殼五倍子棕櫚牡蠣木香肉豆蔻龍肉秦訶子龍

骨

瀉

芒硝大黃續隨子枳殼麻仁石斛檳榔子旋覆花樞

實巴豆葱

溫

其茶更人參乾姜肉桂半復桃花石木香石蠟

涼

槐花芽根黃芩黃連天花粉玄參砂礬

腎臟

補

熟地黃枸杞鹿茸鐘乳粉龜板龍骨五味子鎖陽山藥

芡實覆盆子桑螵蛸牡蠣

小兒牛膝當歸玄參石

瀉

若若猪苓琥珀澤瀉茯苓

邪水邪

溫

沉香 兒孫子 附子 訖肉桂 巴戟 蒺藜 巴補 骨脂 柏

涼

知母 黃柏 牡丹皮 地骨皮 玄參 竹瀝

勝

補

橘核 益智 菖蒲 龍骨 續斷 黃芩

濕

車前子 羅麥 滑石 芒硝 澤瀉 薤白 草根

溫

香烏菜

涼

生地 黃防已 地廬子 黃柏 防風 耳草 銷防葵

命門

補

肉蓯蓉 蒺藜 巴戟 沉香 黃芪 肉桂

瀉

烏菜 樹皮

溫

附子 肉桂 臘脂 肺 川芎 補骨脂 沉香

涼

黃連 柴胡 山梔子

三焦

補

人參 黃芪 乾姜 白朮 耳草 益智 仁良 姜

瀉

黃連 黃柏 山梔子 連翹 薄荷 生地 黃芩 門冬 柴胡 枳

梗

木通 龍腦 瀉 脾 猪苓 桑

牛

子 澤瀉 赤茯苓 枳殼 木

通

橫 鄒子 芒硝 大黃 厚朴

溫

附子 油骨脂 當歸 熟地 黃木 香地榆 阿膠 蒲黃

涼

荆芥 防風 地骨皮 柴胡 菊花 石燕

△百病主治藥

中風 卒倒 不語 痰厥 牙皂 細辛 開關 易主

療氣癰盛須用南星木衣為主

語言寒澁須用石落蒲竹葉為主

口眼喎斜須用防風羌活竹瀝為主

手足抽搐須用防風羌活為主

左癱屬血虛須用芍藥為主

右癱屬氣虛須用參朮為主

諸風須用防風羌活為主

偏寒頭痛須用羌活川芎為主

遍身疼痛須用蒼朮羌活為主

發汗須用麻黃桂枝為主

久汗不出須用紫蘇青皮為主

止汗須用桂枝芍藥為主

衣熱須用柴胡為主

裏熱須用黃連黃芩為主

大熱語謔須用黃連黃芩黃柏為主

癰疽大便實須用大黃芒硝為主

自癰腳腫須用石膏知母為主

心下痞悶須用枳實黃連為主

懊憹煩須用梔子豆豉為主

虛煩須用竹葉石膏為主

不眠須用竹茹枳實為主

鼻衄不得眠須用葛根芍藥為主

奔豚須用桂枝茯苓為主

中寒閉經須用附子乾薑為主

中風須用杏葉白芍藥為主

濕心火須用黃連為主

濕肺火須用黃芩為主

濕脾火須用芍藥為主

濕胃火須用石膏為主

濕肝火須用柴胡為主

濕腎火須用知母為主

濕膀胱火須用黃柏為主

濕小腸火須用木通為主

濕曲屈之火須用梔子為主

濕無根之火須用芍藥為主

內傷元氣須用黃芪人參耳草為主

脾胃虛弱 須用白朮 山藥 爲主
消肉 楊梅 須用山查 草果 爲主
消酒 楊梅 須用黃連 乾葛 烏梅 爲主

消食 積 須用神曲 麥蘖 爲主
消冷 積 須用巴豆 爲主
消熱 積 須用大黃 爲主

六驚 須用苦木 香附 爲主
結痰 須用瓜蒂 貝母 知母 爲主
惡痰 須用半夏 夏茯苓 爲主

風痰 須用白附子 南星 爲主
痰在四肢 經絡 須用竹瀝 薑汁 爲主

痰在兩脇 須用白芥子 爲主
老痰 須用海石 爲主
肺熱 咳嗽 須用黃芩 桑白皮 爲主

肺寒 咳嗽 須用麻黃 杏仁 爲主
咳嗽日久 須用款冬花 五味子 爲主

氣喘 須用蘇子 桑白皮 爲主
乾痰 乾嘔 須用常山 爲主

癰疽 久不收口 須用白豆蔻 爲主
癰疽 初起 者 宜用大黃 爲主

裏急後重 欲瀉 須用木香 枳殼 爲主
痢 裏急後重 欲瀉 須用黃連 枳殼 爲主

久痢 白者 爲氣虛 須用白朮 爲主
久痢 赤者 爲血虛 須用當歸 川芎 爲主

泄瀉 須用白朮 茯苓 爲主
水瀉 須用滑石 爲主
久瀉 須用訶子 肉豆蔻 爲主

但藥胡升麻 外提下瀉之藥
其瀉自止

霍亂 須用藿香 半夏 爲主
嘔吐 須用薑汁 半夏 爲主

飲逆 須用柿蒂 爲主
吞酸 須用苦木 神曲 爲主

消積 須用薑炒黃連 炒枳子 爲主

喘氣須用烏菜香附爲主
喘滿須用枳實黃連爲主
腹滿須用大腹皮厚朴爲主
水腫須用猪苓澤瀉爲主
寬中須用砂仁枳殼爲主
積聚須用三棱莪朮爲主
積在左是死血須用桃仁紅花
爲主
積在右是食積須用香附枳實
爲主
積在中是痰飲須用半夏爲主
黃疸須用茵陳爲主
積滿須用黃芩附子爲主
積滿須用當歸熟干爲主
補氣須用黃芪人參爲主
補血須用當歸生地黃爲主
破瘀血須用蟅尾桃仁爲主
提氣須用升麻桔梗爲主
癆熱痰嗽聲嘶須用竹瀝童便
爲主
吳昨血癰用大黃桃仁爲主

人吐血須用當歸川芎爲主
婦人吐血須用枳殼芍藥爲主
吐血須用京墨生艾爲主
溺血須用梔子木通爲主
虛汗須用黃芪白朮爲主
眼華須用川芎天麻爲主
麻者是氣虛須用黃芪人參爲
主
木者是濕痰死血須用蒼朮半

夏桃仁爲主
癰疽心須用當歸爲主
狂風肝須用黃連爲主
癰疽須用前星半夏爲主
健忘須用遠志石菖蒲爲主
怔忡驚悸須用茯神遠志爲主
虛煩須用竹茹爲主
不寐須用酸棗仁爲主
頭左痛須用芍藥爲主
頭右痛須用參朮爲主
頭風痛須用藜朮白芷爲主
諸頭痛須用蔓荆子爲主
烏髮風須用何首烏爲主

耳鳴須用當歸、藜蘆、蒼朮爲主。

鼻衄須用辛夷、杏仁爲主。

口舌生瘡須用黃連、黃芩爲主。

牙痛須用石膏、升麻、黃連爲主。

眼痛須用大黃、刺桐、黃芩爲主。

喉痛須用甘草、黃芩、黃連爲主。

結核須用夏枯草、黃芩爲主。

肺癰須用薏苡仁、黃芩爲主。

心胃痛須用芍藥、耳葉、黃芩爲主。

腹痛須用芍藥、耳葉、黃芩爲主。

腰冷痛須用乳香、沒藥、黃芩爲主。

腰痛須用杜仲、故紙、黃芩爲主。

膝痛須用白芥子、青皮、黃芩爲主。

手臂痛須用薄荷、桂枝、黃芩爲主。

脚氣須用茵陳、黃芩、黃連爲主。

下元虛弱須用牛膝、木瓜、黃芩爲主。

瘰癧須用參、黃芩爲主。

眼痛須用羌活、黃芩爲主。

諸痛在上者屬風須用羌活、桂枝爲主。

諸痛在下者屬濕須用牛膝、木瓜、黃芩爲主。

消渴須用天花粉、黃芩爲主。

生津液須用人參、五味子、麥門冬爲主。

赤白濁須用茯苓、黃芩爲主。

遺精須用龍骨、牡蠣、黃芩爲主。

小便閉須用木通、車前子、黃芩爲主。

太便秘須用大黃、芒硝、黃芩爲主。

便血須用槐花、地榆、黃芩爲主。

痔瘡須用黃連、黃芩爲主。

脫肛須用升麻、柴胡、黃芩爲主。

諸病須用史君子、檳榔、黃芩爲主。

婦人諸病須用香附、黃芩爲主。

婦人腹痛須用吳茱萸、香附、黃芩爲主。

婦人經閉須用桃仁、紅花、黃芩爲主。

婦人血崩須用炒蒲黃、黃芩爲主。

婦人帶下須用妙乾薑爲主
婦人安胎須用條芩白朮爲主
婦人難產須用芒硝爲主
婦人產後惡露不行須用益母
草爲主
婦人產後虛熱須用妙黑龍龜
婦人吐乳須用白芷貝母爲主
婦人乳汁不通須用川山甲爲
主
小兒驚風須用朱砂爲主
癰疽須用金銀花爲主
癰疽須用夏枯草爲主
瘰癧須用貝母爲主
惡瘡須用貝母爲主
疔瘡須用白礬爲主
便毒須用川山甲木別子爲主
魚口瘡須用牛膝川山甲爲主
疳疔須用五倍子爲主
楊梅瘡須用土茯苓爲主
瘰癧須用輕粉黃蠟爲主

杖瘡跌傷須用軍便好酒爲主
疥癩須用白礬硫黃爲主
癰疽須用蜜陀僧爲主
諸瘡腫毒須用連翹牛房子爲
主
破傷風須用南星防風爲主
湯火燙傷須用白礬爲主
大艾瘡須用杏仁甘草爲主
癰疽咬傷須用斑蝥爲主
蛇咬傷須用白芷爲主
中諸毒須用香油灌之爲主
中諸毒須用豆豉炒制爲主
諸骨節痛須用狗涎頻服爲主

本草分類

△治風門

脚湯液風竹生也古
善云風濕腰膝行致
交肩外而入以蠶正氣故
治風氣行氣開表氣又風
入久安熱仁能生痰宜用
祛風化痰藥又熱極生風

表明氣行

防風

已能緩定宜用
清熱潤燥藥

防風氣溫寒性辛通寒諸

節勝濕止汗住筋津○堅潤

者能去濕及又頭又尾其惡

乾姜藜蘆白欬完花畏寒能

殺附子盡得沉瀉藥本治風

得當歸芍藥陽起石

治婦人子藏風寒

獨活治風寒平苦溫諸風痺

痛無久新頭痛齒頰能

盛金瘡痼症及李脈○頭寒

為使微細辛治少肉頭痛

羌活治苦溫更勝前諸風寒

濕手足太陽表裏通○去皮

及腐朽者得用甘浴足太陽

頭

寒

荊芥

荊芥辛溫散諸風寒傷寒

症發汗良除痺散寒專治

血七風血氣是仙方

取花實成穗者日乾用

薄荷

薄荷香寒散發汗清頭目

能皮風純止驚風熱發

蒸消食下氣除

霍亂○去梗

升麻

升麻辛苦氣寒平饒毒除

風治腹疼腸寒初症并解

血瘡腫咽牙熱自清○細削

用細骨色青綠者銜喉散生

得葱白芷石燕之類本治千

足陽明風邪得參木芍藥之

類甚治手足太陽肌肉間熱

細辛

細辛溫熱治傷寒下氣消

痰通節開頭而諸風不

缺調經治癰又祛肝○水

去土及芦葉頭節祛法為使

惡嫩薑山茱萸黃芪畏硝石

滑石反藜蘆忌生藥得當歸

芍藥川芎白芷牡丹皮藥本

甘遂共發婦人得決明鯽魚

肺青羊肝

共療目痛

白芷

白芷辛溫療風邪主頭痛
疾佐密家婦人崩帶溫經
用血滯心腹痛又蒸

麻黃

麻黃其苦性燥溫土中風
邪治不仁傷寒表症及嗽
鳴理瘰癧瘡消斑痕○洗
用身去節水煮三沸去沫止
汗用根厚粉為

藥本

藥本辛溫治風頂面皮
曹一棧功專辟濕通
孟病瘦腹滿胸中○去茂
出宥州者佳惡蘭莖畏青箱
子

紫蘇

紫蘇辛溫能解表下氣寬
胸爽胃少調胃通腸除
蟲子定喘痰瀉微燥○蒸
隨治風寒濕痺及筋子寒痛

脚氣○子畧炒為碎肺氣
喘急痰嗽嘔吐霍亂五瀉破
歌利木小便便丹溪云蘇性輕
浮而氣味辛溫本草言下氣

者散氣也子尤甚肝
胃氣虛霍瀉者禁服

秦艽

秦艽辛苦氣溫平風痺肢
節口勞疼時行寒熱并勞
熱治疽消冷令隨流○羅敷

天麻

天麻辛平治諸風濕痺舒
筋仍益氣治兒驚風通水
血除煩消腫開竅利○堅實
者佳比使多用更以他藥佐
之乃

蔓荊子

蔓荊子味苦其性主筋
骨寒熱寒攻明目堅固

蔓荊子

蔓荊子味苦其性主筋
骨寒熱寒攻明目堅固

關為痛長... 酒蒸一時... 蛇頭石... 蛇頭石...

全牛蒡子

牛蒡子... 目齒咽... 筋骨... 筋骨...

南星

南星... 齒痛... 齒痛... 齒痛...

白附子

白附子... 治風... 治風... 治風...

瓜蒂

瓜蒂... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

全

全... 治風... 治風... 治風...

金

蠶絲

蠶絲辛鹹散痰結中風喉痺瘡破滅腐易消帶下飲

金

蟬退

蟬退辛鹹氣清涼治頭目眩皮風癢婦人產難胞不

金

全蝎

蝎味辛平去風通辛中微鹹小兒驚風最毒先○驚少

金

虎骨

虎骨辛溫祛風理筋骨治風濕癱瘓外腰寒濕內尸

金

牛黃

牛黃甘小毒苦平涼風癰火

金

牛膝

牛膝苦酸氣平疲痺拘攣

金

何首烏

何首烏溫味苦治諸瘡頭面風其精氣與

金

牛膝

牛膝則下行

經方

菊花

菊花味甘平氣平寒諸風濕痺來皆頭目眩胸煩

痛久服能開胃安○九月採花用乾末耳中塞黃花為候間者入茶野菊味苦大

全蜜蒙花

蜜蒙花味甘平寒專去

能可兒脾症眼熱使肝○此益利酒浸一宿候乾加白蜜拌勿蒸

全白蒺藜

白蒺藜苦平氣微涼諸風瘡毒腫其赤頭瘡目

有黑自二種黑者不入藥風家尤散並炒去刺其骨用沙兜蒺藜去壳取子微炒為

使頭為

全青箱子

青箱子苦冷風惡瘡疥痔核三虫瘻諸瘰癧

全草決明

草決明味甘平涼肝

去目翳風寒濕痺瘡瘡地攻○微炒為末○煎此酒飲之其苦平治肝如菜豆大而鈴微炒黃尖為

全巴戟

巴戟辛平氣平溫木風痺面

以星勞可殺元○肉微白如粉者佳鹽水煮去心殺魚子為使○

全木賊

木賊苦平寒發汗益肝明

揭友人前帶經不斷○去龍以水潤濕火上烘用

全五加皮

五加皮苦平溫寒風痺

○逐志為使惡蛇退去參

黃芩

黃芩苦味性寒。治濕熱。除
胃熱。在視堅者。大腸陰熱。
上。行。便。結。下。行。等。常。生。用。中。
藥。更。龍。骨。煎。使。惡。煎。
火。畏。酒。砂。紅。丹。藥。片。

梔子

梔子苦寒。瀉肝火。更。肝。胃。
熱。心。煩。目。赤。癰。腫。身。熱。
黃。止。瀉。通。淋。消。腫。腹。中。紫。小。
七。枝。者。良。用。仁。去。心。胸。熱。用。
及。去。胆。表。熱。尋。常。生。用。厚。大。
童。便。炒。七。次。至。黑。色。

沙參

沙參性寒。甘。苦。味。能。除。表。
熱。與。胃。辛。病。惡。瘡。身。浮。
痺。散。年。後。苦。補。除。氣。○米。
河。浸。酒。煮。已。反。洗。去。鹽。

玄參

玄參苦。鹹。性。寒。微。寒。清。神。氣。
女。無。損。火。寒。身。熱。走。音。
狂。腎。陽。眼。地。頭。排。索。○水。洗。
苦。寒。煎。蒸。或。酒。煮。者。好。應。乾。

丹參

丹參苦寒。治。熱。狂。主。殺。病。結。水。
鳴。鳴。頭。目。腰。脚。諸。痛。胎。
經。痛。帶。下。婦。人。血。虛。方。使。青。
色。藥。相。對。以。薄。荷。有。毛。苗。
數。根。上。亦。大。如。指。長。尺。餘。處。
上。有。之。十。月。林。根。酒。洗。晒。乾。
畏。鹹。水。

前胡

前胡無毒。苦。寒。主。治。時。
行。內。外。熱。下。氣。消。痰。清。頭。
目。安。胎。治。海。痰。癰。結。○水。洗。
刮。去。黑。皮。并。芎。或。用。竹。歷。深。
潤。晒。乾。半。夏。為。使。

桔梗

桔梗苦。辛。提。氣。血。頭。目。鼻。
咽。皆。肺。熱。胸。膈。腹。脹。多。有。
痰。又。定。驚。癇。癰。癰。癰。去。頭。
及。兩。畔。附。枝。米。泔。浸。一。宿。焙。
乾。鋪。皮。為。使。畏。白。芩。龍。眼。乾。
陳。皮。在。藥。遠。志。同。用。藥。忌。怒。

黃芩

黃芩苦味性寒。治濕熱。除
胃熱。在視堅者。大腸陰熱。
上。行。便。結。下。行。等。常。生。用。中。
藥。更。龍。骨。煎。使。惡。煎。
火。畏。酒。砂。紅。丹。藥。片。

與石蒜葱白同用能升氣於
至附之下與硝磺同用能升
至胸中至高之

百部

百部微溫味甘苦辛主除肺
熱氣上逆暴咳久嗽卑煎
蜜殺之代茶又治癆

桑白皮

桑白皮其性寒無毒西
去心酒洗炒或晒乾

山豆根

山豆根其性寒無毒
水消淨滴於勝元氣去肺
●抹中內東行嫩根去青銅
刀刮去薄皮勿令皮上延治
利水生津用蜜炙或炒出
玉者投人續煎桂心
麻方為使忌鐵鹽

青黛

青黛性寒寒收五臟
大花溫肝消痰解毒消瘡
頭瘡水研

黃連

黃連苦寒清心胃目赤口
瘡痛百嗽
瘡胸脅痛熱嘔吐痢熱毒
瘡楊梅瘡痛兒瘡氣酒浸
炒則上行頭目口舌瘡法燒
辛散酒熱有功黃芩能升為
殺惡瘡花芫花玄參乾冬
花勝為頭鮮已且
毒忌猪肉冷水

胡黃連

胡黃連苦性平陽來
咳喘瘡毒瘡瘡頭明目
●外黃肉黑折之塵出蛇
烟者真感菊花
女參忌猪肉

連翹

連翹苦寒散心火解經濕
熱特輕可排膿消腫用酒
酒治血通淋為

葛根

葛根甘平善解肌陽明頭
額痛乃宜區為瘡前酒毒

全

全

全

全

全

石

餅摩風脇痛亦使醫●五月
捺入土深者去皮細洗用

石

解石解并平用氣皮間熱
痛多生癰疽驚長肉莖積

石

抽肉絕虛羸脚膝痠●酒洗
蒸惡癰水石已

石

豆畏姜黃雷丸

石

葛粉其寒主腰膝石餅湯
毒天煩熱利太小便止渴

石

蒸石蒸并辛瀉里熱正渴無
肌頭痛裂更清肺火與三

石

焦散厚寒及中咽●鴉脂
耳聾水腫喉乾或火喉紅凡

石

使切角方解左方解石大者
方大小者如藥皮上有五

石

水青色破皆作捷性燥能去
風熱耳石蒸大如杏仁白坐

石

細理光澤若良莖者令人酥
錫子為使惡莖草巴豆畏鐵

石

香蒿香蒿味辛性微溫清肺火
邪腫苦煩消腫下氣煎止

石

血霍亂調中第一

茵陳蒿

論●去梗姜汁洗●茵陳蒿苦辛微寒主
茵陳蒿熱黃利便難●寒濕瘧

茵陳蒿

頭目痛伏瘕瘕瘕亦能寬●火
未服生細刺焙乾勿令色焦

滑石

滑石耳寒淚濕熱利便難
通臟腑特行積逐瘀下乳

滑石

難●熱身熱多煩渴●白色
者佳餘色有毒研粉或用以

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

滑石

耳草如之石蒸為使惡莖草
耳草如之石蒸為使惡莖草

用者轉去而進赤眼河潮湖其所以用大黃去經酒製而土熱不去也雜用世人更失或生或熟包煎或酒浸或炒黃芩為茵陳無所畏得芍藥黃芩牡蠣細辛茯苓薤白心下排氣得消石藥石

芒硝

芒硝即朴硝再成視燥乾堅一握情傷寒積熱多石下鹽通淋破月經

犀角

犀角為犀酸鹹氣味太冷傷寒禁服狂中風驚癇熱百熱化腰身水治諸毒出武陵交州寧州近海山中牛首猪獸脚有三蹄似象力數千生有紋而得者有自退者無水陸二種惟特犀角長文理斑白有重七八寸者可作器四耳入藥用祐犀角黑色肌鹿紋裂光潤磨塵試毒露之

不濡者真通天犀照百物發

鴉鷂鳥破水尤為難得凡醫治取生角尖末經藥水煮者入氣場所故曰人氣於常

湯藥磨水刺服多用含人項以磨香一字水調服之於胎

為使惡雅雷九比治一切角惡毒●抑論古方治過多

以外服代犀角惟血出於胃則用外處為君代之可也若

出俸臘但可為佐不然犀性走而諸外麻究而性其

性味亦不甚相合也

羚羊角 羚羊角味苦鹹寒主傷

皆能止又消食破積驅毒●

入藥勿令藥用酒浸不折原

對以純糖定到為末勿令犯

風所經細公某兒割人腸

黃藥 黃藥苦鮮五臟熱病痔

附錄下

黃藥 附錄下

癰無非入濕水不處。銅刀
削去粗皮半蜜水浸半日
出炙就再蜜蜜慢火炙之每
兩冬生蜜六錢為度入下
部單酒炒火盛者

金

苦參 苦參氣寒性平能
除心腹熱逐水利道破瘡
疥木風惡瘡與疥疥瘡米
泔浸一宿蒸三時久晒乾少
入湯藥多作丸服治瘡酒
入湯藥多作丸服治瘡酒
入湯藥多作丸服治瘡酒

金

防已 防已苦辛氣赤平善治
脚腫且寒風濕熱寒邪可
利喉嚨瘡瘡用炙炙●出漢
書文如車幅黃實而香者勝
出華則青白鹿收者名不防
已火之但淡去水氣大主風
氣古方亦通用之酒洗去皮
治肺生用雷公以車前根同

金

胡 胡胡苦寒濕三焦在軌行
經脈血調陽寒濕瘡胎產
主水清且退內傷潮●外感
生用肉傷外氣酒炒三遍有
寒子者蜜水炒半夏為使
畏皂莢女苑藥房忌銅鐵

金

草龍膽 草龍膽寒味苦益益肝
膽冷下熱濕止消消通
太腸垂葉骨兒疳癰腫息○
銅刀刮去積其時草木浸○
宿晒歷人酒炒黑貫衆為使
惡防藥

金

通草 通草辛平屬小腸利便故
除肝熱黃出煩滅腫尤乳
敷敷癰破血下乳

金

車前子 車前子味甘鹹寒此為
去皮節生用
車前子味甘鹹寒此為
去皮節生用
車前子味甘鹹寒此為
去皮節生用

金

草蒿 草蒿苦扶熱能平刺

腹金瘡惡毒癰疽可殺○飛燕
子葉並入藥四者俱勿同用
若同成癰疾者更發當秋冬
採子以糞便浸七日

本

川練子 川練子苦寒微毒傷寒

本

地龍 地龍鹹寒治熱風濕絞腸
酒浸蒸軟去皮按腰間諸
腫瘰癧之良更醫腎風注脚

又用酒浸一日取出焙乾凡
製二兩入川椒糯米各一分
同熬令糯米熟去椒米用若
人被其毒以搗湯飲之并洗
洗解

金

青瓊 青瓊鹹寒去熱明目周
疾滿腎鎮心養精

金

橘菴 橘菴在房有之苗似羅麥
有細花青黃色可食味苦氣
平無毒主熱黃五痔及肝五

毒瘡腫眼腫痛並並汗頭
腫此牛利不止以五味調飲
物食之又主浸淫疥癩熱

腫惡瘡疥癩並搗敷之女子
閉飲小兒疳積及心心痛而
青口中沫出飲死者空心服
之其效自下○五

月揀散用乾用

金

海金砂 海金砂味甘平藥毒主

通利小便便得乾子馬牙
頑共療散

宋熱街 凡湯液濕化或也○金

金

治濕門 云氣虛不能運化水

通於風神

人參

又宜調中消導氣除濕
二便榮外濕宜汗散其用
風內其風能濕也夫濕
寒濕最用宜與
治安門通氣
人參其溫補平賦出渴
先利濕痰頭目困心通平
脈安寬定氣輕虛煩不
人參大如細平密身平年
不燥反熱平惡自賊
黃芪黃芪耳油性無毒補益三

金

黃芪

汗生津潤肺助元氣
生用肺虛寒下風濕水
惡龜甲白薛皮畏防風能
制莖送得防風其功愈大
相畏而相
使者也

金

耳草

耳草耳草平生濕火灸之能
可和中解毒養血

金

白茯苓

腎氣通經消腫結白木
苦參為便惡遠志及天
花并遂海藻
忌苾菜猪肉
白茯苓耳平淡濕消痰
潤肺伐腎邪養心神又
調脾臟益氣助血補虛
者須知使氣血利通入
尤助赤茯苓味淡入足
閉手少陽少肉經東垣
義入丙土主破結血結氣
小腸火利小便分米穀閉
者切忌蓋白補而折道也
去鹿皮梓末水飛去赤
晒乾馬刀為使感白飲
及酸錫得中草防風芍
紫石英安門冬共療五
我神能滋風虛感怒驚
悸善忘健補風勞乏
去皮及根畏惡同茯苓

金

茯苓

我神能滋風虛感怒驚
悸善忘健補風勞乏
去皮及根畏惡同茯苓

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

本

藥名 藥效 藥性 藥用

藥效 藥性 藥用

大不堪

青皮

青皮苦寒破滯氣入肝膽

又利脾胃腸胃小腹痛且

枳殼

枳殼微寒味苦酸逐水消

枳實

枳實同下腸腹更消滯決破堅

厚朴

厚朴苦溫除痰濕最散心

射干

射干苦寒消食熱寬胸下

旋覆花

旋覆花鹹平冷烈逐水

大腹皮

大腹皮辛溫無毒消腫

三棱

三棱苦辛平溫消積散

石硝石

射干

射干苦寒消食熱寬胸下

旋覆花

旋覆花鹹平冷烈逐水

大腹皮

大腹皮辛溫無毒消腫

三棱

三棱苦辛平溫消積散

射干

射干苦寒消食熱寬胸下

旋覆花

旋覆花鹹平冷烈逐水

大腹皮

大腹皮辛溫無毒消腫

三棱

三棱苦辛平溫消積散

射干

射干苦寒消食熱寬胸下

旋覆花

旋覆花鹹平冷烈逐水

大腹皮

大腹皮辛溫無毒消腫

三棱

三棱苦辛平溫消積散

本

煮破面過經下乳汁○醋

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

本

煮破面過經下乳汁○醋

藥性論

金

寒食瘰癧尸與蠱毒○狀如
椰膠黃散極臭而能去臭服
半錢安熱銅屑中一宿至爛
泡腹自起銀者真凡使先於
中銼中研粉上於
熱酒毒上表融用

金

粟壳 粟壳殼酸澀赤溫久瀉
痢喉劫其根水氣入腎
治腎痛鴉片性溫須少食

金

猪苓 猪苓淡苦氣平行水消
水瀉去助膜實炒黃色入
用更甚濕熱暴遺精○肉白
而實者佳銅乃削去黑皮微
焙乾

用

金

澤瀉 澤瀉耳餘瀉水瀉止渴泄
善通淋波治諸除痺腎
疥下乳值生赤可求○秋人
而長尾有兩岐者佳去苦酒
浸一宿日乾
畏海蛤文蛤

金

瞿麥 瞿麥氣寒辛苦味利勝死
治諸癰開破血通經逐死
胎出刺排膿除目翳○不用
莖葉只用實壳以竹漚浸丁
時晒乾莖草牡丹
皮為使惡燥煩

金

紫草 紫草苦寒利九竅腫痛卒
淋俱可療蕩腹心邪治傷
寒痘疹而皺為最妙○去頭
鬚以黃蠟溶化投水用蠟水
蒸之或
酒洗

金

木瓜 木瓜酸溫消腫痺最為霍
亂與脾氣止渴消痰和服
心入肝養腎為脾肺○出單
別者佳忌錫鉄以細力削去
皮去用黃牛乳汁
拌蒸三時日乾

金

赤小豆 赤小豆耳酸性平腹腫
脚氣無寒寒止吐瀉與
卒下血消渴癰疽者
有情○入藥炒用

百合

百合其平醫百食消腹脹
瘰癧心腫肺痿客熱過身

花白者佳按日乾○

葶藶

葶藶大寒平苦味善消水
腫酒肺氣更醫腎癰破脾

積毒祛風治疔瘡○隔紙

炒香或蒸熟榆皮為使思乾

牽牛子

牽牛子苦寒利腹腸走
脾腎治脚腫或下氣能

破痰利腸瀉毒○不

○黑白二種白屬金黑屬水

其寒感南方熱火之氣而生

故性烈而善走也局方多用

黑者水洩夫浮者取沉者咽

乾酒洗蒸三時炒熟去灰

每斤取頭末四兩生者去灰

治水腫以為牛屎浸治風氣

積滯以童便浸得青

木香乾姜山茱萸良

大戟

大戟苦寒有毒消十二
水腫寬胸腹破癰逐邪通經

孕忌風散腫辟瘰癧○細

莖或微炒赤小豆為使惡山

葦畏蘆草開胃及光花

海藻毒用菖蒲煎之

海遂苦寒善攻失消水腫

留又破癰腫及毒熱皮赤

肉白作連珠尖重者熱炒雷

公用并草湯芥花汁同浸三

日東流水洗淨焙乾蒸飲其

相激而力尤勝也○常

為使惡遠志及耳草

羌花

羌花苦寒消水腫軟逆保
鳴瘰癧氣瘰心腹腰脚腫且

疾破積殺虫拔毛孔○醋炒

不可近眼來明傷便反耳草

商陸商陸酸平氣亦平直取五

兩水有神天無飲則邪身瘰

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧○銅片

胡夫皮薄切東流水洗三

商陸

商陸酸平氣亦平直取五

兩水有神天無飲則邪身瘰

瘰癧瘰癧瘰癧瘰癧○銅片

胡夫皮薄切東流水洗三

取肉和菜豆同煮平日去豆
入藥或燉有赤白二種白者
傳入居天內得大蒜良

續隨子

續隨子苦油有毒利水
宜配効最速消痰破積
還藥破通經鮮血利腸
川蓋者良去壳研以紙包用
油煎去

琥珀

琥珀苦平脂化咸利水通
去明目治眼迷赤爛如平
也以前布麻然拾得者真
用先以水調和子仁末安
確內次入琥珀於末中煮
易久別有異光見

楮實

楮實苦寒治腫水明目補
氣壯陽痿皮汗生坐癢癰
瘡葉莖風疹可煎洗○入藥
水沉去滓者去皮酒浸蒸

日焙

燈心草

燈心草并寒無毒清心
利水通淋煎燒火眼癰
止兒啼破積

蓮子

蓮子無毒并平味澁補
神補中氣止渴止痢治腰
寒遇熱須先去苦意○

龍眼

龍眼味甘平無毒能醒
心養神智平腫非從此
安除濕利

治燥門

即湯液燥降收也古
蓋血虛生熱亡生燥是也
宜用鮮熟生津藥及滋血
潤燥藥夫燥熱苦燥
陽宜與治熱門通有

天門冬

天門冬苦寒潤肺滅火
消痰定喘氣肺痿肺癰

天

湯沒去皮心脂熱煎常風寒

力地黃貝母爲使長節背

麥門冬

麥門冬其氣微寒清肺

腎痿屢消穀調中治嘔乾

知母

知母苦寒潤心肺補腎

斑熱利小腸消腫潰去皮

貝母

貝母苦辛平散鬱降火消

風淋症疔腹心腹實○姜汁

泡去心雷公同厚火炮黃夫

延和糯米炒黃熟去米用其

括撲根

括撲根苦寒益津能流

通月水解毒挑膜逐寒陳

天花粉

天花粉無毒沉也閉也

痼熱時疾諸身煩躁太熱

狂退黃疸身而黃唇乾口

積絕傷通月水下乳江小

鵬滴毒腫痛甘痔漏瘡乳

瘰癧膿消腫饒生血長肉

瘰癧撲拍瘰癧血本草云瘰

枯撲突

枯撲突苦辛潤肺消痰

治嗽

治嗽實胸痺止血止痢

補虛勞使手而歌通經閉塞
楚清者鮮熟中饌入衰腐陰
藥氣○十月採黃老矣取去
炒去盡去油用指肥為使惡
乾姜提牛膝乾淡反烏頭
地骨皮○地骨皮苦寒無毒入腎
惟此妙表風肌痺或感濕熱
全州者佳去骨水能刮去粗
皮焙乾
呂鐵

地骨皮

壯丹皮○壯丹皮寒濕火伏養
之骨蒸又補神志之不足
有子種白者補赤者利
州和州宜州山中草葉紅花
者佳二十月採根如能停大
者以銅力剪去骨附乾酒洗
蒸三時日乾用畏免綠子是
藥今人家移枝接者名子葉
杜丹
不用

壯丹皮

五味子

五味子溫燥腎損陰虛
止渴補虛任欬肺通肺
定喘咳利中消積水腫治肺
火盛者用南味辛甘且散風
邪侵○從蓉為使

烏梅

烏梅酸平能欬肺止渴除
煩下痰氣調胃和中斷逆
痢虛勞蒸熱及偏痺白瘰癧
癭仍代瘻或燒雞蘇煎黑瘻
○入藥酒或
水洗蒸去核用

枇杷葉

枇杷葉苦平無毒清肺
止渴止痰促肺氣尤速○
胸面瘡辛恒下氣効尤速○
四月採每葉重一兩者以粗
布拭去毛淨甘草湯洗丁過
被乾酥炙其毛射入瓶含咳
不可

馬兜鈴子

馬兜鈴子寒而苦肺
熱咳嗽癰無數欬逆

連上聖卧難重痛更醫至純
蟲根時各為青木香利肺止
痛無不愈○公家藥閣
取向重子去草膜微炒

金款冬花

款冬花味辛甘止勞
心驚悸洗肝明目咽乾
花半開者良去枝土其草水
浸一宿阴乾杏仁為使惡皂
莢消石玄參畏貝母辛夷麻

黃黃芪黃芩黃連
青相子得紫苑
紫苑苦溫能潤肺消痰紫
血定喘悸客熱胸膈氣能
消積腹治癰并勞症○去芦
蜜水浸一宿焙乾款冬花為
殺惡天雄羅麥雷

金紫苑

紫苑苦溫能潤肺消痰紫
血定喘悸客熱胸膈氣能
消積腹治癰并勞症○去芦
蜜水浸一宿焙乾款冬花為
殺惡天雄羅麥雷

九遠志畏茵陳
同膠其溫保肺氣勞喘損
嗽及久病積重治癰立效
難養肝安胎腰膝墜○可膠
真者難得字用黃明牛膠但

金阿膠

同膠其溫保肺氣勞喘損
嗽及久病積重治癰立效
難養肝安胎腰膝墜○可膠
真者難得字用黃明牛膠但

生皮膠製不如法自製其為
發九煎時必用鹿角一片不
爾則不成也凡使先於猪鬃
內浸一宿取出剉碎以時粉
燒成珠山茶為使

此大黃得火良
消梨勒阿梨勒溫通肺津潤
消痰嗽喘積熱胃弱神
六棧黑色肉厚者良水泡乾
包煨熟去核或酒
浸蒸去核焙乾

金詞梨勒

消梨勒阿梨勒溫通肺津潤
消痰嗽喘積熱胃弱神
六棧黑色肉厚者良水泡乾
包煨熟去核或酒
浸蒸去核焙乾

竹瀝半寒最滋潤出為馬
汗除煩心口瘡目痛殺肺
產中風痰

金竹瀝

竹瀝半寒最滋潤出為馬
汗除煩心口瘡目痛殺肺
產中風痰

金菖蒲

菖蒲氣溫味辛苦除煩下
氣出音語明目聰耳定頭
風伸痺通心五臟神○生石
潤一十九節不露根者佳早
月臘月採附乾去毛秦尤為
使惡濕黃忌鉅糖羊肉飲器

瘡天聲首
瘡天聲首

瘡天聲首

卷之六

遠志遠志苦溫益腎精補中高
志定心驚利通氣除痰

從苗時用生止癆藥。○先用

耳聾黑豆水煮去骨後用姜汁炒乾

雄耐毒得茯苓子良

酸枣仁 平止煩渴引血

及濟寧公金華金華

難多生用不得睡炒乾每茶

半日去皮光礮

生地黄 零年未換

清肺胃 調解養肝

生味者木寒且辛以散之

乾者微溫
洪者微寒

損津液之脉虛血熱者用姜

江打劫免致沉溺痰得門冬

鐵器令消腎白濁男婦赤白

又損衛又合，雖損食則能化。

...

一、此乃

鳥譜



熟地黃

腎精。療傷寒後。

脛肢痛除新產罷廢諸疾○

懷慶者佳水洗用生地搗汁

十俱經畏忌國生地

當歸耳辛頭步血破血用

尾和用身隨所用上頭

磨及氣逆金磨治產人更慎神

○肥潤不枯燥者佳。治以酒

浸治外酒洗血衣酒蒸痰用

補忘錄云川產有力

可致秦產者，力柔可摧。

川芎辛溫行血氣止頭痛

五淋病更難治

蕪治老風又主欬逆反蠱症

○川產歌地重實色白者良

— 10 —

金

清黃 清黃無毒味耳平止血用

去濕腸止瀉又止精脫寒熱
炒黃芩半日焙乾用補血
止血消女子崩中帶下不止
止崩血血暈血尿血腸風下血
隨胎血產後諸血病並治
脫胎瀉腸止瀉止遺精生利
破血消腫去心腹諸結利
小便通解脈厥瘀血婦人月
候不勻血氣心脹

金

栝實 栝實耳聾平頭心滋腎與

水安腰膝利膀胱中冷腹
瀉止諸血養脾健肺補真用
○去泥取仁微炒去油牡蛎
肉桂爲使畏菊花羊蹄諸石
麋麋凡採葉隨月建方以取
得月令之氣也去泥糯米河
濕七日炒填塞
上者不可用

金

槐突 槐突苦酸鹹氣寒濕熱腸

風痔痢寬腸五內邪清頭
目疳瘡疳積胎產難皮去牙
痛根喉痺枝治風痿
崩帶突○微炒用

金

槐花 槐花苦平清肺腸腸風痔

痢最爲良心痛服末俱炒
用絞取黃消皮層蜜膠化風
延濕口瘡口瘡頑瘡
與銀傷○微炒用

金

桃仁 桃仁無毒苦耳平破血通

利月經通除痰定心胸
疏病癰腫痛殺五精花脫頸
色醫淋腫散散氣血肺心清
○凡使湯泡去皮
火煨末研如泥用

金

杏仁 杏仁有毒苦平潤肺止

嗽及奇服消食治癰通氣
開祛風發汗出聲音○九枚
湯泡去皮尖炒黃色去油
有火有沈有童便浸三日又
燒金烟未盡研如泥攤果粉

女子用史浪取明惡黃芽黃
蕊葛根長葉草解胡粉得
得火良變仁者衣人可殺拘

全 郁李仁

郁李仁味甘苦酸平微毒
通利狗屎主牙風腫且其
九使濕沒去皮失半
蜜浸一宿研如膏用

全 胡麻

胡麻味甘平潤平臟治瀉風
積調肺鎮心壓寒高○九使
湯淘去浮者酒煮半日乾乾
食去粗皮微炒服食家九蒸
九晒蜜丸脫名靜
神九餘下切癩疾

全 麻仁

麻仁味甘平潤腸能破積血
下乳救脈停花性大同却有
毒食久令人見鬼精○凡使
以布包泔湯中浸渴冷取出
垂汗中干衣勿令著水次
日乾乾前毛上攤去水用

全 葵子

葵子甘寒滑小腸能生下
乳乳窮瘡癰根主瘡淋鮮椒
毒藥堪作茶其

全 藕木

藕木平鹹平去毒風藥血
解氣凝聚通經產後是毒
冊瘡癰下痢與嘔吐●去皮
節細切和梅枝煮半日開乾用

全 紅藍花

紅藍花辛溫散血脂死
產輩口瘡結毒治諸風
及瘡癰少用搗血東垣說其
作餅順功又花小兒耳聾耳
可●

全 茜根

茜根苦寒清心肺逐瘀止
血及崩帶是黃消瘰癧膠
瘡中蠱積此稱爲最○銅
乃到燒勿犯銀金畏用姑

全 荊根

荊根無毒性平不寒不熱止
渴血治淋瀝消陰客熱腎煩
渴去瘡血出用花安針毫力
龍穿瘡孔爛者止血傳瘡斑

全 龍穿

龍穿瘡孔爛者止血傳瘡斑

荒蔚子

荳蔻子味辛溫行血

止損痛女萎桐仙覽返鳳莖

傳諸者可無痕

馬鞭草

馬鞭草，味苦辛，活血，利女人通經，破瘀。

清膨脹男子
閉囊腫可伸

卷之五

乾漆血

年深積治卑止咳及心

●九使

蜜蠟

養年溫煉去黃止血益

● 蠟燭

香軟經酒醋煮燒便黃赤

代赭石(煅)

代齋石

血精又善止鎮肝健脾

赤紅青色如鷄冠有澤上之

有知浮漚丁者謂之丁頭

粉木飛用乾姜爲使吳附子

凡
 爰
 凡

髮苦溫極補用止血止

●不

對剪、垂、燕、或、自己、髮、或、無、病、

用水洗淨入礮內燒存性止

或入梓葉虎

扶石丹

雲陽洞補洞燧還元

無不洽。豕肉

天灵盖

凡使領軍門軌賊持之

聚頂服之及害不如以虎頭骨及黃犬頭骨代之紅

方士好用此入神藥以爲勝
於神且犯不條罪禍其測其
使男者色白女者色赤陽人
反多是一休時待睡氣盡以
指香煎湯洗過除
灸黃或燒黑研用

人胞衣

男用男胞女用女胞再
人亦可男用男胞女用女胞
動筋膜去草屑以行器盛於
流水中浸一刻以取生肉用
尾端盛放木碗內或鍋內亦
可自外至內蒸爛如糊取出
於石臼內同諸藥爲丸一法
洗淨用酒半碗花柳少許同
入砂鍋內口上用紙糊搜火
烘乾重一兩半者佳爲去入
藥此藥不宜久留恐服之令
膜內生虫也●產後胞衣不
地中七八年化為清水者味

金桃

即桃之當用處方圓六寸

金核

即桃之當用處方圓六寸

辛無毒主小兒疳毒天行熱
病寒熱不歇妄語狂言頭
上無毒發立辟瘴等疾
病用男女病用男根搗碎
水調服●經衣內試經水亦
也燒灰爲末敷脫後傷酒
下主痔瘻入腹用功易病
核仁味甘平微寒無毒主心
氣益氣明目消目腫皆爛
痒赤痛瘻出鼻膿鼻蛾凡
去壳取仁湯泡去皮尖每
兩用芒硝一兩水通七兩
煮一伏時取仁研膏作餅
入菜紙內煎熟如風濕者
良夫後用紙壓去油以花
椒煎滾汁調成膏塗患處
上用新艾燒爛熏七次然後
取洗於天上煨之按油起
以竹篾拭去直待潤色爲

土

柳子

即取乾後地上以去水毒

隨宜入片屑等煎取其効

髮正血虛莫如吐逆毒黑

煮汁服之●先可為酒調如

酒中有毒則酒毒亦在內

益氣虎中發飲之得脫生

血消渴水腫去風熱宜生

驗厚丹溪云屬土而有未生

海外極熱之地土人賴此

以無夏月喝湯多食動氣

以無夏月喝湯多食動氣

附子

附子辛平熱無毒虛寒風

疾霍亂嘔逆速飲逆厥冷服

平圓大重一兩以上者力全

用黑豆煎水浸五日夜去皮

尖并臍切作兩片以姜煮色

夾外又用麝包灰火中煨熟

如外黃內白烈性尚存須薄

切炒令表裏皆黃用童便

煮而浸之以助下行俗方每

用附子皆須并草人參生薑

相配者王制其毒故也惟古

姜附湯生用之地勝為使學

藥數畏防風黑豆耳

草人參黃芪烏雞

烏川烏賊精除寒熱心腹脹

間冷氣結肩脾諸痺目赤

疾消胸痞滯三吏效烏雞

主閉黃瘰能消腫腫壓筋

●畏而有寒者化製同附子

遠志為使反半要瓜蒌貝西

白薇白芨原

藥芝忌飲汁

雄天雄均散寒濕上厥頭

風而風邪息則子專治偏痺

風瘡癰腫切可立●九使

炮去皮底煎湯煮和皮生

天

雄

雄天雄均散寒濕上厥頭

風而風邪息則子專治偏痺

風瘡癰腫切可立●九使

炮去皮底煎湯煮和皮生

藥芝忌飲汁

雄天雄均散寒濕上厥頭

用赤佳遠志爲使

生薑

生薑散主傷寒與客頭

痛厥逆安入脾開胃止痰
云留血行氣到心開
之性本寒也去皮則熱
而熟去之皮則守中而
耳故又有言曰姜有皮
生美代乾姜者以其不
也●秦椒虛使君貴其
天胤厚枝辛夏厚朴其
桂枝辛平熱且浮飲
桂善治上焦熱不
行肢節滯積行看骨
末●凡使君到去
肉桂辛熱補腎臟
桂又止汗利肝肺
寒溫中破積除
色紫而厚者佳

宋集

桂枝

桂枝辛平熱且浮飲

肉桂

肉桂辛熱補腎臟

官桂

官桂無毒治中寒飲逆

桂心

桂心治九種心痛及中

乾姜

乾姜生用能散邪利

腎又生血產後湖熱
○章便燒黑止負血
血崩漏與補用茶同
而茶入氣分生血治
熱及產後不熱丹溪云

龍涎散元氣壯火金氣故也
頭生耳草錢之畏惡同生藥
造乾姜法取生者水浸三
日去皮置流水中三日更去
皮曬乾曬碎瓮中三日內紫
色乃成蜀地者佳○白芨膠
蜀姜去皮水經醃者色白味
極辣治肺胃寒邪功多○乾
生薑萬留皮白乾
荏菹脾胃寒濕
高良姜 高良姜辛苦木溫心經
宿食化脾氣除痺亦堪
論○剉碎麻油拌炒
白豆蔻 白豆蔻味辛太溫上焦
氣冷補選元散肺中
逐寒驅邪消積
止胃逆○去皮用
草豆蔻 草豆蔻辛氣又油心胃
寒痛嘔逆下氣溫中
除霍亂善治飲食不消
起包煨熟去麩用布公以茶

肉豆蔻

黃同煨紙黃黑去黃取
豆蔻皮并子拌用之
肉豆蔻 肉豆蔻辛溫補中下氣
消痰開胃胸膈亂心腹
多膨痛定腸冬瀉有奇功
油色肥實肉白者佳用湯調
糯米粉或醋調麩包灰火中
煨黃熟取出以紙提去油淨
勿令
乾銅

縮砂

砂 縮砂辛溫暖脾胃助食和
中兵瀉吐瀉腸脾腎赤豚
耶去咳無肺行肺氣
暖火炒金香熟剉去皮取仁
搗碎用與檀香豆蔻為使則
入肺與人參益智為使則入
脾與黃柏茯苓為使則入腎
與赤石脂為使則入大小腸

益智

益智 益智辛溫療胃熱和胃止
瀉養神補氣三
焦安○去皮用

胡椒

開毛孔，脫之，不宿食，平。

胡椒，利腸胃，去胃寒，消食，化。痛，性熱，和臟，忌食，辛，熱，性，平。

蜀椒

蜀椒，辛，熱，散，風，寒，齒，目，痛。

結，其，陽，結，便，通，下，關，乃，名，椒。

○九，使，夫，目，及，閉，口，者，油，拌。

濕，蒸，兩，時，又，取，出，入，膏，煎，乾。

入，竹，筒，中，以，杵，杵，去，附，紅，黃。

韭子

花，雄，黃，附，子，防，風，冬。

主，陽，衰，精，冷，遺，泄，白，濁，後。

白芥子

腰，膝，壯，陽，道，入，菜，椒，炒。

胸，膈，上，番，覺，痰，生，服，外。

西皮黃，腫，毒，諸，瘡，調，得。

合，其，不，及，自，首，力，大。

桑葚

桑，葚，辛，平，氣，赤，平，熱，中，消。

血，下，氣，多，痰，反，滿，榮，子，吐，風。

痰，竟，留，股，倒，壁，推，搗，不，順。

情，○入，丸，散，器，炒，研，用。

艾葉

艾，葉，苦，溫，最，熱，中，霍，亂，腹。

氣，崩，漏，安，胎，履，子，宮，生，汁，此。

痢，荒，中，蝦，尖，主，杜，陽，明，肝，膽。

○臨，告，日，已，未，出，時，不，語，致。

月，乾，陳，久，者，良，衍，義，用，艾，搗。

檳榔

檳，榔，辛，苦，善，調，中，下，氣，陰。

瘴，癘，前，脚，氣，與，諸，風，○刀，刺。

去，底，細，切，急，治，生，用，經，火，則。

無，功，緩，治，畢。

妙，皮，醋，煮，過。

常山

常山 辛苦 除寒熱 逐水 消痰 老弱 辟人 惡氣 凡使 用 定色 黃形 如 雞骨 者 佳 生 或 燒 或 醋 浸 煮 熟 則 善 但 症 而不 吐 畏 辛 札 忌 茶 菜 葱

草

草 果 辛 溫 溫 胃 消 痰 止 嘔 吐 酸 味 益 氣 久 能 消 氣 驅 蟲 母 果 積 真 難 實 〇 夫 肉 外 危 取 行 或 用 起 畏 根 煎 〇

女

胡 索 玄 胡 索 味 苦 辛 溫 理 氣 淋 露 止 破 血 導 瘀 產 婦 好 〇 酒 磨 或 煮 服 煎 煮 亦 好

五

頭 脂 五 頭 脂 治 氣 刺 出 血 內 能 行 血 脈 善 治 產 後 血 昏 迷 腸 風 冷 痺 及 疥 疥 〇 內 北 地 色 黑 如 鐵 生 用 者 酒 洗 搗 去 砂 石 熱 用 者 能 後 炒 金 烟 起 是 所

金

鬱 金 鬱 金 辛 苦 寒 無 毒 治 心 痛 醋 磨 服 涼 心 止 血 破 血 凝 金 瘡 用 之 即 生 肉 〇 出 蜀 地 色 赤 似 姜 黃 中 空 如 蟬 肚 者 佳 火 先 燒 或 醋 煮

姜

黃 姜 黃 氣 烈 似 鬱 金 治 冷 氣 脹 痛 腹 心 破 血 積 能 通 經 水 退 風 熱 消 腫

巴

豆 巴 豆 木 重 味 辛 熱 主 湯 胃 中 空 積 結 氣 血 凝 食 水 癖 消 更 通 月 水 非 膿 血 〇 惟 急 治 通 水 較 道 生 用 去 心 膜 紙 挑 去 油 膜 治 潰 堅 磨 積 水 疳 疳 火 或 燒 烟 盡 色 黑 研 用 可 以 通 腸 以 止 瀉 世 所 不 知 處 方 公 說 也

鬼

絲 子 鬼 絲 子 辛 平 補 腎 安 胎 遺 精 夢 泄 脚 腫 調 心 勝 止 口 渴 乾 咽 目 去 積 健 脾 胃 〇 水 淘 洗 去 沙 土 晒 乾 擇 去 子 酒 浸 二 三 日 蒸 出 芽 炒 用

常山

如膏為丸或作餅貼入
亦好緊急只用酒燒研末

補骨脂

補骨脂辛太溫燥傷
便溺腰風虛弱神志可驚

雷公云性太燥酒浸一宿
出用米浸三宿蒸三時又見

乾緊急煨炒止濕殺地補腎
用蘇子仁炒惡草忌羊丹

茴香

茴香無毒味辛平助陽開
胃止痛寒冷疝脚氣生雷

亂諸瘧惡癰藥更寒●九使
酒浸一宿取出焙黃已為碎

胡荽

胡荽辛熱治疔冷面疔
腹脇膨如能勝脫疔痛

腎虛寒疝疔消痰力
最猛●酒洗微炒用

吳茱萸

吳茱萸辛熱毒小治心
腹冷痛如絞疝痺腸風

脚氣攻霍亂欬逆咽乾食
寒性同療水瀉預熱差大

土過然後用鹽水或黃連水
炮炙定為使忌丹參
硝石白堊畏紫石英

山茱萸

山茱萸酸微溫補腎
強陰固精元去頭面風

除病殺逐濕調經益肝氣●
酒浸去核每一斤取皮肉四

兩浸火焙乾枝能撥精故去
之●寒實為使惡

杜仲

杜仲辛平溫無毒腎虛風
冷背腰痠脚弱陰痿小便

遺強志堅筋指自足●削去
粗皮酥蜜塗炙或姜汁塗

久以碎煎為度
惡蛇蟲太翁

續斷

續斷苦辛溫性陽止精能
食腰膝強正血調經安胎

產破赤消瘀破折傷●出川
中皮藥嗽肺已斷有烟塵起

者佳酒浸焙地
黃為使惡雷九

全

車辭

水背脾疼悶痿失弱白濁

疾風痺惡瘡多怒情●出川

煇乾意欲爲使畏葵

根大黃藥胡牡蠣

菜
心腸及食消食寶

寧諸氣諸風諸瘴●嶺南

而香軟可食但天食出者佳

得土產者亦好去皮心異

碎補骨碎補 溫無毒 破

血風下，虛齒痛耳鳴促。

生相右上五月拔銀鈔刀

氣溫無毒主風痺癰瘡

石
腎
脈
節
骨
痿
緩
鳴
宿
火

血脈通暢中消產孕婦服

色或然熱可變諸風

...

翼伏翼中子無毒主兒驚

淋常服延壽無憂等●先試

去肉上毛及頭肚背脚然後

用酒浸下渣取出以黃精白

范寔雲寔爲使

月步。又名天鼠屎。無毒。小兒。

用石無辜瘳熱藥爲末拌飯

寒治瘧暑治血未赤誦服

面癰皮膏洗洗時痛腹中

氣破寒熱積聚除驚悸五逆

石 礪石而寒能吸鐵起毒則

楊最核消癰除頑效●能

吸針屢連三四者佳

之且又服之有大惠藥謂爲

使惡牡丹莖，草畏黃石脂，救

毒，缺

100

全陽起石

陽起石，鹹溫，無毒，治男

腰內痛，正崩漏下，煨子宮。

歌如：熟牙色白，明煨者佳。

螺蛳，爲使，感澤，瀉，蘭桂，兩

九蛇，畏，畏，蛇，絲，方，忌，平，四

合歡

花，上，半，白，下，半，肉，紅，散，武

互，相，交，錯，每，一，風，來，輒，以，解

了，不，相，牽，纏，對，之，皆，迷，使，人

不，忘，其，美，至，夜，而，合，故，又，謂

之，或，合，花，味，平，無，毒，主，安，五

臟，利，心，志，耐，風，寒，金，人，歡，樂

無，憂，久，服，輕，身，明，目，并，漢，云

合，歡，爲，主，而，有，水，銀，金，補，用

之，有，捷，功，也，熱，治，癰，疽，疥，瘡

●皮，主，肺，癰，唾，嗽，心，胸，甲，錯

又能，殺，蟲，續，筋，骨，南，膏

消，腫，膿，血，汁，可，洗，衣，垢

耳，松，香，味，耳，通，無，毒，主，冷，氣，卒

心，腹，痛，聚，滿，下，氣，煎，治

而，黑，風，痺，高，腰，野，鶴，藥，用，金

諸，香，得，白，芷，附，子，良，●又有

三，奈，性，味，類，同，入，諸

香，藥，料，鮮，入，丸，散

覆，盆，子，性，微，熱，陰，痿，腎，虛，精

氣，竭，補，肝，明，目，治，肺，黑

婦，人，宜，子，須，槌，破，●公，家

水，洗，去，皮，蒂，酒，煮，日，乾

△治，瘡，門，古，巷，云，瘡，屬，肺，風，毒

氣，活，血，其，內，服，藥，已，足

前，五，門，下，此，多，贅，其，外，散

菜，而，已，又有，各，門，載，不，盡

者，亦，附

金銀花

金銀花，即，忍，冬，草，其，溫

寒，熱，瘧，疾，血，崩，漏，風

可，搗，●去，梗，開，水

夏，枯，草，更，枯，草，味，苦，辛，寒，風，濕

同治寒瘧

全

全

全

全

除脚氣能消濕熱又滋肝

●四月採附乾王八爲使
山慈菰 山慈菰是鬼燈紫花附

金縷羅地生瘡腫癰疽
瘰癧枝毒消萬病藥也
四月初宅地採之選則常潤
極與老鴉蒜相類但綠無毛
慈菰上有毛包裹真割去皮
焙乾又一種闊慈菰
根似小蒜生油同

松脂 松脂苦平油無毒風寒惡

肺生津固齒明平自火熱潤心
者佳用河水煮化投冷火內
含兩人舂投肝變而煮如此
三次再煎酒煮三次仍前舂
投以白如脂糖爲度則膏氣
用挑柳桑槐芙蓉葉煎水煮
投凡用入石臼內另搗爲末
不可晒焙亦不可單服筆尖

楓香脂 楓香脂味苦無毒藥珍

非霍亂又云浮腫可跳行法
其油熱燥張血投更類用
相停○大根子味其性熱主
病風癰疔瘡癬疥更多服藥
藥傷出入左某去死結
槌去油外調瘡藥常油

白芨 白芨苦辛平無毒藥道疥

癰裂皮肉平胃風毒瘰癧不
我補肺止血治打撲○水洗
紫石英爲使應石
畏辛枝杏仁及烏頭
白欬自欬無苦若手平欬諸瘡

五倍子 五倍子平酸苦味治肺

風毒濕癬瘡癰腫牙疳
并痔瘡頑痰熱湯可煎服
蜀中者佳去更湯藥用左
某黑使使使使至細起以漆

赤石脂之再煉至烟煖用青布包以脚踏利壓乾爲末

全

赤石脂

赤石脂手酸且溫生肌

治口瘡無瘰因腸胃又

治精血下胎衣爲入心藥白

者詳味俱相投青黃腸食

膽論○九使色理肝臟熱

者其火服通赤散急細研水

飛三次服乾應木黃提乾花

青礞石食積滯藏腑小兒疳積

婦人癰攻刺腹心作癰黃○

入藥泥固濟確內

火煨下月調散

蛇床子明瘰及遍身疥瘡壯

金有子治癰通關逐瘀濕○

入煎湯生用入丸散用布包

後去炭壳取淨仁微

燒應壯丹巴豆見母

伏龍肝伏龍肝味氣辛溫消瘰

散腫離生肌止諸血下

歌逆氣時疫胎產水調吞○

雷公云是十年已來紅額內

火氣自熱結積如赤色石中

貴有八棱九使火煨水乾兩

過令乾自陶隱居以爲牛心

共其美雷之說有理當獲之

錯下墨錯下墨即釜底煤金瘡

生肌止血來此紅血

惡心痛婦人難產亦能催百

草霜治熱毒瘡消

預止瀉亦非說

龍骨龍骨味辛平無毒飲口專

治消渴內癰止精血汗安

志藥濕除瘰醫則腰商攻結

氣及頭癰消治癰堅癰瘰風

○九使得香開作白地錦文

然之者古者佳青白者火黑

若下火煨細研或酒煮乾

用吳石法理石乾漆別搗

人參牛黃良柳輪流煮藥

去脫固胎而又破癰堅也

蒸黃機肺癰而味辛熱血附

如輕投仕將判服氣藥又飲
石門愈津菜能通山菜更亦
豆之類猶之天門冬寒而梳
厚朴總而減此其性之付
以藥而用者得之

金

烏賊骨

烏賊骨為厥骨溫藥能止瀉發更

心腹疼痛更消滯瀉通
經破癰食生兒肉味鹹平
氣立○九使水煮一附久金
黃去皮細研水飛日乾惡白
飯白炭

金

蝦蟆

蝦蟆朱芎藭有毒癰腫立

傷生搗又搗骨打撲癰腫乃
是蟻之精源瘡疥癰癩疥連
○九使搗牛白灰車行者去
皮凡腸肺用乾酥炙或酒炙
去骨或
燒灰用

金

鯢鱉甲

鯢鱉甲得寒有毒氣癰

血衝心又治驚邪多啼哭○
水洗細剉蚌粉

金

蜈蚣

蜈蚣有毒能攻毒氣味辛

溫我厚面消積破癰隨胎
產口瘡牙痛保嬰童○姜汁
炙去頭尾為末無用細然盛
施服酒火上

金

蕪荑

蕪荑無香味辛平寒風治

疥癩心冷氣痛堪場陳久
者良小者附藥菜仁止甚為
醫及治諸病入藥實用大有
契按黃得詞

金

雷丸

雷丸無味苦冷微毒逐皮熱

病久服傷用男女同○出淫
明白苦焦赤者枝入醋炙地

黃礬石用生家煎過如藥
生肉藥皮黑礬石又名黑礬
石及染精髮藥用之紅礬石
石礬石綠色煨之則色赤今
亦特見

丹砂

丹砂微寒耳無毒發風流
肝諸香息肉寒心頭更清
肝氣通五臟眼目由原
明光明華微大者如鴉子小
者如石榴子諸藥紫礬石綠
色礬石之作脂鹽雲母片始
細研木炭灰碗內鋪紙滾乾
用礬石
畏鹹水

乳香

乳香辛溫善止諸瘡諸風
瘡及風中消腫止痛定痛
乳補腎催生俱通用○紫赤
如櫻桃者上楓香松脂多可
混之燒之乃辨真偽入丸散
微炒投毒得不粘或搗碎結
包布下眼一宿另研一法用

時以絹袋掛於窓隙間更久
取其研之乃不粘又薰陸香亦
其類也

沒藥

沒藥苦平療瘡癰瘰癧血上
瘡最爲奇腹心筋骨疼痛
風產後金瘡也相

麒麟竭

麒麟竭味辛鹹平飲口
除血暈女血帶下用之更
除內紅外紫黑能消用諸
陽精●九使末微鹹牛作乾
子氣消之不爛如爛者佳
鹹者作腥氣者毒○紫另研
得安能

龍腦

龍腦羊溫百藥先香透腎
腦及頂竅下痺發瘡目眉
翳清心解熱散風涎●散似
白粉腦作抄木氣明○水若
梅花瓣者佳●龍腦又通成片

或如雀屎者，大然非常服之。
某藥注則藥體他時有切，
於茶最相宜。入茶另研，
含隨水飲之，則不化。

金磨香

磨香，辛溫，無毒，藥能攻風，
痛，胎產痛，驚風，發熱，心
痛，宜子目另研，隨用，真者發
變，固中，久
果不寒。

金輕粉

輕粉，辛平，冷，自，水銀，赤，風
毒，外，傳，誤，更，塗，濕，酒，蜂
刺，同，一，種，殺，更，毒，治，癰，腫，人
●入藥，用，湯，煮，五，度，如，麻，脾
慢，火，焙，乾，長，磁，石，石，黃，忌，一
切，血，者，以，其
本，自，冊，砂，也。

金鉛粉

鉛粉，有毒，味，辛，寒，惡，毒，瘡，癰，
臭，水，能，乾，消，積，殺，蟲，止，瀉，
痢，破，赤，腫，胎，亦，可，搗，治，瘡，可，
用，葛，龍，膽，油，十，粉，四，滴，成，丸。

蜜陀僧

●九候，落，熱，燥，金，色，
麥，制，硫，黃，可，為，外，癰，
蜜陀僧，藥，性，寒，平，乳，調，
蜜，面，及，麻，形，似，臭，金，瘡，
皆，外，癰，痔，漏，可，服，細，細，生，
此，藥，前，錄，鐵，皮，堅，重，碎，之，如，
金，色，者，佳，外，傳，生，用，內，服，亦，
服，黃，色，
細，研。

石灰

石灰，石，反，通，辛，風，化，良，藥，生，
肌，不，入，湯，煮，殺，痔，與，黑，黑，
子，產，婦，泡，水，洗，除，胎，●九候，
鹽，藥，肉，生，用，新，可，止，血，妙，紅，
色，雷，公，用，醋，浸，一，宿，火，煅，金，
羅，鐵，氣，出，
存，性，研，細。

金蘇合香

蘇合香，辛，溫，無毒，除，花，
去，惡，殺，三，更，霍，亂，惡，瘧，
并，癰，疽，癰，腐，
中，義，與，中，風。

安息香

安息香，平，辛，苦，味，去，瘡，
毒，諸，惡，氣，燒，灰，海，桐。

金

經受更短心腹
尾腫疾●消漫確
細皮無毒苦平痔腫速
阻反腰疼共血寬腸除宿
積開胃進食補下脘●九使
諸病者良藥脚指大入藥燒
死或先黃或燒黑或水煮傷
入湯先畏枯梗安門冬得治
良藥可煮年金之石法耳治
藥肉可五味淹食治同皮惟
膏食之金

人瘦少
木盤 木盤耳溫療折傷消腫生
肌愈惡瘡而利孔避腰強
痛洗痔腫痢逆及脫
●太元經到熱炒

金

百草灰 燥生日抹落承之丁百
種開乾燒灰以井花水
為丸重燒令白以爾極為餅
膜下按之乾即易當抽一
痛悶瘡出即止以小便洗之
不過三度膜具自無又主金

金

疥耳石 本草不載研方治眼以
之為君●輕白如羊脂
不炙石者俱用砂礮一盞丁
蓋於炭火中煨令通赤以重
便或黃連水淘之再煨至
冷九次細研水飛過用

陸香 出天竺國樹生於砂中
陸夏樹液流出狀如香
膠質白色合香藥要藥微溫
療惡瘡及風水毒腫去腐氣
中惡邪氣伏尸治齒頭痛不
可忍圖經云治腎氣補腰膝
瘰癧乳治血生

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

金

薺 製同乳香
出川蜀江湖洲生苗莖全
似入參而葉小異根似桔
梗粗無心為異故又名土桔
梗根耳空無毒主殺蠱毒諸
百藥無治熱狂淫疾用石金
鉤封釘腫毒毒箭蛇咬人

仙

遺報

又云玉狀茶味耳羊

家收為果或蒸作羹
食之利肺氣和耳目
無非善也
大病楊梅瘡
漏及胃誤服輕粉肢麻癢
筋骨疼痛者能収其毒而祛
其風補其虛若物起熱便
秘者不宜母常老弱亦可服
之健筋骨得
川椒皂角良

捷徑醫家卷之一終

六曲之內

