

金匱玉函要略輯義

四



无外邪内饮。填塞肺中。为痰为喘。为欬。而上气。越婢汤散邪之力多。而溺饮之力少。故以半夏。輔其未逮。不用小青龍者。以脉浮且大。病属阳热。故利辛寒。不利辛热也。目如脱状者。目睛脱突。如欲脱落之状。壅气使然也。
是為咳逆也。邪氣與正氣相搏。正氣不得宣通。但逆上喉咽之間。邪伏則氣靜。邪動則氣奔上。煩悶欲絕。故謂之咳逆上氣也。

越婢加半夏湯

麻黃

六兩○外臺

石膏

半斤

生薑

三兩

金匱要略卷二

四三

金匱要略卷二

大棗

十五枚

甘草

二兩○外
臺有炙字

半夏

半升○外
臺有洗字

右六味以水六升。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。分溫三服。

肺脹欬而上氣。煩躁而喘。脈浮者。心下有水。小青龍加石膏

湯主之。

原註千金證治同。外更加脇下痛。引缺盆。○案今千金缺盆下更有若有實者必躁。其人常倚伏。十一字。

外臺引仲景傷寒論與本文同

尤此亦外邪內飲相搏之證。而兼煩躁。則挾有熱邪。麻桂藥中必用石膏。如大青龍之例也。又此條見證與上條頗同。而心下寒欬。則非溫藥不能開而去之。故不用越婢加半夏。而用小青龍加石膏。溫寒並進。水熱俱捐。於法尤爲

小青龍加石膏湯

麻黃

二兩

芍藥

二兩

細辛

甘草

乾薑

二兩

五味子

半升

石膏

二兩

右六味以水一斗。先煮麻黃去上沫。內諸藥煮取三升。強

人服一升。羸者減之。日三服。小兒服四合。

外臺引仲景傷寒論與本文同

千金

麻黃湯

治肺

脹欬上氣

咽燥

脈浮

心下有

水氣

按本方內

去甘草乾薑

用生薑

外臺古今

經

論決

雪湯

療上氣

不得息

卧喉中如水雞

肺氣欲絕方。

於小青龍方內去芍藥甘草。投枳則臥。一名投枳麻。

黃湯。

附方

外臺炙甘草湯治肺痿涎唾多。心中溫溫液液者。原註方見虛勞

中○案外臺引仲景傷寒論列于甘草乾薑湯之後云並出第八卷中

沉溫溫液液即泛泛惡心之意也。徐肺痿證概屬津枯熱燥。此方乃桂枝湯去芍藥加參地阿膠麻仁麥冬也。不愈於去熱而以生津潤燥為主。蓋虛回而津生。津生而熱自化也。至桂枝乃熱劑而不嫌暖者。桂枝得甘草。

正所以行其熱也。

千金甘草湯

案此方本出下時熱而千金主痿與外臺炙甘草湯藥同但重多下有出血二字千金異多溫

湯

甘草

案此方本出下時熱而千金主痿與外臺炙甘草湯藥同但重多下有出血二字千金異多溫

右一味

以水三升煮減半令溫三服

徐肺痿之熱

由於虛則不可直攻故以生甘草之甘寒

頻頻呷之

熱自漸化也余嘗謂病此初時涎沫成碗服

過半月

痰少而愈但最難壞三四日內脾無捷效耳

外臺引真

肺痿時寒熱兩頻赤氣方童子小

便每日

晚取之去初末少許小便可有五合取上好

金匱要略卷二

金匱要略卷二

甘草量病人中指節。男左女右。長短截之。炙令熟。破作四片。內小便中。置於罔淨處。露一宿。器上橫一小刀。明日平旦去甘草。頓服之。每日一劑。其童子勿令喫五辛。

千金生薑甘草湯治肺痿欬唾涎沫不止咽燥而渴。外臺云

下

生薑 五兩

人參 三兩

甘草 四兩

大棗 十五枚

右四味以水七升。煮取三升。分溫三服。外臺引藥驗云仲景傷寒論備

急荒千金經心錄同

述即炙甘草湯之變方也。甘草人參大棗扶脾胃而生

津液以生薑辛潤宣行滯氣俾胃中津液既灌於肺則

渴渴而止不致肺熱葉焦為治肺痿之良法也。徐亦非

一二劑可以期功。

千金桂枝去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

桂枝

生薑 各三兩

甘草 二兩

大棗 十五枚

皂莢 二兩炙去尖子炙焦 千金方二兩

右五味以水七升。微火煮取三升。分溫三服。千金方

既用桂枝湯嫌芍藥酸收故去之。加皂莢利通竅。不

令通液壅遏肺氣而致喘痿。桂枝和調營衛津營衛宜

令通液壅遏肺氣而致喘痿。桂枝和調營衛津營衛宜

令通液壅遏肺氣而致喘痿。桂枝和調營衛津營衛宜

行則肺氣振而涎沫止矣。徐此治肺痿中之有壅閉者。故加皂莢以行桂甘薑棗之勢。此方必畧兼上氣不得減者。互之。

外臺桔梗白散。治欬而胸滿。振寒脈數。咽乾不渴。時出濁唾腥臭。久久吐膿。如米粥者。為肺癰。

外臺引仲景傷寒論作梗米粥云出第十

八卷

桔梗

貝母各三分

巴豆

一分去皮熬研如脂

右三味為散。強人飲服半錢匕。羸者減之。病在膈上者。吐膿血。膈下者。瀉出。若下多不止。飲冷水一杯則定。徐此即前桔梗湯證也。然此以貝母巴豆易去甘草。則

迅利極矣。蓋此等證危在呼吸。以危急遺禍。不可勝數。故雖見人強或證危正當。以此急救之。不得嫌其峻。坐以待斃也。況以桔梗開提肺氣。貝母清熱而化痰涎。巴豆破猛熱。劑急破其膿。膿下出。尤似示以毒攻毒之意。然非病盛氣實。非峻藥不能為功者。不可僥倖一試也。是在審其形之肥瘠。與病之緩急。而善其用焉。

千金葶藶湯。治咳有微熱。煩滿。胸中甲錯。是為肺癰。千金

葶藶二升

薏苡仁半升

桃仁五十

風雞半升

古四味

以水一斗。先煮葶藶得五升。去滓。內諸藥。煮取

二升服一升再服當吐如膿千金作服一升當有所見吐膿血

魏肺癰欲成未成之際。開治當早者也。葦小蘆大一物也。葦莖與蘆根同性。清熱利水。解渴除煩。佐以薏苡仁。下氣寬中。挑仁潤肺滑腸。瓜瓣亦潤燥清熱之品。再服當吐如膿。可見爲癰雖結而膿未成。所以可治也。較之葶藶大棗湯。皂莢丸。皆得預治之治。仲景所謂始萌可救者。尤此方具下熱散結通瘀之力。而重不傷峻。緩不傷解。可以補桔梗湯。栝梗白散二方之偏。亦良法也。

葉樓氏綱目云。葦莖卽汀洲間蘆荻之粗種也。葦卽

蘆。詳見于泥括補筆說。魏註爲是。聖惠方作青葦。因

用葦莖。聖惠方作甜瓜子。太平御覽引吳普本

軍氏甜瓜子也。聖氏本經連原云甜瓜子。卽甜瓜瓣

爲陽胃內癰。聖氏千金治肺癰有葶藶湯。肺癰有大

黃牡丹湯。于雲用之。然必黃熟味甜者。方不傷胃。是

也。而本草爲云。諸方惟用冬瓜子。不見用甘瓜子

者。若氏續略改用甜瓜瓣。並不可悉也。

凡葶藶湯。藥香蒸肺。藥煩燥。不宜食。葶藶飲子方。

葶藶散。聖門冬。地骨白皮。各十。生薑。干

右六味切。以水二斗。煮取八升。絞去滓。分溫五服。服別

相去八九里。晝三服。夜二服。覆取汗。忌酢物。未好差更作。若數服。其人或胸中寒。或直惡寒。及虛脹并痛者。加吳茱萸八兩。○案此亦用蘆根。而治肺痿。可見癰痿雖虛實不同。然至熱鬱津枯。則一也。故附此以備攷。

肺癰胸滿脹。一身面目浮腫。鼻塞涕出。不聞香臭。酸辛。欬逆上氣。喘鳴迫塞。葶藶大棗瀉肺湯主之。

原註方見上三日一劑可至三四劑

此方與小青龍湯一劑乃通小青龍方見欬嗽門中。○千金肺下有喘氣無痰辛二字。外臺與本文同。唯肺下有脇字。千金外臺此條接于前瀉肺湯條。案方見上三字。衍自三日一劑。至乃通二十字。千金之文。而外臺引千金。無此二十字。方後云仲景傷寒論范汪則誤經亦載此條。明是仲景舊文。今列于附方之後。若必使人編次之誤也。程氏金鑑揭為原文。謂此三十二字為是。此觀也。

程華在肺則肺脹滿。肺朝百脈。而主皮毛。肺病則一身面目浮腫也。肺開竅於鼻。肺氣壅滯。則竅門不開。但清涕滲出。而濁膿稠塞於鼻。肺之間故不開。香臭酸辛也。以其氣逆於上焦。則有喘鳴迫塞之證。與葶藶大棗湯以瀉肺。經是邪外寒皮毛內壅肺氣。凡之喘不得臥。殆尤甚焉。亦以葶藶大棗瀉肺湯者。因其腹未成故也。

○葶藶大棗瀉肺證治第八

論二首 方三首

師曰。病有本標。有吐衄有驚悸。有火邪。此四部病皆從驚發。得之。師曰。本標。病從少腹起。上衝咽喉。發作欲死。復還止。皆金匱要略卷二

從驚恐得之

程篇目止有奔豚一體而吐腹驚怕火邪皆簡脫必有缺
文經曰太陽傷寒者加溫針必驚也若鍼處被寒核起而
赤者必作奔豚發汗後臍下悸者欲作奔豚故奔豚病從
驚發而得尤吐腹有欬與嘔之別其從驚得之旨未詳驚
悸即驚恐蓋病從驚得而驚氣即為病氣也火邪見後驚
悸即及傷寒太陽篇云太陽病以火熯之不得汗其人必
躁到經不解必渴血名為火邪然未嘗云從驚發也驚悸
篇云火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之
此示是因火邪而發驚非因驚而發火邪也即後奔豚證

治三條亦不必定從驚恐而得蓋是證有雜病傷寒之異
從驚恐得者雜病也從發汗及燒針被寒者傷寒也其吐
腹又知二病仲康必則有別結胸之以候知者前云驚發
從寒者恐者腎傷於寒而奔豚為腎病也然水畜也腎水
藏也腎氣內動上衝咽喉如豚之突故名奔豚亦有從肝
而得者以腎肝同處下焦而其氣並善上逆也蓋張從政
曰驚者為自不知也恐者為自知也

後漢云夫奔豚氣者腎之積氣起於驚恐憂思所生若
驚恐則傷神心藏神也憂思則傷腎腎藏志也神志傷
動氣積於腎而氣下上逆走如豚之奔故名奔豚其氣

衆心若心中踴踴如車所驚如人所恐五藏不定食飲
振嘔氣滿胸中狂癡不定妄言妄見此驚恐實脈之狀
若氣滿支心心下悶亂不欲聞人聲休作有時乍瘥乍
振或短氣手足厥逆內煩結痛溫溫欲嘔此憂思奔
豚之狀於其脈來觸視觸視者外無病實脈也

柔靈邪氣藏府病形篇云沉厥奔豚足不收不得前後
蓋本篇所論卽是也而難經名腎積爲奔豚然與此自
別故楊玄操註難經云又有奔豚之氣非此積病也名
曰而病異可以見耳後世有奔豚病氣之稱見于和劑
卽卽內經所謂衝疝出子骨疝病而爲奔豚氣者張氏

醫說云以腎氣奔衝爲奔豚謂脈能奔逸而不能速也
此解得之況難云狀如江豚此說本于丹溪心法決不
可從

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

徐氏乃奔馳之氣與在表之外邪相當者也故狀如奔馳
而氣上衝胸雖未至咽喉亦如驚發之奔馳矣但兼腹痛
是客邪有在腹也且往來寒熱是客邪有在半表裏也沉
寒爲奔豚解寒裏風熱而清奔馳逆上之邪黃芩能清
風熱之熱半夏以和脾胃而化客痰七桂苓爲奔豚主藥

而不用者。病由腎發也。

本脈湯方 外臺引其驗主

甘草

芍藥

當歸

各二

半夏

四兩

黃芩

二

生薑

五兩

芍藥

二兩

生薑

四兩

甘草

李根白皮

一升

右九味。以水二斗。煮取五升。溫服一升。日三。夜一服。

案本草別錄云。李根皮。大寒無毒。治消渴。止心煩逆奔。脈氣。知是李根皮。乃本方之主藥。

外臺小品。奔豚湯。療虛勞五藏氣乏損。遊氣歸上。上走時。若群。此相逐。續續。時氣來。便自如。坐驚夢精。光竭不。澤。陰。瘡。上。引。少。腹。急。痛。面。乍。熱。赤。色。喜。怒。無。常。耳。聾。目。

此無病也

於本方內。去芍藥。加桂心。人參。

又醫。奔豚。氣。在。心。中。或。或。經。氣。不。欲。聞。人。語。驚。心。下。煩。亂。不。安。發。作。有。時。四。肢。煩。疼。手。足。逆。冷。

於本方內。去芍藥。加桂心。人參。生薑。芍藥。生薑。加桂心。

又。奔。豚。氣。在。心。中。或。或。經。氣。不。欲。聞。人。語。驚。心。下。煩。亂。不。安。發。作。有。時。四。肢。煩。疼。手。足。逆。冷。

海。氣。實。走。衝。胸。膈。發。作。氣。欬。絕。不。識。人。氣。力。羸。瘦。少。腹。起。腸。鳴。如。飢。子。走。上。走。下。馳。狂。馳。來。寒。熱。拘。引。陰。器。手。

足。逆。冷。或。煩。熱。甚。

足。逆。冷。或。煩。熱。甚。

於本方內去黃芩芍藥加茯苓人參

又療實耗氣從下上者湯方

於本方內去甘草芍藥當歸加人參桂心

又小品實耗氣手足逆冷胸滿氣促從臍左右起鬱

冒者

於本方內去當歸芍藥半夏生薑加桂心拈接人參

又壯蠲實耗湯療實耗氣從少腹起懣胸手足逆冷

牡蠣_{三兩} 桂心_{八兩} 李根白皮_{一斤} 甘草_{三兩}

右四味切以水一斗煮取李根皮得七升去滓內餘藥

煮取三升分服五合日三夜再

治人參桂湯治氣上衝在心端

於本方內去芍藥生薑加茯苓桂枝

發汗後喘汗令其汗針處發寒熱起而赤者必發實脈氣從

少腹上至心尖其積上各一針與桂枝加桂湯主之

脈喘針即滿針也說針氣汗亦汗法也鍼處宜當避寒若

不知避外候寒氣入勝脈中血不流行所以有結核腫滿

之患也失溫針氣汗其決亦為迅烈矣既針而當不殺行

作解必其人素寒陰盛也故雖有溫針之火但發核未又

變寒從故不但不解反召陰邪而加針之時心既驚應所

以腎水陰邪得上凌心陽而發奔豚也奔豚者腎水陰邪之氣從少腹上衝於心若豚之奔也先冬按上各一壯者外發其寒邪續與桂枝加桂湯者內伐其腎邪也魏冬後與桂枝加桂湯主之意取升陽散邪固衛補中所以為汗從感寒陽衰陰寒之奔豚立法也與前條心動氣短氣結熱聚之奔豚源流大別也

桂枝加桂湯方

桂枝 五兩

芍藥 三兩

甘草 二兩

生薑 三兩

大棗 十二枚

右五味以水七升。後火煮取三升。去滓。溫服一升。

此方乃治奔豚之聖藥也。蓋天逆陽而陰自平也。陰氣更加。陽陰邪止。故在一味中加合兩。不於芍藥外求也。水不即不離之妙如此。此方後世甘草大棗湯證已。在裏而奔豚未發。此證尚在表。而奔豚已發。故有芍藥。芍藥下時。若欲作實。則大棗甘草大棗湯主之。此方中

用湯燒曰汗。水心之液。發汗而解。下則陰虛。心氣虛而腎氣動也。經行後。下則陰虛。陽氣虛。而腎邪上逆也。謂下為腎氣發源之地。是為水以伐腎邪。桂枝行陽以散逆。甘草大棗湯助脾土以制腎水。煎用甘瀾水者。婦之

生薑湯

生薑湯

無力全無水性取其不助腎邪也。經欲作奔豚者有似奔豚之狀而時作未作也。

炙甘草桂枝甘草大棗湯方

炙甘草 半斤 甘草 二兩 大棗 十二枚 桂枝 四兩

右四味以甘爛水一斗先煮大棗減二升內諸藥煮取三升去滓溫服一升日三服 甘爛水法取水二斗置大盆

內以杓揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之甘爛水法原文

為細於今藥湯寒論大齊論徐氏金鑑作爛

徐仲景新證每合數條以盡其變言奔豚由於驚又言其從少腹衝至咽喉又言其兼腹痛而往來寒熱又言其兼

按起而無他病又言汗後胸下悸欲作奔豚而未成者其淺深雖異用和解用伐腎用桂不用桂酌治機妙奔豚二證病因證治無復制義而不會仲景立方之意則岐黃與

用藥則異矣豈古方不宣於今哉

附後治年歷述主氣氣走而歸心下痛滿痞澀欲絕此

附事脈証與年歷述主氣氣走而歸心下痛滿痞澀欲絕此

附事脈証與年歷述主氣氣走而歸心下痛滿痞澀欲絕此

附事脈証與年歷述主氣氣走而歸心下痛滿痞澀欲絕此

金匱要略卷二

論傷寒濕熱

治大氣上奔胸膈中諸病發時迫滿短氣不得臥劇
若便閉欲死腹中冷濕氣腸鳴相逐成結氣用桂五兩
甘草三兩此藥應與藥并服氣在胸心迫滿
聖惠方治奔豚氣上下衝走悶亂面青宜服此方

甘李根皮 三兩 生薑 二兩 吳茱萸 一兩

右諸細羅爲散每服一錢水一中盞煎至六分去滓熱

服藥以上三方各取之要藥品味

又方 續斷 三枚 生薑汁 半合

右以童子小便一大盞微過入前藥二味攪令勻分爲

三服如人行五六里進一服須臾下利爲效此方外臺

○神丹心氣痛氣弱脈證治第九

論一首 證一首 方十首

經曰夫脈當以大過不及陽脈陰脈即胸痺而痛所以然者
貴其振也今陽虛和在上焦所以胸痺心痛者以其陰弦

脈脈太過則病不及其病故脈當以大過不及而候病也
陽微寸口脈微也陽得陰脈爲陽不足上焦陽虛也陰弦
尺中脈弦也陰得陰脈爲陰太過下焦陰實也凡陰實之
邪皆得以上乘陽虛之物所以胸痺心痛胸痺之病輕

金匱要略卷二

論傷寒濕熱

金匱要略卷之六

雜病篇

若即今之胸滿重者即今之胸滿也李延曰內經云胃脈平者不可見太過不及則病見矣寸脈為陽以候上焦正應胸中郭分若陽脈不及而微則為陽虛主病上焦故受病胸痺又脈太過而弦則為陰盛知在下焦故上逆而為痛也尤陽主開陰主閉陽虛而陰干之即胸痺而痛痺者閉也

素靈本藏篇云肺大則多飲善病胸痺喉痺逆氣泉源云胸痺之候胸中幅幅如滿噎塞不利昌昌如痒喉裏麻痺深甚者心裏強否急痛肌肉苦痺故急如刺不得伸仰胸前皮皆痛手不能把胸滿短氣欬唾引痛項間

白汗出或微汗者其脈滑而微者是也不治數日殺人三因作胸痺

平人無寒熱短氣不足以息者實也

平明本

平人者無寒熱之人也無寒熱無新邪也而仍短氣不足以息當是裏氣暴實或痰或食或飲停其升降之氣而然也短氣有從實虛兩處而更若有從新邪來者而得者二端此否其為實無疑此審因察病之法也雖平人無病之人也無寒熱無新邪也下人無病而有短氣不足以息之症不可實其虛也此病邪在胸中痺而不得通暢呼吸喘實正實也李延曰上節云實其虛虛此又云實何也經

金匱要略卷之六

雜病篇

云邪之所聚其氣必虛留而不去其病爲實是也

明理論云短氣者呼吸雖數而不能相續似喘不搖肩似呻吟而無痛者是也

肺痿之病喘息欬唾胸背痛短氣寸口脈沈而遲關上小緊數者棗葉白白酒湯主之

經內經曰肺痺者煩滿喘而嘔心煩者脈不通煩則心下數暴上氣而喘胸中若心肺之令故作喘息欬唾也諸陽受氣於胸而轉行於背氣逆不行則胸背爲痛而氣爲短也寸脈沉遲關脈小緊皆寒客上焦之脈數字誤

案元云遲字下當有一若字蓋此論當以寸口脈沉而

遲爲虛寒之證關上小緊數皆寒客白白酒湯爲寒實之証另作一節解否則豈有遲數二脈同見之理哉此說似有理然不如經之爲誤文之義長矣

張氏醫通云寸口脈沉遲者陽氣衰微也關上小緊者胃以上有寒寒結聚所以胸中喘息欬唾胸背痛而短氣此肺痿也導以桑白皮之痰癰白真糖用以通絡湯之藥則痰癰水也白酒熱飲之痰也白上通於胸中使痰癰方上行無而下車痰癰不吐及數脈其意蓋與經同

栝樓薤白白酒湯方

栝樓薤白白酒湯方

此藥能治諸虛百損
補氣血壯精神

此藥實地 藥白 半升 白酒 七升

右三味同煮取二升。分溫再服。
案藥白本草。辛苦溫。別錄云。溫中散結氣。杜雨庭詩云。
衰年關隔冷。味暖併無憂。可見其以辛溫而散胸膈中
之結氣也。白酒註家無解。似指爲酒之白者。然靈經筋
篇以白酒和桂云云。且飲美酒。由此觀之。白酒非常酒。
千金方。用白蘘漿一斗。外臺亦引仲景傷寒論載本條
云。結胸證。白白酒湯主之。而方中則用白蘘酒。程敬通
云。蘘音再。昨葉也。知白酒卽是昨葉。今用米醋極驗。
千金括接湯主療與本文同。

括接實 一錢 半夏 半升 藥白 一升 枳實 二兩

右五味以水一斗。煮取四升。服一升。日二仲。
案此後不用生薑。枳實半夏。千金方。
附錄不得臥。心驚。煩。皆苦。括接藥白。半夏湯主之。千金方。
或實白。或白。

此藥不特能走脾胃。上而不下也。心痛。微背。是心氣寒。
而不下也。生薑。爲尤甚。所以然者。有痰飲。以爲之援也。
故於胸膈藥中。加半夏。以逐痰飲。
漢代醫通云。心驚。煩。皆苦。胸中痰。結。積。滯。微。而。微。於。

金匱要略卷二
七

背脊者肺之府故於前藥但加半夏以祛痰積之痺逆

也

桂枝湯白半夏湯方

桂枝黃一作桂 芍藥 白三兩 半夏半升 白酒一斗
外臺作

白芍藥去心

右四味同煮取四升溫服一升日三服

聖惠方治胸痺不得臥心痛徹背方

蘇一作桂 桂心三分 半夏一兩湯洗七通去滑

右件藥搗碎為散每服三錢以漿水一中盞入蘇白七

葉生薑半分煎至六分去滓稍熱頓服

何遜心中寒氣氣動在胸膈下逆捨心枳實白桂枝湯主之

何遜自是陽微陰盛矣心中寒氣氣結在胸主胸痺之

病狀也再建陽下之氣候逆而捨心則逆氣未氣俱寒陰

寒之邪動而上逆胸膈之陽氣全虧支推矣故用枳實

白桂枝湯行陽開鬱溫中降氣漸必先從黃芩以散其

氣味性溫緩事除其結聚之邪也再或虛寒已甚無敢忘

其間故用枳實人參湯亦主之以溫補其陽使逆氣旺而邪

氣自消又治胸痺從本治之一法也

張氏醫通云二湯一以治胸中實痰外溢用薤白桂枝

韓伯堂解

以解散之一以治胸中虛痰內結即用人參理中以清
理之一為二治因人素稟而施而不移易之法也
葉千金治中滿胸痹方別標為一條外臺亦引仲景傷
寒論要胸痹理中湯即並人參湯方後註云張仲景曰
胸痹心中痞堅留氣結於胸胸滿脇下逆氣噎心理中
湯亦主之而引范汪出枳實薤白桂枝湯方名枳實湯
方後云此本仲景傷寒論方

枳實薤白桂枝湯方

枳實四枚 厚朴四兩 薤白半斤 桂枝一兩

法據實

古玉味以水五升先煮枳實厚朴取二升去滓內諸藥若
乾沸分溫三服仲景用厚朴

人參 甘草 乾薑 白朮 各三

古時或以水八升煮取三升溫服一升日三服

經此即理中湯也中氣強則痞氣散胸滿能消氣能
平人參白朮所以益脾甘草乾薑所以溫胃脾胃得其和
則止熱之氣開發而胸痹亦愈

胸痹胸中氣塞短氣此為杏仁甘草湯主之橘枳薑湯亦主

金匱要略

華佗

之

經胸痹胸中急滿胸痺之重者也胸中氣塞胸痺之輕者也經腹中為氣之海痺在胸中則氣塞短氣也神農經曰夜夢主胸脇逆氣杏仁主下氣甘草主寒熱邪氣為治胸痺之輕劑

茯苓杏仁甘草湯方千金名茯苓湯外臺引千金方後六仲景傷寒論同

茯苓 三兩 杏仁 五十枚 甘草 一兩

右三味以水一斗煮取五升溫服一升日三服不差更服外臺古今錄驗療氣急發滿胸急方

於本方中去甘草加栝皮

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮 一斤 枳實 三兩 生薑 半斤

右三味以水五升煮取二升分溫再服

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

栝皮枳實生薑湯方千金無方外臺

此方治心下堅痞緩急方

此方治心下堅痞緩急方

氣聚則寒邪散寒邪散則痛緩此胸痹之所以有緩急者
亦心痛去來之義也意或仁以除痺下氣大附子以溫中
散寒程李趙曰緩急者或緩而痛暫止或急而痛復作也
意或仁入脾利氣附子溫中行陽為散服則其效更速矣
案緩急之緩或謂緩字之訛此說似是而非外臺載
胸痹心下堅痞緩急方四首聖惠亦同故知程李之解
是也

意或人附子散方

意或仁十五 大附子十枚

右二味拌為散服方寸匕日三服

案外臺引古今錄驗載意或人散三方初一方用意或
人五百枚甘草三兩後一方與本方同唯用意或人一
千五百枚云此方此皆深悉注同仲景方用意或人十
五兩

聖惠方意或人散治胸痹心下堅痞緩急
意或人二兩 附子二兩 甘草一兩

右藥篩為散每服三錢以水一中盞入生薑半分煎至
六分去滓用熱酒服之

心中痞滿連心懸痛按之生薑枳實湯主之
下重者下之心

金匱要略卷二

此方治心下堅痞緩急方

經心中痞。即胸痺也。諸逆。如腸下逆。搶心之類。邪氣獨留於上。則心懸痛。枳實以泄痞。桂枝以下逆。生薑以散氣。无諸逆。誤發欬。客氣而言。心懸痛。謂如懸物動搖而痛。逆氣使然也。經心懸而空痛。如室中懸物動搖而痛也。用桂枝生薑枳實湯。通陽氣。破逆氣。痛止痞開矣。

潘氏續論云。懸者懸閤之義。不在胃。而懸留於腹脇間也。

桂枝生薑枳實湯方

外臺載仲景傷寒論心下懸痛諸逆大虛者桂枝生薑枳實湯方同

桂枝

生薑

各三

枳實

不投○徐氏云桂枝作兩小臺有反字

右三味以水六升。煮取三升。分溫三服。

千金經心三物湯治心下懸諸逆懸痛

經心二

膠結

生薑二

若藥以水四升。煮二味。取三升。去滓。內枳。分三服。

心痛微背脊痛。心下硬。赤石脂圓主之。

經心下硬者。胸有條止之時。故以枳實散白白酒如半夏。

則為陰寒。即其浸透乎陽。先試燒肝。白白酒之所能治。

也。故以烏頭赤石脂圓主之。方中烏頭微薑一派大辛大。

熱。則無他。解暖透陰邪而已。李超曰。心痛在內。而微背。則

內而透於外矣。背痛在外。而微心。則外而入於內矣。故既

金匱要略卷之六

心下懸痛

治諸虛百損
補氣血
益精神

補氣血
益精神
壯筋骨

有附子之溫而復用烏頭之迅佐乾薑行陽大散其寒佐
蜀椒下氣大開其鬱恐過於大散大開故復佐赤石脂入
心以固澁而收陽氣也

赤石脂丸方外臺引附子湯寒濕云千金

蜀椒一兩一分 烏頭一分 附子半兩炮一法

乾薑一兩一分 赤石脂一兩一分 外臺作二分

右五味末之蜜丸如梧子大先食服一九日三服不知稍

加服千金云烏頭用烏頭六錢附子蜀椒各半兩

外臺云此方行陽有隱士出山云得華佗法若久心痛

每旦服三丸稍加至十丸盡一劑遂終身不發

心痛先治九種心痛外臺引千金云附子丸

附子二兩一分 生薑一兩一分 外臺作二分

已至一兩一分 人參一兩一分 乾薑一兩一分 吳茱萸

右六味末之煉蜜丸如梧子大酒下強人初服三九日三

服得者二九○黃帝中惡風脈痛口不能言又治連年

積冷流注心腹疼痛并治衝上氣逆馬腰重血寒等客主之

忌口如常飲外臺云

此丸痛者一服心痛二服心痛三服心痛四服心痛五食

心痛六服心痛七服心痛八服心痛九服來心痛案以上

金匱要略卷之六

金匱要略卷之六

金匱要略

卷之六

方雖分九種不外積聚痰飲結血蟲注寒冷而成附子
已豆散寒冷而破堅積狼牙菜散殺蟲注而除痰飲乾薑
人參理中氣而和胃腕相將治九種之心痛已豆除邪殺
蟲散治中惡腹脹痛口不能言連年積冷流注心胸痛冷
氣上衝皆宜於辛熱辛熱能行血破血落馬陸車血凝血
積者散并宜之

○腹滿寒疝宿食病脈證治第十

論一首 脈證十六條 方十三首

腹滿寒疝法當腹滿不滿者必便難兩肘疼痛此虛寒從
下上也當以溫藥服之脈經必下自下邪閉塞大五字千金

三

七欲陽胃氣也欲陰陰象也以陰加陽脾胃受之則為腹
滿欲不滿則陰邪必去欲其滿而下則散道為便難為兩
腹疼痛然其果不從外入而從下上則病自內生所謂腎
虛則寒動於中也故不當散而當溫經若寒實則用後條
溫藥下之也

兩腹腹滿按之不痛為虛痛者為實可下之舌黃表下苦下
之黃白表下苦下為實也

沉而欲手按腹腹滿實也按之不痛內無積食燥屎聚
聚則和雖寒而海當以溫藥若按之痛乃以外乎而此內
金匱要略卷之六

六經辨證

結食腹脹則知內實是可下之。而又以舌黃驗定虛實。若舌有黃胎即是濕熱內蒸。為未經下過。必須下之。則黃自去而腹滿自除。舌無黃胎是近虛寒。又非下法矣。魏無形之虛氣作寒則按之無物何病之有。傷寒有形之實物為患如宿食在胃。病氣在少腹等是也。按之有物阻碍於藏府之側。為有不痛者乎。是於按之痛否。以決其虛實之法也。

張氏傷寒集註云。中胃按之而痛。世醫便謂有食。夫胃為水穀之海。又為倉庫之官。胃果有食。按必不痛。試將飽食之人。按之痛否。惟邪氣內結。正氣不能從腸出入。

按之則痛。又胃無穀。神氣虛而外浮。按之亦痛。若不審印正虛實。輕謂有食。傷人必多。又按者輕虛平按。若不得法。加以手少。未有不痛者。

腹滿時減。復如故。此為寒當與溫藥。腹輕減下

除腹滿有增減則非寒其結者之病所以得陽即減得陰

如滿故曰此為寒當與溫藥。腹滿不減故用承氣下之。此

腹滿時減則寒氣或寒或熱當與溫藥以散其寒。

葉全齋云。此篇無形虛寒腹滿之字。當與溫藥之下當

有宜厚於生薑甘草。手足人參湯主之。十四字。於是脫

則則陽氣而大陰虛自如此。此說覺其為。

傷寒論

病者身黃躁而不渴胸中寒實而利不止者死

徐沈尤金鑑
誤作燥今從

之
症者黃之類也者也。凡身黃脾虛而色敗也。氣不至故
腹中無陽故不渴。氣竭陽衰中土已敗而復寒結於上藏
就於下何恃而可以通之止之乎故死

李經親以躁為陰躁不可從本條不言腹滿而徐註以
為虛寒腹滿未詳然否。脈經以此條列于嘔吐下利篇
似違

寸口脈弦者即脇下拘急而痛其人壽者惡寒也

凡寸口脈弦亦陰邪加陽之象故脇下拘急而痛而寒從

外得與欲陽脈弦之兩脈寒痛有別故彼兼便難而此有
惡寒也

夫中寒家善火其人清淨出發熱色和者善愈

經云寒則面慘而不和今發熱色和則寒發於肺經而為
熱也。經中寒家謂素有中寒病之人也。凡陽欲上而陰引
之則文陰欲入而陽拒之則竟中寒者陽氣被抑故善火
清淨出發熱色和則邪不能留故善愈。經此諸証俱為外
感寒邪者言也。外感寒邪于腰滿病何與以腰滿病其中
亦有內外合邪者故必明辨乎外中寒之證所以為內中
寒之惡也

案千金此云一條云凡病者未脈望之口燥消涕出
身重此人中寒乃按下文連此條而為一條知此條
為下條欲讀不能者發耳

中寒其人下利以裏虛也欲嘔不能此人肚中寒

原註云云
痛○千金

中寒

也中寒而下利者裏氣素虛無為脾藏邪得直侵中藏也
欲嘔不能者正為邪逆既不能却又不甘受於是陽欲動
而復止邪欲出而仍留也沉陽和則嘔而欲嘔不能乃陰
寒凝滯於裏所以肚中痛也

夫是人統膈痛必有風冷穀氣不行而反下之其氣必衝不

衝者心下則痞

經云人虛弱人也若統膈作痛必有風冷有穀氣者而不
行是人未可刺下而反下之則風冷之氣心下衝如不上
衝者裏虛而陷於心下為痞也凡此有似裏實而實為虛
今是五瀉藥以助脾之行者也乃反下之穀出而風冷不
與俱出正乃益虛邪乃無制勢必上衝若不衝者心下則
痞

而腹滿發熱十日振浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

此方有桂枝

附子粳米湯方

故作雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐也附子粳米湯散寒止逆
張氏醫通云腹中寒氣奔迫上攻胸脇以及於胃而增
嘔逆煩之冒氣空虛邪無所砥輒入陽位則殆矣是以
除患之機所重全在冒氣棄其邪初犯胃尚自能食而
用附子粳米之法溫飽其胃冒氣溫飽則土厚而邪難
上越胸脇逆滿之渴陰得溫無敢留戀必還從下竅而
出矣

附子粳米湯方

附子一枚 半夏半升 甘草一兩 大棗十枚

粳米半升

右五味以水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服
外臺云水八升煮米熟湯成去滓溫服一升日三服
此方與附子粳米湯方同其藥味加甘草二兩棗十枚法必
同

經云寒以熱藥腹中寒氣非附子辛熱不足以溫之雷鳴
切痛非甘草大棗粳米之甘不足以和之逆滿嘔吐非半
夏之辛不足以散之五物相需而為佐使
外臺云此方與附子粳米湯方同其藥味加甘草二兩棗十枚法必
同

方與本條同

又附子粳米湯方海藥附子粳米湯方腹中寒鳴切痛胸脇逆滿

附子粳米湯方

附子粳米湯方

於本方內加宿薑白水梗米作

又小品解急蜀椒湯主寒疝氣心痛如刺統臍腹中盡痛白汗出欲絕又療心腹痛困急欲死解結逐寒上下痛良

於本方內加蜀椒乾薑

三四服滿門附子梗米湯治憂愁相索神志不守思慮兼并擾亂臟氣不主傳導使諸陽不舒反順為逆中寒氣張腸鳴切痛胸脇逆滿嘔吐不食

即於本方加乾薑

百一選方附子梗米湯補虛生胃氣逐冷痰和五藏快

附子梗米湯

於本方內加人參黃芩白水川薑木香去大棗用陳

倉米治人參黃芩

或治要試謂胃門若胃寒甚服藥而翻者互附子梗米

湯加丁香除熱助仁半錢大便乾者更加枳殼半錢之

元連門若胃中寒甚乾逆不已或復嘔吐輕劑不能取

附子梗米湯加炒川椒丁香每服各三十五粒

附子梗米湯三物湯主之治而附子梗米

附子梗米湯三物湯主之治而附子梗米

附子梗米湯三物湯主之治而附子梗米

物意在行氣故君厚朴。

厚朴三物湯方

厚朴 八兩 大黃 四兩 枳實 五枚

右三味以水一斗二升。先煮二味取五升。內大黃。煮取三升。溫服一升。以利爲度。三升下十金。有去滓二字。

千金云。腹中轉動者。勿服。不動者更服。

按之心下滿痛者。此爲實也。當下之。宜大柴胡湯。張經無宜。大柴胡湯。

五雲與前七物湯三物湯爲一條。傷寒論可。下者作利。腹中滿痛者。宜下有。大承氣三字。

无按之而滿痛者。爲有形之實。邪實則可下。而心下滿痛。則結處而高。與腹中滿痛不同。故不宜大承氣。而宜大柴

胡。觀此爲邪實。而且按熱者言也。仲景已叙之傷寒論中。太陽篇矣。云傷寒十餘日。熱結在裏者。與大柴胡湯主之。宜下之。而不用大承氣。乃出大柴胡者。正與傷寒論篇中。所言相背也。

張氏醫通云。邪從胸脇而入於腸。位合用大柴胡兩解之。與脾腹硬滿。承氣證不同。○葉氏說如是。而金經謂。痛者之下。當有有潮熱之三字。若無此三字。則不當與大柴胡湯。此有誤。然今據脈經而求經旨。此示應於三物湯之證。宜大柴胡湯五字。恐是衍文。其方亦錯出。大柴胡湯方。

大柴胡湯方

傷寒論卷之六

柴胡 二兩 黃芩 二兩 芍藥 三兩 半夏 半升

枳實 四枚 大黃 二兩 大棗 十二枚 生薑 五兩

右八味以水一斗二升。煮取六升。去滓。再煎。溫服一升。日三服。

腹滿不減。減不足言。當須下之。宜大承氣湯。不足言。千金作不驚人。

腹滿時減時滿。虛滿也。腹滿常滿而滿。實滿也。腹滿不減。雖減不逾時減。不足言減也。虛滿常溫。實滿當下。故宜大承氣湯下之。尤減不足言。謂雖減而不足云減。所以形其滿之至也。故宜大下已上三方。雖緩急不同。而攻泄則一。所謂中滿者。屬之於內也。

大承氣湯方

每中

大承氣湯方。每中。大承氣湯方。每中。大承氣湯方。每中。

心下中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝皮起。出見有頭足

上下痛而不可觸近。大建中湯主之。心下中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

心下中大寒痛

嘔不能飲食。腹中寒上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

心下中大寒痛。嘔不能飲食。腹中寒上衝皮起。出見有頭足。上下痛而不可觸近。大建中湯主之。

大承氣湯方

肝經大建中虛脈後溫覆令有微汗則寒去而痛止此治
心胸中寒之法也經寒氣搏於腸胃之外冲突出見於皮
膚脈脈之分如有頭足其痛則逆於外故不可以手觸近
也

大建中湯方

蜀椒

乾薑

人參

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取
一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日
食糜溫覆之

張氏千金衍義云虛寒積聚之治此方最力其方中人

參詳椒薑五散之散人皆得之至於膠飴為助滿之首
劑而反用以治痛者不能食是專用助滿之味引領椒
薑人參為散滿之通使也

千金大建中湯治虛勞寒痺飲在腸下次次有聲飲已
如從一逆下次次然也有頭重脚重起引兩乳內痛裏
急暴多失期氣短目眩喘急多忘

人參

乾薑

甘草

右三味以水四升煮取二升去滓內膠飴一升微火煎取
一升半分溫再服如一炊頃可飲粥二升後更服當一日
食糜溫覆之

大建中湯方

大建中湯方

附子一投旁者加黃芩一兩
陽下偏痛發熱其脈緊強此寒也以溫藥下之宜大黃附子
湯

〔尤〕陽下偏痛而脈緊張陰寒成聚偏著一處雖有發熱亦
是陽氣被鬱所致是以非溫不能已其寒非下不能去其
結故曰宜以溫藥下之〔程氏〕曰大黃苦寒走而不守得附
子細辛之大熱則寒性散而走泄之性存是也〔魏〕此發熱
或有形之物積于腸胃而皮膚熱作故在可下之例未必
爲假熱症〔徐〕附子細辛與大黃合用並行而不倍此卽傷
寒論大黃附子湯心湯之法也

千金衍義云少陰病始得之反發熱脈沉用麻黃附子
細辛湯以治太陽少陰之兩感此治陽下偏痛發熱脈
沉變是決爲下法也大黃附子湯以治寒從下上之癰
癰頭附子細辛黃芩不違汗下亡陽說無發熱外證豈
不可變大黃附子甘蜜之治乎此治食已則吐之大黃
甘蜜湯具有成法始知權變之方不在規矩之外也
〔張氏〕醫通云此證若身實顯上微黃小便利大便黑此
陽虛寒逆傷血虛小腹痛而發黃或小便連腰下痛大黃
附子湯治之如神如內施

論後漢書

卷之八

下三也。當以強藥服之。大黃附子湯。蓋其方也。金鑑改。
偏痛作滿痛不可從。

大黃附子湯方

大黃 三兩 附子 三枚 細辛 二兩

右三味以水五升。煮取二升。分溫三服。若強人煮取二升。
半分溫三服。服後如人行四五里。進一服。外臺引小正云仲景同。

寒氣厥逆。亦圓主之。此條服

經此條之文。方必有簡脫。難以爲後世法。不釋。程溫經。
說寒無非辛熱之劑。四逆湯輩。可選用之。不必拘泥。

赤丸方。千金黃連冷類。熱門主藥用。

茯苓 四兩

半夏 一升

千金月桂枝不用半夏。

烏頭 二兩

細辛 一兩

千金月桂枝不用半夏。

烏頭 二兩

右四味末之。內真朱爲色。煉蜜丸。如麻子大。先食酒飲下。

三九日。再服一服。不知稍增之。以知爲度。千金月桂枝不用半夏。

赤丸朱砂散也。

黃千金湯。茯苓丹圓。治傷寒。或惡寒。發熱。體寒者。即

本方。用人參。不用細辛。更有附子。黃朱砂。凡六味。餘詳

此條。此即傷寒論中之類也。蓋據千金與

脈病。脈微而沉。則新氣不行。而惡寒。實則不誤。食邪正相

搏。即爲寒。此寒由連。連者。發則白汗。此手足厥逆。其脈沉

黃連朱砂散也。

黃連朱砂散也。

緊者大烏頭煎主之。脈痛脈經寸口至即為寒病為
為寒病下脈經有明脈浮而遲浮則為風虛遲則為寒病
十六字明是寒病通膈以下為別條矣原本若發作若發白
沉作白沉今發經本及十金外臺改定其脈沉
緊脈平脈經十金外臺經餘諸不其脈沉強
无弦緊脈皆陰也。而弦之陰從内生。緊之陰從外得。弦則
衛氣不行而惡寒者。陰出而痺其外之陽也。緊則不欲食
者。陰入而痺其胃之陽也。衛陽與胃陽並衰而外寒與內
寒交盛。由是陰反無與而上衝。陽反不治而下伏。所謂邪
正相搏。即為寒病者也。惡病犯寒。即發。故謂之寒病也。
純不素陽虛陰盛。積寒在裏。以召外寒。夾雜于表裏。而為
急者也。表裏之寒邪既盛。而正陽與之相搏。寒邪從下起。

始發于至陰之分。而寒病成矣。寒病既成。伏于少腹。連臍
痛發止有時。發則白津出。此汗本下部虛寒。陰邪逼迫外
越故也。及至寒積久而發。四肢厥冷。脈得沈緊。何非寒厥
之或為害也耶。

寒者則為論云。病在少腹。腹痛不得大小便。病名曰
疝。疝之寒。王氏雖大奇論云。此者寒氣結聚之所為也。
惡寒者。則即古經云。病腹中氣寒。上下引也。據此綱目
此病在腹。也。寒者即病之總名也。吳原云。此者痛也。此
由陰虛積於內。寒氣結聚而不散。作厥虛弱。風冷拘攣
相襲。則腹中寒。惡寒。此安寒。此腹痛也。

案陰陽別論白汗王氏釋為流汗淮南修粉訓云奉一
爵酒不如於色舉一石之尊則白汗交流此云白汗出
者蓋不舉痛苦之甚而汗出也程云冷汗也徐光尤親
仍原文作白汗而解之趙本作自汗並非

烏頭煎方

千金注此仲景第一物烏
頭煎三因名大烏頭湯

烏頭

大苦大寒無毒不反燥千金作十五枚以蜜引牛黃湯煮取汁
五升下烏頭下有三因云三因云大烏頭煎在後先煮細沙炒令黑不以酒

右以水三升煮取一升去滓內蜜二升煎令水氣盡取一升強人
服七合弱人服五合不差明日更服不可一日再服二升千金外
臺作二升
程烏頭大熱大毒破積聚寒熱治臍間痛不可俛仰故用
之以治臍間寒痛治下焦之藥味不互多多則氣不

此沉寒新冷故以一味單行則其力大而厚甘能解藥
毒故內蜜以制烏頭之大熱大毒

王冰至真要注云夫大寒內結積聚新病以熱攻除寒
格熱之熱天縱之則痛發尤甚攻之則熱不得前方以
蜜煎烏頭佐之以熱甚多其藥服已便消是則張公從
此所以然因藥用也

案此藥中痛及腸痛寒者當歸生薑內湯主之

此亦寒多而血虛者之法

血虛則脈不榮寒多則脈然

此亦寒多而血虛者之法

此亦寒多而血虛者之法

血也。雖李氏云。血屬肝。肝藏血。其經布脇肋。腹脇并痛。若血氣寒而凝泣也。當歸通經活血。生薑溫中散寒。裏急者內虛也。用羊肉補之內經云。形不足者溫之以氣。精不足者補之以味是也。

當歸生薑羊肉湯方

千金婦人門名當歸湯。註云。明治名小羊肉湯。

當歸 三兩

生薑 五兩

羊肉 一斤

外臺云。去脂。

古三味以水八升。煮取三升。溫服七合。日三服。若寒多者。加生薑成一斤。痛多而嘔者。加橘皮二兩。白朮一兩。加生薑者。亦加水五升。煮取三升。二合服之。

千金用芍藥二兩。註云。子母秘錄有。

王氏古方選註云。寒氣為沉寒在下。由陰虛得之。陰虛則不得用辛熱燥烈之藥。更却其陰。故仲景另立一法。以當歸羊肉辛甘重濁。溫緩下元而不傷陰。佐以生薑五兩。加至一觔。隨血肉有情之品。引入下焦。溫散五寒。若痛多而嘔。加陳皮白朮。其安中氣。以禦寒逆。本方三味。非但治氣逆。經絡虛寒。下焦虛寒。亦稱神劑。張氏千金衍義云。凡少腹疼痛。用此心寧。藥不應者。用之無功。

羅氏本草衍義云。懷中素云。寒氣用生薑羊肉湯服之。無不應驗。有一婦人產當歸。寒氣入產門。腹脇以下。

金匱要略卷二

血虛寒厥

即本方一法用附子一箇不使爲頭爲竇附湯

氣發代當於陽子建中歲庚時
如要一臨頭洗名發陽子歲

其脈數而緊乃弦狀如弓弦按之不移脈數弦者當下其寒
脈緊大而遲者必心下堅脈大而緊者陽中有陰可下之
尤脈數為陽脈弦為陰陰陽參見是寒熱交至也然就寒
而言則數反從弦故其數為陰疑於陽之數非陽氣生熱
之數矣如就風寒言則弦反從數故其弦為風從熱發之
弦而非陰氣生寒之弦者與此通相發明也故曰脈數弦
者當下其寒脈緊而遲大而緊亦然大雖陽脈不得為熱正

以形其陰之實也故曰陽中有陰可下之

之不釋也是與脈經合則此脈數作浮爲是金鑑自其脈數至脈弦數者十九字爲衍文以當下其寒之四字

外憂為頭毒治寒茹腹中絞痛賊風入攻至歲拘急不得
 轉側發背有時使人陰縮手足厥逆此症上見
 此症一名五疳或利中食即見此症此症上見
 外憂與頭毒治寒茹腹中絞痛賊風入攻至歲拘急不得
 金匱要略卷之二十一

柴胡 四兩

黃芩

人參

芍藥

桂枝

生薑 各一兩半

甘草 一兩

半夏 二合半

大棗 六枚

右九味以水六升煮取三升溫服一升日三服

經有表邪而挾內寒者烏頭桂枝湯證也有表邪而挾內熱者柴胡桂枝湯證也以柴胡桂枝生薑升陽透表人參半夏甘草大棗補中開鬱黃芩芍藥治寒中有熱雖合此表裏兩解寒熱兼除之法也況予以此方每於四時加減治胃脘心腹疼痛功效如神

仁賢直指云柴胡桂枝湯治腎氣冷熱不調証案腎

氣即病也

外臺走馬湯治中惡心膈腹脹大便不通

巴豆 二枚

杏仁 二枚

杏仁 二枚

右二味以漿水浸之令碎熱湯二合掄取白汁飲之當下老少量之通治無尸鬼擊病

死中惡之證

證治諸般

為病即真穢惡毒之氣直從口

鼻入於心肺腸胃臟腑壅塞正氣不行故心膈腹脹大

便不通是為實證非似六淫侵入而有表裏虛實清濁

之分既用巴豆極熱大毒峻猛之劑急攻其邪佐杏仁

以制肺與大腸之氣使邪從後陰一掃盡除則病得愈

若殺須臾正氣不通，營衛陰陽機息則死。是取通則不
痛之義也。

肘後飛尸走馬湯，通治諸飛尸鬼擊。

即本方

外臺文仲療卒得諸病，少腹及陰中相引絞痛，白汗
出欲死，此名寒疝，亦名陰疝。張仲景飛尸走馬湯方
同案，此爲治寒疝附于本篇之末者。而主療與外臺
異者何？

問曰：人病有宿食，何以別之？師曰：寸口脈浮而大，按之反濡，
尺中亦微而濡，故有宿食。大承氣湯主之。

凡寸口脈浮大者，假氣多也，穀多不能益脾，而反傷脾，按

之脈反濡者，脾傷而濡，血氣爲之不利也。尺中亦微而濡，
善中氣阻滯，而水穀之精氣不能遽下也。是因宿食爲病，
則宜大承氣下其宿食。

案金鑑云：按尺中亦微而濡之微字，當按傷寒論作大
字。今按傷寒論可下篇亦作微字，而金鑑又云：微字當
是大字。若是微字，斷無當下之理。彼註如此，今引以爲
證，誤也。

是亦宿食不消候云：宿食未消，新穀又入，脾氣既弱，故
不能磨之，則經滯而不消也。今人腹脹氣急，噎氣噤口，
時復增寒壯熱是也。

程如云。滑為有食結滯。經宿則脈滿矣。尺以候內。沉以候裏。故宿食之脈。按之反濡。尺中亦大而滿也。

脈數而滑者實也。此有宿食。下之愈。宜大承氣湯。

腹脹滿而痛。脈數而滑者實也。此有宿食。故當下之。李彭曰。滑者水穀之氣勝也。若滑而兼數。則實熱已入胃府矣。故云有宿食可下之。魏滑與濡相反。何以俱為實宜下。滑者濡之淺而實邪欲成未成者。濡者滑之深而實邪已成者。故不論為滑為濡。兼大而見。則有物積聚。宜施攻治。無二理也。

陽明篇云。欲滑而數者有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

下利不欲食者有宿食也。當下之。宜大承氣湯。

尤穀多則傷脾而水穀不化。穀停則傷胃而惡聞食臭。故下利不欲食者。如其有宿食當下也。夫脾胃者。所以化水穀而行津氣。不可或止者也。穀止則化絕。氣止則機息。化絕機息。人事不其煩乎。故凡大承氣。速去其停穀。穀去則氣行。氣行則化機而生。以全矣。若徒事消利。將宿食未去。遽升降之機。不轉腸中水穀不化。而下奔則利。宿食在胃。故不欲食。當當攻去宿食。

經應純云。傷食惡食。故不欲食。與不能食者自別。下利

有此更無別據應証知非三陰之下利而為宿食之下利也故當下之

大承氣湯方

凡前症

宿食在上脘當吐之宜瓜蒂散

經言有三脘宿食在上脘者膈間痛而吐可吐不可下也
在中脘者心中痛而吐或痛不吐可吐可下也在下脘者
臍上痛而不吐不可吐可下也今食在上脘故當以瓜蒂
散吐之也

千金云凡病宿食在上脘當吐之脈數而滑者實也有
宿食不消下之愈胃中有辟食冷物即痛不能食有熱

物即食大腹有宿食寒濕發熱如瘧宿食在小腹者
當暴發熱明且復止

瓜蒂散方

瓜蒂

一分

赤小豆

一分

煮取汁和散一錢匕溫服之

古二味

行爲散

以香豉七合

煮取汁和散一錢匕溫服之

不吐者少加之以快吐爲度而止亡血及虛者不可與之

不吐者

少加之

以快吐爲度而止

亡血及虛者

不可與之

溫服之

不吐者少加之以快吐爲度而止亡血及虛者不可與之

東垣試効方云若有宿食而煩者仲景以梔子大黃湯
主之氣口三盛則食傷太陰痰寒問亂極則心胃大寒

東垣試効方云

若有宿食而煩者

仲景以梔子大黃湯

主之氣口三盛則食傷太陰

痰寒問亂極則心胃大寒

東垣試効方云

主之氣口三盛則食傷太陰

痰寒問亂極則心胃大寒

東垣試効方云

若有宿食而煩者

仲景以梔子大黃湯

東垣試効方云

東垣試効方云

若有宿食而煩者

仲景以梔子大黃湯

主之氣口三盛則食傷太陰

痰寒問亂極則心胃大寒

東垣試効方云

外傷于風寒與腹中有宿食。自是兩截。脈經腹上有或
字義尤明顯。

金匱玉函要略輯義卷二