

傷寒論國字辨

三

傷寒論國字辨卷之三

尾張

淺野微元甫 著

大陽病篇第二

大陽病項背強^{コリテ}凡^レ汗惡風葛根湯主^ス之。

項背強^{コリテ}大陽病表症項背強^{コリテ}也凡^レ項背コリテ解ノマワ
ラズ也。是大陽病間症ノ位地也。間症トハ大陽病桂枝湯ノ位
地大表也。麻黃湯ノ位地表ノ裏也。葛根湯ノ位地其中間
也。故間症ト云也。凡^レ大陽病頭痛發熱惡風其症ハケレト者
大表症也。是ハ深^シヤウナレ其邪及テ淺^シ項背強^{コリテ}凡^レ頭痛
痛惡風其症ヲタカナル者ハ是間症也。其邪淺^シヤウナレ及テ
深^シ無^シ汗ハ間症ノ位地深^シ故^ニ汗出^ス也。惡風ハ風ニアタレバ
ゾトサキ也。其表症ヲ明^ス也。言ハ大陽病ノ發病項背強^{コリテ}

凡汗之惡風者大陽病間症其位地桂枝湯之症ヨリ
源々麻黃湯之症ヨリ淺シ故葛根湯主之也桂枝加葛根之症
項皆強凡凡及汗出者大表症主之問症及此症項
皆強凡凡無汗惡風者間症主之也大表及是問症
之位地汗之明也學者此位地ヲ知テハ項皆強凡凡者
ミマス頭痛發熱惡風ハカリ者モ葛根湯ヲ与ス其要汗
乙ト汗ナキトヲ知ス

葛根湯

葛根_四

麻黃_三

桂枝_二

芍藥_二

甘草_二

生薑_三

大棗_{十二}

右七味以水一斗先煮麻黃葛根減二升去白沫內諸藥煮
取三升去滓溫服一升覆取微似汗不須飲粥餘如桂枝法

枳實及禁品

生者麻黃葛根減二升去上沫古云山茅ノリ直ツカウ故先
二味者上ノアリ去ル也後世ハ山ヲ制者賣出故右通スルニ
及之也覆卧具也取微似汗ハ火汗ヲ出ヌ也不須飲粥ハ
粥ヲ与テ汗ヲ發ス也及之也將息保養云云如此覆取微似汗以
下後人ノカキ加ル也麻黃湯葛根湯大青竜湯等ハ發汗ヲ主トス
方ニ卧具ヲ多クテ粥ヲスリテ汗ヲ出ス也後世ハ麻黃汗ヲ大ニ
出テテ恐テ甚シ故此說ヲ力加ヘ名也是取之也凡其
脉症の中ニ六過甚害ナキ若其害アリハ皆匠人脈症ヲ審ニセテ
誤用シ罪ヲ禁ク也非ス豈モ麻黃汗ヲ數スルニマシマ桂枝ノ
鮮明イニ能の中ニ其害アリ故仲景氏白與桂枝湯欲及
其表此證也得之便服咽中乾煩躁吐逆ト云由考スハ賤

毒散者無微不類其害猶甚也何多麻黃之方也故
葛根湯主之所謂瘧瘍其症之項背強汗多其症
太陽病中風傷寒之頭痛項背強惡寒惡風身重汗多其症
桂枝湯主之麻黃湯主之其脈浮弱其症身重汗多其症
者主之也故此方外邪入病頭痛發熱惡寒惡風等症
入之或八九日者發熱惡寒初起之時或八九日者
寒惡風頭痛等症之時或八九日者發熱惡寒初起之時
用大汗下之汗出毒氣散度數多者若始有汗者
不可下之方下之毒氣散入重症也又夏月寒冷頭痛
發熱惡寒池瀉主之其症在胃氣散也其症在胃氣散也
目下之症是服汗下散也

大陽與陽明合病者必自下利葛根湯主之

合病者混合之義多物合之也故合病者大陽病ト
陽明病ト二症合病也始大陽病者頭痛項背強發熱惡風
惡寒等症後或腹中和或下利或下利者陽明病ト
大陽病ト合病也自下利者別下利者因下利其本症自
下利也病人多下利者誤也言大陽病問症之發熱或
頭痛發熱惡風或項背強者陽明合病ト必自下利者
者也葛根湯主之太陽陽明ト合病者其地位間症可深
言下利者間症也及下利者其地位同一也而葛根湯ハ
間症之位ト主之故陽明ト合病下利者主之其下利
者亦主之又大陽病頭痛發熱惡風腹中和者
或腹中滿者皆陽明ト合病也葛根湯主之也故此方頭
痛惡寒惡風或下利腹中滿者主之若腹痛者

ヨキ者桂枝人參湯ヲ與フニ
大陽與陽明合病不下利但嘔者葛根加半夏湯主之

嘔ハフミマケラズアリテ物ハクセ也言ハ前章ノ如ク大陽ノ症ハ頭痛發

熱惡風陽明ノ症腹中和モ或ハ腹必レ滿者下利セズ但嘔スル者ニ

亦大陽ノ陽明ノ合病也故ニ葛根湯ニ半夏ヲ加テ治スル也若シ大

陽ノ陽明ノ合病下利嘔逆併有者ハ葛根湯ノ位地ニ非ズ其脈

症ヲ審テ方ヲ處スヘシ

葛根加半夏湯

大陽病桂枝症及下利遂不止脈促者表未解也喘而

汗出者葛根黃芩黃連湯主之

大陽病桂枝症頭痛項強發熱汗出惡風等ノ症也及下之

ハ桂枝ノ病大表也故ニ法於テ腹中ニ及クニ若腹中ノ症アリハ

別症ヲ表症ノ形ニ非ス故ニ先表ヲ解シ而後ニ腹中ノ症ヲ治ス

是一定ノ法也然ニ表ヲ解セズニツ下ス故ニ及下之云也利

遂不止下之因テ表熱裏入ツ下利止也脈促者表未

解也凡脈二三來者遲三四來者數者名ヲ但脈ニ云是表

症裏症ト云レ脈也故表未解ト云也喘而汗出者ハ葛根黃

芩黃連湯主之喘セシ多如ノ自心タレキ也表熱胸間入テスル也

汗出ニ表解也言ハ大陽病頭痛項強發熱汗出惡風等ノ症

大表桂枝ノ症ニ腹中及マナレタニ腹中ノ症アリハ別症ヲ表症

ト非テ故ニ表ヲ解シ而後ニ腹中ヲ治ス是一定ノ治法也然レ

表未解セズ及下之是ヲ以テ表熱裏入下利止且又喘而汗

出者表熱胸中入テ喘ヲ生汗出ニ表解也然レ其脈促

卷之三

在者、表証裏証、ハシハ其、實表イタ解セトス、是、葛根、
黃連、黃芩、湯ノ主所也。

葛根黃連黃芩湯

葛根

甘草

黃芩

黃連

右四味、以水八升、先煮葛根、減二升、內諸藥、煮取二升、去滓、
分溫再服ス。

此方、陽、大陽、裏ヲ主リ、症ハ表裏ノ熱ヲ主ル、泄瀉痢疾等ノ
表裏ノ熱症ニ活用スヘシ。

右四章、始ノ一章ハ葛根湯、開症ヲ但表証ノ者ヲ明ス、第二章ハ
葛根湯、開症ノ表裏ノ症アリテ下利ニ者ヲ明ス、第三章ハ葛根
湯、開症ノ表証ヲ上攻ニ者ヲ明ス、此上ノ三章ハ其症表裏アリト
主レ、其本一病也、第四章ハ表裏ノ症アリトイエ、表裏各別

ナレヲ明ス、且此章葛根湯三章ノ後ニ於テ出スモ、葛根湯ノ
桂枝湯ニ於テ其地位異ナリトイエ、桂枝湯大表ヲ主トシ、葛根
湯開症ヲ主トシ、施テ大表ニ及ラズ、其地位遠カス、麻黃湯ノ
桂枝湯葛根湯ヲ其地位大ニトシ、故ニマニ於テ桂枝湯葛
根湯ニ方ニ給テ更麻黃湯ヲ起ス、是作者ノ微旨也。
大陽病、頭痛發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘者、麻
黃湯主之。

此章大陽病、ホイエ、其實中風傷寒ヲ包テ云也、何ヲ以知、麻黃
湯ヲ主ルヲ以也、イカニナレ、大陽病中風傷寒ト三種ニ分テ、イエ、
モト皆大陽病也、故治法ニ於テ其症同キハ皆一方ヲ以治ス、
此三種ノミナシヤ百病トイテ皆然、是方ヲ用ルノ自在ナルエ也、
此症頭痛發熱、身疼、腰痛、骨節疼痛、惡風、無汗而喘者、大

麻黃湯

傷風病深症ヲ純陽者故ニ麻黃湯ヲ以汗ヲ發也骨節疼痛
ハフレテ痛也惡風風ニテハソラトヤムキ也惡寒云々惡風ニハ
大陽病ニ大表症ニテ明ス也喘ハセシラシ如ク息タリキ也寒邪胸
中ニ入ラレテ也始ニ頭痛發熱ニテ其發病ハゲレキ也身疼腰痛骨
節疼痛寒邪ヲタ入也是大陽病ノ裏症ノ純陽者ヲ麻黃湯
ノ主ノ可ノ位地也大陽病ノ裏症ト云ハ桂枝湯ノ症ハ至テ淺レ故大
表症也麻黃湯ノ症ハ至テ深レ故ニ大陽病裏症也外ノ所ニ裏症
云トト異也學者ロキウヘシ純トハチリモノナキ也故ニ專陽症ニ陰
症ノイララ云也麻黃湯ヲ用ル肝要也也至モ陰症ノキタル者ニ
用テ大害アリ慎ヘレ大陽病中風傷寒ニ右ノ症ヲ純陽者ナ
皆麻黃湯ヲ以強ク汗ヲ發ス也

麻黃

桂枝

甘草

杏仁

右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二
升去滓溫服八合覆取微似汗不須歎粥餘如桂枝法將息
覆取微似汗以下後人ノ如所說上見ヘリ

麻黃湯

葛根湯

汗

其異

葛根

湯

表和

葛根

主

葛根

陽裏症

表熱暴急

主

其位地

不和

主

湯

其主

其熱

主

麻黃湯

其主

凡麻黃湯

主

其位地

大陽

經

主

表半裏

小柴胡湯

半表半裏

主

其熱

大陽

裏症

結者

主

表熱

主

麻黃湯

大陽裏症

表

主

麻黃湯

大陽裏症

表

卷之三

熱主裏症ノ結ヲ主ス故麻黃湯ノ症表熱ノ半表半裏ニレ者也

凡者也小柴胡湯ノ症裏症ノ半表半裏ニレ者也

又大青竜湯ノ症其症頭陰症ヲ帶ス其熱熱惺也麻

黃湯ノ症劇者似イテ終陰症ヲ帶ス其熱振擻ナレ是純

陽ノ最ナキ者也是亦二湯ノ別也

麻黃湯ノ症脉浮緊者ナリ而脉浮緊ヲ舉ス者ハ麻黃湯脉浮

緊其意ナリ者ナリ其正ニ非ニ故也凡脉浮緊者ハ其症必ス陰

症、疑似者ナリ也其脉ノ位地亦陰陽兩症ノ間ナリ而ノ麻黃湯

ノ主ナリ純陽ノ熱症也故脉浮緊ヲ舉サハ麻黃湯位地

ノ正ナリ而ノ麻黃湯ノ症脉浮緊ナリ其症皆是陽症ノ脉浮緊

ナリ者也故大青竜湯大陽中風ノ章白脉浮緊或熱惡寒身

疼痛汗不出煩躁者大青竜湯主之已是中風ニハ其症淺ニ

治於大青竜湯ノ與ナラズ但其脉浮緊又煩躁ナリ故大青

竜湯ノ與也其汗不出煩躁ナリ云ス已ニ麻黃湯ノ與ナリ汗出ナリ者

也然其脉浮緊ハ是大青竜湯ノ症ナリト云然其發熱惡寒

身疼痛是純陽症ナリ故ニ麻黃湯ノ與也又傷寒總目云曰

或已發熱或未發熱必惡寒體痛嘔逆脉陰陽俱緊者ハ

是其脉浮緊ノ其症皆純陽ナリ故ニ麻黃湯主之也又或陰

症、解陰症非ス或汗出多煩躁其脉浮緊者ハ發熱惡寒

體痛嘔逆ナリ亦是大青竜湯ノ主ナリ也故ニ右ノ章傷寒ト

云大陽病ト云傷寒中風ニ純陽ノ症ハ皆此内ニモルナリ明也

是麻黃湯ノ脉浮緊ノ年々変候ナリ我也

問曰本經麻黃湯ノ症脉狀舉ス而麻黃湯ヲ論ス脉浮緊以

又云浮緊以麻黃湯變候ナリ何ヤ曰麻黃湯ノ脉狀ヲアケル

又云浮緊以麻黃湯變候ナリ何ヤ曰麻黃湯ノ脉狀ヲアケル

又云浮緊以麻黃湯變候ナリ何ヤ曰麻黃湯ノ脉狀ヲアケル

ハ言難ヲ以也凡其言者一定ノ形状アルヲ以也若其妙處至
 テ言ヲ以傳フカラス若強ク言ヲハ害アリ夫麻黃湯ノ症惡寒
 發熱骨節疼痛是傷寒深症ヲ純陽者者也若此症其脉
 沈微弱湯ノ類也陽症陰脉ヲ附刺用ユキ者也然麻黃湯
 ノ脉陽脉トシテ待ス然レ陽脉ノ状亦多シテ一定ニカラス若一定
 ニカラス強テ一定ノ脉狀ヲ奉ルトテ學者必目ヲ膠ノ変化ニマタハサレム
 也故脉狀トシテ其作者ノ深意もユキ也夫麻黃湯傷寒深症
 純陽ノ主方也其症リテ而但是浮而陽脉ノ者ハ用ニシテ是其脉
 狀一定ノ舉ニカサルユキ也學者多ク陽症陽脉ノ主方ニテ會得ス
 夫麻黃湯變化尺大カス曰然ハ則麻黃湯ヲ論ノ必其脉浮緊
 者何也曰麻黃湯ノ症曰頭痛發熱身疼痛骨節疼痛惡
 風無汗而喘者傷寒總目章曰或已發熱或未發熱必惡

寒體痛連脉陰陽俱緊者此二條異同アリトイヒ傷寒發病
 深症ト同然則麻黃湯ノ脉浮緊ヲ知ヘ是必浮緊ヲ以論
 ユキ也然本經大青竜湯症脉浮緊リテ麻黃湯ノ症浮緊ヲ
 アケル大青竜湯脉浮緊一定ノ麻黃湯ハ陽脉ニ宜シク以
 テ也故浮緊大青竜ノ本脉ニ麻黃湯ノ変候トス也

桂枝湯症其病多モ大表也桂枝加葛根湯ノ症其病大
 表也施開症及フ者也葛根湯ノ症其病間位アリテ施大表
 及フ者也間症ノ地位ハ其表項背強テ凡レ限リテ其裏陽明腹
 滿アリテ限リ葛根黃連黃芩湯ノ症葛根湯ノ症其位
 地同大表症者也大陽病發病位地其淺深ノ別ト云
 一二三四五六七八九十ノ如レ其一二三ハ大表症桂枝湯主レ
 四也其二三ヲ主レ四五及フ者桂枝加葛根湯主レ也其

四五六ツ主ノ三二一及又七八及ア者葛根湯主ノ所也但四五
六ツ主ノ三二一ノ症ナク独七八ノ症有者葛根黃連黃芩湯主
所也然葛根湯主ノ所四五六ツアリ其八九十主ノ外六五四
ト三二一及ア者ハ麻黃湯主ノ所也是大陽病發病位地ノ
辨也學者其位地ヲツヅカニテ寸ハ必シモ其見症ニカワラズ治法
ヲ施スヘシ是學者ノ必ム心ヲ用ニヘキ也

大陽與陽明合病喘而胸滿者不可下宜麻黃湯

合病ノ義ハ前章ニ見ヘリ是大陽ノ症ハ頭痛發熱惡風惡寒云云
也陽明ノ症ハ腹中和或腹微滿或不大便也喘而胸滿ハ法ニ
於テ熱内ニ盛ラ上攻ス故胸滿而喘也而ツヅカニ喘而胸滿ト
云テ胸滿而喘スト云セザル者胸滿ハ麻黃湯ノ本症ニ非ス喘ハ本症
也故喘トツヅカニ塞レ不可下宜麻黃湯トハ大陽陽明トノ合病

陽明ヲ主ト大陽施及ア症下ヲ治スアリ然レ此症ハ大陽ヲ主ト
陽明及ア者也故不可下也宜其時ノ宜ヲ見カライテスルノ科也
是喘而胸滿トイエハ已ニ其症病時ナレハ陽明本症ノ胸滿非ス故
法ニ於テハ麻黃湯ヲ以汗ヲ發スレ已ニ汗ヲ發シ後ト陽明胸滿
ノ症アス各其症ニ隨テカヲ處スヘキ也ト云ハ其人頭痛發熱惡寒惡
風等ノ症アリ又腹中不和或腹少ニ滿或不大便等ノ症アレハ
是大陽ト陽明トノ合病也其喘而胸滿又不大便等ノ症アレハ
陽明ノ下スキ症ニ似タレ然レハ頭痛發熱惡風トノ表症アレハ
下スカラス其宜ヲハカライテ先麻黃湯ヲ与テ汗ヲ發スレハ大陽ノ
表症胸中ニ入テス所ナレハ即愈モシ汗ヲ發シ後大陽ノ症解シ而喘
滿ノ症アレハ其症ニ隨テカヲ處スヘシ

葛根湯大陽陽明合病ノ症ト麻黃湯大陽陽明合病ノ症

其別イカ答曰大陽病表症桂枝ノ症ノ如ク多腹中不和或腹微滿者大陽陽明合病葛根湯ノ症也大陽病表症桂枝比ニ更甚腹中不和腹微滿或不大便又胸滿スル麻黃湯ノ症大陽陽明合病也故大陽ノ表症桂枝ノ症ノ如ク腹中不和腹微滿喘ス麻黃湯ノ症非ス是葛根湯ノ症也法ニ於テ先葛根湯ヲ与テ汗ヲ發シ而後葛根黃連黃芩湯ヲ与テ其喘ヲ治スヘシ葛根湯ヲ与テ汗出テ喘ス者身胸滿ノ症ニトイエ亦麻黃湯主レ所也若大陽ノ中風ヲ其表症桂枝ノ症ノ如ク喘ヲ加ル者ハ葛根湯ノ症ニ非ス麻黃湯ノ主レ所也是疑症ノ分別ニテ處方ノ異ナル所也

大陽病十日以去脉浮細而喘卧者外已解也設胸滿脇痛者與小柴胡湯脈但浮者與麻黃湯

十日以去十日以往ト云如十日以後ノ也大陽病其始桂枝ノ症ノ如或葛根ノ症ノ如ラハケレカストイエ其症綿々ト永ビク云ト也脉浮細ト此細陰脉微細ノ細非ス凡表邪ノ脉必浮中ノ者也今表邪解モ上故脉中ナク細ヲ浮也喘卧者ハ喘ハスキ好ムヲ也病人卧居也外已解也病人卧居カテ起居テハナク其脉浮細外邪已解也設胸滿脇痛ノ者與小柴胡湯大胸滿脇痛小柴胡湯ノ主症也脉但浮者ハ與麻黃湯大脉但浮者中ヲ細者外未解也故與麻黃湯也大陽病桂枝ノ症或葛根ノ症ニ汗ヲ發シ十日以後又綿々ト永年病人卧テ分リ居ル者其症重クヤテ其脉浮細者ハ外邪已解也其卧者喘ハツカレテ病非ス某ヲアテ保養ハ金快ス若卧好其脉浮細又胸滿脇痛者ハ外

症已解也。裏イテ解也。與小柴胡湯。若脉但浮。細ナク又實。時者。外未解也。麻黃湯ヲ与ス。小柴胡湯。麻黃湯モ与テ云者。先此方ヲ与テ其後症ノマウスヲ見テ其症ニ隨テ方ヲ處スノ意ヲ示マ也。

右三章始一章。麻黃湯。大表裏症。白暴急ナ者ヲ舉。第二章ハ麻黃湯。大表裏症。ユルカ者ヲアシ。第三章ハ大陽病。綿ヒトメ麻黃湯ノ症。又云者ヲアケテ麻黃湯ノ位地ヲ明ス。凡麻黃湯ニ其熱ヲキス者也。桂枝湯。白振湯ノ其位地ノ不和ヲ主ス者。同カラセ也。

大陽中風。脉浮緊。發熱惡寒。身疼痛。不可汗出而煩躁者。大音龍湯主之。若脉微弱。汗出惡風者。不可服。服之則厥逆。筋惕肉瞤。此為逆也。

大陽中風。中風。大陽病中ノ一種故ニ大陽中風ト云。又大陽純陽名也。大陽中風ト云。中風純陽症ヲ帶陰ノ症ナキヲ明ス也。傷寒ヲ帶陰ノ症多キ故。大陽二字ヲ主サ但傷寒ト云也。脉浮緊。脉皮膚ノ際ヲカク浮云。緊ハ引ナク強ク引ハル也。故ニ強クカレ脉ヲ緊ナキ也。云々。浮緊ハ浮弱ノウラト心ヲ得ヘシ。此脉ハ寒邪ノ深ク又陽症陰症ノ分。陽ニ至。脉也。故ニ少シテモ治法ヲ誤ハ忽陰症ニ変シヤス。脉也。發熱惡寒。身疼痛。其邪深ク麻黃湯ノ症也。不汗出而煩躁。是麻黃湯ノ與テ汗ヲ發スレ内ニ伏熱アル故ニ汗出ス汗出サル故ナルシテ煩躁也。煩躁ハ煩悶ノアカク也。若脉微弱。至ナク弱也。是陰脉也。汗出惡風者。不可服。汗出惡風。脉微弱者。表虛陰症也。故。服之。則厥逆。筋惕。肉瞤。筋惕。肉瞤。筋ト肌肉トヒモ多ク動ラレ也。是ハ亡陽ノ症也。此為

逆也。ハリを療治ヲ逆治ト云々。療治ヲ順治ト云也。言ハ大陽ノ中
風脈浮。脈緩。發熱惡寒。無汗。身疼痛。在者ハ麻黃湯ノ症也。故ハ麻
黃湯ヲ與ヘテ汗ヲ發スル。汗出テ煩躁スル者ハ内ニ已ニ伏熱アルヲ以テ汗
出テ煩躁スル故。タレシテ煩躁スル也。此症大青竜湯ヲ主所也。大青竜
湯ハ麻黃湯ノ麻黃ヲ倍シ石膏生薑ヲ加ル者也。凡汗ヲ發スル症内
ニ已ニ熱アル者ハ麻黃桂枝ノ類ニテ用ルハイヨイヨ乾燥ノ汗出テ煩躁
石膏ヲ以テ熱ヲ解ス。汗即出テ陰陽和シ雨フルカ如シ。小柴胡湯ヲ與ヘ
テ汗出テ表熱解シ陰陽和ス。故也。初學ヲ悟得ス。シ大青竜湯
症中風劇症ヲ表熱大陽ノ裏入テ伏シ表裏ニ已ニ汗出テ純陽ノ症
在者也。若脈微弱汗出而喘在者ハ傷寒陽虛陰脈ヲ桂枝附子
湯ナク症也。然ハ大青竜湯ヲ服スト。即亡陽ノ厥逆筋惕肉瞤
電症ヲ生ス。是ヲ逆治ト云也。是仲景氏陰症ヲ填重スル至可此

誠ヲ後世ニ垂然ニ示ス者陰陽ヲ辨ス。アノバニタリニ發散ノ方ヲ
用ル者ハ重シ。至可重者ハ死症ト在。皆仲景ノ罪人也。

大青竜湯

麻黃四 桂枝二 甘草二 杏仁四十
生薑三 大棗十二 石膏半斤

右七味以水九升。先煮麻黃減二升。去上沫。內諸藥。煮取三
升。去滓。溫服。二升。取微似汗。汗出多者。溫粉撲之。一服汗者
停後服。若復服。汗多亡陽。遂虛。惡風。煩躁。不得眠也。

溫粉一 葛粉一 白芷一 葦朮一 木各等分。粉トシ。綿ニ包身ニウツ也。
取微似汗。以下後人ノカキ加所也。大青竜湯ノ症已ニ伏熱アルハ汗多シ
出テ煩躁ス。其症解シ純陽ノ症用キ何シ亡陽ノ表症アルハ然レハ汗
出テ煩躁ス。若ハ溫粉撲之。云ハ麻症ヲ知ザル者ノスル所也。何シ仲景氏

汗出惡風者不可服麻黃湯也。此為逆也。云云。ハ言ハ
 太音竜湯純陽症ノ主方也。若脉微弱汗出惡風者ハ陽虛陰脉也
 若此症ハ用麻黄湯以下ニ変症ヲ生ズ也。慎テ用ケナカレト云ノ義也
 是仲景氏陰症ヲ慎重誠々後人ニ垂テエミテ大音龍湯本症
 用テ此変症ト云ニ非ス是多文理少レ書ヲヨム者ハ直ニ解ス也。然レハ
 唐人ニテ是ヲカキ加タル不審ナリ。ハ脉症ヲ審スル医ハ唐ニモコレナ
 ル者ナリ。故ニ是ヲカキ加テ杜撰ニ医ヲ恐レムルハ是亦陰症
 ヲ慎重スルヲ見通シ知レバ類也
 此方場大陽ノ表裏ヲモリ症ハ表症也。シテ裏已ハ熱アル者ヲ主トル
 中風傷寒太陽病主此症アリ。ハ脉浮緊者ニ用ヘレ又抱瘡ノ初
 症惡寒甚シテ裏已ハ熱アリ。ハ汗出ス煩躁者ニ用ズレ

傷寒脉浮緩身不疼但重者有輕時無少陰症者大音竜湯
 發之

脉浮緩者ハ脉ウカミテ皮膚陰ヲウツク浮ト云緩ハ急ノ反ニテ也ヤ
 カミヲリトウツク緩ト云是陽症ノ脉也身不疼但重者有輕時トハ
 傷寒ニ身疼腰痛骨節疼痛モハル此症ハ身不疼但重者有輕時トハ
 身不疼自由ト云フ也然レハ時々有輕ナルモ正也。是内ニ伏熱有故
 也無少陰症者ハ少陰ハ三陰ニ也三陰ハ大陰少陰厥陰也此
 三部ノ病ハ皆陰症也然レハ大陰ハ腹中ハカリ虛寒ノ其外皆陽
 也厥陰皆虛寒ノ胸中ハ熱也者也至テ重痺ト云上下寒
 熱異ト者也但少陰表裏上下皆寒ナル者ヲ三陰ノ大本也故
 無少陰症ハスレ陰症ナキ也少陰症ハ脉微細也但欲寐ハ
 少陰本症也。是病人身重者ハ熱モナク見テ所ハサレタレトモ

ナキヤナレ但ムヤコバリナレハカリ居也實ニ至テ重病ニテ死ニ近キ
病也此症身不寒但重ナキ症モサレモ苦痛モナク但麻ヲ居ルナレ此症
ミヤレヤスミヤレヤ陰ノ微細此脉ハ浮緩ナレ大ニ異ナレ也是ヲ以
テ分ヘレ然レモ脉ハ微細ナレカキカキ者モ故ニ其症ミヤレヤスミヤレヤ
ヨク宗ン邪ヘレ少陰ノ症但誤麻ニ終日終夜同シ事也此症ハ身重ナ
レ時ニカキコアリ是亦異ナレ也サテ其外ニ少陰ノ症ト云ハ皆惡寒
口中和シ手足寒身疼痛吐利咽痛下利便膿血清投下利脉
沈手足厥冷汗出等ノ症也此皆虛寒ヲ生ミ症也身重ナ
外コレヲ症アルマナキカキカキモ疑ヒキ症アルマナキ大青竜湯用
ニカラム誤テ用ヒテ大害ヲナス也言ハ傷寒發病脉浮緩惡寒發
熱其表症也カラス身重ニ至但重ナレ輕時アリ而少陰ノ症ナキ
者ハ純陽成熱ノ症也大青竜湯發之發之ナレ推止ノ法アリ

汗ヲ登ノ而後ノ症ヲ見ル辭也此症脉浮緩ナレ中風似キ其身
重ニ傷寒ノ症也而又少陰ノ症似キ然レモ其脉浮緩ナレ又少陰
ノ症ナキ又陽症ナキ疑ナレ故ニ大青竜湯ヲ以汗ヲ登ス然レモ猶
疑ニシキコトヲナス故ニ後症ヲ見ル辭ヲナス是仲景氏治法ヲ慎
重ニシテ也

問曰大青竜湯ノ症前章ノ脉浮緊發熱惡寒身疼痛不出而
煩躁者其症大劇是傷寒ニ似ナレ而中風云後章ノ脉浮緩
身不寒但重ナレ有輕者其症大緩是中風ニ似ナレ而傷寒云
且三陽ノ症其異ナレ甚レ而其一方ヲ以治ス其何ヲ答曰凡中風ハ
輕病ヲ重入ニ淺傷寒ニ重病ヲ重入ニ深レ夫唯裏入ニ淺レ故ニ
表症ミヤレモ唯裏入ニ深レ故表症ミヤカ也故ニ商黃ハ三麻黃湯ニ
テ汗出ス而後始テ大青竜湯ノ症トテ後章ノ發病ヨリニ大青竜

傷寒證也。是日數二三。口開。其裏入。乃同。其病ノ
輕重大。異ナル所也。是前章ハ中風トナレ後章ハ傷寒ト
スルエエ也。曰然ハ則傷寒中風ノ總目章。舉ル所ト大異
ナルハ何ソヤ。答曰總目章ハ常格ヲ論ス者也。此章ハ亦
症ヲ論ス也。凡物常ト変トアルハ表裏アルカ知レ故ニ常格ヲ知テ亦
知ラサハ必ズハ窮ス凡古今ノ方書常格ヲ論フ變ヲ論セス但傷寒論常
變並舉テ其術ヲ示ス是其貴エ也。凡病症ハ變化多ク極ムカラス
但常格アリテ變セサレ者ハ位地ト脉也。故傷寒論ノ例一方必ス二
症ヲ一ヘテ病症同カラストイレ位地ト脉ト同キサハ一方ノ主治
ス。ト云フ是方ヲ用ルノ變化ヲ教ヘ所也。

傷寒表不解。心下有水氣。乾嘔發熱而咳。或渴。或利。或噎。或
小便不利。水腹滿。或喘者。小青龍湯主之。

傷寒表不解。惡寒發熱。身疼痛等ノ症解セサレ也。心下有水氣。法
證也。法證其不可見。不可知。理ヲ説テ人ヲ病因ヲ知ラシムル
者也。心下。胸下也。有水氣。痰水フル也。乾嘔。カラエツキ也。咳ハセ也。
噎ハセトモ。凡飲物ムセシ非ス食物ノ咽カサレ也。水腹滿。胸下也。小便
利。胸下滿也。喘。喘息イキタク咽鳴也。言傷寒惡寒發熱。身
疼痛者。若シ麻黃湯ヲ手ヲ寒解セス其上乾嘔發熱ノ咳ニ或渴
渴者。若シ或下利。或食物咽ニカエム。或ハ小便利セス。水腹滿
或喘息ノ解者。皆心下水氣アルヨリ生スル所也。此水氣アル故ニ
發表ノ藥ヲ手フトイレ表解セサレ也。故ニ今小青龍湯ヲ手ハ水
氣アル表ヲ手解スル也。是表裏並解スル法也。

麻黃湯
芍藥湯
乾薑湯
五味子湯

甘草^二

桂枝^三

半夏^四

細辛^三

右八味以水一斗先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升加減注若微利者去麻黃加羌活如鷄子大若湯者去半夏加括蕒根三兩若噎者去麻黃加附子一枚若小便不利少腹滿者去麻黃加茯苓四兩若喘者去麻黃加杏仁半升

凡本編例一方衆症主治者或以舉也或力多如症此方治者所或力多如症此方治者云云也故或湯主或利或噎或小便不利少腹滿或喘者皆小青竜一方主治也也イカニ此衆症皆下水氣アルヨリ生スル故ニ其症種種カレ其本ニアル故也故或云云皆加減スル及ハ本方多治者也然如或云云法ヲ出スハ後人ノ加減所ナク本編ノ判

ヲ知ル也

此方主治其場々太陽表裏主其症表惡寒發熱身疼痛者裏水氣諸症主也又右ノ表症アリ裏ノ下利腹痛者又喘急持病者人風邪ヲエリタル故也然又石骨ヲ加フ又久多痰咳アリテ変ノ水腫トナリ小便利セ

又小青竜湯真武湯トモ水氣症也而小青竜湯ノ症其水氣久イ其ヲ而熱症ヲ發ス是陽症水氣深キ者其病心下及ヒ下部ニ在者也真武湯ノ症水氣久イ虛寒トナリ熱症ヲ發ス者

是非是陰府ノ水氣也其病一兩主トセリ者也

凡咳二類一其小柴胡湯咳也其二猪苓湯小青龙湯真武湯咳也小柴胡湯咳表熱裏入下攻也上攻咳者此熱咳也猪苓湯小青龙湯真武湯咳水咳也而此水咳亦二猪苓湯小青龙湯二湯咳熱水致也三真武湯咳寒水致也而此猪苓湯咳表熱陽明入下攻也其水咳結者久久水氣非小青龙湯咳久久水氣寒者下攻而熱者心下攻致也真武湯咳久久水氣寒者下攻而虛逆者此咳致也是咳二類四湯別也

類三

凡湯三類一五苓散猪苓湯渴也二小青龙湯茵陳蒿湯渴也三小柴胡湯白虎湯渴也五苓散猪苓湯渴表熱一且其水咳結此渴致也是久久水氣非故其治法利水

表熱渴地攻下內攻也猶表熱陽明入下攻也五苓湯別也茵陳蒿湯在瘧疾熱也小青龙湯在寒久水寒上攻又熱也茵陳蒿湯其症下攻相熱也寒上攻又熱者是猶純陽症也小青龙湯其症心下攻下部也寒上攻又熱者是猶純陽症也陰症之最甚者此二陽皆久久之症一旦之病非重要之四湯之症法於水熱相搏也凡水熱相搏心下上攻者必渴也三白虎湯小柴胡湯白虎湯渴是熱渴也小柴胡湯渴其熱半表裏攻下心下上攻者也故手足溫者小柴胡湯之症也白虎湯渴其症陰陽攻下心中熱結者也故手足冷或背微惡寒者渴者是白虎湯渴也是渴三類之別也

傷寒心下有水氣咳而微喘發熱不渴服湯已渴者此寒去

欲解也。小畜龜湯主之。

傷寒惡寒發熱而咳又火喘急者。是表解。又心下痰水者。也。然湯ヲ服シヤシテ渴を者。是心下寒去。熱又心下痰水者。也。猶小畜龜湯主之。所也。水氣ノ症惡寒。又水氣解。又渴也。若者。其症深者也。惡寒。少。發熱多。又渴者。其症アサキ者也。是ヲ以其淺深ヲ辨ス。

右四章始一章ハ大畜龜湯表症甚多裏伏熱アリテ純陽ノ者ヲ明ス第二章ハ大畜龜湯表症頗緩多裏伏熱アリテ陰症類者ヲ明ス第三章ハ小畜龜湯表症アリテ裏水氣寒ヲ有者ヲ明ス第四章ハ小畜龜湯表症アリテ裏水氣解ミテ欲解者ヲ明ス此四章其位地同ス其症ハ異ナル者也。

大陽病外證未解。大陽病發熱四五日治。施表桂枝湯。

大陽病外證未解。大陽病發熱四五日治。施表桂枝湯。若也。浮弱。浮緩。數緊。若也。微弱。大同カラス。誤ヘカラス。言ハ大陽病四言頭痛發熱惡風等ノ症イテ解ミ。其脉浮弱ナル者。曰テ終多トイテ其脉浮弱ナル其症深者也。法於汗ヲ以解ス。宜桂枝湯。宜其宜ハカテ先此方ヲ與テ後症ヲ見テ辭也。言病ヲ得テヨリ日數ヲ經テ。理於其症深也。然其脉浮弱ナル故ニ先桂枝湯ヲ与テ其後症ヲ見テ其症隨テ治法ヲ施スヘシ。

大陽病下之微喘者。表未解故也。桂枝加厚朴杏仁湯主之。言ハ大陽病數日頭痛發熱惡寒發熱等ノ症ストイテ數症アリモ先表解シ而後下スヘシ。今表ヲ解ミテ先下テ微喘ナル者ハ下テヨリ表邪胸中入テ兩旁ニ裏症非ス故ニ其本症ノ某桂枝湯ヲ以表ヲ解シ厚朴杏仁ヲ加テ胸中ヲ治ス也。

桂枝加厚朴杏仁湯

桂枝湯方中加杏仁五兩厚朴二兩餘同本方

大陽病外證未解者不可下也下之爲逆也欲解外者宜

桂枝湯

大陽病外證未解頭痛項強惡寒發熱等不可下也下之

爲逆也凡下者外證未解者裏入熱結下利多寸下ストキハ諸

症皆治熱ノ根本ヲ下スナリモ外證未解先下スハ表熱

虛ニ乘ン裏ニ入種ノ變症ヲ生フ故下之爲逆治也下割用

第フ肝要也凡表解スト云ハ惡寒惡風ナキヲ目アトスル也夕

トイ頭痛項強身疼チノ症ヤミモ少シ惡寒惡風ノキミアルト

ハ外症イタ解スト也故解外者宜桂枝湯トハ言ハタトイ

下ハ外症ハ外證解スト者下ハ外證ハ外證解ストハ外

解スト桂枝湯宜キ也此文下之爲逆ト云ハ至極宜キ仲景氏

トイ工臣病ハ粗欲解外者宜桂枝湯ト云ハ其ヲ粗瀉也イカトナハ

本編ノ例凡外ト云ハ大陽ノ表症目小柴胡湯ノ桂枝湯ト云ハ勿論

陽明胃實ノ症外皆外證ト云故傷寒十三日不解章小柴胡湯以

解外ノ文又又大承氣湯ノ章有潮熱者外欲解外文アリ然レ此

章欲解外者宜桂枝湯云テ其脉狀ヲアケス故イカマウナル外症ハ

桂枝湯ニ宜キヲ知ヘカラス學者何國ヲ桂枝湯ヲ用ニヤ故本編

ノ文曰大陽病外症未解脉浮弱者當以汗解宜桂枝湯言

ハ外症解者其症種ニ多トイ工臣其脉浮弱者汗ヲ以解ス

ハ桂枝湯宜ト云テ也其治法備リトモトナク又中風傷寒ノ治

法モ言外アリ其文ノ工極天地ノチカイ也スヘテ書物ノ例字アリテ

外者ハ通セス只其書ノ例トナカキル者也此例字ヲ得テヨマサレハ

七出也哉

トトト解セ也傷寒論諸方主之ヲ又與又宜ト云々如、皆例字也

註多ノ義理ヲフタリ外ト云々例字ナリ

大陽病先發汗不解而復下之脈浮者不愈浮為在外而

又下之故令不愈今脈浮故知在外當須解外則愈宜桂

枝湯

此文拙ト甚シ細密ニスキテ無用ノ文字多シ今試ニ改作ル大陽病脈

浮發汗不解而復下之浮為在外當須解外宜桂枝湯カク如トハ

二十字ヲ減シヨクキコヘテサツリトス也予カ如キハ文章ヲ知ル者非ス

然レモトノ文ヨリハ拙ナシハ唐人ニ至テ拙キ者アルヲ見ルヘシ素人ノ

唐人ハ醫術モ文章モ名人ハカリト思フ誤リ也傷寒論後人々

加シ章多ク總論云より明白ナレバヤス人ノ信スキト非ス

大陽病脈浮發汗發熱身疼痛八九日不解表證仍在此

當發其汗服藥已微除其人發煩目瞑劇者必衄衄乃解所

以然者陽氣重故也麻黃湯主之

發煩煩悶ヲ發也目瞑目ヲ合也衄鼻血也言大陽病脈浮

身痛汗發熱身疼痛者麻黃湯ノ症也然レハ醫誤ラ桂枝湯

或葛根湯ヲ与フ故其症解リ又八九日経トイヒ主症仍ハ在者

ハ麻黃湯ヲ与ス其汗ヲ發スキ也於是麻黃湯ヲ与ヘ服セテ其症

少シ除去トイヒ其煩悶モ多ク致シ目モクムヤウナハ陽氣モアリテ

煩悶モ因テ其熱致ス多ク致ス故也若劇者ハ必ス衄ス衄ス乃解

鼻血由テ因テ其熱致ス故也然レハ衄ス因テ解ス汗ヲ以テ解

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

場ニ症ニ衄後其脈イデ和セス故ニ麻黃湯ヲ用ル也モレ衄後脈

症者及二三日桂枝湯根之症者各其脈症隨治法施ス
（し必ス桂枝湯ヲ發汗シテカレ）

大陽病。脈浮緊。發熱。身無汗。自衄者愈。

前章ノ衄ヲ致ス藥力ヲ以テ發汗也衄後モ亦麻黃湯ヲ用ヒ餘邪ヲ
キセ故也然レ自愈ト云ハ杜撰也

二陽併病。大陽初得病時發其汗。汗先出。不微。因轉屬陽

明。雖自微汗出。不惡寒。若太陽病證不罷者。不可下。下之

為逆。如此可小發汗。設面色緣緣正赤者。陽氣鬱鬱在表。

當解之。繫之。若發汗不微。不足言陽氣鬱鬱不得越。當汗

不汗。其人躁煩。不知痛處。不在腹中。作在四肢。按之不可

得。其人短氣。但坐。以汗出不微故也。更發汗則愈。何以知

此章ノ準弱煩碎ヲ取ヒ然レ初學ノシテ之ヲ解ス二陽ハ大陽ト

陽明也大陽ノ症惡寒發熱身疼腰痛等云也陽明ノ症但氣

腹滿潮熱等也然レ此章ハ後人ノ加テ故自汗出テ不惡寒以陽

明ノ症ト也此說後アリ言ハ初大陽ノ症チキ汗ヲ發スチラス故其

熱解テ遂ニ惡寒トシテ止ムチラス熱チチテ汗ヲ出テ惡寒チセ

ル者ハ是大陽ヲ轉テ陽明ニ屬ス也陽明ノ症下スレ然レ大陽ノ

三指者

是汗出微故也何ヲ以知之乎脉滿故也滿ハシテ義ハ陽氣

和利ナル脉也微ハ通微ハ義微セサル汗ノトク出ス也
脉浮數者法當汗出而愈若下之身重心悸者不可發汗
當自汗出乃解所以然者尺中脉微此裏虛須表裏實津

液自和便自汗出愈

悸動氣也心悸胸中ノ動氣也身重胸中動氣アリテ尺脉微
ナル者下スヨウテ裏虛也故ハ汗ヲ發スヘカラス自然下表裏ノ氣
實津液和スハ自汗出テ愈ヘト云フ也然レモ身重心悸ノ尺脉
微ナル者若ク腹ヲ自然下表裏實レ津液自和スルアルヘカ
ラサル也

脉浮緊者法當身疼痛宜以汗解之假令尺中遲者不可

發汗寸口カ本編ノ例非ス總論ニリ且榮氣不足血少ト云モ

本編義ニ非ハ後人ノ加テ也然レモ脉症合サル因テ汗ヲ發スヘカラス

云云治法ヲ慎重ニ考テ貴之キヲ也但不可發汗云テ治法ヲ云ス

使論ニ凡ハ後人ノ考テ貴之キヲ也但不可發汗云テ治法ヲ云ス

脉浮者病在表可發汗宜麻黃湯

脉浮而數者可發汗宜麻黃湯

右二章ハ膚淺ニ取リ足らず且脉浮者脉浮ヲ數ル者其症

多シ一觀ニ麻黃湯宜トスヘカラス

病常自汗出者此為榮氣和榮氣和者外不諧以衛氣不

共榮氣和諧故爾以榮行脉中衛行脉外復發其汗榮衛

和則愈宜桂枝湯

此章冒首ト脉狀ヲ云テ故榮衛多不和ナラレトノ因ヲ知ヘカラス

病人臟無他病時發熱自汗出而不愈者此衛氣不和也

先其時發汗則愈宜桂枝湯

前章同意取之且臟字甚拙

傷寒脈浮緊不發汗因致衄者麻黃湯主之

汗出多衄致麻黃湯主之症本編云此章取之

傷寒不大便六七日頭痛有熱者與承氣湯其小便清者

知不在裏仍在表也當須發汗若頭痛者必衄宜桂枝湯

傷寒六七日頭痛發熱者惡寒止四五日頭痛猶大陽症也

又不大便六七日四五日腹滿潮熱譫語等症ア弁ハイマカ承氣

湯ア与之カラス又小便清者ハ裏ニ在ストイエレ已惡寒發熱身

疼痛等症ア弁ハ發汗ノ症トナスヘカラス又頭痛ノ衄スル者桂枝

湯主之

遺右舉左ヲモテ辨別トスヘカラス如シ傷寒論外古今

方書多此類也故學者先傷寒論法則得會得而後

古今圖書集成醫部全錄治法ヲ施スヘカハ子カハ大過ナレ

傷寒發汗已解半日許復煩脈浮數者可更發汗宜桂枝

湯

汗ヲ發後心煩脈浮數者恐桂枝之症非ス猶餘症

ヲ參考スヘ

凡病若發汗若吐若下若亡津液陰陽自和者必自愈大下

之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治之得小便利必

自愈下之後復發汗必振寒脈微細所以然者以內外俱虛

故也下之後復發汗晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴

無表證脈流緩身無大熱者乾姜附子湯主之

傷寒論卷之三

凡病大陽病或中風或傷寒或合病併病其他諸病發汗
 吐下後也云也若發汗若吐若下若亡津液ハ凡
 汗吐下治法ヲ施ス其脉症の中ニツイエ津液ヲ亡セサルヲアタ
 リス若脉症の中ニツイエ或汗出過多ヲ亡陽ナリ或ハ吐下ス
 ル過多ヲ虛寒トモ是ハ逆治也此又若發汗若吐若下
 而亡津液云々者ハ發汗吐下ノ脉症の中ニツイエ津液ヲ亡ス者アリ
 又津液ヲ亡サル者モアル故也陰陽和者ハ必ス自愈陰陽其
 脉ノ陰陽ト其位地ノ陰陽ト也脉ノ陰陽ハ浮沈也位地ノ陰陽ハ表
 裏也言大陽病中風傷寒或合病併病其他諸症發汗吐下ノ
 治法ヲ施シ其脉症の中ニ津液ヲ亡ラナク其人全無故復
 者ハ若其津液ヲ亡ス者其脉症隨テ法ヲ施スヘシ若其津
 陰陽皆和者ハ病癒者モ必ス自愈者也若クマテヤラスヲ

見之 大下之後復發汗小便不利者亡津液故也勿治
 之得小便利必自愈言大下之後汗ヲ發シ小便利ヤル者ハ
 是病似然然其脉微ヲ察ス其脉陰陽和モ其位地ノ陰陽
 和者津液ヲ亡ス故也是ヲ治ラナカレ必ス自然ニ小便利ニイ
 ヲレ若其脉ノ陰陽和モ其位地ノ陰陽和モ其位地ノ陰陽
 脉症隨テ治法ヲ施スレ 下之後復發汗必振寒脉微細
 所以然者以内外俱虛故也振寒ハ其人發熱セズ但サムク總
 身乙々也惡寒ト大同ミス惡寒ハゾトサムキ也振寒ハ至テサムク
 總身ブルク也微細ハ陰脉也言ハ下之後マタ汗ヲ發シ其人至テサムク
 振イ其脉微細ナル者ハ下因テ其内ヲ虛レ汗ヲ發スニ因テ其外
 虛故也其脉ノ陰陽和モ其位者ノ自然ニ愈ル者非其

脉症隨治法ヲ施スレ若下ノ後マタ汗ヲ發シ甘熱ミトノ夜熱汗
 出振タノヲルイ其脉浮弱モ者ハ是病ニ非スミサ鮮セントモ也
 其治法トメテ容子ヲ見レ是亦自愈ノ者也 下之復發汗
 晝日煩躁不得眠夜而安靜不嘔不渴無表證脉沈微身
 無大熱者乾姜附子湯主之晝日ハヒル也煩躁ハハモンツカノ也
 安靜安靜シモ也凡病晝煩躁ノ夜レツカテ大抵法ニハ晝
 寒アリ虛ル者トス晝日レツカラ夜煩躁ル者ハ法ニハ晝
 アリ實アル者トスコトク然レ非ス大法イ也言ハ下ノ後一ツ汗ヲ發レ
 晝日煩躁ノ安眠スルマツス夜ハ安靜ヲ煩躁セス又不嘔ハ胸中
 毒ナキ也不渴ハ裏熱ナキ也魯表證惡寒發熱身疼痛等
 也脉沈微ハ陰脉也身無大熱ハ熱アル也カクノ如者ハ下
 因テ其内ヲ虛レ汗ヲ發スレ因テ其外ヲ虛内外俱虚スル也

是汗下因テ陰症變シ其脉ノ陰陽和シ其位地ノ陰陽和セラル者也
 其脉症隨治法ヲ施スレ是乾薑附子湯主之也右汗下ノ後
 症アルカク如シ是其脉症ヲ審セス誤テ汗下ヲ施スル生スル變
 症也凡脈者汗下ノ症ニ隨テ脉症ヲ及覆ノ煩重スレ且又世上
 古方ハ手ヲシテ補方ナシト云フ大ニ誤也仲景氏ノ補方アルカクノ如
 但是ノミナヤ一編ノ傷寒論皆補陽ノ治法也後世ノ比スヘキ可
 非ス但其手ヲシテ云ハ傷寒論規則ヲ知ラズ寒下ノ古方ノヲ好テ
 用ル者過也

乾薑附子湯

乾薑 兩

附子 枚

右二味以水三升煮取一升去滓頓服
 北方四逆湯比スレ陰子同之投用イ而乾薑半兩減シ三兩ノ

甘草湯獨附子ノカヲ專ニ故ニ陽氣ニ回復ス其速也陽氣
微ニ亡散者用之然後世薑陽湯ト名ヲテ所謂直中寒症
主方トス

發汗後身疼痛脉沈遲者桂枝加芍藥生薑各一兩人參
三兩新加湯主之

汗ヲ發後身疼痛マムキハツルニ又テ疼痛シ其脉沈遲者陰
症也然猶此方ヲ奉ル者ハ仲景氏ノ治法ニ非ス

桂枝加芍藥生薑各一兩人參三兩新加湯
桂枝四芍藥四甘草二人參三

大棗枚二生薑四
右六味以水一斗二升煮取三升去滓溫服一升

發汗後不可更行桂枝湯汗出而喘無大熱者可與麻黃
杏仁甘草石膏湯

發汗後表氣不和者桂枝湯ヲ与レ症アリ然更ニ桂枝湯ヲ行フ
カスト云テ脉症ヲ与テ論セス二劑ノ取ニ足ラス

麻黃杏仁甘草石膏湯
麻黃四杏仁五甘草二石膏半斤

右四味以水七升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取
二升去滓溫服一升

些少發後餘熱胸中ニ在テ喘ヲナス者又ニ喘息ノ持病熱アテ
渴者用之然レ脉微弱者ニ与テハカス

發汗過多其人又手自冒心下悸欲得按者桂枝甘草
湯主之

又手ノ平ヲ組也冒心ハ手ヲミテ心ヲオウ也心下ハ胸サキ也悸
又手ノ平ヲ組也冒心ハ手ヲミテ心ヲオウ也心下ハ胸サキ也悸

動氣也。按之也。言病人手ヲ組テ自ラ胸ヲオイ又人ヲノヲサ
シテ下欲スル汗ヲ發ス因テ動氣發ス故也。然レ其人又手自

冒心病人一時苦痛ノ狀之病症トスルカラス

桂枝甘草湯

桂枝四兩 甘草二兩

右二味以水三升煮取一升去滓頓服。

發汗後其人喘下悸者欲作奔豚茯苓桂枝甘草大棗湯

主之。

奔豚ハ豚ノイノコ也言ハ其人臍下動氣アルハ豚ノワレ如クキ

上ト云也。是水氣ノ症也。

茯苓桂枝甘草大棗湯

茯苓四兩 桂枝四兩 甘草二兩 大棗十五枚

右四味以甘爛水一斗先煮茯苓減二升內諸藥煮取三

升去滓溫服一升日三服作甘爛水法取水二斗置大盆內

以物揚之水上有珠子五六千顆相逐取用之。

物水ヲタムモノヒヤクノ類也珠子多也泡ヲサス也類ハ丸ノモノ一ツヲ

一顆ト云故泡ノ多クハ五六千顆ト云也相逐ハ泡ノ多クハ盆ノ上ニ

浮コウ云也水二斗ニテ泡一斗ニナルモノ也當時ノ苦一服ニ減

自ホトフハ水四合ヲ鉢ニ入レ田舎ノ茶ヲタケルヤウスレハ泡トスル

此方水邪ヲ下降ス速也故水種又ハ小便不利等ニ脉症隨

テ用ユヘ

發汗後腹脹滿者厚朴生薑甘草半夏人參湯主之。

汗ヲ發シ腹脹滿者症因多シ脉狀ヲテテ論セサハ陰陽表裏ヨ

知レハカラス

傷寒論卷之三

二五出七載

厚朴生薑甘草半夏人參湯

生薑

半夏

人參

甘草

右五味以水一斗煮取三升去滓溫服一升日三服

此方壅塞不通氣降積聚痰飲等用之

傷寒若吐若下後心下逆滿氣上衝胸起則頭眩脈沈緊至汗則動經身為振振搖者茯苓桂枝白朮甘草湯主之發汗後病不解及惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之發汗後病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之發汗後惡寒者虛故也不惡寒但熱者實也當和胃氣與調胃承氣湯

心下逆滿腹中引氣逆上心下滿也氣上衝胸心下逆滿スル氣胸中七衝也起則頭眩起目目イレ居目イレ居也

脈沈緊其症裏也故流也水邪有故三緊也動經ハ经脉ヲ動也身為振搖ハ振ハ力ヲウ也搖ハ多ク也總身マルカウ也言ハ傷寒若吐若下後心下逆上ノ滿其氣胸中ニ上リウキ起テハ頭眩者ハ是或吐ス或因テ其上ヲ破リ或下ス因テ其内ヲ虛ス是因テ水氣鼓動ス故也其病裏也故其脉沈也水氣邪トナル故ニ緊也其茯苓桂枝白朮甘草湯ノ主也若其上ニ汗ヲ發スル水邪イヨイ盛ラ经脉ヲウカシ總身振ト動搖ス猶茯苓桂枝白朮甘草湯ノ主也發汗病不解及テ惡寒者虛故也芍藥甘草附子湯主之惡寒ハ症汗ヲ發スル其病解ノ惡寒ハムヘシ然レハ汗ヲ發ス其病解セズ及テ惡寒者ハ其人モト虚ニ又テ汗ヲ發其虛ヲス故也芍藥甘草附子湯主之發汗後之病仍不解煩躁者茯苓四逆湯主之汗ヲ發ス其外ヲ虚スヲ明ス下

ト云其内ヲ虚スルヲ明ニ病仍不解ト云仍ニ再三治スルヲ云再三治
解セテ也ト云傷寒汗ヲ發シ解セテ若ク是ヲ下ノ解セテ再三治
シ病仍解セテ其上下煩躁者ハ汗下ニ因テ其内外ヲ虚シ又虚ス
因テ水氣ノ症ヲ生カス故也ト云伏以今四逆湯主之也ト云發汗後惡
寒者虚故也ト云惡寒但熱者實也ト云和胃氣與調胃承氣
湯言ハ汗ヲ發シ後其病解ノ惡寒止ベキハハナニ又ヲ惡寒スルハ其人
ト云虚也又汗ヲ發シ因テ陽氣益虚ス故其治法上ニ述ベキ如シ若
又汗ヲ發シ後惡寒モ但熱者實也ト云熱裏ニ入テ胃氣和セザル也ト云
實熱症也調胃承氣湯ヲ与テ下ノ胃氣ヲ和ス也ト云凡ハ與ト云ハ
先此湯ヲ與テ後症ヲ見テ解也ト云發汗ノ後陽熱ノ症モ亦多端
ト云之ヲ傳スカス故但熱者實也ト云細言脉症ヲアアス
之與ト云後症ヲ見テ解ヲ作者ノ深意アルエ也ト云夫發

汗吐下ノ後變症ヲ生スル者ハ皆其法ヲ得テ者也而ノ其法ヲ得セシ者
多ク病人モト虚ヲ常陰ノ症ヲ醫者ツミカニ察セテ純陽ノ治法ヲ施ス
是ヲ以其本症ヲ治セザルニナス種ノ變症ヲ生ス也ト云上ノ章凡
病ト云フ此ニ至ルテ汗吐下後ノ變症ヲ與ル皆陰症ニ陽陽症
ハ苓桂朮甘湯一方ナルヲ以見レ然レ病症多端一概ニ論スヘ
カス故結末ニ純陽ノ症ヲアテテ治療ノ道一偏ニナムヘカラス汗
吐下後ノ變症モトヨリ陽症ノ者アルヲ示シ且是ヲ以陰陽二症ノ
治法ヲ備レ也又汗吐下ヲ以示トイエカリニ設テ辭ヲ其實汗吐
下ヲカリテ其虚ヲ論ス也汗吐下セザル者トイエ其症アル者ハ其治
法同事也學者察セヨ

茯苓桂枝白朮甘草湯

茯苓

桂枝

白朮

甘草

右四味以水六升煮取三升去滓分溫三服

此方發飲心下胸中^ツ上^ツリ^ツ自^ツイ^ツナ^ツレ又^ツ經^ツ絡^ツヲ^ツ多^ツ身^ツ動^ツ搖^ツ者^ツ治^ツス^ツリ^ツヤ^ツリ^ツ發^ツ飲^ツ上^ツニ^ツル^ツ目^ツア^ツテ^ツス^ツル也又^ツ金^ツ匱^ツ心^ツ下^ツ有^ツ痰^ツ飲^ツ胸^ツ脇^ツ支^ツ滿^ツ目^ツ眩^ツ用^ツ桂^ツ苓^ツ水^ツ甘^ツ湯^ツ又^ツ夫^ツ短^ツ氣^ツ有^ツ微^ツ飲^ツ常^ツ從^ツ小^ツ便^ツ去^ツ之^ツ苓^ツ桂^ツ水^ツ甘^ツ湯^ツ主^ツ之^ツ腎^ツ氣^ツ丸^ツ亦^ツ主^ツ之^ツ云^ツ皆^ツ發^ツ水^ツ下^ツ陰^ツ小^ツ便^ツヲ^ツ泄^ツ也故^ツ水^ツ腫^ツ主^ツ其^ツ症^ツ隨^ツテ^ツ用^ツ之^ツレ又^ツ表^ツ症^ツアリ^ツテ^ツ泄^ツ瀉^ツス^ツ者^ツモ^ツツ^ツレ

芍藥甘草附子湯

芍藥^三 甘草^二 附子^{一枚}

右三味以水五升煮取二升五合去滓分溫三服

此方表陽虛汗多惡寒主之又寒濕手足^{ミヅ}掌^ツ急^ツ或^ツ鶴^ツ膝^ツ風^ツ主^ツ熱^ツ者^ツ用^ツ之^ツ又^ツ寒^ツ疝^ツ腹^ツ痛^ツ主^ツ之^ツレ

扶苓四逆湯

扶苓^六 宋板作四兩 人參^二 甘草^二

乾薑^半 附子^{一枚}

右五味以水五升煮取三升去滓溫服七合日三服

此方其位地^ハ火^ツ陰^ツ主^ツ其^ツ症^ツ汗^ツ吐^ツ下^ツ後^ツ虛^ツ寒^ツ諸^ツ症^ツ主^ツ之^ツレ
逆湯^ハ此^ツス^ツレ^ハ緩^ツ方^ツ也又^ツ虛^ツ寒^ツ腫^ツ脹^ツ用^ツ之^ツレ

右正文五章其前三章ハ大陽病中風ノ表症^ハ者^ツヲ^ツケ^ツテ^ツ前^ツノ^ツイ^ツニ^ツ備^ツラ^ツセ^ツ所^ツヲ^ツ補^ツフ^ツ後^ツノ^ツ二^ツ章^ツハ大陽病中風傷寒汗吐下後ノ變症ノ治法ヲ舉^ツク篇初ヨリ此^ツニ^ツ至^ツテ一大段トス其章法ヲ論ス^ツ持^ツ解^ツ詳^ツ也

傷寒論國字辨卷之三終

傷寒論國字辨卷之三

三出卷終

傷寒論國字辨卷之四
甘草二

傷寒論國字辨卷之四

尾張

淺野微元甫 著

大陽病篇第三

大陽病。發汗後。大汗出。胃中乾。煩躁不得眠。欲得飲水者。火與飲之。令胃氣和。則愈。若脈浮。小便不利。微熱消渴者。與五苓散。發汗已。脈浮數。煩渴者。五苓散主之。

大陽病。惡寒發熱。頭項強痛。無汗等。表症。云胃中乾。大汗出。是因胃中津液カワタ也。煩躁。胸中イキレテ苦テアケル也。微熱ハ火レノ熱也。消渴ハカキテ湯茶ヲ多ク飲也。言ハ大陽病表症汗ヲ發シ後煩躁ノ狀ニアタル者。其汗ヲ發スル寸。大汗出。是因胃中津液カワタ故也。大汗出。已ニ汗ヲ發ス。後又大汗出。非ス始メ汗ヲ發ス。寸。大汗出。云也。マテルヤ。是文法也。胃中乾ハ法語也。胃中乾ハ見レ

「カラサレ」也故法語ヲ以テ其ワケヲ知ラセム也欲得「飲水」ハ病人冷水ヲ得テ飲ムハ快カシト思フ也又少與飲ニ「ハ」病人冷水ヲ飲タラズヤヤアミテ飲レハ胃中調和ノ煩躁眠ミヲ得サレ症愈「コレ」トナレ身胃中乾ク症ヲ東熱ノ症トナル「レ」若脈浮小便不利微熱消渴者「五苓散」ハ大陽病始「汗」ヲ散シ大汗出後其脈浮ラ小便不利微熱消渴者ハ「汗」ヲ散シ因テ水氣上逆也五苓散「フ」テ小便利シハ愈然レハ此症相似者多ク陽明病脈浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯ノ症也又傷寒無大熱口燥渴心煩背微惡寒者及ヒ渴欲飲水口乾燥者ハ白虎加人參湯ノ症也此三症「五苓散」ノ症ト相似「テ」ギレヤス「レ」故ニ此「五苓散」後症「見」テ辨ナクモ也發汗已脈浮數煩渴者五苓散

主「ハ」汗「ヲ」散シ前其懸以「ハ」浮或緩「ハ」汗「ヲ」散ス後反「ハ」浮數「ハ」又煩渴加者「ハ」表症「ヲ」時非「ハ」其「ハ」汗「ヲ」散シ因「ハ」水氣上逆也五苓散「ハ」用「ハ」水氣消「ハ」諸症「ヲ」ミ「テ」起テモ故「主」之上也凡「主」之上此方「主」不可疑也凡五苓散症水氣上逆也其間發熱頭痛惡寒惡風等「ハ」五苓散ノ本症非「ハ」其水氣「ハ」故「ハ」表症解「セ」ル也故五苓散「ハ」用「ハ」水氣去「ハ」表症「ハ」隨「ハ」解「ス」

五苓散

猪苓十ハ 澤瀉六兩 茯苓十ハ 桂半 白朮十ハ
右五味為末以白飲和服方寸匕日三服多飲煖水汗出愈方寸匕四方寸匕「ハ」猪苓「ハ」スライ落「ハ」ホ「ハ」云也此時「ハ」二寸ハ合「ハ」子尺ノ八分ホト也煖水ハ湯也多ク飲以下ハ後人ノ考加「ハ」也五苓散其位地大陽ノ裏「ハ」主「ハ」其症ハ小便利「ハ」口渴「ハ」目「ハ」

トスル也故中風傷寒頭痛發熱アリ口渴小便利セサル者コレ又夏
秋之間濕熱デ下利發熱口渴小便利セサル者用コレ又食傷吐瀉

傷寒汗出而渴者五苓散主之。不渴者茯苓甘草湯主之。

汗出ノ渴者表熱裏入ノ白虎湯ノ症ニ似タリ然レ表裏俱熱
時ニ惡風心煩等ノ症アリサレバ白虎湯ノ症非ス是水氣上逆ノ症ナル
ヲ審也故五苓散主之。若汗出ヲ渴ス脉浮數小便利セサル者ハ
是水氣上逆非ス水氣下ル者也。五苓散ノ症非ス茯苓甘
草湯主ル可也。

茯苓甘草湯

茯苓^二 桂枝^二 生薑^三 甘草^一

右四味以水四升煮取二升去滓分溫三服

五苓散猪苓湯白虎湯三方ノ煩渴其病因各同カラス五苓散
三表水上逆ノ陽明胃中ノ滯ナキ者也猪苓湯ハ重水水上逆ノ陽明
胃中ノ滯アリ者也其煩渴ハ皆水逆ノ上逆也熱アリイテ亦輕
瘥白虎湯ハ表熱入テ心胸中ニ結シ大ニ煩渴スル者也而ソ其
熱モ亦甚キ症也

五苓散猪苓湯茯苓甘草湯茯苓桂枝白朮甘草湯小耆詭湯
真武湯六方皆水氣ノ症也而其位地ハ皆同カス五苓散ハ位地ハ
太陽也猪苓湯ノ位地ハ陽明也五苓散ハ表ヲ猪苓湯ハ裏也
別茯苓甘草湯ハ茯苓桂枝白朮甘草湯ハ其位地上ニ太陽也而
茯苓甘草湯ハ大表ヲ茯苓桂枝白朮甘草湯ハ太陽ノ裏也小耆
詭湯ハ陽症ノ水氣心下ニアリテ熱症也真武湯ハ陰症ノ水氣ニ
法於テ熱症ナキ者也。是水氣六方ノ別也。

以上二章始一章ハ大陽病解後五苓散猪苓湯ノ疑症ヲ明ス

終一章ハ五苓散猪苓湯甘草湯ノ別ヲ明ス

中風發熱六七日不解而煩有表裏症渴欲飲水水入則吐者名曰水逆五苓散主之

中風發熱六七日不解而煩者ハ中風ハモト淺症ト法於六七日ハ解スベシ也然レ解セズ又煩ヲ加者ハ水氣ノ症アリ故ニ解セズ又煩ヲ加也者表裏證トハ表症ハ發熱ヲ云裏症ハ煩渴ヲ云渴欲飲水水入則吐者名曰水逆トハ口渴メ水ヲ飲ミテ欲水口ハ則吐ル者其人心下逆上ノ水ヲテ飲テ水ト相ハム故ニ吐ス是ヲ水逆ト云言ハ中風六七日其發熱解セズ又煩ス者ハ内水氣故也是ヲ以テ表ハ中風ノ發熱解セズ裏ハ水氣ノ煩渴アリ渴メ水ヲ飲ミテ飲ミ則心下逆上ノ水ト相ハムテ吐ス者水逆ノ症也五苓散

用テ其心下水ヲ治スト表熱モ亦隨テ解ル也

去持脉時病人手又自冒心師因試令飲而不飲者受必兩耳聾無聞也所以然者以重發汗虛故如此

手又分手ヲ組也師ハ醫師也聾ハ耳ノキエス也汗ヲヨク發テ陽氣虛多ホクナリ也陽氣虛實ヲ知テ多ク汗ヲ發テ者或ハトス然レハ匡ノ病症ヲ見タテハ脉ト症ヲ以テ照シ合セテ陰陽表裏上下淺深ヲ定メ也然レ耳聾一症ヲ以テ論スト粗陋ニ取

發汗後飲水多必喘以水灌之亦喘

灌ハ水ヲノギカケル也水ヲ飲テ多シ其水胸中ニ停ハ喘ル汗後限ル解ニカサレテ也要ス皆取ニ足ス

發汗後水漿不得入口為逆若更發汗必吐下不止發汗吐下後虛煩不得眠若劇者必反覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑豉湯主之發汗若下之而煩熱胸中窒者梔子豉湯主之

發汗後水漿不得入口為逆上凡發汗之法陽症治之ノ法也故若陰症施之ハ更逆ヲ發ス是ヲ逆治ト云今發汗ヲ後餘症ナク又渴モナド但水ヲ以テ口ニ入ルモ吐キ禁ヲ以テ口ニ入モ吐クハ病人陰症若ク帶陰ノ症ヲ審カセテ純陽發汗ノ治法ヲ施故也是ヲ逆治ト云也若更ニ發汗ヲ必吐下ノ不止トハ已ニ水禁口ニ入ルヲ得ル猶表症アリ更ニ發汗スルハ必其變症吐下ノ止サルニ至ル是厥陰ノ症ナル也發汗吐下後虛煩不得眠ヲハ發汗吐下止ニ其法ヲ治ス逆ヲ去リ同ヲ云發汗ノ逆ハ陽ヲ亡スルヲ云下逆ハ

胃中ヲ虛スルヲ云吐逆ハ病毒胸中へ上リ攻ルク云虛煩ハ胸中物フルカ如クイキ苦ヲ感テアタラシトイテ實ハ物ヲ虛氣ニシテ云若劇者ハ必ス又覆顛倒心中懊憹梔子豉湯主之ハ刺ハ甚キ也又覆顛倒ハ病人苦ヲモリ寐スルコトヲ交リタリカク也心中懊憹又覆顛倒ト云ハイハレスイカヒスヘカス苦ヲ云此二句心中懊憹又覆顛倒ト云ハキ者也然レ今又覆顛倒心中懊憹ト云フモノハ發汗吐下後卒然ト又覆顛倒スル者アリ始何ノ故ヲ知ヌマワク是ヲ問ハ心中懊憹スル故也又始ハ虛煩ヲ不得眠卒然又覆顛倒スル者アリ此二條ヲ明ニス故ニ只ト二句上下ニマキタル也又文法也梔子豉湯主之ハ右ノ症ハ梔子豉湯主之而左ノ疑ハカレ也若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者梔子生薑湯主之ハ少氣者嘔者皆梔子豉湯主之若症ヲ加ヘ者也少氣ハ元氣ヲ云也梔子豉湯陽虛ノ症又他ノ病毒

胸中引之氣方也故甘草加和散也咽之者胃氣通利之逆上之也故生薑加導也發汗若下之煩熱胸中窒者梔子豉湯主之。人發汗又下之煩熱又熱又胸中窒者及發熱胸中窒者梔子豉湯主之。又發汗煩熱胸中窒者水藥口入者亦梔子豉湯主之也。

梔子豉湯

梔子枝十四 香豉四合

右二味以水四升先煮梔子得二升半內豉煮取一升半去滓分爲二服溫進下服得吐者止後服。

此方位地胸中主之。梔子陽虛熱胸中集心煩主之。主之香豉病毒胸中滿主之。如苦主之。

梔子甘草豉湯

梔子豉湯方中加甘草二兩餘同本方。

梔子生薑豉湯

梔子豉湯方中加生薑五兩餘同本方。

傷寒五六日大下之後身熱不去心中結痛者赤欲解也梔子豉湯主之。

身熱五六日大下之後身熱不退者身熱去也言胸中結痛者大下之後故言客氣胸中結聚又

也此症之故身熱去也故身熱之方置之但胸中

傷寒下後心煩腹滿卧起不安者梔子厚朴湯主之。

傷寒衣被不潔下之故表裏裏入心煩腹滿卧起

此方カラレ者ハ腹滿ヲ主症ト心煩ヲ客症ト也然レ則下ス
一症似タリ然レ已ニ下後ノ腹滿ニ寸ハ其虛邪ナリ客カ也
故小承氣湯ノ二味ヲ以テ腹滿ヲ和シ梔子ヲ加テ心煩ヲ治ス

梔子厚朴湯

梔子十枚

枳實四枚

厚朴兩

右三味以水三升半煮取一升半去滓分三服溫進一服得

吐者止後服

傷寒醫以丸藥大下之身熱不去微煩者梔子乾薑湯主之
醫以丸藥大下之ハ医云大ト云ス通治ノ以テ甚トスル辭也
ステ脉症ヲ審セテス通治スル皆医ノ外也況マ巴豆入りト丸藥
ヲ以テ大下ノ通治ラス其ケシカラズ医者也云フ意也此是医ノ字ト大下
ト此意ヲ言外ラズ身熱不去医大下ノ陽虛スル深キヲ以テ

故身熱不去也微煩ハ火ト煩也此症陽虛ヲ深ク故乾薑ヲ用
是也梔子鼓湯ノ症ハ陽虛スルヲ淺者也而其症ハ反覆顛倒心中
懊懣ス此症陽虛スルヲ深者也而但微煩耳也二症病人淺
深ト症候ト相反スヲカク如レ是治療ノ見症ノミヲ以テ從事スヘカラ
サルニエシ也

梔子乾薑湯

梔子十枚

乾薑二兩

右二味以水三升半煮取一升半去滓分二服溫進下服得
吐者止後服

此方其位地ハ大陽ヲ主トリ其症ハ胃中陽虛ノ胸中熱ル者

凡用梔子鼓湯病人當微瀉者不可与服之

微瀉ハ少下利也。梔子豉湯ノ諸方皆發汗吐下後ノタメニ設ル
所ナレハ病人舊微瀉スル者固ヨリ不可ナレ又服ノ吐スル者亦心所
主然此章及ヒ諸方ノ後得吐者止後服ト云者後人ノ加
也

右正文五章始一章ハ五苓散水逆ノ症ヲアケテ下ノ梔子豉湯
相照ノ以テ辨別ス示ス也二章ハ梔子豉湯ノ本症ヲ舉三章ハ
梔子豉湯ノ症表熱ヲ常ニ有テ者ヲ多ク是表裏俱熱ノ者似ク四章ハ
梔子豉湯ノ症其本腹部ニ在テ者ヲアケテ上下ノ症アル者也五
章ハ梔子豉湯ノ症陽虛ノ極ニ至陰症入ト云者ヲ舉ル也
大陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動振
振欲擗地者真武湯主之

大陽病發汗汗出不解其人仍發熱心下悸頭眩身動振

大其症解スヘキハ少ナシ解セタメ其人猶又發熱スル也心下悸ハ心下ハ
胸下也悸ハ動悸也頭眩ハ目ニイ也身動振ハ欲擗地ハ動振即
肉間ヲ動身ノ肉ニイ也振ハソク身ノフル也擗ハ擗ハ同
少手ヲ以テ押開ト也病人陽氣虛ノ身外廓ノシテリナキヤリニ
示テ手ヲ以テ押開テ入タラ思フ氣味也言只大陽病發熱惡寒頭痛
身重等ノ症其汗ヲ發シ汗出ハ其症解スヘキハツタルニ解ス猶又
發熱ノ且又心下悸頭眩身動振ト欲擗地者ハ汗ヲ發
スル因テ上陽レ且水氣ノ症アル也故ニ真武湯ヲ以テ陽ヲタステ
テ水氣ヲ治ス也是始メ大陽病也ト云ハ汗出テ惡風脈微弱
トノ症陰症ヲ常ニ有テ者ヲ多ク察ス汗ヲ發スル因テ此變症ヲ生
ス也心下悸以下皆陰症水氣ノ候也
此症イ皇レ陽症帶陰也始メ大陽病發汗汗出不解其人仍發

身病者、頭痛項強、發熱惡寒、惡風、或汗出、或汗不出、或身病者、汗者、其汗多、汗出者、諸症皆イニキハツナル、其人發熱、心下悸、頭眩、身動、振々、欲舞、地者、其人、陽症、常陰、也、此病、人、我、療治、コトクト、其症、候、察、見、ル、ニ、陽、生、也、今、此、病、人、有、我、療治、コトクト、其症、候、察、見、ル、ニ、陽、病、三、四、日、五、六、日、汗、ヲ、數、ク、汗、十、分、出、タ、レ、ハ、熱、甘、メ、ス、續、テ、ス、イ、ニ、數、熱、舌、胎、黃、ハ、食、進、ニ、ス、目、眩、シ、タ、コ、多、ク、總、身、フ、リ、イ、又、肌、肉、ヒ、ク、ト、フ、リ、動、キ、何、ト、落、ツ、カ、獨、リ、ユ、リ、ト、寐、ヲ、居、キ、モ、ナ、ス、人、ニ、シ、ツ、カ、リ、ト、抱、カ、レ、居、カ、ル、マ、ウ、ス、ル、ヘ、又、其、脉、狀、ハ、浮、數、カ、浮、大、或、ハ、緊、數、ノ、類、ナ、ル、此、章、義、知、レ、タ、真、武、湯、用、タ、レ、此、章、ヲ、義、知、レ、タ、陰、症、ヲ、知、ノ、附、子、ヲ、用、ユ、ヤ、西、ア、モ、ト、ハ、今、イ、ウ、モ、陰、症、手、足、ニ、下、利、脉、微、類、也、是、テ、ハ、附、子、ヲ、用、イ、ス、若、熱、症、者、附、子、用、イ、ス、陰、症、者、附、子、用、イ、ス、也、然、レ、此、症、手、足、ニ、下、利、脉、微、ノ、類、症、ヲ、マ、ル、ナ、シ、而、伸、景、氏、附、子、ヲ、用、ル、ニ、ハ、其、陰、症、ヲ、ハ、疑、ナ、シ、然、レ、手、足、ニ、下、利、脉、微、等、ノ、症、ヲ、種、ノ、熱、症、アル、者、陰、症、ヲ、帶、タル、者、又、明、也、而、今、手、足、ニ、下、利、脉、微、ノ、症、非、ハ、附、子、ヲ、用、イ、ス、故、世、間、陽、症、帶、陰、ノ、症、治、ス、ア、タ、サ、レ、ミ、ナ、ラ、ス、誤、ホ、ノ、タ、メ、ニ、此、ス、ル、者、多、シ、歎、ス、
 (キ、ニ、非、ス、ヤ)

咽、喉、乾、燥、者、不、可、發、汗、
 咽、喉、ハ、ノ、ド、也、乾、燥、ハ、カ、ワ、ク、也、咽、喉、カ、ワ、ク、者、ハ、裏、ニ、熱、ツ、ヨ、キ、症、也、發、汗、ハ、溫、ホ、フ、以、テ、表、ヲ、攻、ル、也、且、是、病、裏、ニ、テ、リ、表、ヲ、セ、メ、熱、症、ニ、溫、ホ、ヲ、施、ス、通、治、ニ、ユ、シ、也

淋、家、不、可、發、汗、發、汗、必、使、血、
 淋、家、ハ、淋、病、也、淋、病、ハ、濕、熱、裏、ニ、ル、也、溫、ホ、ヲ、用、ハ、其、血、ヲ、動、シ、使、血、也

衾家雖身疼痛不可發汗汗出則瘳

衾家腫物多者不可發汗也瘳產後或亡血大虛人引之

病也衾家膿血多者不可發汗也瘳又汗發亡陽之症也

衾家不可發汗汗出必額上陷脈急豎直視不能眴不得

眠衾家鼻衄血出人也額上陷也隨之入也急豎也

亡血家不可發汗發汗則寒慄而振亡血家吐血下血

亡血家吐血下血也寒慄而振惡寒也亡血家亦是亦亡

汗家重發汗必恍惚心亂小便已陰痿此為亡陽也

汗家常汗出人也恍惚心亂小便已陰痿此為亡陽也

亡陽也關之此方不可用也

右五苓散方章曰真武湯方章曰發汗之害

生之故也此六章之發汗之害也然則六章之後人

加也此六章之非斯也凡萬病之汗發之害也

病入之脈陰陽表裏之病一症之汗發之害也

也故右五苓散方章曰真武湯方章曰發汗之害

湯方章曰正方是其人陽症陽脈也故也

氏之法凡萬病之表症陽脈也皆汗發之害也

汗發之害也其規矩法度一部之傷寒論悉備

出於此

出於此

出於此

出於此

ナラバ凡百ノ治法皆然リ故ニ傷寒ニ論ヲ會得スレハ一病一
症ニカヘラス萬病ノ治方一貫ニ手ニ入テノル所ナレ然ラスノ一病
一症ヲ論スルニ混雜ノ手ニ入ス是法アルト法ナク故也ヨクヨク

考スヤ也

病人有寒復發汗胃中冷必吐蚘
腹中虫蚘蚘ノヤウル者也病人有寒ハ腹中寒アリテ下利
腹痛或ハ食ヲ吐スル類テ陰症也然レハ汗ヲ發スレハスノ四月
中ノ陽氣ミロヘテ吐蚘ノ症ナル也

本發汗而復下之此為逆也若先發汗治不為逆本先下
之而又汗之為逆若先下之治不為逆

本發汗而復下之ハモト汗ヲ發スヘキ表症ナルニ汗ヲ發セシメ下之
於是表熱裏裏入テ裏症生ス是ヲ逆治トスル也本先下之

而又汗之為逆ハ本先下スヘキ裏症ナルヲ下サスノ汗ヲ發ス於是熱
盛テ變症正ス是ヲ逆治トスル也是治法ノ前後ヲ論スル也然
レハ脉症ヲアタテ論セス故ニ益ナレ

傷寒醫下之續得下利清穀不止身疼痛者急當救裏後身
疼痛清便自調者急當救表救裏宜四逆湯救表宜桂枝湯
下利清穀ハ食物化セス色カラスノ下利也腹中虛寒ノ症也清
便ハ清穀ノ大便秘也傷寒表症アリテ汗ヲ發スヘキ者ナルニ誤
下之於是陰症表ミイテ下利レ其下利食物變化セス清穀ニテ
下リ身疼痛者急當以陰虛寒ノ劇症也法ニ於テ先急四逆
湯ヲ与テ裏虛寒ヲ救レ清穀下利止テ大便已調イ猶身疼痛
者ハ桂枝湯ヲ与テ其表ヲ救ヘキ也此症傷寒表症ヨリ變シ来
ル者ナラハ先表ヲ救テ而後裏ヲ救フヘキ者ニ似タリ然レ陰陽

二症アル者ハ先陰證ヲ救テ而後陽證ヲ治ス一定ノイテ治法ハ綱也
若此法知テ先陽證ヲ治スハ忽死症ナル初学ノ尤モ會得スヘキ
也此症先四逆湯ヲ与テ清穀下利ノ陰證ヲ治スハ陽氣復
テ清便自調イ身疼痛モ自然イユ若猶愈セ者ハ傷寒ノ表症
如沬證ニ症非ス但其表氣和セザル故也桂枝湯ヲ与テ表ヲ和
シ全ク愈ユ急當救裏ヲ下利清穀ハ少陰ノ症ノ至テ深キ者也
スレニルヤカスル寸口此症ナル故ニ表症ノ身疼痛ハステ置テ裏
救キ也又急當救表トハ身疼痛スレハ陰ノ本症ナリ又已ニ清穀
下利ノ後モトハ表氣不和ノ症ナルモ又ユルタカラ此故也又四逆
湯桂枝湯ト主ニト云多與トイフモノ已ニ清穀下利ナリテ通脉
四逆湯ノ症至モハカ此カラ又已ニ清穀下利ノ後ナルハ身疼痛ス
レハ附子湯ノ症モ知ヘカラス故ニトモニ與ト云後症ヲ觀ル辭ヲ

作也是治法ヲ慎重スルノ至也

右二章上ノ梔子豉湯陽虛ノ症ト五苓散表水ノ症トヲウ
ケテ陰證ノ別ヲ明ス始一章少陰水氣ノ症ヲ明ス終一章少陰
虛寒ノ極ヲ明シ前セ七章ヲ結ス

病發熱頭痛脈反沈若不差身體疼痛當救其裏宜四逆
湯

發熱頭痛脈反沈又身體疼痛者ハ少陰ノ表症ヲ麻黃細辛
附子ノ症也且當救其裏ト云ハ表裏両症ニ者表ヲステ先ツ裏ヲ
救フ也此章ハ偽喜ナリ内ニモコレト拙キモノ也イカトナハ散熱頭痛
ハ太陽ノ表症也其脈浮ナハ桂枝麻黃辛ノ症ナリ其脈沈ナ故ニ
少陰ノ表症ヲ麻黃細辛附子湯ノ症也又身體疼痛ノ其脈浮
ナハ太陽病麻黃湯ノ症ナリ其脈沈ナハ少陰病附子湯ノ症

也又四逆湯、少陰ノ主方ナレ其症吐利厥逆ヲ目アテ、少陰裏
症ノ主方也然言此裏、少陰ノ表症ナレハ其主方ニツイテ表裏
ノ干カイ也豈仲景氏シカク如キ表裏混雜イテ然レ傷寒

論、後人ノ偽章ナレ明白ナレ也

大陽病先下之而不愈、因復發汗、以此表裏俱虛、其人因
致冒、冒家汗出自愈、所以然者、汗出表和故也、裏亦和然

後下之

冒ハ物ヲ以テ首ヲオウ也故、鬱冒トマキテ熱ニテ逆上ノ物ヲウリ
タルヤナレ也故、冒家汗出ハ熱鬱散ノイユ然レ此症先下ノ
マテ汗ヲ發シ是ヲ以表裏俱虛者汗出ハ自愈云ハ道理ナキ

也

