




重刻脈學奇經八脈序
余奉中丞夏公教既刻本草綱目矣臨川
令袁君與李君時珍鄉人也則取其脈學
與奇經八脈考示余曰李君平生學力盡
在此幸併刻之爲全書余念古良醫治疾
未有不先診脉者自軒岐已然辨人鬼別
男女特其粗爾微茫呼吸之間而生死輕
重係焉如濟北才人顏色不變而在死法

中其脉病也故曰無數者同之有數者異之苟不明乎脉之法則所同者多矣脉學者專辨脉訣之誤也今之醫者無不誦脉訣而李君謂非叔和著特條列而正之然非李君之言也宋陳無擇嘗斥爲高陽生作矣亦非無擇之言也朱晦翁嘗譏其鄙淺僞書矣脉訣行而脉經隱脉訣之誤既明脉經其可復興乎奇經八脉者其名出

于難經而其論原于素問以非十二經之正故謂之奇經也昔淳于意拜受公乘陽慶脉書奇咳術卽此世之醫者且不能舉其數况通其義乎叔和曰天雨降下溝渠溢滿聖人不能圖也脉絡流溢諸經不能復拘也然則八脉可以不講乎八脉明而脈理盡矣脈理盡而病無不察可以窮吾治之之方矣語云人之所病病疾多而醫

月
月
之所病，病道少通乎。脉學又通乎。八脉之學道其患也乎哉？因併刻附于本草之後。

癸卯秋七月上澣長洲張鼎思書



王叔和考證諸書目錄
黃帝素問 王啓文注
皇甫謐甲乙經 玄珠密語
諸家注解難經 吕廣虞廣
李本正王宗正
華佗脉經 杜光庭
王叔和脉經
徐氏脉經訣文
吳廣脉賦
王叔和脉經
嵇氏遺書
巢氏病源
太平聖惠方
仲景金匱方
仲景傷寒論
千金方論
外臺祕要
太極圖說

王啓文注
張元素
周易
清伯仁
裴世賢
宋廷臣
陳瑞孫
謝晉翁
成無己
巴注
孫真人
王謙

王叔和脉經
嵇氏遺書
巢氏病源
太平聖惠方
仲景金匱方
仲景傷寒論
千金方論
外臺祕要
太極圖說

王啓文注
張元素
周易
清伯仁
裴世賢
宋廷臣
陳瑞孫
謝晉翁
成無己
巴注
孫真人
王謙

諸家注解高陽生脈訣

通真子
李希范

南陽活人書

張潔古
沈氏

張世賢

池氏

勿吮子

脉經手訣

及

劉

元

陳言三因方

脉要新括

通真子
溫真

診脉湏知

劉

賈

方脈舉要

劉

三

王貺指迷方

崔紫虛脈訣

李希范脈體

脉理玄祕

李東垣

楊仁齋醫脉真經

蕭世基脈粹

碎金脈訣

張擴太素脈訣

魏伯祖脈說

張杲醫說

楊文德太素脈訣

王適齋脈訣

王世相醫問

詹炎舉太素脈訣

脉訣刊誤

戴同父

決脈精要

黎民書

彭用光太素脈

脉訣圖說

朱丹溪傳

診家樞要

滑稽書

醫經小學

劉純

醫學權輿

朱丹溪傳

儒醫精要

趙繼宗書

儲華谷祛疑說

朱子文集

吳草蘆集

祁貫傳道集

題奇經八脉攷

奇經八脉聞之舊矣而不解其奧今讀瀕湖李君八脉攷原委精詳經絡貫徹頓覺蒙闇塞決胸次豁然誠僊醫一家不空指南也然匪六易牙亦未易味之七李君博極群書叅討今古九流百氏咸有撰述此特其丁譬解因僻述其槩而題之于足厥真著卷中錄

隆慶壬申中秋日道南吳哲拜題

奇經八脉攷引

奇經八脉攷者李君瀕湖所撰輯以活人者也經有奇經文

新編奇經八脈考 卷之二
正有奇獨攷奇者奇經人所略故致詳焉并病原治
法靡不條具若指掌立惟醫學有賴玄修之士亦
因以見身中造化真機矣用心之勤如此何其仁哉
瀕湖世儒兼以醫鳴一門父子兄弟富有著述此特
見一斑耳問不佞嘗推其直諒多聞之益因僭識簡
端以告後之君子

明萬曆丁丑小暑日同里日岩顧問頓首書

奇經八脈攷

奇經八脈總說

凡人一身有經脉絡脉直行曰經旁支曰絡經凡十二經各有一別絡而脾又有一大絡并任督二絡爲十五也難經作陰絡陽絡共二十七氣相隨上下如泉之流如日月之行不得休息故陰脉營於五藏陽脉營於六府陰陽相貫如環無端莫知其紀終而復始其

流溢之氣入於奇經轉相灌漑內溫藏府外濡腠理
奇經凡八脉不拘制於十二正經無表裏配合故謂
之奇蓋正經猶夫溝渠奇經猶夫湖澤正經之脉隆
盛則溢於奇經故秦越人比之天雨降下溝渠溢滿
霑濡妄行流於湖澤此發靈素未發之祕者也八脉
散在群書者畧而不悉醫不知此罔探病機仙不知
此難安爐鼎時珍不敏叅攷諸說萃集於左以備學
仙醫者筌蹄之用云

奇經八脉考

奇經八脉者陰維也陽維也陰蹻也陽蹻也衝也任
也督也帶也陽維起於諸陽之會由外踝而上行於
筋分陰維起於諸陰之交由內踝而上行於營分所
以爲一身之綱維也陽蹻起於跟中循外踝上行於
身之左右陰蹻起於跟中循內踝上行於身之左右
所以使機關之蹻捷也督脉起於會陰循背而行於
陰循腹而行於身之前爲陰麻之海任脉起於會
海衝脉起於會陰夾臍而行直衝於上爲諸脉之衝
序里文

要故曰十二經脉之海帶脉則橫圍於腰狀如束帶所以總約諸脉者也是故陽維主一身之表陰維主一身之裏以乾坤言也陽蹻主一身左右之陽陰蹻主一身左右之陰以東西言也督主身後之陽任衝主身前之陰以南北言也帶脉橫束諸脉以不令言也是故醫而知乎八脉則虎龍升降玄牝幽微之微妙得矣

陰維脉

陰維起於諸陰之交其脉發於足少陰築賓穴爲陰維之郄在內踝上五寸腨肉分中上循股內廉上行入小腹會足太陰厥陰少陰陽明於府舍在腹哀下
中行四寸半並
月下一寸五分並
夫腹中行四十半循脇肋會足厥陰於期門直乳下
上胸膈挾咽與任脉會於天突廉泉上至項前而終
禾突在結喉下四寸半宛宛中
廉泉在結喉下二寸中央是穴凡一十四穴

陽維脉

陽維起於諸陽之會其脉發於足太陽金門穴在足

卷之三

三

外踝下十五分上外踝七十會足少陽於陽交爲
在外踝上七寸循膝外廉上髀厭抵小腹

陽維之經

在外踝上七寸斜屬二陽之間循膝

循脇肋斜上肘

卷之三

陽於大臂 骨上 髓中 在臂外

附上七子兩瓶鑑

過肩前題

手少陽會於臑會天門

肩端二寸宛宛

上陷中缺分
骨前一寸五
後大指下與

上大入肩後會手十一分

上腦空

小靈後一寸半夾承靈

卷之三

卷之三

臨泣後
臨泣在睡人面
參際五分

陽明五

子脉會於陽白

卷之三

本神直耳上人髮際中凡三十二

越人曰

易雜陰雜者維絡於身，

詳經者也

故陽維起於諸陽之會，於陽陰維維於陰，陰

然失志，深

加陽而維於陰，陰而

雜爲病苦

心痛 滲滲 緾
慢 痩

言經序
卷之三
張潔古曰：衛爲陽主表，陽維受邪爲病，在表故苦寒。熱營爲陰主裏，陰維受邪爲病，在裏故苦心痛，陰陽相維則營衛和諧矣。營衛不_安諧則悵然失志，不能自收持矣。何以知之？仲景云：病常自汗，是衛氣不與營氣和也。宜桂枝湯和之。又云：服桂枝反煩不解。先刺風池風府，却與桂枝湯此一穴，乃陽維之會也。謂桂枝後尚自汗發熱惡寒，其脉寸浮尺弱，而反煩爲病在陽維，故先鍼此二穴。仲景又云：藏無他病時發熱自汗出而不愈，此衛氣不和也。桂枝湯主之。

又曰：陰維爲病苦心痛，治在三陰之交太陰證，則理中湯少陰證，則四逆湯厥陰證，則當歸四逆湯吳茱萸湯主之。
李瀕湖曰：陽維之脈與手足三陽相維，而足太陽少陽，則始終相聯附者，寒熱之證；二經有之，故陽維爲病亦苦寒熱，蓋衛氣晝行於陽，夜行於陰，陰虛則陽爭，而發熱；寒熱則寒熱之在表，而兼太陽證者，有汗當用桂枝，無汗當用麻黃；寒熱之在半表半裏而兼少

陽證者當用小柴胡加減治之。若夫營衛慄卑而病寒熱者黃芪建中及八物湯之類主之。潔古獨以桂枝一證屬之。陽維似未擴充。至於陰維爲病主心痛而三陰熱厥作痛似未備矣。蓋陰維之脉雖交三陰而行實與任脉同歸故心痛多屬少陰厥陰任脉之氣上衝而然暴痛無熟久痛無寒按之少止者爲虛不可按近者爲實。凡寒痛兼少陰及任脉者四逆湯兼厥陰者當歸四逆湯兼太陰者理中湯主之。凡熱王叔和脉經曰寸口脉從少陰斜至太陽是陽維脉也。動苦肌肉痺癢皮膚痛下部不仁汗出而寒又苦在耳前起骨上廉開可有空乃手足少陽陽明之會。又曰寸口脉從少陽斜至厥陰是陰維脉也。動苦癲。

痛兼少陰及任脉者金鈴散延胡索散兼厥陰者朱砂散兼太陰者承氣湯主之。若營血內傷兼夫任衝手厥陰者則宜四物湯養營湯妙香散之類因病藥之如此則陰陽虛實庶乎其不差矣。

王叔和脉經曰寸口脉從少陰斜至太陽是陽維脉也。動苦肌肉痺癢皮膚痛下部不仁汗出而寒又苦在耳前起骨上廉開可有空乃手足少陽陽明之會。又曰寸口脉從少陽斜至厥陰是陰維脉也。動苦癲。

奇經八脈考 卷之三
痛瘡仆羊鳴，又苦僵仆失音肌肉痺瘻，應時自發汗出，惡風身洗洗然也。取陽白金門。見陽前

僕參蹠

瀕湖曰：王叔和以癲癇屬陰維陽維，靈樞經以癲癇屬陰蹻陽蹻，二說義異旨同，蓋陽維由外踝而上循陽分而至肩肘歷耳額而終行於衛分諸陽之會，陰維由內踝而上循陰分而上脇至咽行於營分諸陰之交，陽蹻起於跟中循外踝上行於股外至脇肋肩髀行於一身之左右而終於目內眦，陰蹻起於跟中循內踝上行於股內陰氣行於一身。

身之左右，至咽喉會任脉而終於目內眞邪，在陰維陰蹻則發癲邪，在陽維陽蹻則發癇，癇動而屬之陽陽脉主之，癲靜而屬陰陰脉主之，太抵二疾當內取之四脉之穴分其陰陽而已。王叔和曰：診得陽維脉浮者暫起目眩，陽盛實者苦肩息洒洒如寒，診得陰維脉沈太而實者苦胸中痛，腹下支滿心痛，如有瘡狀，男子兩脇下實，腰中痛，女子陰中痛。

素問腰痛論曰陽維之脉令人腰痛。痛上怫然，腫刺。

陽維之脈與太陽合，膕間去地一尺。

王啓玄曰：陽維起於陽，則太陽之所生並行而上，至膕下復與太陽合而上也。去地一尺乃承山穴，在鏡腦腸下分內間陷中可刺七分，

肉里之脉令人腰痛不可以欬欬則筋縮急刺肉里之脉爲二病，在太陽之外少陽絕骨之後。

王啓玄曰：肉里之脉少陽所生陽維脈氣所發，絕骨之後陽維所過分肉穴也在足外踝直上絕骨

之端如後二分筋肉分間刺可五分

飛陽之脈令人腰痛痛拂拂然甚則悲以恐

王啓玄曰此陰維之脈也去內踝上五寸脇分申並

少陰經而上也刺飛陽之脈在內踝上五寸少陰之前與陰維之會禁賓穴也○甲乙坐元太陽之絡別走少陰者名曰飛陽

人足陰蹻脉

陰蹻者足少陰之別脉其脉起於跟中足少陽然谷

穴之後然谷在膕前同足少陰循內踝下照海穴

卷之三

6+

卷之三

交信在內踝
骨上少陰前

下五分

直上循陰股入陰上循胸裏入缺盆上出

人迎之前至咽嚙交費衝肺入喉內崩土行屬

背與手足太陽足陽明

張紫陽八脉經云，八脉者，衝脈在風府穴下，督脈在
臍後，任脈在臍前，帶脈在腰陰蹻脈在尾閭前，陰囊
下，陽蹻脈在尾閭後二節，陰維脈在項前一寸三分。
陽維脈在項後一寸三分。凡人有此八脉，俱屬陰神。

閉而不開惟神仙以陽炁衝開故能得道八脉者先
天太道之根一炁之祖采之惟在陰蹻爲先此脈纔
動諸脉皆通次督脈衝三脉總爲經脈造化之源而
陰蹻一脈散在丹經其名頗多曰天根曰死戶曰復
命關曰酆都鬼戶曰死生根有神主之名曰桃康上
通泥丸下透涌泉倘能知此使真炁聚散皆從此關
竅則天門常開地戶永閉瓦脉周流於一身貫通上
下和炁自然上朝陽長陰消水中火發雪裏花開所
謂天根月窟開來往三十太宮都是春得之者身體

輕健容衰返壯昏昏默默如醉如癡此其驗也要知西南之鄉乃坤地尾間之前膀胱之後小腸之下靈龜之上此乃天地逐日所生炁根產鉛之地也醫家不知有此

瀕湖曰丹書論及陽精河車皆往往以任衝督脈命門三焦爲說未有專指陰蹻者而紫陽八卦脉經所載經脉稍與醫家之說不同然內景隧道惟返觀者能照察之其言必不謬也

陽蹻脉

陽蹻者足太陽之別脉其脉起於跟中出於外踝下足太陽申脉穴在外踝下五分陷中容爪甲白肉際當踝後逸跟以僕參爲本在跟骨下陷中拱足得之足上外踝上三寸以附陽爲郄在外踝上三寸足太陽之穴也直上循股外廉循脇後胛上會手太陽陽維於臑俞在肩後大骨下胛上廉陷中上行肩臂外廉會手陽明於巨骨在肩尖端上行兩臂定窩中舉臂取之有空又骨罅間陷中會手陽明少陽於肩髃行巨竈夾腋孔旁不分近下有微脉動處同足陽明上而

至目內眞與手足太陽足陽明陰蹻五脉會於瞤中。

明穴見陰蹻下從睛明上行入髮際下耳後入風池而終

風池在耳後夾玉枕骨下髮際陷中

凡十二穴○難經曰蹻脉從足

筋骨下髮際陷中

至目長七尺五寸合一丈五尺

甲乙經曰蹻脉有陰陽何者當其數曰男子數其陽女子數其陰當數者爲經不當數者爲絡氣之在身也如水之流如日月之行不休故陰脈管其藏而陽脉管其府如環之無端莫知其紀終而復始其流溢之氣內溉藏府外濡腠理

二蹻爲病

秦越人難經曰陰絡者陰蹻之絡陽絡者陽蹻之絡陰蹻爲病陽緩而陰急陽蹻爲病陰緩而陽急王叔和脉經曰陰蹻脉急當從內踝以上急外踝以上緩陽蹻脉急當從外踝以上急內踝以上緩又曰討白脉前部左右彈者陽蹻也動苦腰背痛又爲癲癇偏仆羊鳴惡風偏枯瘡痺身體強又曰微濶又曰寸口脉後部左右彈者陰蹻也動苦癲癇寒熱

詩經
卷之五
五

百病畢又爲少腹痛裏急腰及骯骫下相連陰中

皮膚溫病之火也。少陽主火，故謂之火也。少陽主火，故謂之火也。

臂解骨也
腰下穴也

卷之三

又曰，癲癇瘡癰不知所苦，兩蹻之下男陽女陰。

又曰癲癇病非一也。陽蹻在肌肉之上，陽脉所行，通貫六府，主持諸表，故名。陰蹻在肌肉之下，陰脉所行，通貫五藏，爲陽蹻之絡。陰蹻在肌肉之下，陰脉所行，通貫五藏，爲陽蹻之絡。陰蹻爲病，陰急則狂走目，持諸裏，故名爲陰蹻之絡。陰蹻爲病，陽急則狂走目，持諸表，故名爲陽蹻之絡。五絡不通，表和裏病，陽蹻爲病，陽急則狂走目，不寐，表病裏和，陰病則熱，可灸，照海陽陵泉，在膝下寸，衛

外廉陷中足少陽之合也筋病治此陽病則寒可鍼風池風府項後人髮際一寸太筋內宛宛中督脉太陽陽維之會也又曰在陽表者當汗之在陰裏者當下之又曰癲癇晝發炙陽蹻夜發炙陰蹻素問腰痛論曰腰痛不可舉者申脉僕參舉之太陽本也又曰會陰之脉令人腰痛痛上漂漂然汗出上部下五寸橫居視其盛者出血王啓玄云足太陽

陰直陽之脈循腰下行會於後陰故曰會

後條直而行者故曰直陽之脉也蹻爲陽蹻所生申脉穴也蹻上郤下乃承筋穴也卽腨中央如外陷者中也太陽脉氣所發禁鍼刺但視其兩腨中央有血絡盛滿者乃刺之出血

又曰冒陽之脉令人腰痛痛引膺目睭睭然甚則反折舌卷不能言刺內筋爲三病在內踝上太筋前太陰後上踝二寸所

王啓玄云陰蹻起於然谷之後上內踝之上循陰股入陰而循腹入胸裏缺盆上出人迎之前入頃

內廉屬目內眞會於太陽陽蹻而上行故病狀如此內筋卽陰蹻之郄交信穴也

素問繆刺論曰邪客於足陽蹻之脉令人目痛從內背始刺外踝之下半寸所各二病卽中
厥也左刺右右刺左如人行十里墳而已

靈樞經曰目中赤痛從內背始取之陰蹻

又曰風痙反折先取足太陽及膕中及血絡出血若

中寒邪取陰蹻及毛上及血絡出血

李漁湖曰足太陽京骨穴也在足外側小指本節

後太骨下赤白際陷中鍼三分灸七壯膾中委中穴也。在曲膝後橫文中鍼三分陰蹻取交信穴見前三毛大敦穴也。在足大指外側三毛中肝脉之井也。鍼三分灸三壯血絡者視其處有絡脉盛滿者出其血也。

又曰陰蹻陽蹻陰陽相交陽入陰陰出陽交於目銳背陽氣盛則瞋目陰氣盛則瞋目熱厥取足太陽少陽

甲乙經曰人病目閉不得視者衛氣留於陰不得行

於陽留於陰則陰氣盛陰氣盛則陰蹻滿不得入於陽則陽氣虛故目閉也。病目不得瞑者衛氣不得入於陰常留於陽留於陽則陽氣滿陽氣滿則陽蹻盛不得入於陰則陰氣虛故目不瞑也。

靈樞曰五穀入於胃也其糟粕津液宗氣分爲三隧故宗氣積於胸中出於喉嚨以貫心肺而行呼吸焉營氣者泌其津液注之於脈化而爲血以榮四末內注五藏六府以應刻數焉衛氣者出其悍氣之慄疾。

而先於四末分肉皮膚之間而不休焉晝日行於陽，夜行於陰，常從足少陰分間行於五藏六府。今厥氣客於五藏六府，則衛氣獨衛其外，行於陽不得入於陰，行於陽則陽氣盛，陽氣盛則陽躡陷，不得入於陰，則陰氣虛，故目不瞑也。治當補其不足，瀉其有餘，以通其道而去其邪。飲以半夏湯一劑，陰陽已通，其卧立至其方用，流水千里以外者八升，揚之萬遍，取其清五升，煮之，以葦薪火沸，置秫米一升，治半夏五合，徐炊令至一升半去其滓，飲汁一小杯日三稍益。

以知爲度，故其病新發者覆杯則卧，汗出則已，久者三飲而已。

李瀕湖云：靈樞有云：足太陽之筋爲目上綱，足陽明之筋爲目下綱，寒則筋急，目不合，熱則筋縱，目不閉。又云：壯者血氣盛，肌肉滑，營衛不失其常，故晝精而夜瞑。老人氣血衰，氣道澀，衛氣內伐，故晝不精，而夜不瞑。又云：多卧者，腸胃大而皮膚澀，分脈爲嗜卧，巢元方云：脾病因倦而嗜卧，臍病多煩，守經文

而不眠。王叔和脉經云：水流夜疾，有聲者土休，故也人亦應之。人夜卧，則脾不動搖。脈爲之數疾也。一云：脾之候在瞤。瞤動，則知脾能消化也。脾病，則瞤澀嗜卧矣。數說皆論目閉目不瞑，雖不言及二蹠蓋，亦不離乎陰陽營衛虛實之理。可互攷者也。

衝脉

衝爲經脉之海又曰血海其脉與任脉皆起於少腹之內胞中其浮而外者起於氣街

行至橫骨足陽明去腹中行二寸少陰去腹中行五分衝麻行於二經之間也○橫骨在陰上
去腹中行二寸半
如脛月 仗腋左右各五分上行歷太赫橫骨
中行之青華 氣穴卽胞門二寸各于一戶太赫上一寸去
四滿氣穴上 中注四滿上 育俞中注上 商曲肓俞上
石闕商曲上 隱都石闕上 通谷隱都上 幽門通谷上
巨曲用旁各五分膕中 至胸中而散凡二十四穴一寸夾
靈樞經曰衝任皆起於胞中上循背裏爲經絡之海
其浮而外者循腹右上行會於咽喉別而絡唇口血
氣盛則充膚熱肉血獨盛黃 塗灌皮膚生毫毛婦人

有餘於氣不足於血。月下數脫血，任衝並傷，脉不榮其口唇，故髭鬚不生。宦者去其宗筋，傷其衝脈，血爲不復，皮膚內結，唇口不榮，故鬚亦不生。天宦不脫於血，而任衝不盛，宗筋不強，有氣無血，唇口不榮，故鬚亦不生。

素問水熱穴論曰：三陰之所交，結於脚也。踝上各下行者，此腎脉之下行也。名曰太衝。

王啓玄曰：腎脉與衝脉並下行，循足合而盛大。故曰太衝。一云：衝脉起於氣衝，衝直而通，故謂之衝。

素問陰陽離合論曰：聖人南面而立，前曰廣明，後曰太衝。太衝之地，名曰少陰，其衝在下，名曰太陰。王啓玄曰：心藏在南，故前曰廣明；衝脉在北，故後曰太衝。足少陰腎脉與衝脉合而盛大，故曰太衝。兩脉相合，爲表裏也。衝脉在脾之下，故曰其衝在下，名曰太陰。靈樞經曰：帝曰：少陰之脉獨下行何也？岐伯曰：不然。陽溝諸經其下者，注於少陰之太絡，起於腎下，出於夫衝脉者，五藏六府之海也。其上者，出於頑穎，滲諸

氣街循陰股內廉斜入膕中伏行骭骨內廉並少陰之經下入內踝之後入足下其別者並於少陰滲三陰斜入踝伏行出屬附屬下循跗上入大指之間滲諸絡而溫足脛肌肉故其脉常動別絡結則跗上不動不動則厥厥則寒矣

王海藏曰手少陽三焦相火爲一府右腎命門爲相火心包主亦名相火其脉同診腎爲生氣之門出而治脣下分三歧上衝夾脣過天樞上至膻中兩乳間元氣所繫焉又足三焦太陽之別並足太陽正路入

絡膀胱約下焉三焦者從頭至心心至肺肺至足爲上中下三焦其實真元一氣也故曰有藏無府脉訣云由焦無狀空有客寄在胸中膈相應一云其府在氣街中上焦在胃上直治在膻中中焦在胃管治在膻旁下焦在脅下膀胱並治在肺經曰原氣者三生命也十二經之根本也李瀟湖曰三焦卽命門之用與衝任督相通者故附著於此

卷之五
衝脉爲病

越人難經曰，衝脉爲病逆氣而裏急。

靈樞經曰，氣逆上刺膺中陷下者，與下胸動脈腹痛，刺膺，在右動脈按之立已。不已刺氣街按之立已。

李東垣曰，秋冬之月胃脉四道爲衝脉所逆，脇下少陽脉二道而反上行，名曰厥逆，其證氣上衝咽不得息，而喘息有音不得卧，宜調中益氣湯加吳茱萸五分隨氣多少用之。脾胃論 夏月有此乃太熱之證，用黃連黃蘖知母各等分酒洗炒爲末，白湯和丸每服。

一二百丸空心白湯下，卽以羨膳壓之，不令停留，胃中直至下元以瀉衝脉之邪也。蓋此病隨四時寒熱溫涼治之。

又曰，凡逆氣上衝或兼裏急或作躁熱皆衝脉逆也。若內傷病此宜補中益氣湯加炒蘆菔炒連知母以泄衝脉。○凡腎火旺及任督衝三脉盛者則宜用酒炒黃蘖知母亦不可久服恐妨胃也。○或腹中刺痛或血虛則裏急宜用當歸。○逆氣裏急脣咽不通大便。

不行者宜升陽瀉熱湯主之

方見蘭室秘藏

○麻木厥氣上

衝逆氣上行妄聞妄見者宜神功丸主之

方見蘭室秘藏

孫真人千金方云欬唾手足厥逆氣從小腹上衝胸

咽其面翕熱如醉因復下流陰股小便難時復冒者

寸脉沉尺脉微宜伏苓五味子湯以治其氣衝其方

用伏苓五味子

錢桂心甘草

錢

水煎服胸滿者去桂

程算敷曰太平侯病膻中痛喘嘔吞酸脣上一點氣
上至咽喉如水每子後申時輒發醫以為太寒不效
祝橘泉曰此得之大醉及厚味過多子後申時相火

自下臍上故作痛也以二陳加芩連卮子蒼朮數飲
而愈

素問痿論曰治痿獨取陽明者何也曰陽明者五藏
太府之海也主開宗筋宗筋主束骨而利機關衝脈
者經脉之海主滲灌谿谷與陽明合於宗筋會於氣
街而陽明爲之長皆屬於帶脉而絡於督脈故陽明
病而通其俞調其虛實和其逆順筋脉骨肉各以其
時受月則病已謂肝甲乙心丙丁脾戊己壬氣法時月也

李東垣曰，暑月病甚，則傳腎肝爲瘻厥。瘻乃四肢瘻軟厥，乃四肢如火，或如冰，心煩，衝脉氣逆上甚，則火逆，名曰厥逆。故瘻厥二病多相湊也。經曰，下氣不足，則瘻厥心愾，宜以清燥去濕熱之藥。或生脉散合四苓散，加酒洗黃蘖知母，以洩其濕熱。○李瀕湖曰，濕熱成瘻，乃不足中，有餘也。宜滲洩之藥。若精血枯涸，成瘻，乃不足中之不足也。全要峻補之藥。

靈樞經曰，胸氣有街，腹氣有街，頭氣有街，脅氣有街，故氣在頭者止之於腦，氣在胸者止之膺，與背肺氣。

在腹者止之背俞，與衝脈於臍之左右之動脈。氣在脅者止之於氣街，與承山踝上以下取之者用毫鍼。先按，在上久應手乃刺而與之，所治者頭痛眩仆，腹痛中滿暴脹及有新積作痛。

素問舉痛論曰，寒氣客於衝脈，衝脈起於闢元，隨腹手王叔和，厥經曰，兩手厥浮之俱有陽沉之俱有陰，陰陽皆盛此衝督之脉也。衝督之脉爲十二經之道路。

奇經文

也衝督用事，則十二經不復朝於寸口。其人若恍惚，狂癲。

又曰：脉來中央堅實，徑至關者，衝脉也。動者少腹痛，上擔心。有痕瘡遺溺，腸支滿煩，女子絕孕。

又曰：尺寸俱牢直上直下，此乃衝脉。胸中有寒疝也。張仲景曰：傷寒動氣在右，不可發汗。汗之，則衄而渴。心苦煩，飲水即吐。先以竹葉湯，次以竹葉散。不可下。下之，則津液內竭，頭眩，咽喉燥，鼻乾，心悸。竹葉湯。○動氣在左，不可發汗。汗之，則頭眩汗不止，筋惕肉瞶。此爲難治。或先用竹葉湯。○動氣在左，不可發汗。汗之，則腹滿。

木桂蠅湯，次用小建中湯。

不可下。下之，則腹裏拘急，不止。動氣反。

劇身雖有熱，反欲拳。

先服甘草乾葛湯，次服小建中湯。

○動氣在上，不可發汗。汗之，則氣上衝正，在心端。

李根湯。

不可下。下之，則掌握熱，煩身熱。汗泄，欲水自灌。

竹葉湯。

○動氣在下，不可發汗。汗之，則無汗，心中大煩，骨節疼，頭痛，目運惡寒。吐穀。

先服太陳皮湯，次服小建中湯。

不可下。下之，則腹滿卒起，頭眩，食則下清穀，心下痞堅。

甘草湯。

李瀕湖曰：此乃脾之左右上下有氣築築然牢，而痛，正衝任足少陰太陰四經病也。成無巳詳文以

爲左肝右肺上心下肺蓋未審四藏乃兼邪耳

岐伯曰海有東西南北人亦有四海以應之胃者水

穀之海其輸上在氣街下至三里衝脉爲十二經之海其輸上在於大杼下出於巨虛之上廉脈中者爲氣之海其輸上在於柱骨之上下前在人迎脈爲髓之海其輸上在於風府○氣海有餘氣滿胸中悵息而赤氣海不足則氣少不足以言○血海有餘則常想其身大怫然不知其所病血海不足亦常想其身小狹然不知其所病○水穀之海有餘則

腹滿水穀之海不足則饑不受食○髓海有餘則輕勁多力自過其度髓海不足則腦轉耳鳴脛痺眩冒目無所見懈怠安卧

任脈

任爲陰脉之海其脈起於中極之下少腹之內會陰

之分在兩陰之間

上行而外出循曲骨

橫骨上毛

上毛際

至中極

膚下四十步

同足厥陰太陰少陰並行腹裏循

開元

膚下三寸小腸之募

歷石門

膚下二寸名命門

在

氣海

膚下一寸半穴在

會足少陽衝脈於陰交

膚下

子生氣之海

中男子生氣之海

會足少陽衝脈於陰交

膚下

當膀胱上口

循神闢中央

水分臍中

水分臍上一寸當

會足太

三焦之募

陰於下脘

脅胃下口

歷建里

三寸

會手太陽少陽足

陽明於中脘

脾胃之募也

上上脘

五寸

巨闢鳩尾下

一寸

鳩尾

蔽骨下

中庭腹中下

一寸

膻中

六分直兩乳

玉堂

紫宮

華蓋

一寸

璇璣

天突下上喉嚨會陰維於天突廉泉

天突在結喉下

四寸

廉

環唇上至下斷交復出分行循面繫兩目下之中央

至承泣而終目下七分直瞳子陷中

二穴

凡一千七穴○難經甲

乙經並無循面以下之說

任衝之別絡名曰尾翳下鳩尾散於腹實則腹皮痛虛則癢搔

靈樞經曰缺盆之中任脉也名曰天突其側動脈人迎足陽明也

任脉爲病

素問曰任脉爲病男子內結七疝女子帶下瘕聚

又曰女子二十七而天癸至任脉通太衝脉盛月事以時下七七任脉虛太衝脉衰天癸竭地道不通故形

壞而無子

又曰。上氣有音者治其鍼。盆中脈之會刺。一寸灸三壯。

脈經曰。寸口脈來緊細實長至關者任脉也。動苦。

少腹繞脅下引橫宵陰中切痛。取關元治之。

又曰。橫寸口邊脉丸丸者任脉也。苦腹中有氣如指上捨心不得俛仰拘急。

督脉

督乃陽脉之海。其脈起於腎下胞中。至於少腹乃却行於腰橫骨闊之中央繫溺孔之端。男子循莖下仍

塞。女子絡陰器合篡間俱繞篡後屏翳穴。

前陰後陰之間也

別

統督

至少陰與太陽中絡者合

少陰上股內廉由

會陽

在陰尾尻骨兩旁分之穴

貫脊會於長強穴在骶骨端與少

陰會並脊裏上行歷腰俞

二十一椎下推下

陽關

十六椎下推下

命門

十四椎下推下

下懸樞

十三椎下推下

脊中

十一椎下推下

中樞

十椎下推下

筋縮

九椎下推下

至陽

七椎下推下

下靈臺

六椎下推下

衝道

五椎下推下

身柱

三椎下推下

陶道

大椎下推下

太椎

一椎下推下

丁與

乎足三陽會合上

痺門

項後入髮際下寸

會足太陽陽維同

會陽維入繫

推

舌本上至風府

項後入髮際中

會足太陽陽維同

會陽維入繫

推

入膺中循肺戶

在腋內窪處

會足太陽陽維同

會陽維入繫

推

強間百會後

三十寸半

後頭百會後

下寸半

上顴

奇經八脉

歷百會頂中央前頂百會前頤會百會前上星會
旋毛中寸卽頤門

前一寸

至神庭額會前二十寸直鼻

爲足太陽督脉之會

五分

循額中至鼻柱經素髎鼻准頭也

水溝即人會手足陽明

中

至允端在唇上端入斷交上齒縫中

上齒

與任脉足陽明交會而終

凡三十穴督脉別絡自長強走任脉者由小腹直上貫膂中央上貫心入腋上顧環唇上繫兩目之下中央會太陽於目內眎睛明穴見陰下上額與足厥陰同會於顳入絡於腦又別自腦下正項循肩胛與手足太陽少陽會於太杼第六椎下兩旁去脊中一寸五

分離中內俠脊抵腰中大循督絡腎難經曰督脉任脉四尺五寸合共九尺○靈樞經曰頸中央之脉督脉也名曰風府張潔古曰督者都也爲陽脉之都綱任者妊也爲陰脉之妊養

王海藏曰陰蹻陽蹻同起跟中乃氣井而相連任脉督脉同起中極之下乃水溝而相接滑伯仁曰任督二脉一源而二岐一行於身之前一
行於身之後人身之有任督猶天地之有子午可以

分可以合分之以見陰陽之不離合之以見渾淪之無間一而二二而一者也

李瀕湖曰任督二脉人身之干午也乃丹家陽火陰符升降之道坎水離火交媾之鄉故魏伯陽參同契云上閉則稱有下閉則稱無無者以奉上有神德居此兩孔穴法金氣亦相湊崔希範天元入藥鏡云上鵠橋下鵠橋天應星地應潮歸根竅復命關貫尾開通泥丸大道三章真指云修丹之士身中下竅名曰亥牝正在乾之下坤之上震之酉兌之東坎離交

媾之地在人身天地之正中八脉九竅十二經十五絡聯轉虛間一穴空懸黍珠醫書謂之任督二脉此元氣之所由生真息之所由起修丹之士不明此竅則真息不生神化無基也俞琰註參同契云人身血氣往來循環晝夜不停醫書有任督二脉人能通此二脉則百脉皆通黃庭經言皆在心內運天經晝夜存之自長生天經乃吾身之黃道呼吸往來於此也鹿遞尾聞能通督脉龜納鼻息能通任脉故二物皆長壽此數說皆丹家河車妙旨也而藥物火候自有

別傳

王海藏曰。張平叔言。鉛乃北方正氣。一點初生之真陽。爲丹母。其蟲爲龜。卽坎之二陰也。地軸也。一陽爲蛇。天根也。陽生於子。藏之命門。元氣之所繫。出入於此。其用在臍下。爲天地之根。玄牝之門。通厥陰。分三岐。爲三車。一念之非降。而爲漏。一念之見守。而成鉛。升。而接離。補。而成乾。陰歸陽化。是以還元。至虛。至靜。遁法。自然飛昇。而懶。

督脈爲病

大壯火主中少陽太冲生二十一爻

素問骨空論云。督脈生疾。從小腹上衝心。而痛不得前後。爲衝疝。女子爲不孕。癃閉。遺溺。嗌乾。治在骨上。謂腰橫骨上手甚者。在臍下。臍下一寸督脉交穴也。

王啓玄曰。此乃任衝二脉之病。不知何以屬之。督脈李瀨湖曰。督脈雖行于背。而別絡自長強走任脈者。則由小腹直上貫臍中。貫心入喉。上顧環唇而入於目之内背。故顯此諸證。啓玄蓋未深攷爾。素問曰。督脈實。則脊強。反折虛。則頭重高搖之。有過者取之。所別也。

秦越人難經曰督脈爲病脊強而厥

王海藏曰此病宜用羌活獨活防風荆芥細辛藁本

本黃連大黃附子烏頭荳耳之類

張仲景金匱云脊強者五疰之總名其證卒口噤背反張而瘛瘲諸藥不已可灸身柱大椎陶道穴

又曰脊家脉築築而弦直上下行

王叔和脉經曰尺寸俱浮直上直下此爲督脈腰背

彊痛不得俛仰大人癩病小兒風癇

又曰脈來中央浮直上下動者督脈也動苦腰背膝

寒大人癩小兒癇宜炙項上二狀

素問風論曰風氣循風府而上則爲腦風風入係頭

則爲目風眼寒

王啟玄云腦戶乃督脈足太陽之會故也

帶脉

帶脉者起於季脇足厥陰之章門穴同足少陽循帶

脉穴章門足厥陰少陽之會在季肋骨端肘外盡處分居九寸是穴○帶脉穴屬足少陽經在季脇下寸圍身一周如束帶然又與足少陽會於五樞脉

維道章門下五寸維道穴二分五尺不穴

奇經文

靈樞經曰足少陰之正至臍中別走太陽而合上至

腎當十四椎出屬帶脉

楊氏曰帶脉總束諸脉使不妄行如入束帶而前垂故名婦人惡露隨帶脉而下故謂之帶下

帶脉爲病

秦越人曰帶之爲病腹滿腰溶溶如坐水中房慢兒緩明堂曰帶脉二穴主腰腹縱濶濶如囊水之狀婦人小腹痛裏急後重癥瘕月事不調赤白帶下可鍼六分灸七壯

張潔古曰帶脉之病太陰主之宜灸章門二穴三壯素問曰邪客於太陰之絡令人腰痛引小腹控脅不可忍脉謂季脇下之窄軟處

張仲景曰太病瘡後腰以下有水氣牡礪澤瀉散主之若不已灸章門穴

王叔和曰帶脉爲病左右遶脅腰脊痛衝陰股也

王海藏曰小兒癩疝可灸章門三壯而愈以其與帶

脈行於厥陰之分而太陰主之又曰女子經病血崩久而成枯者宜潤之益之血閉

久而成竭者宜益之破之有三治始則四物入紅花調黃芪肉桂次則四物入紅花調鰤鯉甲桃仁桂童子小便和酒前服末則四物入紅花調易老深

藥散

張子和曰十二經與奇經七脉皆上下周流惟帶脉起少腹之側季脇之下環身一周絡腰而過如束帶之狀而衝任二脉循腹脇夾脅旁傳流於氣衝屬於帶脈絡於督脈衝任督三脉同起而異行一源而三岐皆絡帶脉因諸經上下往來遺熱於帶脉之間客

熱鬱抑白物滿溢墮溲而下綿綿不絕是爲白帶內經云思想無窮所願不得意淫於外人房太甚發爲筋萎及爲白澀白澀者白物澀衍如精之狀男子因溲而下女子綿綿而下也皆從濕熱治之與治痢同法赤白痢乃邪熱傳於太腸赤白帶乃邪熱傳於小腸後世皆以赤爲熱白爲寒流誤于載是醫誤之矣又曰資生經載一婦人患赤白帶下有人爲炙氣海灸我不着今灸着我我去矣可爲酒食祭我其家如

其言祭之遂愈。予初怪其事，因思晉景公膏肓有二鬼之事，乃虛勞已甚，鬼得乘虛居之。此婦亦或勞心虛損，故鬼居之。灸既着穴，不得不去。自是凡有病，此者每爲孚之。按此穴莫不應手酸痛，令歸灸之，無有不愈。其穴在兩脇季肋之下一寸八分，若更灸百會穴尤佳。內經云：上有病下取之，下有病上取之。又曰：上者下之，下者上之。是矣。

劉宗厚曰：帶下多本於陰虛陽竭，營氣不升，經脉凝澀，衛氣下陷，精氣積滯於下，焦竒經之分蘿，釀而成

以帶脈爲病，得名亦以病形而名。白者屬氣，赤者屬血，多因醉飽房勞，服食燥熱所至，亦有濕痰流注。下焦者腎肝陰溼，濕勝者或驚恐而木乘土位，濁液下流，或思慕無窮，發爲筋痿，所謂二陽之病發心脾也。或餘經濕熱，屈滯於少腹之下，或下元虛冷，子官濕淫，治之之法或下或吐或發中兼補，補中類利，燥中兼升發潤中兼溫養，或溫補或收澀，諸例不同，亦機之活法也。

巢元方病源曰：腎着病，腰痛冷如冰，身重，腰如帶，五

千錢不渴，小便利，因勞汗出，衣裏冷濕，而得久則變，
爲水也。○千金用腎著湯，三因用滲濕湯，東垣用獨活湯主之。

氣口九道脉

手檢圖曰：肺爲五藏，華蓋上以應天，解理萬物，主行精氣法，五行應四時，知五味，氣口之中陰陽交會，中有五部，前後左右各有所主，上下中央分爲九道，診之則知病邪所在也。

李頤湖曰：氣口下脉分爲九道，總統十二經，并奇

經八脉，各出診法，乃岐伯祕授黃帝之訣也。扁鵲推之獨取寸口，以決死生，蓋氣口爲百脉流注朝會之始故也。三部雖傳而九道淪隱，故奇經之脉世無人知。今撰爲圖，并附其說於後，以洩千古之祕藏云。

診左手九道圖

彼內者是少陰，左者腎者

部俱浮直盡下者督脉

中如內者足太陰帶脉左右脣旁

中央書局

後部中央直者手

三部俱牢直直下者衝脉

後如外者是少陽 跖左者陽主

卷之三

診右手內外反此

岐伯曰前部如外者足太陽膀胱也動苦目眩頭項
腰背強痛男子陰下濕癰女子少腹痛引命門陰中
痛子臟閉月水不利○浮爲風○濁爲寒○滑爲勞

熱○緊爲宿食

中部如外者足陽明胃也動苦頭痛面赤○滑爲飲
○汎爲大便不利○濁爲嗜臥腸鳴不能食足脛痺
後部如外者足少陽也動苦腰背脅股肢節痛○浮
爲氣○濁爲風○急爲轉筋爲勞

前部如內者足厥陰肝也動苦少腹痛引腰大便不

利男子革中痛小便難疝氣兩丸上入女子月水不利陰中寒子戶閉少腹急

中部如內者足太陰脾也動苦腹滿胃中痛上管有
寒食不下腰上狀如居水中○沉濁爲身重足脛寒
痛煩滿不能臥時欬唾有血洩利食不化

後部如內者足少陰腎也動苦少腹痛與心相引背

痛小便淋女人月水來上擗心胃腸滿股裏拘急
前部中央直者手少陰心手太陽太腸也動苦心下
堅痛腹中急實急者爲感忤○虛者爲下利腸鳴

女子陰中癢痛○滑爲有娠

中部中央直中者手厥陰心主也動若心痛面赤多喜怒食苦咽○微浮若悲傷恍惚○濇爲心下寒○

沉爲恐怖如人將捕之狀時寒熱有血氣

後部中央直者手太陰肺手陽明大腸也動若欬逆氣不得息○浮爲風○沉爲熱○緊爲胸中積熱○濇爲時欬血

前部橫于寸口左丸者任脉也動若少腹痛逆氣捨心胸拘急不得俛仰○脈經云寸口脉緊細實長下

聚

至關者任脉也動若少腹遠脅痛男子七疝女子瘕三部俱浮直上直下者督脉也動若腰脊強痛不得俛仰大人癩小兒癩

三部俱牢直上直下者衝脉也動若胸中有寒疝○脉經曰脉來中央堅實徑至關者衝脉也動若少腹痛上搶心有瘕瘕遺溺女子絕孕

前部左右彈者陽蹻也動若腰背痛癲癇僵仆羊鳴偏枯瘡痺身體強

癱 音顛 仆

瘡 音闊 驚

痙 音頸 風

痓 去聲 作

癥 音顛 痘

瘞 音委 肢

瘡 音賈 積

瘡 山訥 二一音

瘻 音顛 痘

瘞 音委 陰

瘡 痘

瘡 痘

瘻 音隆 小

瘞 音腫 也

瘞 瘰

瘞 瘰

瘻 音消 钺

瘞 初介 痘

瘞 何

瘞 瘰

瘻 音消 钺

瘞 初介 痘

瘞 除

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音免 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

瘻 音筆 别

瘞 音汗 便

瘞 便

瘞 瘰

脉訣攷證錄祖傳醫業未盡述其典事升萬國生平利
東王脉訣非叔和書太不以脉曲伸神妙如斯人
癰瘡朱子曰古人察脉非一道今世惟守寸關尺之
法所謂關者多不明獨俗傳脉訣詞最鄙淺非叔和
本書万能直指高骨爲關然世之高醫以其書贊遂
委棄而羞言之跋郭長陽書

其高骨爲闢之說不知其正出脈經也

盧陵謝

翁

曰今稱叔和脉訣不知起于何時宋熙

寧初校正脉經尚未有此陳孔碩始言脉訣出而脉經隱則脉訣乃熙寧以後人作耳惟陳無擇三因方言高陽生剽竊作歌訣劉充賓從而和之其說似深知脉經者而又自著七表八裏九道之名則陳氏亦未嘗詳讀脉經矣

河東王世相曰診候之法不易精也軒岐微蘊越人叔和撰難經脉經猶未盡泄其奧五代高陽生著脉

訣假叔和之名語多牴牾辭語鄙俚又被俗學妄註世醫家傳尸誦茫然無所下手不過藉此求食而已於診視何益哉

雲間錢溥曰晉太醫令王叔和著脉經其言可守而不可變及托叔和脉訣行而醫經之理遂微蓋叔和爲世所信重故假其名而得行耳然醫道之日淺未必不由此而誤之也

七表八裏九道之非

金陵戴起宗曰脉不可以表裏定名也軒岐越人叔

承央

和皆不言表裏，脉訣竊叔和之名，而立七表八裏九道，爲世大惑。脉之變化從陰陽生，但可以陰陽對待而言，各從其類，豈可以一浮一沉爲定序，而分七八九之名乎？大抵因浮而見者，皆爲表；因沉而見者，皆爲裏，何拘于七八九哉？廬山劉立之以浮沉遲數爲綱，以教學者，雖似捷徑，然必博學反約，然後能入脉妙，若以此自足，亦畫矣。

櫻寧滑壽曰：脉之陰陽表裏以對待，而爲名象也。高陽生之七表八裏九道，蓋鑒鑒也。求脉之明，爲脉之

謝氏曰：脉經論脉二十四種，初無表裏九道之目。其言，芤脉云：中央空，兩邊實。云：芤則爲陰，而脉訣以芤爲七表屬陽。云：中間有兩頭無仲景脉法云：浮大數動滑爲陽，沉澁弱弦微爲陰，而脉訣以動爲陰，以弦爲陽，似此背誤頗多。則脉訣非叔和書可推矣。

草盧吳澄曰：俗誤以脉訣爲脉經，而王氏脉經知者安可混乎？脉之浮沉虛實緊緩數運滑濶長短之相

反四配自不容易，况有難辨如洪散俱大而洪有力，微細俱小而微無力。芤類浮而邊有中無伏類沉而邊無中，有若豆粒而搖搖不定者動也。若鼓皮而如如不動者革也。俱對待也。又有促結代皆有止之脉促疾結緩故可爲對代則無對總之凡一十七脉不正于七表八裏九道二十四脉也。詳文集

灝湖李時珍曰：脉經論脉止有二十四種無長短二十六脉訣歌脉亦有二十四種增長短而去數散皆非也。素難中景論脉祇別陰陽初無定數如素問之鼓

搏喘橫仲景之慄甲榮章綱損縱橫逆順之類是也。后世脉之精微失傳無所依準因立名而爲之歸著耳。今之學者按圖索驥猶若望洋而況舉其全旨乎此草虛公說猶得要領也。

男女脉位

齊褚

登曰：男子陽順自下生上故右尺爲受命之根。

萬物從王而出故右關爲脾生右寸肺肺生左尺腎腎生左關肝肝生左寸心女子陰逆自上生下故左寸爲受命之根萬物從王而出故左關爲脾生左尺

詳褚氏遺書

肺，肺生右寸腎，腎生右關肝，肝生右尺心，肺，肺生右寸腎，腎生右關肝，肝生右尺心，
華谷儲詠曰：脉訣以女人尺脉盛弱與男子相反爲
肯者，夫男女形體絕異，陰陽殊塗，男生而覆女，生而
仰，男則左旋女則右轉，男主施女主受，男之至命在
腎處，臟腑之極下，女之至命在乳處，臟腑之極上，形
氣既異，脉行于形氣之間，豈畧不少異耶？此褚氏之
說爲有理也。詳褚氏遺書

戴起宗曰：脉訣因男子左腎右命女子，左命右腎之
別，遂言反此肯者，而諸家以尺脉盛弱解之，褚氏又

以女人心肺，診于尺，倒裝五臟，其謬又甚，不知男女
形氣精血雖異，而十二經脈所行，始終五臟之定位
則一也，安可以女人脉位爲反耶？

丹溪朱

震亨

曰：昔軒轅使伶倫截嶰谷之竹，作黃鍾

律管，以候天地之節氣，使岐伯取氣口，作脉法，以候
人之動氣，故黃鍾之數九分氣口之數，亦九分律管
具，而寸之數始形，故脉之動也，陽得九分，陰得一寸，
吻合于黃鍾，天不足西北陽，南而陰，北故，男子寸盛，
而尺弱，肖乎天也，地不滿東南陽，北而陰，南故，女子

尺盛而寸弱，肖乎地也。黃鍾者氣之先兆，故能測天地之節候。氣亡者，脉之要會，故能知人命之死生。世之俗醫誦高陽生之妄作，欲以治病，其不殺人也，布龍丘葉氏曰：脉者天地之元性，故男女尺寸盛弱，肖乎天地。越人以爲男生于寅，女生于申，三陽從天，生三陰從地，長謬之甚也。獨丹溪惟本律法，混合天人，而闢之，使千載之誤，一旦昭然，豈不韪哉？

臟腑部位

紹興王宗正曰：診脉之法當從心肺俱浮，肝腎俱沉。

脾在中州之說，王叔和獨守寸關尺分部位，以測五臟六腑之脉者，非也。

慈溪趙

繼宗

曰：脉訣言左心小腸肝膽腎右肺大腸

脾胃命者非也。心肺居上爲陽，爲浮；肝腎居下爲陰，爲沉。脾居中州半陰半陽，半浮半沉，當以左寸爲心，右寸爲肺，左尺爲肝，右尺爲腎，兩關爲脾。關者陰陽之界限，前取陽三分，後取陰三分，所謂土居金木，水寓在半陰半陽半浮半沉之左關耶？命門卽是腎，不

宜以右尺爲診脈要。

吳草廬曰：醫者于一寸關尺輒名之，曰此心脉此肺脉。此肝脉此脾脉此腎脉者非也。五臟六腑凡十二經，兩手寸關尺者手太陰肺經之一脉也。分其部位以候他臟之氣耳。脈行始于肺，終于肝而復會于肺。肺爲氣所出之門戶故名曰氣口，而爲脈之太會以占一身焉。詳文集

李時珍曰：兩手六部皆肺之經脈也。特取此以候五臟六腑之氣耳。非五臟六腑所居之處也。凡診察皆

肺心脾肝腎各候一動五十動不止者五臟皆足。內有一止則知一臟之脉不至。據此推之則以肺經一脉候五臟六腑之氣者可心解矣。褚儲趙氏不知，脈隨五臟之氣行于經隧之間，欲以男女臟腑顛倒部位執泥不通。戴同父言褚氏倒裝五臟丹溪別男女尺寸草廬明三部皆肺三說皆有真見學者所當益知。脉分兩手出于素問脉要精微論而越人推明，脈及一脉十變，子難經非始于叔和也。若如其說，永矣。

則一脈十變何從推之可謂鑒而任矣○命門卽腎之說乃越人之誤也予嘗著命門攷命門三焦客難

二說凡一千餘言云

瀕湖脈學

李時珍曰宋有俗子杜撰脉訣鄙陋紕繆醫學習習誦以爲權輿逮臻頌白脉理竟昧戴同父常刊其誤先考月池翁著四診發明八卷皆精詣奧室淺學未能窺造珍因撮粹擷華僭撰此書以便習讀爲脉指南世之醫病兩家咸以脉爲首務不知脉診不可杜明嘉靖甲子上元日謹書于瀕湖過所

浮陽

浮脉舉之有餘按之不足，脉經如微風吹鳥背上毛。厭

厭聵聵輕汎如循榆莢素問如水漂木崔氏如捻葱葉黎氏

浮脉洪天有輕清在上之象在卦爲乾在時爲秋在人爲肺又謂之毛太過則中堅旁虛如循雞羽病在外也不及則氣來毛微病在中也○脉訣言尋之如太過乃浮兼洪緊之象非浮脉也

體狀詩浮脉惟從肉上行如循榆莢似毛輕三秋得

令知無恙久病逢之郤可驚

相類詩浮如木在水中浮浮大中空乃是芤拍拍而浮是洪脉來時雖盛去悠悠○浮脉輕平似捻葱虛來遲大豁然空浮而柔細方爲濡散似楊花無定蹤

浮而有力爲洪浮而遲大爲虛虛甚爲散浮而無力爲芤浮而柔細爲濡

主病詩浮脉爲陽表病居遲風數熱緊寒拘浮而有力多風熱無力而浮是血虛○寸浮頭痛眩生風或

有風痰聚在胸關上土衰兼木旺尺中溲便不流通

浮脉生表有力表實無力表虛浮數風熱浮芤失血浮散勞極浮芤虛寒浮緩風濕浮虛中風浮虛傷暑

沉陰

沉脉重手按至筋骨乃得

如石投水必極其底

脉經

如綿裹砂內剛外柔

楊氏

沉脉重手按至筋骨乃得

脉經

如綿裹砂內剛外柔

楊氏

如石投水必極其底

脉經

如綿裹

脉法地有淵泉在下之象在卦為坎在時為冬
脈在人為腎又謂之石亦曰營太過則如彈石按之
益堅病在外也不及則氣來虛微去如數者病在
中也。脈訣言緩度三關狀如爛綿者非也沉有
緩數及各部之沉爛一

編乃腎脉井沉也

體狀詩木行潤下脉來沉筋骨之間栗滑匀女子寸

芳男子尺四時如此號爲平

相類詩沉幫筋骨自調匀伏則推筋着骨尋沉細如
綿真弱脉絃長實大是牢形沉行筋間伏行骨上
主病詩沉潛水畜陰經病數熱遲寒滑有痰無力而
沉虛與氣沉而有力積并寒○寸沉痰鬱水停胸關

主中寒痛不通尺部濶遺并泄痢腎虛腰及下元痛
沉脉主裏又有力裹實無力裹虛沉遲痼冷沉數內熱
沉滯氣鬱沉弱寒熱沉緩寒食沉牢冷積

遲

陰

遲脉一息三至去來極慢

經

遲爲陽不勝陰故脉來不及○脈訣言重手乃得
是又有尤無浮一息三至甚爲易見而曰懶惡日就
且難是薄脉矣真認可矣

體狀詩

遲來

一息至惟三陽不勝陰氣血寒但把浮

沉分表裏消陰漚益火之原水火不勝陰氣血寒但把浮

相類詩脈來三至號爲遲小馳干遲作緩持遲細而
難知是濤浮而遲大以虛推二至爲遲有方爲緩
遲其爲敗浮大而更爲虛無力爲濤○黎氏曰遲小而實
緩大而慢遲爲陰盛陽衰緩爲衛盛營弱宜別之

主病詩遲司臟病或多痰沉痼癥瘕子細看有方而
遲爲冷痛遲而無方定虛寒○寸遲必是上焦寒閑

主中寒痛不堪尺是腎虛腰脚重溲便不禁疝牽丸

浮脉主臟

有方冷痛

無方虛寒

浮遲表寒

沉遲裏寒

數脉不息六至

肝經

脉流薄疾素

間

數爲陰不勝陽故脈來太過○浮沉遲數脉之細
領素問脈經皆爲正脉脉訣立七表八裏而遺數
脉止謬于心

藏其妄甚矣

體狀

數脉息間常不至陰微陽盛必狂煩浮沉表

裏分虛實惟有兒童作古看

相類詩數脉比平人多一至緊來如數似彈繩數而時

止名爲促數見關中動脉形

數而弦急爲緊

數爲滑

數而有流利爲促

數甚爲極數見關中爲動

主病詩數脉爲陽熱可知只將君相火來醫實宜涼

涼虛溫補肺病秋深却畏之○寸數咽喉口舌瘡呴

主病詩數脉爲陽熱可知只將君相火來醫實宜涼

紅嗽嗽肺生，渴當開。胃火并肝火，尺屬滋陰降火湯。

數麻主膚，有力實火，無力虛火。
沉數裏熱，氣口數實，肺壅，數虛，肺壅。

滑陽中陰

滑脈往來前郤流利，展轉替替然如珠之應。指經脉滻，如欲脫。滑爲陰氣有餘，故脈來流利如水脉者，血脈滑，故肺之府也。血盛則脉滑，故腎之脉宜之。氣盛則脉滑，故肺之脉宜之。按扶卽伏，二平關如珠不進，不退，是不全厚滑沉滑尺寸之滑也。今正之。

體狀相類詩：滑脈如珠替替然，往來流利郤還前莫。

將滑數爲同類，數脈惟看至數間。滑則如珠，數則六至。

主病詩：滑脈爲陽元氣衰，痰生百病，食生火，上爲吐。

逝下畜血，女脉調時定，有胎○寸滑膈痰生，嘔吐，吞酸舌強或欬嗽，當關宿食，肝脾熱渴，痈癰淋看尺部。

滑主痰飲，滑燥宿食，浮滑風痰，沉滑食痰，滑數痰火，輕言關滑，胃熱尺滑，血畜婦人經病之旨相反，其謬如此。

滑陰

滑脉細而遲，往來難短，且散或一止復來。

脉如輕力，刮竹脉，如雨沾沙，通真經，參伍不

調，素問如陽氣有餘，氣盛則血少，故脉來壅滞，而肺壅所補于多不似有舉之全無與，麻痺所

體狀詩細遲短濶往來難散止依稀應指間如雨沾

沙容易散病蠶食葉慢而艱

相類詩參伍不調名曰濶輕力刮竹短而難微似秒

芒微與甚浮沉不別有無間

細遲短濶時一止曰濶極細而與重按若
遲曰微浮而柔細曰濡沉而柔細曰弱

主病詩濶緣血少或傷精反胃亡陽汗雨淋寒濕入

營爲血痺女人非孕卽無經○寸濶心虛痛對胸胃
虛脇脹察關中人爲精血俱傷候腸結溲淋或下紅

濶主血少精傷之病女人有孕爲胎病無孕爲敗
血桂光庭云濶脉獨見人中形同代爲死脈

虛 隅

虛脉遲大而與按之無力隱指豁豁然空

虛紫虛云形大力薄其虛可知

足舉之有餘止言浮脉不見虛狀楊仁齋言狀似
柳絮散漫而遲滑氏言散大而更皆是散脉非虛也

體狀相類詩舉之遲大按之鬆脉狀無涯類谷空莫

芤麻爲虛人而遲按之無力

芤爲虛血虛浮散二脉見浮脉

主病詩芤虛身熱爲傷暑自汗怔忡驚悸多發熱陰

虛瀉早治養營益氣莫蹉跎○無不禁心寸口虛關

中腹脹食難，欹骨蒸痿痺傷，精血郤在神門兩部居。

經曰：虛脉虛，曰氣來虛微爲不及，病在內，日久病脉虛者死。

實陽

實脉浮沉皆得，脉大而長微絃，應指幅幅然。

《脈經》：堅實貌。○脉訣言如繩，應指來及緊麻，非實麻也。

體狀詩浮沉皆得，大而長應指無虛幅幅，強熱蘊三焦成壯火，通腸發汗始安康。

相類詩實脉浮沉有力，強緊如彈索，轉無常須知，守脈幫筋骨，實大微絃更帶長。

浮沉有分爲實，急彈久爲緊，沉而實大微絃，而長爲牢。

主病詩實脉爲陽，火鬱成發狂譖語吐頻頻，或爲陽毒或傷食大便不通，或氣疼。○寸實應知面熱風咽疼舌強氣壅胸當，關脾熱中宮滿尺實腰腸痛不通。
起曰：血實脉實，日脉實者水穀爲病，日氣來實，是謂大通。○脉訣言尺實小便不禁，與尿經尺實其證誤爲虛寒藥用薑附，愈誤矣。

長陽

長脉不大不小，迢迢自若。

引續如猿，長竿爲神素。

氏朱

如循長竿末稍爲至，如

月半部之長一部之長在肺爲春在人爲肝心

長有三部之長一部之長在肺爲春在人爲肝心
脉長神強氣壯腎脈長蒂圓根深經曰長則氣治

皆言平

脉也

體狀相類詩過于本位脉名長絃則非然但滿張絃
脉與長爭較遠良土反度自能量實牢綈緊皆兼長脉

主病詩長脉迢迢大小匀反常爲病似牽繩若非陽
毒癲癩病卽是陽明熱勢深長主有之病

短陰

短脉不及本位脉應指而廻不能滿部脉絕處過于本位
戴叔公云短脉只見大寸若關中見短上不通寸下不通入足陰陽絕脉必死矣故關不診短○養

居士云長短未有定體諸脉舉按之一附過于本位者爲長不及本位者爲短○長脉屬肝宜于春短診肝肺長短自見

體狀相類詩兩頭縮縮名爲短濶短遲遲細且難短
濶而浮秋喜見三春爲賊有邪干濶微動結
主病詩短脉惟于尺寸尋短而滑數酒傷神浮爲血
澀沉爲痞子主頭疼尺腹疼經日短則氣病
洪陽

洪脉指下極大脉來盛去衰

洪脉在卦爲離在時爲夏在人爲心素問謂之大亦曰蜀滑氏曰米盛去衰如鉤之曲上而復下應

洪脉在卦爲離在時爲夏在人爲心素問謂之大亦曰蜀滑氏曰米盛去衰如鉤之曲上而復下應

脈來去之象。萬物敷布下垂之狀。○詹炎壽

血脈來去之象。萬物敷布下垂之狀。○詹炎壽
言如環使者非脉訣云季夏宜之秋季冬季發汗

通陽俱非洪脉

所宜蓋謬也

體狀詩脉來洪盛去還衰滿指滔滔應夏時若在春

秋冬月分升陽散火莫狐疑

相類詩洪脉來時拍拍然去哀來盛似波爛欲知實
脉參差處舉按絃長幅幅堅

洪而有力爲實實而無力爲洪

主病詩脉洪陽盛血應虛相火炎炎熱病居脹滿胃
翻湏早治陰虛洩痢可愁如寸洪心火一焦炎肺
脉洪時金不堪肝火胃虛關內察腎虛陰火尺中看

洪主陽盛陰虛之病洩痢失血久嗽者忌之
經日形瘦脉大多氣者死日脉人則病進

微陰

微脉極細而硬按之如欲絕若有若無脉細而稍長

戴氏○素問謂之

小氣血微脉

微脉

體狀相類詩微脉輕微腎腎乎按之欲絕有如無微

爲陽弱細陰弱細比于微畧較粗

輕診即見重按如欲絕者微也

有者細也

榮榮如蠶絲仲景曰脉腎腎如蠶上肥者陽氣微

長病得之死卒病得之生

主病詩氣血微脉亦微

惡寒發熱汗淋漓男爲勞

采蘋

極諸虛候，女作崩中帶下醫。○寸微氣促或心驚，關

脉微時，脹滿形，尺部見之精血弱惡寒，消癉痛呻吟。

微主久虛血弱之病，陽微惡寒，陰微發熱，脉訣云，歲中日久爲白帶，渴下多時骨亦枯。

緊

陽

緊脈來往有力，左右彈人手，素問如轉索無常景，數如

切繩，經如紡錠，丹溪

緊乃熱爲寒束之脉，故急數如此，要有神氣素，間謂之急。○脉訣言，寥寥人尺來，崔氏言，廻線皆非緊狀，或以浮緊爲弦，沉緊爲牢，亦近似耳。

體狀詩舉如轉索切如繩，脉象因之得緊名，總是寒

邪來作寇，內爲腹痛，外身疼相類詩

見統

王病詩緊爲諸痛，主于寒喘欬風癟吐冷痰，浮緊表

寒湧發越，緊沉溫散自然安。○寸緊人迎氣口分當

開心腹痛，沈沈尺中有緊爲陰冷定是奔豚與疝疼

諸緊爲寒，爲痛人迎緊盛傷于寒氣口緊盛傷于食尺緊痛居其腹，况乃夾在其腹中。○中惡浮緊欬嗽流緊皆主死。

緩

陰

緩脉去來小駛，于遲，原

經

一息四至，戴

其軸應指和緩往來甚，主疾太氏如絲在經不卷

素

如初春楊柳舞風之

象楊玄如微風輕颺柳稍仁滑伯

操緩脉在卦爲坤，在時爲四季，在人爲脾，陽寸陰尺，上下同等浮一大而契無有偏勝者，平麻也。若非其時，卽爲有病緩而和匀不浮，不沉，不疾，不徐，不微。

不弱者，卽爲胃氣，故杜光庭云，欲知死別何以取

古賢推定五般土陽土須知不遇

陰陰土遇陰當細數詳玉函經

體狀詩緩脈阿阿四至通，柳稍裹梟，颺輕風，欲從脉

裏求神氣，只在從容和緩中相類詩

見遲一脉

主病詩緩脉營衰衛有餘或風或濕或脾虛上爲項強，下痿痺分別浮沉太小區○寸緩風邪項背拘開爲風眩胃家虛神門濡泄或風秘或是蹠跚足力迂

浮緩爲風，沉緩爲濕，緩大風虛，緩細濕痺，緩弱氣虛及胃齒痛，夢鬼之病，自汗，肢悞與緩無關

芤陽中陰

芤脉浮大而弱按之中央空兩邊實，脉中空外實狀，如慈意芤，慈意也，素問經言，芤脉名剝三點云，芤脉何似，行脉中，脉以血爲形，芤脉中空脫血之象也○脉訣言，兩項有中間無是脉斷滅矣，又言，芤脉中空，氣入小腸與失血之候相反，誤世不小多

體狀詩芤形浮大，更如慈意按之旁有中央空火犯陽經，血上溢，熱侵陰絡，下流紅

脉學

相類詩中空旁實乃爲芤浮大而遲虛脉呼芤更帶

絃名曰革血亡芤革血虛虛

主病詩寸芤積血在于胸關內逢芤腸胃胞尺部見

乏多下血赤淋紅痢漏崩中

絃 陽中陰

絃脉端直以長古素經按之不移綽綽如按

琴瑟絃

巢氏

狀若箏絃脉訣從中直過挺然指下

刊誤

絃脉在卦爲震在時爲春在人爲肝輕虛滑者平實滑如循長竿者病勁急如新張弓絃者死泄氏曰絃緊而數勁爲太過絃緊而細爲不及戴用父曰絃而弱其病輕絃而硬其病重○脉訣言時

時帶數又言脉緊狀繩
章皆非極象今削之

體狀詩

絃脉迢迢端直長肝經不玉土應傷怒氣滿

胸常欲叫號蒙瞳子淚淋浪

相類詩

絃來端直似繩絃緊則如繩左右彈緊言其

力絃言象牢脉絃長沉伏間

又見長脈

主病詩絃應東方肝膽經飲痰寒熱瘡繩身浮沉遲

數湏分別大小單雙有重輕○寸絃頭痛膈多痰寒

熱瘡瘕察左關關右胃寒心腹痛尺中陰疝脚拘攣

微爲木盛之病浮熱支飲外溢

脉數多熱

絃遲多寒沉絃縣飲內痛

大玉虛

脉學

脉屬

絃細拘急

陽微頭痛

陰絃腹痛

單絃飲癖

雙絃寒癥若不食者木來古土必難治

革陰

革脉絃而芤仲景如按鼓皮丹溪

仲景曰絃則爲寒芤則爲虛虛寒相搏此名曰革
男子亡血失精婦人半產漏下脉經日三十部脉革
長病得之死卒病得之生時珍曰此卽芤絃二脉
相合故均主失血之候諸家脉書皆以爲牢脉故
或有革無牢有牢無革混淆不辨不知革浮牢沉
革虛牢實形證皆異也○又按甲乙經曰渾渾革
革至如涌泉病進而危弊綽綽其去如絃絕者
死謂脉來渾渾革變急如涌泉出而不反也王凱
歸以爲溫脉與此不同

體狀注病詩革脉形如按鼓皮芤絃相合脉寒虛女

人半產并崩漏男子營虛或夢遺相類詩

見孔

牢

陰中陽

牢脉似沉似伏實大而長微絃

脈

扁鵲曰牢而長者肝之象沈氏曰似沉似伏牢之位也仲景曰寒脉牢堅有牢固體也○脉訣不言形狀但云牢之實大絃長牢之云脉入皮膚辨息難又以牢爲死脉皆孟浪謬誤體狀相類詩絃長實大脉牢堅牢位常居沈伏間革主病詩寒則牢堅裏有餘腹心寒痛木乘脾疝癩

瘕何愁也失血陰虛邵忌之

瘕木乘脾疝癩

脉學

十三

牢主寒實之病，木實則爲痛，屬鶴，云與火爲虛牢，爲質失血者，脉宜沉細，反浮大而牢者，死虛病見實脉也。○脉訣言：骨間疼痛氣居于表。

池氏以腎爲腎傳于脾皆謬妄不經。

濡陰卽弱字

濡脉極更而浮細如帛在水中輕手相得按之無有

脉如水上浮漚

經帛浮水中重手按之隨手而沒之象○脉訣言：按之似有舉還無是微脉非濡也。

體狀詩：濡形浮細按須輕水面浮綿力不禁病後產

中猶有乘平人若見是無根

相類詩：浮而柔細知爲濡沈細而柔作弱持微則浮

微如欲絕細來沉細近于微

浮細如絲日濡

沉細如綿日弱

浮而

極細如絰日微

沉而極細不斷日細

浮而

主病詩：濡爲亡血陰虛病，髓海丹田暗已虧，汗雨夜

來蒸入骨血山崩倒濕侵脾○寸濡陽微自汗多開

中其柰氣虛何人傷精血虛寒甚溫補真陰可起病

濡主血虛之病，又爲傷風

弱陰

弱脉極更而沉細按之乃得舉手無有脉

弱乃濡之沉者脉訣言輕手乃得

經

昔是濡脉非弱也○素問曰：脉弱以滑是有胃氣

日得

經

以滑是

有胃氣

脉弱以滯是謂久病病後老

弱見之順平人少年見之逆

體狀詩弱來無方按之柔柔細而沉不見浮陽陷入

陰精血弱白頭猶可少年愁相類詩歷

見補

主病詩弱脈陰虛陽氣衰惡寒發熱骨筋萎多驚多汗精神減益氣調營急早醫○寸弱陽虛病可知關爲胃弱與脾衰欲求陽陷陰虛病湏把神門兩部推弱主氣虛之病仲景曰陽陷入陰故惡寒發熱又云弱主筋沉王骨陽浮陰弱血虛筋急柳氏曰氣虛則脉弱寸弱陽虛尺弱陰虛關弱胃虛

散陰

散脉大而散有表無裏脉經渙漫不收崔氏無統紀無拘束至數不齊或來多去少或多來少渙散不收如楊花散漫之象柳氏

戴同父曰心脉浮大而散肺脉晦澀而散平脉也脉裏散征肺腫病脉也腎脉裏散溢飲脾也難經曰散脉獨見則危柳氏曰散爲氣血俱虛根本脫離之脉產婦得之生孕婦得之墮

體狀詩散似楊花散漫飛去來無定至難齊產爲生

兆胎爲墮久病逢之不必醫相類詩散脉無拘散漫然濡來浮細水中綿浮而遲

大爲虛脉，芤脉中空有兩邊。

主病詩 左寸征，仲右寸汗溢。飲左關應，裏散右關裏。
散脈腫脈，散居兩尺，魂應斷。

細陰

細脉小，于微而常有，細直而更若絲線之應。指經

素問謂之小，王子啓玄言如葵蓬狀其柔細也。脉訣言往來極微是微反大于細矣與經相背。

體狀詩 細來纏纏，細如絲，應指沉沉，無絕期。春夏少

年俱不利，秋冬老弱郤相宜。相類詩

見微瀉

主病詩 細脉榮榮血氣衰，諸虛勞損七情乖。若非濕

氣侵腰腎，即是傷精汗洩來。○寸細應知嘔吐頻，入
關腹脹胃虛形尺。逢定是丹田，冷洩病遺精號脫陰。
脉經曰，細爲血少氣衰，有此證則順，否則逆。

伏陰

伏脉重按着骨，指下裁動。

脉行筋下，見沉脉訣言，尋之似有定，全無殊爲外證。

體狀詩 伏脉推筋着骨尋，指間裁動隱然深。傷寒欲

汗，陽將解，厥逆臍疼證屬陰。

主病詩 伏爲霍亂，吐頻腹痛多緣宿食停蓄飲老

寐。

痰成積聚散寒溫裏莫因循○食鬱胸中雙寸伏欲

吐不吐常兀兀當關腹痛困沉沉關後疝疼還破腹

傷寒一手脉伏日單伏兩手脉伏日雙伏不可以

陽證見陰爲診乃火邪內鬱不得發越陽極似陰故脉伏必有大汗而解正如久旱將雨六令陰晦雨後庶物皆藉之義又有夾陰傷寒先有伏陰在內外復感寒陰盛陽衰四脉厥逆六脉沉伏湏投蓋附及矣關元脉乃復出也若太溪衝陽皆無脉者必死○脉訣言徐徐發汗潔古以附子細辛麻黃湯主之皆非也劉元素曰伏脉不可發汗

動陽

動乃數脉見于關上下無頭尾如豆大厥厥動搖

仲景曰陰陽相搏名曰動陽動則汗出陰動則發

熱形冷惡寒此三焦傷也成無己曰陰陽相搏則往不來三關沉沉含糊證妄殊非動脉詹氏言其形鼓動如鉤如毛者尤誤

體狀詩動脉搖搖數在關無頭無尾豆形圓其原本是陰陽搏虛者搖兮勝者安

王病詩動脉專司痛與驚汗因陽動熱因陰或爲洩

瘡拘攣病男子亡精女子崩

仲景曰動者之崩又曰婦人手少陰脉動甚者妊娠也

促脈來去數時一止復來

經

如蹶之趣徐疾不常

氏

脈經但言數而止爲促脈訣乃云并居寸口不言

時正者謬矣數止爲促緩止爲結何獨寸口也

體狀詩促脈數而時一止此爲陽極欲亡陰

三焦鬱

火炎炎盛進必無生退可生

相類詩

脉見代

主病詩促脈惟將火病醫其因有五細推之時時喘

歎皆痰積或發狂癲與毒疽

脉見代

促王陽盛之病。促結之因皆有氣血痰。

一

飲食五者之別一有留滯則脉必見止也

結 隆

脉

經言是火火首集之氣無不聚其頭不

結脉往來緩時一止復來

脉

經言是火火首集之氣無不聚其頭不

脈訣言此來去聚而却還與絡無關仲景有頭
暈如循長等曰陰結萬萬如車蓋曰陽筋脉經久
者曰筋王死此三麻名同實異也

體狀詩結脈緩而時一止獨陰偏盛欲亡陽浮爲氣

脉見代

滯沉爲積汗下分明在主張相類詩

脉見代

主病詩結脈皆因氣血凝老痰結滯若沉吟內生積

脉見代

聚外癰腫痞瘕爲殃病屬陰

脉見代

則氣餒浮氣處有痛積伏若內有積聚

脉見代

伏脈動而中止不能自還因而復動

脉見代

脉學

脉

良久方來

吳氏

脈一息五至肺心脾肝腎五臟之氣皆是五十動而一息合大行之數謂之平脈反此則止乃見焉腎氣不能至則四十動一止肝氣不能至則三十動一止蓋一臟之氣衰而他臟之氣代主也經日代則氣衰滑伯仁曰若無病羸瘦脈代者危脈也有病而氣血全損氣不能續者祇爲病麻傷寒心悸脉代者復脉陽主之妊娠脉代者其胎百日代之生死不可不辨

體狀詩動而中止不能還復動因而作代看病者得乏猶可療平人郤與壽相關回方是代結生代死自殊塗

脉常之止無常數或止有常數必依數而止還入尺中良久方來也至病詩代脈元因臟氣衰腹疼洩痢下元虧或爲吐瀉中宮病女子懷胎三月分脉經日代散者死五十不正身無病數內有止皆知定四十一止一藏絕四年之後多亡命三十一下止卽年應十動一止一年殂更觀氣色兼形證兩動一止三四日三四動止應六七五六一下止七八朝次第推之自無失

脉皆以四五十五動爲準乘子經直○佛東楊曰古

以動數候，脉是契緊語，謂候五十動，乃知五臟矣。夫今人指到腕臂，即云見了，夫五十動，豈彈指間事耶？故學者當設脉，問證聽。

四言舉要

宋南康紫虛隱君崔嘉彦希範著明蘄州月池子李言聞子都刪補

脉乃血派 氣血之先 血之隧道 氣息應焉
其象法地 血之府也 心之合也 皮之部也
資始于腎 資生于胃 陽中之陰 本乎營衛
營者陰血 衛者陽氣 營行脈中 衛行脈外
脉不自行 隨氣而至 氣動脈應 陰陽之誼
氣如橐籥 血如波瀾 血脉氣息 上下循環

十二經中

皆有動脉

惟手太陰

寸口取決

此經屬肺

上系吭嗌

脉之大會

息之出入

一呼一吸

四至爲息

日夜一萬

主十五百

一呼一吸

脉行六寸

日夜八百

十丈爲準

初持脉時

念仰其掌

掌後高骨

是謂關上

心肝居左

關前爲陽

關後爲陰

陽寸陰尺

魂魄穀神

皆見于口

肺脾居右

腎與命門

左大順男

右大順女

本命扶命

男左女右

脉搏

皆見于口

左主司官

右主司府

關前一分

人命之主

左爲人迎

右爲氣口

神門決斷

兩在關後

人無二脉

病死不愈

男女脉同

惟尺則異

陽弱陰盛

反此病至

脉有七診

曰浮中沉

上下左右

消息求尋

又有九候

舉按輕重

三部浮沉

各候五動

寸候胸上

關候膈下

尺候于臍

下至踝躁

左脉候左

右脉候右

病隨所在

不病者否

浮爲心肺

沉爲腎肝

脾胃中州

浮沉之間

心脉之浮

浮大而散

肺脉之浮

浮濶而短

肝脉之沉

沉而絃長

腎脉之沉

沉實而濡

脾胃燭王

脈宜和緩

腎脉之沉

沉實而濡

春絃夏洪

秋毛冬石

命爲相火

左寸同斷

太過實強

病生于外

四季和緩

是謂平脉

春得秋脉

死在金日

不及虛微

病生于內

四時百病

胃氣爲本

五臟准此

推之不失

調停自氣

呼吸定息

不可不審

音和之則

三至爲遲

遲則爲冷

六至爲數

數卽熱證

轉運轉冷

轉數轉熱

遲數旣明

浮沉當別

浮沉遲數

辨內外因

外因于天

內因于人

天有陰陽

風雨晦冥

人喜怒憂

思悲恐驚

外因之浮

則爲表證

沉裏遲陰

數則陽盛

內因之浮

虛風所爲

沉氣遲冷

數熱何疑

浮數表熱

沉數裏熱

浮遲表虛

沉遲冷結

表裏陰陽

風氣冷熱

辨內外因

脉證參別

脉理浩繁

總括于四

既得提綱

引申觸類

浮脉法天

輕手可得

沉沉在上

如水漂木

有乃洪大

來盛去悠

無力虛大

遲而且柔

虛甚則散

漂漫不收

有邊無中

其名曰芤

浮小爲濡

綿浮水面

濡甚則微

不任尋按

沉脈法地

近于筋骨

深深在下

不任尋按

有方爲牢

實大絃長

牢甚則實

沉極爲伏

無力爲弱

柔小如綿

弱甚則細

幅幅而強

渥脈屬陰

丁息三至

小弱于遲

緩不及四

二損丁敗

病不可治

兩息奪精

脉已無氣

浮大虛散

或見革

浮小濡微

沉小細弱

遲細爲濤

往來極難

易散不止

止而復還

脉訣

卷之三

三

四

結則來緩

止而復來

代則來緩

止不能回

數脉屬陽

六至一息

七疾八極

九至爲脫

浮大者洪

沉大牢實

彈如轉索

是謂之滑

有方爲緊

數見關中

動脈可候

有正爲促

長則氣治

過于本位

長而端直

絃脉應指

短則氣病

不能滿部

不見于關

惟尺寸候

一脉一形

各有主病

數脉相兼

則見諸證

浮脈主表

裏必不足

有方風熱

無方血弱

浮遲風虛

浮數風熱

浮緊風寒

浮緩風濕

浮虛傷暑

浮芤失血

浮洪虛火

浮微勞極

浮濡陰虛

浮散虛剝

浮絃痰食

浮滑痰熱

沉脈主裏

主寒主積

有方痰食

無方氣鬱

沉遲虛寒

沉數驚伏

沉緊冷痛

沉緩水畜

沉牢痼冷

沉實熱極

沉弱陰虛

沉細痺濕

沉紋飲痛

沉滑宿食

沉伏吐利

陰毒聚積

運麻主麻

陽氣伏潛

主吐主狂

有力爲痛

數脉主麻

無力虛寒

無力爲瘡

水經

重

滑脉主痰

或傷于食

下爲畜血

上爲吐逆

濡脉少血

或中寒濕

反胃結腸

自汗厥逆

絃脉主飲

病屬膽肝

絃數多熱

絃遲多寒

浮絃支飲

沉絃懸痛

陽絃頭痛

陰絃腹痛

緊脉主寒

又主諸痛

浮緊表寒

沉緊裏痛

長脉氣平

短脉氣病

細則氣少

大則病進

浮長風癟

沉短宿食

血虛脉虛

氣實脉實

洪脉爲熱

其陰則虛

細脉爲濕

其血則虛

緩大者風

緩細者濕

緩濶血少

緩滑內熱

濡小陰虛

弱小陽竭

陽竭惡寒

陰虛發熱

陽微惡寒

陰微發熱

男微虛損

女微渴血

陽動汗出

陰動發熱

爲痛與驚

崩中失血

虛寒相搏

其名爲革

男子失精

女子失血

陽盛則促

肺癰陽毒

陰盛則結

疝瘕積鬱

代則氣衰

或泄臘血

傷寒心悸

女胎三月

脉之主病

有宜不宜

陰陽順逆

凶吉可推

中風浮緩

急寢則忌

浮滑中痰

沉遲中氣

戶厥沉滑

卒不知人

入臟身冷

入腑身溫

風傷于衛

浮緩有汗

寒傷于營

浮緊無汗

暑傷于氣

脉虛身熱

濕傷于血

脉緩細濶

傷寒熱病

脉喜浮洪

沉微澑小

證反必凶

汗後脉靜

身涼則安

汗後脉躁

熟甚必難

陽病見陰

病必危殆

陰病見陽

雖困無害

上不至關

陰氣已絕

下不至關

陽氣已竭

代脈止歇

臟絕傾危

散脈無根

形損難醫

飲食內傷

氣口急滑

勞倦內傷

脾脉太弱

大疊多沉

滑痰緊食

數火細濶

滑主多痰

絃主留飲

濕

浮滑兼風

沉滑兼氣

數火細濶

瘡脉自絃

絃數者熱

寒則絃緊

洩瀉下痢

沉小滑弱

寒則絃急

嘔吐反胃

浮滑者昌

實大浮洪

霍亂之候

脉代勿訛

厥逆遲微

喘急息肩

浮滑者順

沉澑肢寒

散脉逆證

浮滑者順

浮濡易治

病熱有火

洪數可醫

沉微無火

無根者危

骨蒸發熱

脉數而虛

熱而濇小

必殞其軀

勞極諸虛

浮弱微弱

土敗雙絃

水炎急數

諸病失血

脉必見芤

緩小可喜

數大可憂

瘀血內畜

却宜牢大

沉小濡微

反成其害

遺積白濁

微濁而弱

火盛陰虛

芤濡洪數

三消之脉

浮大者生

細小微濁

形脫可驚

小便淋悶

鼻頭色黃

濁小無血

數大何妨

大便燥結

湏分氣血

陽數而實

陰遲而濇

癲乃重陰

狂乃重陽

浮洪吉兆

沉急凶殃

癥脉宜虛

實急者惡

浮陽沉陰

滑痰數熱

喉痺之脉

數熱遲寒

纏喉走馬

微伏則難

諸風眩運

有火有痰

左濁死血

右大虛看

頭痛多絃

浮風緊寒

熱洪濕細

緩滑厥痰

心腹之痛

氣虛絃裏

血虛微濁

其煩有九

痛氣絃急

積聚在裏

細遲從吉

牢急者生

腰痛之脉

多沉而絃

兼浮者風

兼緊者寒

絃滑，痰飲

濡細，腎著

大乃腎虛

沉實，陽肺

腳氣有四

遲寒數熱

浮滑者風

濡細者濕

痿病肺虛

脉多微緩

或濇或緊

或細或濡

風寒濕氣

合而爲痺

浮濶而緊

三脉乃備

五疸實熱

脉必洪數

濡微屬虛

切忌發渴

脉得諸沉

責其有水

浮氣與風

沉石或裏

沉數爲陽

沉遲爲陰

浮大出厄

虛小可驚

脈滿脉絃

主制于木

濕熱數洪

陰寒遲弱

浮數爲虛滿

緊則中實

浮大可治

虛小危極

五臟爲積

六腑爲聚

實強者生

沉細者死

中惡腹脹

緊細者生

脉若浮大

若有痛處

瘤疽浮數

惡寒發熱

邪氣已深

癰疽所發

脉數發熱

不怕洪大

不數不熱

不疼陰瘡

未瀉癰疽

寸數而實

已潰癰疽

肺瘻之形

肺癰已成

脉宜短濶

不宜浮大

數而不熟

肺癰實熱

滑數可知

喘糊嘔血

關脉芤虛

未瀉當下

緊數膿成

切不可下

婦人之脉

以血爲本

血旺易胎

氣旺難孕

少陰動甚

謂之有子

尺脉滑利

妊娠可喜

滑疾不散

胎必三月

但疾不散

五月可別

左疾爲男

右疾爲女

女腹如箕

男腹如斧

欲產之脉

其至離經

水下乃產

未下勿驚

新產之脉

緩滑爲吉

實大絃牢

有證則逆

小兒之脉

七至爲平

更察色證

與虎口文

奇經八脉

其診又別

直上直下

浮則爲督

牢則爲衝

緊則任脉

寸左右彈

陽蹻可決

尺左右彈

陰蹻可別

關左右彈

帶脉當訣

尺外斜上

至寸陰維

尺內斜上

至寸陽維

督脉爲病

脊強癲癇

尺內斜上

至寸陽維

衝脉爲病

逆氣裏急

任脉爲病

七疝痕堅

陽維寒熱

目眩僵仆

帶主帶下

臍痛精失

陽蹻爲病

陽緩陰急

陰蹻爲病

胸脇刺築

癲癇瘛瘲

寒熱恍惚

八脉脉證

各有所屬

平人無脉

移于外絡

兄位弟乘

陽溪列缺

病脉既明

吉凶當別

經脉之外

又有真脉

肝絕之脉 循刀責責 心絕之脉 轉豆躁疾
脾則雀啄 如屋之漏 如水之流 如盃之覆
肺絕如毛 無根蕭索 麻子動搖 浮波之合
腎脈將絕 至如省客 來如彈石 去如解索
命脈將絕 鯁游魚翔 至如涌泉 絶在膀胱
真脈既形 胃已無氣 參察色盞 斷之以臆

大林山人
卷之九
至平陰縣
脊髓脉
卷之十
至平陰縣
腰脉