

牛山活套

下

牛山先生活套卷之下目錄

婦人部	調經	經閉
帶下	虛勞	求嗣
小產	產育	產後
婦人陰病		
小兒惱論	驚風	
小兒雜病	痘瘡	
外科	瘻疽	
便毒	麻疹	
瘡瘍	瘰癧馬刀	
下疳瘡	楊梅瘡	
癰瘡		
癩風		
瘡瘍		
癰風		

折傷

金瘡

破傷風

湯火傷

虫獸傷

中毒

救急

牛山先生活套卷之下

被髮翁 貞庵 香月啓益 著

婦人部

○婦人ノ病外感内傷共ニ男子ノ病ニ不異只月經ニルヲ以テ其品種々ニ別アリ婦人ノ病ヲ治セハ先ツ月經ノ事ヲ能ク問テ治スベキ也

○室女ハ其病多クハ氣鬱ヨリ發スレバ鬱ヲ開キ氣ヲ順スベレ正氣天香湯ノ類ノ方ニ加減ノ用ヨ

○寡婦ハ其病欲鬱ノ氣順セサルヨリ發スルナリ分心氣飲正氣天香湯ノ類ニ加減ノ用ヨ

○虛弱ナル婦人ハ逍遙散ニ加減ノ用ヨ

○脾胃虛弱ニメ痰アリ常ニ頭痛眩暉スル婦人俗ニ血道
ト云フ半夏白朮天麻湯ニ加減レ六君子湯ニ當取酒芍藥天麻ヲ加テ有効

○婦人產後ハ氣血ヲ補フベシ產後大抵氣色モ能ク床ニ
ツクモナクツキアリテ不足レ血ノ道持モチトテ生涯病者十
ル者アリ逍遙散ニ加減レハ物湯ニ加減レ六君子湯ニ加減
レ或ハ家傳苦菜湯ノ類ヲ用ベシ

○心脾ニ藏常ニ婦人ハ虛鬱スル者ナム加味峻脾湯ヲ
用テ効アリ上ニ載スル所ノ數条先づ婦人平生ノ病也此等
ノ藥ヲ用テ通治ノ方トナスベシ餘ハワレノ門ニテ可参考

調經

○婦人ノ諸病ノ起ハ月經ノ不調ニヨル也經水或ハ前アヘミ或ハ後
或ハ多ク或ハ少ク或ハ月ヲ踰エヌテ未來或ハ一月ニ而ヒ來ニ來ニ來ニ
是皆不調ノ故也調氣兼血湯千金調經湯回春ノ類ニ加減
ス用ヨ有奇効

○調經ノ主方ハ逍遙散ニ加減スベシ經水期ニ先テ來ニ來ニ來者
八血熱也本方ニ酒黃芩山梔子莎草川芎生地黃阿膠
艾葉ヲ加ヨ經水期ヲ過テ不來痛ヲナス者ハ血虛有寒也
木方ニ川芎莎草用桂莪朮烏藥木通紅花蘆木ヲ加テ經
水來シトメ痛ヲナス者ハ血實氣滯也本方ニ川芎生地黃
莎草黃連桃仁紅花玄胡索牡丹皮莪朮ヲ加ヨ經水來寸

ニ心腹疼痛腰脛ニ牽引スル者ハ瘀血也本方ニ川芎生地
黄桃仁玄胡索莪朢青皮ヲ加ヨ經水行テ後痛ヲナス者ハ本
方ニ川芎熟地黃入參白朮黑炒ノ乾姜ヲ加ヨ經水期ヲ過テ
來リ色紫黒ニメ塊ヲ成ス者ハ氣鬱血滯也本方ニ川芎莎
草牡丹皮青皮紅花玄胡索生地黃ヲ加ヨ經水期ヲ過テ來
リ色淡者ハ瘀多シ本方ニ陳湯ヲ合シ川芎生地黃ヲ加ヨ
以上ノ加減調經ノ通治也共ニ有奇効

經閉

○經閉ノ症ハ多ハ氣滯リ血滯^{レカ}故也室女寡婦ニ多也先少
鬱氣ヲ開クレ正氣天香湯ニ四物湯ヲ合レ莪朢青皮紅
花蘇木玄胡索ヲ加テ用ヨ其効如神

○經閉ノ症腹脹滿スル者ハ治シ難シ壯盛ノ婦素ヨリ實症ノ
人ナラハ四春ノ通經丸甘露丸等ノ峻劑ニテ抑下スベレ此等ノ
藥ハ峻急ニ毒藥十六容易ニ用ヒ難シ能脉症ヲ詳ニノ此方
ヲ用ヘシ虛弱ナル婦人ニ用ルナカレ然凡有故無損ト云テ病ニ
中テ元氣ニ妨ナキ者ナガ能病人ヲ診シ得テ峻剤ヲ用ル時ハ
其効速疾也ヨクエ工夫ノ可用フナリ

○婦人虛弱ニ經閉スル血脉枯竭スル故也通經調氣湯
激限百補丸回春經閉ノ類ヲ用テ有効加味道遙散ニ桃仁紅花
ヲ加ルモ亦有効

○室女經閉メ峻熱發熱スル者ニハ牡丹皮湯回春經閉ニ用ヨ滋
陰至宝湯加味道遙散ニ川芎莎草陳皮貝母紅花ヲ加

テ用ベシ有奇効

○婦人經閉積塊アル者ハ四物調經湯回春經閉ヲ用ベシ有効

○婦人經閉ノ者加味道遙散ニ莎草川芎紅花ヲ加テ家

傳神通丸ヲ用ヨ其効如神

血崩

○血崩ノ症ニ虛實新久ノ不同アリ初テ發メ實症ナス清熱解毒ノ剤ヲ用ヨ四物湯ニ黃連解毒湯ヲ合シ或ハ四物湯ニ涼膈散ヲ合メ用ヨ有奇効

○崩血不^レ止者ニ六膠艾四物湯ヲ用ヨ其効如神

○崩血不^レ止者血暈タツクノ人事ヲ不知類ニハ先ツ菴菜湯ヲ振出メ用ヒ甚キ者ニ獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無何有ノ地ニカヘレ

其後ニ膠艾四物湯ヲ用或^レ逍遙散ニ阿膠艾葉地榆側柏葉ヲ加テ用ベシ其効如神

○崩血ノ勢ヒ緩ニタラハ益母湯回春血崩ヲ用ヒ或^レ逍遙散ニ地榆阿膠ヲ加テ用ヨ或^レ八物湯ニ黑炒トウガ莎草阿膠地榆ヲ加テ其効如神

○崩血ノ症面黃三四肢困倦腰臍痛ニ煩熱メ不安者脾氣不行血ヲ統ルアタワサル故也補中益氣湯ニ防風川芎芍藥酒黑炒ノ黃柏ヲ加^ヘ或^ハ加味峻脾湯ニ阿膠地榆ヲ加^ヘ或^ハ異功散ニ當歸芍藥阿膠地榆側柏葉ヲ加テ有奇効共ニ見合テ可用

○帶下赤白共ニ月經不調房欲過度ニ因テ發ス或ニ産後血虛メ胃中ノ濕痰下流スルノ故也先づ逍遙散ニ澤浮地榆ヲ加テ用ヨ或ハ八物湯ニ阿膠黒炒ノ乾姜ヲ加テ用ヨ共ニ神効アリ

○帶下赤白共ニ氣血ノ虛ニ屬スル者ハ加減八物湯四春ヲ用

ヨ其効如神

○帶下ハ濕寒ニ屬シ及ビ湿痰下流ノ者ハ五積散ニ沙草

小茴香吳茱萸ヲ加テ其効如神

○帶下白キ者ニ加味逍遙散ニ白蘋冠花ヲ加テ用ヨ帶下

赤キ者ニ加味道逍遙散ニ赤蘋冠花ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

○帶下アリテ羸瘦レ四肢無力困倦スル者ハ脾胃虛弱ニテ
濕下流スル也補中益氣湯ニ茯苓半夏ヲ加ヘ加味歸脾

湯ニ半夏沢泻ヲ加ヘ六君子湯ニ升麻柴胡川芎當歸ヲ

加テ用ベシ共ニ神効アリ

○帶下ノ症ニハ腰眼脾俞腎俞命門穴天樞痞根ノ諸穴
ヲ灸スレ薰肺ノ法モ可也出于入門可考

虚勞

○婦人ノ虛勞ハ七情ノ氣鬱結ノ相火熾盛ヒヤウ或ハ經水不
調變テ虛勞ト尤始ハ發熱自汗盜汗咯血漸ニ羸瘦レ
咳嗽吐紅ノ不救ニ至ル又產後脫血レ或ハ產後百日ノ中ニ
房事ヲ過レ氣血耗散メ前症ニ至ル是ヲ產後ノ蓐勞ト
云難治先づ逍遙散ニ加減レ滋陰降火湯

○大補湯ノ類ニ加減メ用ヨ共ニ有神効委方考ニ載可参考
 ○先風寒ニ感レ咳嗽不止日久ノ勞咳ノ症トナルニ先ツ茯苓補心湯ヲ用ヨ無効すハ黃芪鰲甲湯ヲ用ヨ共ニ有神効
 加減委ク方考ニ載ス可参考

○婦人ノ虛勞咳嗽發熱ノ者ニ滋陰ノ制ヲ用テ効ナキモ
 蔡丸扶羸湯ヲ用ヨ有神効此方藥味薄メ病人滋補ノ
 味厚キ藥ニ飽タル時アヘ飲ヨキニ因テ多ハ驗ヲトナリ
 ○室女寡婦慾鬱氣鬱メ虛勞ノ症ニ似テ紛々類多く分
 心氣飲ニテ家傳神通丸ヲ下セハ胸膈ノ氣舒暢ノ其病
 自ラ愈ル也可祕

○脾胃虛弱尤婦人虛勞ノ如ク煩テ大便不調ハ脾胃虛
 勞也補中益氣湯ニ貝母山藥五味子棗門益智ヲ加テ有神
 効參苓白朮散モヨレ六君子湯ニ蔡丸桔梗山藥ヲカルモ
 尤ヨレ

○產後ノ舉労ニ大補湯ニ貝母桔梗五味子蠶甲蔡丸ヲ
 加テ其効如神八味丸ヲ常服スベレ有効

求嗣

○求嗣ノ論及藥方諸書ニ載ストイヘ多ハ虛妄ノモノニ
 也啓益豐前ニ在レ時婦人古土富貴草ト云双紙ヲ作テ
 印行ス今世間ニ行ル此書ニ求嗣ノ説委ク論ヲ載ス此書
 ノ見テ求嗣ノトヲ知覺スベレ故ニ爰ニ畧ス

○婦人求嗣ノ事ヲ欲セハ先づ己ガ心行ヲ慎ミ第一ニ嫉妒

ノ情ヲ發セス夫婦共ニ和合レ病アズ、藥ヲ服シ虚損ヲ覺ヘハ夫婦共ニ上手ノ醫師ニ診セテ其藏府ノ虛損ヲ補ヒ平日無病丸時交合スヘシ姪セストムヲナレ

○下部虛寒スル婦人ハ姪ムヲナレ温泉ニ浴メ子宮煖ヘリ姪ム者多シ其國ノ温泉ノ所ニ行テ湯治スヘシ其、効多シ温泉ナキ所ニテハ當飯湯トテ當飯四五斤ヲ大釜ニテ煎レ居風呂桶ニ入テ浴スヘシ此方奇一妙一

○陰虛レタル婦人ハ六味丸ヲ服シ姪ムヲ多シ

○精血清冷稟賦薄弱在夫婦共ニ固本健陽丹ヲ服シテ効ヲ得ルト多シ圓春

○求嗣ノ藥方諸書ニ載スルトシレ考合テ用ヘシサリナガラ多損ノリテ益ナレ只房夏ヲミタリニ貪ルヘカラズ夫婦ノ氣血充實スル時交合スレハ多ハ子ヲ生ズ子ナキ者仕官ノ人ハ江戸結ノレ商人ハ他國ヘ行テ數日逗留シ彼國メ交合スレバ夫婦共ニ氣血充實スル故ニ必ス娘姪ス是ヲ以テ知覺スヘシ

妊娠

○妊娠ハ多ハ脉ニ見ル者也其脉状諸書ニ詳也可参考也テ若キ婦人一兩月モ經水不来時ハ妊娠アリヤト心ヲ付テ診脉スヘシ妊娠七八多ハ脉平和ニメ脉状不疾者也二三ヶ月ニ七八惡阻ノ氣サレアリテ恶心嘔吐万ノ食物ニ臭アリテ好惡差別アル者也如是脉症共嬾胎ニ窮リタラハ大槻ノ病六服藥スヘカラズ妊娠ノ疑似時ニ驗胎ノ方ヨリ逐月ノ護胎ノ方

五月帶々更總テ產前諸病ノ議論婦人壽艸ノ中ニ委ク
載ダリ可参考

○姪婦ノ諸病ハ服藥ヲサズメ可也サレハ大家富貴ノ人強
テ服藥ノトヲ望ム者ニハ異功散ニ當砂仁黃芩ヲ加テ用ヨ
或ハ回春女胎丸ヲ用ヘシ共ニ奇効アリ

○姪婦素モヨリ虛弱ニメ胎孕ヲ榮艸シ難者ニ補中益氣
湯ニ芍藥川芎砂仁黃芩ヲ加テ有奇効

○姪婦惡阻ノ症トテ月經止ルト其儘胸心惡ク鼻ニ物ノ臭
立リ甚キ者ハ嘔吐惡心ス多ハ三ヶ月マテノ煩ニメ其ヲ過レバ
治セゼ必ス止ム者也人ニヨリテ五ヶ月ノ比ニテモ止ヌ者モ
アリ多ハ藥ヲ用テモ効ナク或ハ煎藥ナドハウケクスメ其ヘト
吐スル者アリ如是丸ニ砂仁ヲ押シテ碎テ粒トナシテホツクト
トツスレハ藥ノ如クナクシテ能惡阻ノ症ヲ治スル也○惡阻ハ
多ハ痰胸膈ニル故也ニ陳湯ニ黃芩砂仁連翹ヲ加テ用ヨ
有神効甚キ者ニ前藥ニ黃連姜製少許ヲ加ヨ其効如
神惡阻ノ藥ハ一貼ヲ七分ホトノ分量ニメ一番煎ハカリヲ用
ヘシ一度ニ少ヒテ與テ可也藿香ナドノ類物テ臭ノル藥
ヲ用ユカラス

○子癇ノ症ハ產婦ノ大凶症也口噤三眼目吊鈎亢ニ羚羊
黃芩砂仁竹葉ヲ加テ有効

○子癇ノ症ハ產婦ノ大凶症也口噤三眼目吊鈎亢ニ羚羊
角散四春妊娠門ヲ用ヘシ子癇ノ催ニ出アリ時ニ此方ヲ用ハ
多ハ

收ル也。○子癇ノヨキ症ハ癲癇ノ病ノ如ク又吊レ痰喘急促
頻ニ歎ヲ咬ミ口噤眼目吊鉤スル類ニハ先ツ其標ヲ治スヘレ
家傳神通ノ振藥ヲ用ヒニ陳湯ニ姜製ノ黃連釣藤鉤ヲ
用ヘレ其効如神疾喘退キ其病勢少ク收リタル時ニ羚羊角
散ヲ用ヘシ子癇ノ治方ニハ種ニ手段多レ口授心傳ノ大祕更
也子癇ノ症ニ頻ニ歎ヲ鼓レ牙ヲカニ舌ヲ出レ病勢ワニ者
舌ヲカニ切テ火スルトアリ如是キニレキ症ニハ木綿ノ小手拭
ヲカニセテ置ヘレ必ス舌ヲクヒ切ノ患ナレ何程勢ワヨキ子癇
ノ症モ子產^ウルレバ必收ルモノナレハ何トゾレテ子ヲ生スル手段
ヲチスヘシ是ニ至テ口授心傳アリ其人ニ非サレハ傳ルトナ
カレ可祕

○子懸ノ症ドテ胎動ニヨツテ心胃脹痛スル也紫蘂和氣飲
ヲ用ヨ懸テ產前ノ諸病六此方ニ因テ可加減

○子腫ノ症ハ妊娠面目虛浮スル也多ハ脾胃虛弱ニ属ス
ル也補中益氣湯ニ黃芩^{黄芩}砂仁ヲ加テ用ヨ或ハ六君子湯
ニ黃芩砂仁沢浮ヲ加テ用ヨ共ニ有神効

○子氣ノ症ハ兩足浮腫スル也夏月ノ妊娠ハ十二メハ九ハ腰足
必腫ル者也皆脾氣虛弱ナル故也補中益氣湯ニ車前子沢
浮ヲ加^ヘ或^ヘ異功散ニ當^ヘ升麻車前子ヲ加^ヘ或^ヘ回春子氣
ノ主方モ可也共ニ有神効

○子淋ハ小便澁少也二味安胎飲^{白朮^{白朮}ニ赤茯苓木通車}前子麥門冬淡竹葉ヲ加テ有奇効此方ヲ四五貼用テモ

効ナクハ紫蘿和氣飲ヲ用ヘレ是ニテモ効ナクハ胎氣下墜
メ膀胱ヲ妨ケル故也升提ノ剤ニ宜レ補中益氣湯ニ唐防風
茯苓車前ヲ加ヘ或ハ升陽益胃湯ニ加減シ或ハ升麻葛根
湯三四君子湯ヲ合レ此胡山拖子防風ヲ加テ用ヨ元氣上升
メ小便自ラ快通スル也是大秘良也議論委ク方考ノ升陽
益胃湯ノ条ニ載ス可参考

○胎動スルニ因テ妊娠ノ諸病ヲ生ス紫蘿和氣飲ヲ用テ
胎ヲ安シズベ諸病自ラ愈ルナリ

○轉胞ハ卒ニ小便スルヲ得サル也ニ味ノ安胎飲ニ冬葵子
木通滑石ヲ加テ用ヨ其効如神圓春ノ轉脬ノ主方モ可也
如是ニメを通シ難ニハニ陳湯ニ瓜蒂ヲ加テ煎服シ鳥羽ヲ喉
ニ入テ挿レハ痰ヲ吐出メ小便自ラ通ス此法尤妙也如是ニキモ通レ
兼ハ補中益氣湯ニ防風羌活ヲ加ヘテ中氣ヲ上提スレハ其効
如神

○妊娠ノ崩漏ハ虛ニ属ス血卒ニ漏下スル也芎釈湯ヲ用ヘレ或
ハ膠艾四物湯ノ類ヲ用ヨ共ニ有神効甚キ者ハ人更ヲ不知口
噤スル也獨參湯ヲ用テ元氣ヲ無可有ノ地ニカヘスベレ此手段ニ
ロ授心傳ノ祕アリ其人ニアズニハ傳フ十カレ可秘

○妊娠ノ諸病夫ニ因テ治スベレ但胎禁ノ藥物ニ心ヲ付テ治
ヲ施スベシ妊娠ノ傷寒妊娠ノ瘡妊娠ノ食傷ノ類ハ剛暴ノ病ナ
ベ胎禁ノ藥ヲ厭テ治ヲ緩ヒニスベ却テ邪勢ノ為ニ胎ヲ落サ
ハ更ナベ其門ノ藥方ノ条ヲ考テ治スベ素問ニ故アバ

無損ドアリ能ニ此理ヲサトリテ治スベレ妊婦五月ニ胎落
安キ者ナレバ必ズ胎禁ノ藥物ヲ斟酌スベシ六ヶ月後ハ胎モ撻
ナレハ胎禁ノ藥ニ中テモ墮胎タダノ患ナレ殊ニ况ヤ産月ノ時ニハ胎
禁ノ藥ト云フナレ然ニ大毒ノ類ノ藥物ハ斟酌スベレ是ロ授
心傳ノ秘也

小產

○小產五六月ニテノイ中ニ必ズ保養ホウヨウノ法ニ背キ或ハ虛弱ノ人
其胎ヲ保ホウツアタハスメ墮ハルルセ古人云小產ハ大產ヨリ重シ大產
ハ栗カエデノ熟メ自脫スルスルガコトニ小產ハ生栗カエデヲ採テ其皮壳ヒョウヲ破リ其
根蒂ヲ斷ハルガ加ク自然ノ更ニアフヌト云テ大切ノ更トナセリ
保養將息大產ヨリ十倍スベレ

○小產氣虛ニ血下更不止モノハ春補氣類血湯ヲ用ヘシ
此其大概也

○小產瘀血アソア心腹疼痛惡寒發熱スルニハ補血定痛湯
ヲ用ヘシ此ニ方小產ヲ治スルノ常法也

○小產血下ルト過多ナ人更ヲ不省口噤癥カクシ瘓擗擦天吊
ノ症病ノ如ク破傷風ノ如レ如是才寸ハ先づ苦菜湯龍王湯
白朝散十五味湯ノ類ニ入參ヲ倍加レ見合テ用ヘシ血暈ヤ
三瘦症ヤミテ補氣類血湯ヲ用ヘシ虛甚クメ前証ヲ見サヘ獨
參湯ヲ用ヒ苦菜湯ト互ニ用ハ正氣服ノ其効如神
○小產ノ後血勢アラテ不止或ハ寒勢往來セバ增損四物湯
ヲ用ヨ其効如神

○小產下血四五日不止者ニ膠艾四物湯ヲ用ベレ其効如神

○誤テ毒物ヲ食レ或ハ毒藥ヲ服メ胎ヲ墮ス者腹痛メ不可忍或ハ其胎未墮者口噤手強^{タクニ}自汗癱瘓似中風者毒物^{アシス}所也九死一生ノ病也世醫多ク不識風トナレテ之ヲ治ム必ズ死スル也白扁豆一味濃煎メ用ヒ其病立處ニ愈ル也是大祕藏ノ車也譽薦驗ノ靈方ニソ世医ノ不知處ナリ此一味ノ應驗微妙ノ義理存スロ授心傳ノ大祕車也

○小產後諸症退キテ氣血ヲ補ヘレハ物湯大補湯ノ類ニ加減ノ用ヨ又ハ逍遙散ニ加減ノ用ヨ脾胃虛弱ノ婦又ハ毒藥毒物ニヨツテ小產レタル後ハ補中益氣湯ニ白扁豆ヲ加テ

調理スベレ

○小產後腹痛泄泻スルニハ六君子湯ニ白扁豆砂仁ヲ加テ用ヨ又ハ東垣升陽湯ヲ用ヨ其効如神

産育

○產育ハ臨產ノ事諸書ニ詳也婦人壽艸ニ委ク其手段ヲ書載タリ常ニ此書ヲ讀テ其事ヲ究メ置ヘキナリ

○產婦ヲ医ニ委子賴時ハ臨月ニ入ラバ預メ藥ヲ調合メ病家ニ畜ヘサセ置ヘシ芎藭湯紫蘚和氣飲苦菜湯安神散等ノ藥方ニレクノ用ヒヤウ又ハ用ル時節ヲモ上包ニ書付置ヘシ出產ノ更ハ昼夜ヲ不余者ナハ賴委子タル医在宿セザン時モ此藥ヲ用ヒ其間ニ医モ臼^{ヨリ}來テ其手少ヒ能^{ヨリ}朝鮮ノ

好人參ヲ病家ニ調へ置スキ也

○產婦臨月ニ腰腹痛ムアラバ先ツ紫蘿和氣飲ヲ用テ見合スベシ脉六至已上ニ胎谷道ノ邊ニ來リ疼痛頻ニメ漿水破レ下ラエ芎藭湯ヲ用ヨコロ産下スル也是平產也

○催生ノ方ハ產セントノ胎產門ニ來リ至リ児ノ頭ヲ見ハソ少時モ出難キ時ニ平胃散ニ滑石冬葵子ヲ加テ用ヨ忽ニ產下ス也和俗ハ產ノ氣付クト其ヘ医ニ催生藥ヲ乞ヘ压卒尓ニ催生ノ劑ヲ用ルト無レ催生ノ方ハ児ノ頭產門ニ至ラズニハ用ルノナカレ姑婆ノ類頻ニ催生ノ方ヲ乞望ナス紫蘿和氣飲ヲ用テ見合スベシロ授心傳ノ祕也

○妊娠産セント欲メ痛疎カニメ三四日モ產セズ破水先ツ下リテ產スハ十ケトハ產門乾キ滯テ難產トナル破水下テ一日モ產スナケル實体ナル者ニハ五積散ニ加減ノ用ベシ破水大分下ハ多ハ氣脫七八補中益氣湯ニ酒芎藭川芎木香ヲ加テ用ヒ何日ニテモ產ノルヲ待ヘレ如是スレバ漿水又滋生ノ産道潤ヒ出テ產レ易キ也此大祕夏也

○生產十症ト云フ一諸ノ医書ニ詳ニ載タリ可参考

○難產ニ變レ横產側產ノ類ニ紫蘿和氣飲ニ人参ヲ倍加メ用ヨ蛇脱衣一錢焙テ細末メ酒ニテ可用有効

○難產久胎不下者ニ麝香五分官桂三分細末ノ黃酒ニテ用ベシ其効如神

○胎腹中ニ火テ疼痛ノ母火シト欲スルニ鹿角ノ黑燒ヲ酒ニテ

服其効如神○又一方熊胆五分水煎服スレ其効如神

○難產ニ伏龍肝百草霜滑石冬葵子甘艸細末メ芎の湯ニ
テ服スレ其効如神

産後

○産後ノ脉ハ緩滑沈細ニ宜シ實大弦牢濁疾ハ皆危也

○産後ノ症先虛實ヲ不問古芎の湯ヲ用ヘレ陳皮人參ヲ加
紅花少許ヲ加テ用ヨ其効如神産後ハ何ホド容易ノ産ニテモ
血脫スレバ產落スト其一古芎の湯ヲ用ヘレ人參ヲ加テ氣ヲ補
フベシ陳皮ヲ加テ藥滯ヲメグラシ紅花少許ヲ加テ用ヘ瘀血ヲ
ヨイ順スニ因テ此方ノ藥驗如神

○產ニハ芎の湯ヲ用ヘレ古芎の湯ヲ用ル一日許ニメ後

ニ芎の湯ヲ用ユベレ加減委ク方考ニ載ス可参考

○產弱ノ婦人ノ產後ニハ木保產湯ニ加減メ用ユレ方考ニ載
奇参考

○產後ノ血暈ニ先ツ虛實ヲ不問苦菜湯ヲ振出テ用ヨ或ハ
白朝散十五味湯龍王湯ノ類ヲ見合テ振出ノ用ヘレ又ハ東垣ノ
全生活血湯ヲ煎テ用ヨ此五種ノ藥方ハ用ニ口傳多シ產後ノ
血暈ニ世医多ハ童便ヲ用テ血熱ヲスト云テ推ナヘテ童便ヲ用
セ也血熱實ニ属スル者ハ可也虛熱ニ属スル者ニ全生活血湯ヲ用
ヘシ委ク此議論方考ニ載ス可参考

○產後大二脫血スル血暈ノ不知人事者必死ス急ニ救ヘレ大料
ノ獨參湯ヲ用ヘレ若口噤テ牙齒不開藥汁不入ハ獨參湯ヲ

臭ノ穴ニ吹入ヘレ咽ニ通テ則甦ルナリ緩ニスレバ必ズ死スルナリ
是故三産前ヨリ獨參湯ヲ前シ置ヘキ也産下メ一時二時ノ間ニ
大ニ脱血スベ必ズ血暈メ多々言語レナカラ即死メ不救ト多シ
此時ハ大糀ノ獨參湯ニ水三リ五水ニ至ルヘレ分量多少口傳ナラテハ別ニ治方アラス陽
旺エレハ陰長シ氣ニ因テ血生スロ授心傳ノ議論アリ其人ニ非大
六傳ルトナカレ可祕

○産後胞衣不下ノ症ハ急症也産下スルト半時ホド過キテ下ル
ヨリ一時ノ余モ不下時ハ芎藾湯ニ肉桂ヲ加テ用ヨ有効半日或ハ一
兩日モ不下モアリ一時ノ余モ不下ハ芎藾湯ニ平胃散ヲ合シ滑石
百霜草冬葵子ヲ加テ抑下スベシ如是メモ不下時ハ先ツ脇帶ヲ
断テ取糞藥スベシ此治法緩ニナレハ腹脹滿シ心胸ニ冲上テ喘息

急ニ至ル也脇帶ヲ断テ後王不下者ハアヒソレハ急ニ變症出
ナレ産婦ニヨリテ胞衣不下ヲ數日ニメ瘀血下ニ従テ水母ナ
トヲ剣ミタル如クニナリテ下ル者アリ産母ニヨク教ヘサトノ心安
コト知レメテ補氣養血ノ剂ヲ用テ置時ハ自然ニ下ル也

○胞衣不下心腹疼痛レハ嚙ハノ隣ハ動々類ノ者ニ熊胆五分
或一麦水煎服スベシ立チ處ニ下ル也奇妙可祕

○産後ノ児枕痛ニハ失笑散ヲ温水ニテ服スベシ或苦菜湯
ニ紅花蘆木乳香没藥玄胡煮ヲ加テ用ヨ有神効

ニ蒲黃乳香没藥五靈脂烏藥紅花ヲ加テ用ヨ其効如神

○産後崩漏不止者ハ膠艾四物湯ヲ服スベシ有神効

○産後寒熱往来ト其寒如冰其熱如炭在ニハ増損四物湯
ヨ用ヨ其効如神

○産後血熱不止者ニ増損四物湯ヲ用テモ不^レ止者當取補
血湯ヲ用ベレ其効如神如是方ヲ用テモ効ナキ時ハ全生活
血湯ヲ貼服スハ其効如神可祕

○産後或ハ小産後四五日ノ後寒熱往来譖言妄語病邪
氣ニ似タル者ニ熱入血室ノ症也四物湯ニ小茈胡湯ヲ合レ
桃仁紅花ヲ加テ用ヨ其効如神

○産後血熱ノ症ニ增損四物湯全生活血湯保元湯一名當取
補血湯
ノ類ヲ見合テ用ヒ其熱大半退キ余熱アリテ暴勞トナラント
欲スル者ニ加味逍遙散ヲ用ヒヨ咳嗽アリス滋陰至宝湯ヲ用ヨ

共ニ有神効

○産後ノ腹痛多ハ瘀血也瘀血ヲ追退ルノ利ヲ用テモ不^レ止
時ハ當取建中湯ヲ用ヨ其効如神外ニハ陳艾ヲ土器ヲ以テ焙
乾レ絹ニ包ミテ脐ノ上ヲ熨スレ艾ノ氣口の中にテ其痛立
止^ム也方經驗此方頻ニ試テ有効可祕

○産後泄泻ハ脾胃虛也葛根湯ニ六君子湯ヲ合シ白扁豆
草姜ヲ加テ用ヨ有奇効無効ハ東垣ノ升陽湯ヲ用ユベレ其効
如神

○産後中風口眼喰斜手足牽引^{タリ}氣血虛ノ風ニ中ルナリ
四物湯ニ烏芷順氣散ヲ合ノ用ベレ葵花地黃湯ヲ用ル亦
有効○産後小產後血虛レ瘡病ト尤モ又前ニ一方ニ加減

用ヨ有神効

○産後血虛竭ノ大使祕結スル者ハ四物湯ニ枳殼麻仁桃仁
厚朴紅花烏藥黃芩ヲ加テ用ヨ其効如神

○產後尿祕ノ不通ニ去白ノ陳皮ノ細末ヲ溫酒ニテ一二錢ヲ
服スレバ即通ス奇妙可秘 張不愚ガ
秘方ナリ

○產後ノ浮腫ハ多ハ腑胃中ノ血虛也補中益氣湯ニ茯苓車
前子木香砂仁ヲ加テ其効如神補中治濕湯モ可也如是ノ方ヲ
用テモ効ナキ時ハ加減金匱賢氣丸ヲ用ヨ其効如神

○產後十九症ト云フアリ 回春二見此更ヲ常ニ能考ヘ讀覺テ議
論ヲ極ムベシ又ハ婦人壽草ノ產後ノ卷ヲ常ニ讀覺テ諸ノ手
段ヲ能心得テ產後ノ療治ヲナスベ不可忽也

○產後ノ諸病ハ丹溪ノ說ノ如ク氣血ヲ補ヲ以テ本トメ余ノ雜
症ハ標ヲ以テ治スヘシ是故ニ既調血飲ニ加減メ用ペシ回春ニ
委ク加減ヲ載タリ既木保產湯モ亦有効壽世保元ニ加減ヲ
委ク載タリニ一方共ニ龔氏ガ方ナレ既其中ニ保產湯ハ虛弱ヒン
賦ノ婦人ニ宜シ調血飲ハ實体ノ婦人ニ宜シ此ニ方加減メ用ユ
時ハ雖不中不遠ノ義也余ノ雜病ハレモノ門ニ因テ見合テ可
施治也

乳病

○婦人ノ乳病ハ多ハ肝經ノ怒火ヨリ發スル也乳汁不通ハ結核
自成也此結核久ク不消ハ結メ乳癌トナレ初メ結核ヲナレテ寒
熱ヲ發セハ速スミヤカニ揉マワラゲテ散ズレバ乳汁亦通テ結核自ラ

消スル也

○乳汁不通メ寒熱性來ノ結核ヲ生セバ小茈胡湯ニ白芷青皮木通赤芍藥連翹貝母天花粉ヲ加テ用ヨ其効如神

○乳汁不通ニ先ツ不問虛實木梳ヲ以テ頻ニ乳房ヲカキ刮リ湯泉散コ服スベシ乳門

○湯泉散コ服スベシ乳春

○乳病結核ヲテ乳癌トナラント欲スル者ニハ白芷貝母各二味細末メ温酒ニテ送リ下スベシ其効如神

○乳癰初發ニ青搗葉白芷防風黃芩ニ連翹生甘草節各等分水煎温服メ外ニ生天南星黃柏ノ細末ヲ糊ニ押マセテ貼久シ其効如神

○乳吹、症トテ小兒ノ口氣ニ吹ヒテ腫痛スル也貝母、細末ヲ服立處ニ効アリ鼻中ニ吹入モ可也外ニハ葱白ヲ搗テ餅トナレ一指ノ厚サ乳ノ上ニヒロケテ灰火ヲ用テ葱ノ上ヲ熨ス須臾ニメ汗出テ腫痛立處ニ消ス

○婦人ノ乳汁不出ニ露蜂房熟地黃各等分黑燒ニノ糊ニテ丸梧桐子ノ大サニノ毎服五十九大麥ノ煮タル湯ニテ用ヒニ七日ノ中ニ乳汁出テ如湧奇妙ニ可祕此方啓益常ニ用テ取驗也紫陽ノ野人ノ所傳也

○婦人氣血ニ盛ニ乳房腫痛シ或小兒歎メ乳ヲ飲トアヌ或ハ乳母ヲ置テ實母ノ乳ヲ小兒飲トナケハ陽明實ノ乳房腫痛スル也麥芽一味每一克五分水煎メ服スレバ其乳腫立處ニ

消スル也奇ニ妙ニ

○婦人小產後或ハ產後ニ其兒死スレバ乳汁ヲ断シヲ欲ス必
其時ハ腫痛ヲナス也乳汁ヲアゲンコトニ時ニ麥芽一味ニ水
煎シ服スハ長ク乳汁ヲ断也

○乳癰乳岩ノ症初發ニ十六味流氣飲ヲ用ヘシ多ハ消散スル
也破テ後岩凹ノ如ナルニハ加味道遙散ニ連翹青皮ヲ加テ用ヨ或
ハ清肝益榮湯茈胡清肝湯ヲ用ヨ或ハ五積散ヲ用ヨ共ニ有奇
効無効スハ加味飯脾湯ニ連翹青皮ヲ加テ有奇効

婦人陰病

○婦人ノ陰中ニ瘡ヲ生ズルハ男子ノ下疳瘡ニ同じ多ハ鼈胆泻
肝湯ニ加減ノ用ベレ甚キ者ハ防風通聖散ニ加減ノ用ベレ

○血海頻ニ疼痛スル者アリ東垣ノ烏藥湯ヲ用ヨ其効如神
譽五倍子葱白等分水煎シ頻ニ洗ベレ其効如神

○陰門腫痛スル者ニハ龍胆泻肝湯ヲ用ヒ外ニ小麥朴硝白
朶子龍胆連翹ヲ加テ有効外ハ蛇床子白朶子水煎メ頻ニ洗
ベシ或ハ沢蘭枯礬ヲ用テ水煎メ洗ベレ有効又加味飯脾湯ヲ
用ルモ有奇効

○陰門痒メ痛ニ不時水ヲ出スニハ加味飯脾湯ニ宜シ有奇効
○陰門寒冷ニメ帶下ヲ生ズル者ニハ八味丸料ヲ用ヨ有神効
○陰門ヨリ一ツ肉ヲ挺出スル病アリ陰挺ノ證ト名ク先ツ龍
胆泻肝湯ヲ用テ濕熱ヲ去リ後ニ加味飯脾湯ヲ用ヒ或ハ補

中益氣湯ニ山梔子牡丹皮茯苓川芎黃柏ヲ加テ用ヨ其肉自ラ消スル也

○婦人交接スル毎ニ血ヲ出シ痛ヲ子ス症アリ此肝經ノ虛火脾ヲ動ソ血ヲ攝スルアタワズメ血ヲ出ス也補中益氣湯ニ芍藥川芎防風ヲ加テ用ヒ或ハ加味釣脾湯ヲ用ヨ共ニ有神効

○婦人陰門時ニ有聲轉失氣ノ如クナルニ陰吹ト名ク此症久ク帶下ヲ患ヒ或ハ產後血脫ノ後ニ必多キ症也加味釣脾湯ヨ用ベシ有神効啓益常ニ此症ヲ治スルニ升麻葛根湯ニ四君子湯ヲ合レ當釣川芎遠志防風黃芪ヲ加ヘテ用奇効アリ大祕夏也医按委ク遊豐司命錄ニ載ス可参考

○婦人陰風ノ症アルニ男子交接スル其虱男子ノ陰毛ニ傳染

メ身中ニビコリ鬚毛眉毛一ニテア食ヒ落メ大風ノ形ノ如クニ到ル者也婦人此症アハ草烏頭一味水煎メ頻リニ陰門ヲ洗ヒ雄黃ノ細末ヲ絹ニ包ミテ陰門内ニ入テ半日許ホトツ置一七日ナハ其虱多六次スル也男子傳染シタルニモ草烏頭ノ煎湯ニテ洗ベシ其後ニ沉香奇南香ノ類ニテ薰ズベシ其虱忽々次スル也奇妙ノ一也

小兒總論

○小兒三歳ヨリ以下ハ脉ヲ診スルアラズ病アラハ男子ハ左女子ハ右ノ手ノ虎口ノ三關ヲ見テ其病ヲ知ルベシ三關トハ手ノ第二指ヲ見ルニ第一節ヲ風關ト名ク第二節ヲ氣關ト名ク第三節ヲ命關ト名ク此ニ關ニ見ル所ノ筋肉ノ絞ノ色ヲ見テ

病ヲ知ル也紫丸ハ熱ニ属レ紅丸者ハ寒ニ属レ青者ハ驚風
白キ者ハ疳黑キ者ハ中惡黃丸者ハ脾胃ノ困也若風關ニ見
ル者ハ其病輕シ氣關ニ見ル者ハ其病重シ命關ヲ過ル者
ハ治シ難シト知ルベシ

○小兒三歳以上ハ医ノ一指ヲ用テす關尺ノ三部ヲ按レ診ス
ベシ常ニ六七至ヲ以テ法トス小兒ハ純陽ノ者十ハ其脉至テ
急速ナル者也六七至ヨリ增ルスハ熱トシ減ズルスハ寒トシ浮
洪ハ風熱盛也數十寸ハ驚風沉遲ヲ虛トシ沉實ハ積トスル
也此其大槩也諸ノ方書ノ小兒門ニテ可考

○初生ノ小兒ニハ黃連甘艸クモウトウ淡洛根各等分紅ノ綿ニ包ミテ熱
湯ニヒタレ其汁ヲ飲シノ乳ハモノ如クニメスワシムベシ委ク争ガ著所

ノ小兒膏艸ニ詳ニシルス也平日此書ヲ讀テ初生ノ小兒ノ類膏
人法ヲ知ルベシ

○小兒初生十四五日ノ後吐乳スルトアヌハ病ノキサスト知テニ味湯一
黃連丁子連翹ヲ加テ用ベシ

○小兒ハ大小便サヘ滯リナリヒタト通ズレハ病ナレト知ルベシ少ニテ
モ大小便ノ通ジ滞ル十スハ病アリト知ルベシ小兒科ノ家傳ニハ時ハ
下シヲ用テ大便ヲ通スル者アリ是モ亦一術ナリ

○小兒大小便通スルカタク腹脹ル者ニ八升發ニ陳湯ニ加減ゾ
用ヨニ陳湯ニ升麻茈胡ヲ加ヘタル方也此丹溪ノ妙方也

○小兒吐乳セバ先ツニ陳湯ニ砂仁連翹黃連ヲ加テ用ヨ吐乳
ニ連翹ヲ加ルト大祕密ト也其理意味深長在ナリ其人ニ

非ぶ傳ルナヤレ

○小兒ノ諸病ハ多々乳食ヨリ發スルト知ルベシ小兒ノ情ハ別ニナリ
飲食ノヨリ外他ノトナレ是故ニ皆食ニ破ル病ト心得ヘキ也

○小兒ニハ魚病ナレ凡家傳ノ保童圓ヲ用ルト一ヶ月ニ十日力
十五日カ用ヒ食ヲ化シ疳虫ヲ除キ滞ル所ノ臍^{ウツラ}垢^{ウツラ}ヲ除キテ
病ナキナリ

○小兒ノ病ニ始ニ論スル如ク食ヨリ發ノ痰ヲ兼ルト多ケハ
ニ陳湯ニ加減ヲ用ヒ或ハ神通丸保和丸等ヲ用ユベキナリ

○小兒諸病多ハ大人ニ同ジケハ其門ニ依テ見合テ治ニ施
スシ但剤ノ多少アリ加減アリ是ニ口授心傳多シ可祕

驚風

○驚風ノ症ニ二種アリ急驚風アリ慢驚風アリ急驚風ノ症
ハ牙關緊急熱甚ク頰^{ホウ}赤ク上竄直視^{リツシテ}涎潮^{タキツモ}ノ如ク涌出ル痰
喘急速^{タキツモ}ニ手足搐搦^{ツクツク}又張シ顎動レ唇口紅ニメ眉眼引ワリ口中
燒^{ヒヤウ}が如ク大小便閉結^{イハキ}レ其脉浮洪數緊也是陽症ニメ内ニ實熱
アリ風ヲ挾ム者ハ先づ敗毒散^{回春丸}ノ加減ヲ用テ風ヲ驅テ搐搦
自ラ收ル也瘦熱ニ因テ急驚ヲ見サバニ陳湯ニ牛胆南星天麻
釣藤鈎ヲ加ヘテ用ヨ或ハ靈砂丹^{回春丸}ヲ用或ハ万億丸ヲ用テ下メ
利ヲ得^シ多シ小兒科其家ニ傳ル所ノ下ノ方ニ奇妙ナルシ
万億丸ハ回春小兒ノ通治ニ見ヘタリ

○瘡疹或ハ痘瘡出ント欲スル前ニ必ス大熱ヲ發シ搐搦及張入
ルト度ニナシ下ノ利アリ下時ハ勢解利ノ其痘其疹自ラ出テ熱

解ノ擣定ル也

○下ノ方ニ蜈蚣^{フシコク}全蝎^{クモカニ}巴豆牛胆南星朱砂牛黃麝香龍腦姜
桑夜明砂^{ハマチ}細末^{ヒメタマ}ノ錠子トナレ或ハ丸トナレ金箔^{バク}ヲ衣トソ用其妙奇
奇妙ニシテ言難^{ハシキ}レ分量口傳アリ

○急驚下ノ後或ハ風ヲ驅^{カス}テ後急症退ハニ陳湯ニ南星砂仁扁豆^{ハナヅチ}加テ用ベレ惣^{ツウ}テ毒藥ヲ用テ病ヲ退タル後ノ調理ニハ必扁豆^{ハナヅチ}ラ用ベレ此我家ノ大祕良也

○慢驚風ノ症ハ或ハ病後吐泻^{トクサ}レ或ハ藥餌ニヨワテ脾胃虛損シ
四肢逆冷口鼻ノ氣微ニ手足癱瘓^{ハリ}レ昏眩^{スイイ}ノ睛^{メラハ}ノ露^{ロハ}ス此脾虛
ノ風ヲ生ズ無陽ノ症ニ中氣虛損不足ノ病也故ニ急驚風ハ急
危ノ症ナレモ實ニ屬スレバ治レ安キナリ慢驚風ハ緩^{ハシキ}タル症ニノ

急ニ慢驚症ハナケレバ不足ニ屬スレハ治レ難キ也

○慢驚風ヲ治セハ醒脾散^{ハニ出ニ}加減ノ用ベレ

○慢驚風ヲ治スルニ啓益常ニ錢氏白木散ニ陳皮砂仁扁豆天
麻鈎藤鈎^{ハカルニ}城アリ脾胃甚弱キ者ニハ四君子湯ニ黃耆天麻
ヲ加ヘ甚虛弱ナラバ神中益氣湯ニ天麻鈎藤鈎^{ハカルニ}加テ共ニ家傳
保童圓ヲ用ヨ奇^{ハシキ}也

○憩^{ハシ}テ急驚風ニテモ慢驚風ニテモ病退テ後ハ調理スベレ六
君子湯ニ天麻砂仁當取^{ハカルニ}加ヘ或ハ補中益氣湯或ハ異功散ヲ
用ベレ小兒ノ調理ニ四君子湯異功散ノ類ニ宜シ藥味ノ品スク
ナキガヨキ也小兒ノ藥ハ少服ナレハ藥品多キ方ハ藥氣ウスクレテ

山法集
卷之三
○小兒ノ疳疾ニ五種アリ皮黃、肌瘦、髮直、尿白、肚大ニン青筋アリ好テ食ヲ欲シ泥土炭茶生米ノ類ヲ好ニ食シ或ハ吐シ或ハ泄シ或ハ便堅硬祕塞シ腹内ニ積塊アリ諸虫トナフテ怪キ病ヲトス也是皆乳母ノ攝糞法ニソムキ其熱乳ヲ飲レムレバ疳虫ヲ生テ怪キ症ヲナス也又ハ久ク吐乳ヲナレ久浮久利ノ後久瘧久咳下血久瘡ノ後皆津液亡テ濕熱ヲ生シ其濕熱ニ依テ虫ヲ生メ怪キ病ト十ルナリ漸ク飲食ヲナス時ニ至リテ酒肉油膩ノ物生冷硬物冷水

○小兒ノ疳疾ニハ多ハ肥兒丸四春出四味肥兒丸ヲ用ヘシ多久煎湯ヨリ丸業ニ利アリ

○疳疾ハ多ハ脾胃ノ實熱ナシバ如何ホドニ瘦フセタリ压補藥益アラズ只虫ヲ殺ス剤ヲ用ヘシ蜈蚣赤盤蔓拌ノ虫常山・虫山蚕漆葉此漆葉製法口傳三棱莪木胡黃連牛黃真此製法山查内丁子人參使君子ヲ調合分量口傳瓦器品ニ入テ黒燒ニメ鹽屋ノ煤ヲ加テ細末シ丸シ用ヨ或ハ土用鳥ノ黑燒ヲ加ルモヨレ此方ハ奇妙ノ方也去レニ虛症ノ小兒ニ用ヒガタレ能ニ見合テ用ユヘレ

可笑ミ

疳疾

牛山舌會
卷之三
十四

村上一味齋が傳也

○疳疾ハ多ハ保童圓ヲ用テ吉也眼ニ疳氣アラレ赤腫臉赤キ類ニ保童圓ヲ異功散ノ煎湯ニテ用ヒ神効アリ

○疳疾咽渴ノ湯水ヲ多ク飲者ニ八錢氏白木散ニテ保童圓ヲ用ヨ有神効

○疳疾形体柴瘦シ眼赤ク或ハ白膜眼ヲ遮ル者ニ保童圓ヲ細末ノ鱠魚肉ヲ炙テ此細末ニ鱠魚ニシケテ二三切木トフ食スベシ或ハ鱠魚ノ腸ヲ醤油ニテ煎テ食セシムルモ其効如神

疳疾

○疳疾ハ乳哺慎マガニ因ニ積聚ノ致ス所也此症初ニ六兩服ニ

積疳ノ寒熱大往來し飲食減少ス淨府湯ニ加減メ用ヘシ有神効○此症モ治法大槻疳疾ニ同じ肥兒丸磨積圓局保童圓消疳丸金消疳丸^回類見合テ可用

○總テ疳疾六小兒科其家ニ傳ル所ノ消疳ノ藥アリ多ク峻急ノ毒藥也全蝎班蝥蠍虫硇砂紅卿子水蛭ナトノ類ヲ用ル也是ホドノ症ニ小兒科ニ委テ治スベシ加様ナル症ヲ虛實ヲ不問此等ノ類ノ強制ヲ過服シ脾胃虛損メ救ハサルニ至ル如是ノ強制ニテ脾胃虛損セハ朝ニ補中益氣湯六君子湯ノ類ニ加減メ用ヒタヘ六保童圓辛金消疳丸ノ類ヲ用ヘシ有奇効或ハ強制ヲ過服メ泄浮スルニ六錢氏白木散ニ陳皮白扁豆硇仁ヲ加テ其効如神

○小兒ノ癥疾寒熱アツテ或ハ間日ニ發レ或ハ毎日發スル者アリ是ヲ和俗カタカイト名ク淨府湯或ハ七味清脾湯ニ加減メ用ヨ其効如神家傳神通丸ヲ用テ奇ヒ妙

小兒雜病

○小兒ノ病弄舌トテ頻ニ舌ヲ出メビロツカスルト有是皆心熱ノ致ス所也ニ陳湯ニ黃連薄苛ヲ加テ用ヨ或ハ錢氏白木散ニ黃連桔梗ヲ加テ用ヨ有神効

○小兒時アツテ發熱シ天吊スルニ鈎藤鉤散回春小兒雜病ニ出ラ用ヨ

有神効

○小兒ノ夜啼不止心熱ニ屬ス黃連朱砂ノ細末ヲ水ニテ用ヨ或ハ乳頭ニ右ノ細末ヲツケテ児ノ口ニテ吹シメヨ有奇効小兒ノ覺テ祝由スル也医書ニ載タリト雖凡医師タラン者必ス祝由ノ術ヲスヘカラス祝由只本朝ニモ一科焉テ主之可慎也

○驚口瘡ハ和俗舌シトキト云小兒ノ口中白ノ驚鳥ノ口ニ似タレハ也是胃熱也清胃散ニ加減ノ用ヨ又ハ牛黃散春宣シ或ハ升麻葛根湯ニ桔梗黃連連翹ヲ加テ其効如神又小兒口瘡ヲ治スルニ黃連ニ細末ヲ蜜ニ調テ貼之或ハ黃連ニ細末ヲ寒中ノ雪水ニテ解テ符レル其効如神寒中ニ雪降時其雪ヲ磁器ニ押付テ入テロヨ封カミム水トナル其水ヲ取テ用ヘテ多レ医師多ラン者必畜ヘ置ヘキ也

○重舌ノ症ハ和俗小舌ト云舌ノ下ニ又舌ノ形ノ如クナル肉ヲ生
ズル也是病心脾ノ熱也重舌出来レバ必唇口ノ兩傍ニ瘡ヲ生
ムルトアリ又木舌ノ症トテ舌硬腫テ柔柔和ナラザルアリ是亦心
脾ノ實火ナリ二病共ニ當取連翹湯ヲ用ヨ春甚キ者ハ黃連
解毒湯防風通聖散ヲ用ヨ共ニ有ニ神効或ハ黃柏ノ末ヲ竹
瀝ニテ解テ重舌ノ上ニスルベシ或ハ黃連石羔ノ末ヲ雪水ニテ
解キ又ルベシ或ハ蒲黃ノ末ヲスルベシ或ハ百草霜滑石芒硝
末ヲスルベシ或ハ紫雪ヲ舌上ニスルベシ何レ氏手ヲ不停メスルベ
シ一術アリ體ノ下ノ真中ニ艾灸スルト四五壯スレバ即重舌縮也

穴ノ点スルニロ傳アリ可祕

○小兒ノ牙腫テ涎ヲ流レロ自キツメ鼻翼ヲ掩フニ至ル甚キ者ハ齒
齦脱落レ頬腫腐爛メ不救ニ至ル其速スヤカルト如走馬故ニ走馬
牙疳ト名リ和俗ハクサト云清胃升麻湯春東垣ノ神効散ニ宜シ
香蘭葉ヲ煎テ頻ニ口中ニ含ムベシ其効如神

○小兒好ニ泥土炭生米ノ類ヲ食スルハ脾疳也清胃散胃湯春
用ヨ或ハ平胃散ニ黃芩砂仁ヲ加テ煎服レ保童圓ヲ送リ下スベシ其
効如神

○小兒丹毒ノ症トテ遍身所ニ赤腫トアリ其丹毒アナタコトタ
所ヲカヘテ赤ヲ見ス者アリ此火外ニ行ル也和俗赤シサト云犀角消
毒飲春黃連解毒湯升麻葛根湯ニ犀角連翹ヲ加テ用ヨ其
効如神○赤遊丹毒トテ身ノ内ヲ走リ赤ク腫ル、症アリ伏
龍肝ヲ鷄子清ニ解テクベシ其効如神

○小兒咽喉腫痛スルハ風熱ノ毒也。會厭ノ而方腫ハ雙乳鶴ト云治レ易シ。傍腫ルハ單乳鶴ト云治レ難シ。皆喉痺也。甘桔湯ニ宜シ。因春小兒雜門ニ出ス所ノ甘桔湯ノ方モ吉。

○小兒眼目腫痛スルニハ熟地黃一兩ヲ新汲水ニ浸レ搗爛ラレ脚心ニ貼テ布ニテ包ミ置ケハ有奇効。○小兒ノ眼ノヲナ赤キ者、虫氣ノ症也。保童圓ヲ錢氏白木散ノ煎湯ニテ送リ下セヨ其効如神。

○小兒耳腫痛セバ藿香正氣散ニ烏藥細辛ヲ加テ用ヒ。ビシ頸痛耳鳴耳聾耳ハ腸胃ノ生ズル所ナガル陽明ヲ發スレバ自ラ愈也。家傳玉樞丹ヲ刻用ルモヨレ。○停耳ノ病耳中ヨリ膿ヲ出レ或ハ水ヲ出三藿香正氣散ヲ用ヨ外六五倍子ノ細末ノ壳ヲ炒テ黄色ニメ香油ニ調テ貼タルモ吉也。

○耳聾ハ多ハ停耳ノ後ニ發ル者也。棗ヲ食焼タル上ニ置テ蒸レ其肉ヲ取テ木綿ニ捻リツケテ長カラレバ其ヲ耳中ニサレテ半時一時ア。一日ニ兩三度スレバ其効如神可秘。

○大人小兒共ニ耳聾ノ症ニ鶴鳩ノ油ニ磁石麝香少許ヲ入テ煉合テ錠子トナシテ耳内ニ入テロ中ニ生鐵少許ヲ含ムア。三五度ナレバ其効如神右ノ錠子ヲ綿ニ裹ミタルモ吉レ右ノ方ハ本草綱目ノ鶴鳩ノ条ノ説明ニ見タリ。鶴鳩ノ脂日本ニナレ申華ヨリ長崎ニ来ルサレモ甚稀也。河内國ニ鶴鳩アリト云人レドモ其實否ヲレラヌ。此方耳聾ヲ治スルニメハ九ヲ治ス先師元益

老人此油ヲ畜ヘテ耳聾ヲ治スルノ名ヲ得其後此油ヲ求得ズ石
龜尿クモリノミヲ取テ麝香ヲ加ヘ右ノ方ノ如シテ口中ニ鐵アラヲ含スレハ其効
如神是亦一奇方也可秘

○小兒ノ頭瘡ハ熱毒ナリ或ハ胎毒ニヨツテ也和俗クサトム多ハ
下シテ利ヲ得ル也保童圓カクジンゲンノ用テ吉也荆防敗毒散カシマヒヤウツクサンノ用モ吉虛ニ
屬スル者ハ四君子湯ニ升麻葛根湯ヲ合シテ連翹レンキヲ加ヘテ用ヨ
有奇効胎毒ニヨツニ瘡痍遍身ニ出来者ニモ治方右ノ如用テ
ヨレ○小兒科ノ家ニ胎毒下シクサノ類ノ妙方多シ祕メ不出紫
陽ノ野人一方ヲ傳フ白屈菜ハクヅカラヲ陰乾ニメ黒燒ニメ貼之甚有奇
効

○臍瘡ハ風濕也小兒臍帶ヲ断トキ不慎レテハ落スルコトニ其断スル

目ヨリ水濕入テ脐瘡トナル甚時ハ臍風撮口ノ症トナフテ不救ニ
至ル也又脾胃ニ濕熱ヲテ脐中ヨリ水ヲ出レ膿ヲ出レ臭氣掩
鼻アツメモノアリ錢氏白木散ニ連翹酒芩レンキイクイヲ加ヘテ用ヨ外ニ八黃柏ノ
末龍骨ノ末ヲ脐中ニ入テ填シ有奇効

○諸ノ虫痛ハ胃氣ノ傷テ濕熱ニヨリ虫ヲ生テ痛也使君子
枳榔シラカバノ二味水煎レ用ヨ家傳保童圓神通丸肥兒丸ノ類及魂
丹玉樞丹ノ類ヲ用ベシ其効速ナリ

○小兒蛔虫ヲ吐レ或ハ殺道ヨリ蛔虫ヲ下スニ練陽湯リョウニヤウ春ヲ用テ
有効○冬月蛔虫ヲ吐スルハ多ハ是胃寒胃虛ノ症也錢氏白
述散ニ丁子ヲ加テ用ヨ有神効

○小兒人疝氣陰囊腫痛メ不可忍者ハ此寒氣ニ齧セ元也

五倍子ノ黒焼ヲ酒ニテ方寸七ヲ用ヨ其効如神○小兒陰囊腫大ナルニ蟬退半兩水一大碗煎湯ニテ腫勢ヲ洗フ一度ヒハ其腫立處ニ止也強鹹ノ類ニ咬レテ腫痛スルニモ前方甚妙也

○小兒ノ脱肛ハ大腸ノ氣虛也提肛散ニ宣レ痢後ナドニ必ス肛門脱スルト多レ補中益氣湯ニ募丸防風ヲ加テ用ヨ

○小兒ノ遺尿失禁或ハ睡中不自覺メ尿ニ類ハ多ハ虛寒也破故紙散桂肝丸共ニ四春ヲ用ヨ多ハ小兒夜起半ヲ懶ク思テ床之上ニ直ニ溺シ其ト習テノセトナリテ此症ニナルト多レ腰眼ノ穴命門ノ穴尾骶骨ニ灸ヲスレバ此症愈ル也

○小兒尾骶骨痛者アリ此陰虛ナリ補陰降火湯春或ハ右

缺九左缺九ヲ用テ其効甚多シ

○小兒鮮頰ハ願門ト午頭ノ縫ノ不合也此元氣ノ虛也ハ物湯ニ加減ノ用ヒ六味丸左缺九補中益氣湯ノ類ニ加減メ用ヒ其間ニ六保童圓扁角ヨ有奇効

○行遲ノ者ハ元氣不足也調元散ニ宣レ

春或ハ補中益氣湯ニ石菖蒲ヲ加テ用ヨ髮遲者齒遲者共ニ此方ニヨツテ加減スベレ

○語遲者ハ邪衆心也蒲黃丸ニ宣レ

○涎多キ者皆脾濕也涎出テ不正涕出不正其鼻涕涎沫

セシテツニテ鼻ノ下口ノ兩傍赤ク爛ル者アリ和俗コレヲ赤口ト云又ハヨダト云

多ハ無病小兒ニテ七八歳ニナハ自愈ル者也平胃散ニ連翹車前子ヲ加テ用ヨ外ニ六黃連ノ細末ヲ寒ノ雪水ニテ貼セヨ其効如神

○小兒ノ龜胸ハ煦タカクノ掌ヲ覆ガ如シ龜胸丸宜春

○龜背丸和俗ニセムレト云龜背丸ニ宜レ春○龜胸龜背共ニ

腎氣，虧損タリ尤敏丸ニ加減ノ角ヨ有効

○鶴飾ハ血氣不充ノ症也必大病ノ後或ハ創後瘍瘍後ニ足
眥瘦テ如鶴膝當飯地黃丸春或ハ大防風湯ヲ用テ其病愈也
大人モ必有此症後ニ難治ニ至ル可慎

痘瘡

○小兒ノ痘瘡ノ症ハ發熱甚メ風邪ノ病ニ紛ル者也疑似ノ
間ニ先づ升麻葛根湯或ハ香薷散ニ葛根ヲ加ヘ或藿香正
氣散參蘇飲ノ類ヲ見合テ可用痘瘡ノ熱ハ何程甚シキトテモ
耳ノ大又手巾指令ナリ冰ノ加グ腮赤ク眼ノ内赤ノ時ノ次伸
艸ニ著シ置也可考

○痘瘡發熱アラワレ三日ヲ過テ痘瘡額ノアタリニ蚊カノロヌノ
ゴトク色好アラヘルヲ取上ノ好痘瘡ト知ベレ發熱ヲ覺ルト其ニ
ニ痘出見レ或ハ坐日ノ中ニ痘出ルハ後ニ必惡症ニ變スル者也
油斷スヘカラズ加味敗毒散痘瘡春或ハ升麻葛根湯ニ加減メ用
ヘシ共ニ山查子ヲ加ヨ山查子ハ治痘毒ノ聖藥也

○痘瘡ノ序病ニ發熱甚ク眼天吊ス者多シ或ハ搖櫈上竄
驚風ニ似タル者アリ是佳兆也必痘少ク出テ其後ハ苦ナレ升
麻葛根湯ニ連翹蟬脫山查子ヲ加テ用ヨ或ハ和解散保赤全
書ニ加減メ用ベシ

○痘出テ毒氣甚ク血紅一片ニメ地界ヲ不分者ニハ神効散四
ヲ用ベレ勢甚者ニハ參連ヲ加ヘ驚怖心アラバ蟬脱連翹ヲ加テ用
ビシ山查子ヲ加フ妙トス又解毒疎痘湯ニ山查子ヲ加テ有神効或
入參羌活湯モ有奇効共ニ見保赤全書也

○痘出テ三日ノ内ニ痘頭里陷スル者ハ虛ニアラザル也火盛ユ一
也九味神効散ヲ用テ其火毒ヲ退久レ有効

○痘瘡起脹ノ時節ニ瘡勢弱ク瘡色白メ頂陷者ハ虛症也
十全內托散ニ丁子肉桂穿山甲ヲ加テ用ヘニ有神効或保元
湯保赤全書丁子肉桂川芎當歸穿山甲ヲ加テ有神効共ニ見保
赤全書

○痘瘡出干後ハ闇由ニ乳香ヲ焼ヘシ奇妙也

○痘出齊ノ後三日ヲ大事ノ時分ト知ヘレ好痘ハ膿漿十分ニ滿
テ山ヲ上ル也其次ハ六七分膿漿也凡ソ痘ハ膿漿ノ有無ニテ生
死判カルル者也膿有ル時ハ毒外ヨリ散ス故ニ生ル也膿ナキ才毒内
ニ攻ム故ニ死スル也拔膿引テ瘡痂厚者ハ好痘ナリ痂薄者ハ
其次ナリ

○痘色紅紫乾枯シ焦黒化者ハ毒熾サシニメ血凝也清毒活血
湯ニ宜シ痘色淡白ニメ尖圓カツイナラズ根ニ紅暈ナキ者ハ氣虛メ
血縮ル也參芪鹿茸湯或保元湯ニ宜シ其方共ニ活絡心法
ニ出タリ可考

○痘瘡大便實スル者ハ宜レ大便泄スル者ハ脾氣虛シ肌肉ノ
艱ハラシナキ故ニ多ハ惡症ニ變ル者ナリ加味四苓散參术散錢

氏白木散ニ扁豆砂仁山査子ヲ加テ可用活幼法ニ出ス

○痘瘡寒戰咬牙ノ見ル、ヲ惡症トス虛ニ属スル也建中湯活幼

法保元湯補中益氣湯ニ加減メ用ヨ

○痘瘡吐逆スル者ニハニ陳湯ニ合升麻葛根湯加連翹山査子其効如神

○痘毒咽喉中ニ出テ腫痛シ飲食通りガタキニ利咽解毒湯活幼ニ連翹山査子ヲ加テ其効如神

○痘瘡ノ餘毒必腕股等ニ滯リ膿血ヲ生レ骨ノ中ニ齧リムテ手足不舉類ノ者多シ大連翹飲ヲ用ベシ或ハ全内托散ヲ用ヨ共ニ活幼心法ニ出タリ

○痘瘡甚痒キ者ハ表症ト知ベシ保元湯ニ加減シ或ハ黃蓍

實表湯活幼ヲ用ベシ其効如神

○九痘瘡、瘡疥ノ類ヲ始ニ煩ヒ又ハ疥癬ノ類未愈ニ痘瘡ヲ患ル者ハ多ハ痒塌ヨヤクナフノ危症ニ變スル者也和俗ニ之ヲクサケ交ルト云テ甚惡症トス大連翹飲ニ宜レ

○痘瘡ニ麻疹ヲ夾ム者アリ甚危症也玄參升麻湯活幼ヲ用テ其効如神

○懃テ痘瘡ノ次第俗用ノ手段予か著ス所ノ小兒育艸ニ詳ナリ可考

○痘瘡ニ和俗米泔水バクスイヲ沸湯トナレテ落痂ノ時ニ沐浴スルアリ中華ノ書ニ此事アルヲ未得考、痘瘡色惡ク充時ニ水楊煎湯ニテ瘡ヲ洗ヒ三豆湯ニテ浴スルノ類諸書ニ見ヘタリ

セレトモ日本人ノ如ク推レテ、テ俗習トルヲナレタハ十五六日
ノ後ニ洗フベシ危症ノ痘瘡ハ日數ニカハル（カラズ）三十餘日或ハ五
十日モ過テ洗ベシ是日本ノ俗習也、之ニ從ヘン朝鮮國ノ医鄭
萬里ニ此事ヲ朝鮮ニテモナスヤト筆談レケレモノ朝鮮ニテ此車
ナレト答タリ寢旦ト同事ト見タリ

○惣ノ痘瘡ノ治方ヲ考ルニハ保赤全書痘疹全書活幼心法
ノ三書ニ委ク備ル也之ニテ考ヘテ己か識分次第ニ治ラ施スヘ
○今時痘瘡ノ治方寒熱虛實ヲ不問始ヨリ多ハ參蓍ノ類
ヲ用ル者多シ虚ニ屬スル者ニハ甚効アリ然レニ痘瘡初發ハ熱
毒甚シ風藥ノ類ヲ以テ發散スル寸ハ痘毒發出メヨレ補藥ヲ用
テ補往其邪氣メ實ヲ實スルヲナカレ近代補藥ノ人ノ命ヲ失フ

車カキリナレ可慎、ト也

麻疹

○夫麻疹ハ痘瘡ニ比スレハ甚カロキ者ナレ其症六府ヨリクニツ
テ陽症ニメ暴急ノ症也夫ニヨリテ和俗ノ謬ニ痘瘡ハ美目定ノ
麻疹ハ命定メトムテ甚大切イトスル也其子細ハ急病ナルヲ以テ
療治ノ法少ク急ルスハ其變掌ヲ返ガ如クナレバナリ

○麻疹ハ發勢スルヲ二三日出脹共ニ三日ニメ出テ没スル也没ニテ
又出ルモアリ其發リハ傷寒感冒ノ熱ノ如レ去レニ北症ハ咳嗽甚
クテ咽喉ノ間呼吸短息ニメ不利之ニ因テ咽ノ中ハレカキニ因テ和
俗ハレカノ病ト名ツクルト也升麻葛根湯ニ宣レ咳甚久ニ陳湯
ヲ合レ桔梗蘗梗ヲ加ヘ或ハ參蘗飲ニ連翹ヲ加ヘ或ハ葛根

湯ニ小茈胡湯ヲ合レ或ハ黃連解毒湯ヲ用ヒ或ハ涼膈散ヲ用テ見合テ療治スベシ

○麻疹ノ症、多ク咽不利、咽渴スルニ因テ飲水多キ故ニ必刺病ニ變スル者也。又ハ麻疹ノ毒内ヨリ下ル者モアリ何ノ道ニモ大方ハ麻後ニ必刺病トナル者也。升麻葛根湯ニ山楂子扁豆砂仁ヲ加ヘ虛スル者ニハ錢氏白朮散ニ連翹白扁豆砂仁升麻ヲ加テ其効如神。

○麻疹ノ毒氣流注ノ刺ト丸者ニハ清熱導痰湯ニ宜レ方ハ活幼心法ニ出ル也。

○麻疹ノ症四ノ大忌アリ是ヲ犯スニカレニハ葷腥生冷ノ物ヲ食フニカレ風寒ニ中ルト勿レニハアワテ、寒涼ノ藥剤ヲ用ルト勿レ黃連解毒涼膈ノ類是也。ニニハ辛熱ノ藥剤ヲ用ヘカラス桂枝湯ノ類又善活麻黃ノ類是也。四ニハ補溫ヲ用ヘカラス泄利ノ症アス加味四苓散ニ加減ノ用ヒヨ訶子肉豆蔻參茋ノ類ヲ禁スベシ此四大忌ヲ犯六其禍如爻掌可慎

補遺

○宝永戊子ノ秋ヨリ冬ニ至リ明ル己丑ノ歲ノ春ニテ日本六十餘州ヲレナタテ麻疹流行メ男女老少ヲ不問一般ノ疫麻也貴トナク賤トナク此患ニテ死スル者多レニ予京師ノ高倉ノ旅館ニアツテ此病ヲ治スル五百三十余人也。其内一人モ死スル者ナレ皆之ヲ治ルノ医或ハ寒涼ヲ過レ或ハ辛熱ヲ用ヒ或ハ補藥ヲ用テ其害輕レ予一方ヲ製ス葛根連翹湯ト名ツ

葛根連翹升麻白芍藥酒茈胡酒黃芩當歸桔梗山楂陳梗
山梔子各等分甘艸桔梗半水煎服。紅點出。カタキ者ニハ防
風牛房子ヲ加へ泄痢アル者ニハ扁豆砂仁木通車前子ヲ加へ咳
嗽甚キ者ニハ桔梗甘艸ヲ倍レ前胡桑白皮ヲ加フ熱甚キニ
酒黃柏酒黃連少許ヲ加へ或淡竹葉ヲ加へ口甚渴スル者ニ
麥門冬石羔ヲ加へ血乾テ大便祕スルニハ川芎生地黃紅花大
黃少許ヲ加フ此方ヲ用ニ三百發百中奇妙。其効不可
言也。

外科

瘡疽

外ハ外科ノ専門ニ任スベシ。セレモ毎度腫物ノ善惡ヲ見テ知ベレ初
發ニ荆防敗毒散追風通氣散ノ類ヲ用ヘレ漸漬テ膿血出テ
八千金内托散ニ加減角ベレ

○瘡疽膿血多脫去スレ氣血甚虛耗ス或ハ八物湯或ハ十全
大補湯補中益氣湯ニ加減角ベレ

○瘡疽ヲ治スルニ八經絡ヲ分テ治スベシ。頭瘡ノ類ニハ茈胡清肝
湯清肝益榮湯ノ類ヲ可用

○瘡疽ノ治方ハ追風通氣散ニ悉ク加減ス。春之ヲ見合テ
用ヨ其効多キ也。

○瘡疽ノ外治ハ腫物ノワリヲ閑藥ニテフセグヘレ此閑藥家
ノ秘方多レ外科ニモ閑藥ヲ膏藥ニテセクアレモ惡キ也。子細

膏藥、身ニ貼テ温ヘリワタレハ膏藥ヲ持チ起メセキ、カヌ者也。黄柏、榆皮、大山椒、葉ヲ陰乾シ右三味細末ノ等分水ニテ解、腫物ノウリヲセキテ上ニ松原紙ヲサキテ覆フヘレ或酢テ解タルモヨレ此閑藥ヲ用ヒ一夜ノ内ニ腫物腫レ起ルナリ奇妙ノ事ナリ。

○外治ノ夏南蠻流鷹取流、針ヲ以撲潤スル也。其上ニ艾灸スル切りテ血ヲ出レ膿ヲ出スカ故ニ治スルト早レサレニ虛弱ナル人ハ元氣ヲ撲セ阿蘭陀流ハ切ルコト不用艾灸ヲ、カリニテ木綿ヲ以テ腫ヲ卷テ温ル也。膏藥モ專温散ノ剂ヲ用ルニ因テ老人虛人宣レセレモ實症ノ腫物ヲ木綿ニテ卷ハ實熱ヲ包ミ籠テ急ギ也。如瘡痕、氣血ノ虛ヨリ生スレバ實ニ屬スル者ハ稀ナレドモ其内熱入毒ノ深キ腫物アル也。經曰謂實者病邪ノ實也ト是以テ可悟。

療瘻馬刀

○瘻瘻ノ症肝經ニ生スル者也。耳後ニ累シトメ生ス多ハ肝鬱ノ症ニテ痰結ノ十斯所也。或ハ氣鬱ヨリ生スルナレバ十六味流氣飲加味逍遙散此胡清肝湯、清肝益榮湯分心氣飲加味啟脾湯益氣類榮湯廣茂潰堅湯ノ類ニ加減メ用。ジ其効如神。

疔瘻

○疔瘻ハ手足面部ニ生スル者也。皆多ハ厚味ノ人ニ生スル者也。殊外尤急症也。先づ灸火ヲ用ヘシ。痒キハ灸メ痛ムニ至ル痛ムハ灸メ痒キニ至ルト云テ。灸ニ宜キ也。内藥ハ追疔奪命湯ニ加

減メ用ベレ外ニハ蟾酥丹ヲ貼ヨ又ハ疔毒キト云又ハ郡藥ト云藥
ヨ敷クベレ 郡上大夫家ノ藥 五八霜 櫻木皮黒焼

熊胆 各等分ニメ細末シ猪ノ油ニテトキ火ニアタ、メテ疔上
ニ貼ハ汗出其處、治モ也其効如神

○疔瘡ノ類ニ青筋ノ症トテ急症アリ知ラズシバ有ペカラズ青
筋出テ胸咽ノ間ニ攻入ナリ日本ノ俗ハ日腫ト云此症ヲ治セハ先ツ
病人ノ尺澤ノ穴ヲ見テ針ヲ以テ筋ヲ断切ル寸ハ黒血ヲ出テ神
効アリ又紙燭ヲ以テ脊及ヒ手足ヲ見ルニ粟粒許ノ赤点アラズ
針ヲ以テ断破スレハ有神効此ニワノ手段奇々妙々也

便毒

○便毒ハ和俗ニ横根ト云フ兩腿ノ合縫ノ間ニ生スルノ腫物也

神奇散龍胆泻肝湯田春本条ニ加減メ用ベレ

○初發ノ時ニ實スル者ニハ喬麥鈎大黃各等分細末メ酒ニテ
毎服ニ度ヲ用ベレ小便ヨリ毒下ル也奇々妙々

○便毒潰テ後ハ實スル者ハ防風通聖散ニ加減スベレ虛スル者
ハ加味逍遙散ニ加減メ用ベレ何レモ鉤藤鉤ヲ加テ妙トス可秘又
茈胡清肝湯ニ加減メ角ベレ

下疳瘡

○下疳ハ多ハ姦亂ナル人娼妓ノ類ニ交接メ其臭穢ノ氣ニ摸テ
生ズル者也初發ニハ消疳敗毒散田春本条ニ加減メ用ヨ或ハ龍胆
泻肝湯防風通聖散ノ類ヲ見合テ用ベレ虛セハ清肝益榮湯
茈胡清肝湯逍遙散ヲ見合テ用ヨ或ハ八物湯ニ小茈胡湯ヲ

合レ連翹金銀花ヲ加氣虛スル者六補中益氣湯ニ連翹防風青皮ヲ加テ用ヘシ痛甚ク何ノ方ヲ用テモ不止痛苦難忍者

六黃葛建中湯ヲ一二貼用ハ真妙如神

○外ヨリ蒼木紫薇黃芩蛇床子艾葉當歸等分水煎瘡
ヲ洗ヒテ其上三白散ヲスリタルヘシ三白散ハ予家ノ祕方ナリ
牡蛎ノ白燒葛根天花粉ノ三味各等分極細末ノ用也平田
道仙ガ家ノ祕方ノ白藥ト云ハ三白散ニ龍腦ヲ加ヘタル者也傳
曰此白藥ヲ娼妓ノ類ニ交リタル時ニ自己ノ小便ニテ陰莖ヲ洗ヒ
其上ヲ温水ニテ洗ヒテ貼ハ瘡毒ニ中ルナシ因テ此藥ヲ瘡毒
ヨケト名ツクルナリ可祕

○下疳ノ藥ヲ外治ノ医ハ流フヲ禁スル者多レサレ疎瘡愈_{イニ}_{カ子}

ル寸ハ洗藥ニテ洗テ粉藥ヲ貼クベシ膏藥ノ類ハ瘡ヲ薰シテ
惡レ痛強ク瘡口大ナラバ三白散或ハ白藥ヲ乳香没藥ヲ加
テ麻油三テ煉テ貼クベシ下疳ノ貼藥ハ隨分極細末スヘシ粉藥
麩末ナレハ害多レ陰頭ハ其皮薄クアマク粗キ粉ニテハ思
ヒアヌ者也此大祕要也

楊梅瘡

○楊梅ハモト下疳瘡ヲ傳染シタル人之ヲ耻テ治スルト遲滯ノ
一變メ便毒トナリ便毒一變ノ楊梅瘡トた京都江戸大坂等ノ
都會ノ所ニ多キ煩也鄙野ノ地ニハルト少シ京ニテハ濕氣ト云
何レモ娼妓ニ交媾メ傳染スルノ病也初發ニハ荆防敗毒散消風
敗毒散_同本条二十四味風流飲_同上ニ加減ノ用ヘ

○楊梅瘡經日不愈者ハ或ハ鼻爛レ鼻柱朽落レロ臭ク唇
缺ヶ或ハ腕ノ折目膿中ニアツリ毒氣膿ヲナシ或ハ總体ノ瘡
乾テ總身疼痛レ或ハ骨ウタキニナリ或ハ眼ニ毒入り或ハ耳聾レ
種ニニ変化スルニ因テ其人終ニ癪人トナル者ナリ之ニ因テ人之ヲ
患ニ嫌フ一大風ニ類スル也此等ノ類ニハ四春ノ通仙五寶丹ヲ
用ヘシ此方王范泉_{ハシミシ}か廣東ヨリ傳來ル妙方也此瘡中華ニモ
古ハ既トナレ近世廣東ヨリ傳來スルニ因テ廣東瘡ト名ツク
ルト痘疹全書_{袁了}_{ナカ}作ニ見ヘタリ和俗此瘡ヲ唐瘡ト云モ廣東瘡
ト云ヘルベレ唐ト東ト音同キ故カ此五寶丹ニモ家ニノ祕方多
シ何方ニモ真珠ノ真ヲ用ヒサバ其効ナレ

○楊梅瘡日久ク不愈ニ防風通聖散ヲ五冬かケホドニメ用

効ヲトルト多レ又奇驗方トテ近来阿蘭陀外科ノ用ル方アリ何
モ山飯来ノ入タル大料也是モ紅毛流其家ニノ祕方多シ可考
合又傳來ノ方ヲ諸医ニ逢テ祕方ヲ談スヘシ互ニ交易メ習フヘ
キト也予ガ家ニ傳所ノ奇驗方ノ祕方 土茯苓_{七分}或當歸
皂角刺 皂夾子 蕃蕷仁 白芷_{各一又半} 木瓜 木通
白鮮皮 金銀花 連翹 防風_{各二分} 甘艸_{五分} 茯苓
芍藥 何首烏 黃芩 人參 川芎 生地黃 沈香_各
_{或二分} 石調合メ一劑五爻或六七爻或八十九爻或十五爻ニシ煎
法次第アリ口傳用ヒ様モ口傳アリ又山玄湯トテ予ガ家ノ名方
アリ 山玄_{五丸日本ノ山飯来イハラ莖也} 二月此二尺半有脚トナリ 山飯来_{半斤} 山飯來_{或一斤} 黄連

黃芩 人參 當歸 防風 桔梗 川芎 生地黃

芍藥 羌活 荆芥 木通 各一匁

蝮蛇 陰干五匁無すハ
白花蛇ヲ用ル也

津蟹

ノ黒燒 五分

右調合メ七貼ニ分テ蝮蛇陰干津蟹鮮虫ノ黒燒ハ後

三貼ニ分ケテ入ル也一日ニ一貼アリ用ル也飲毎ニ鷄ヲ全リタルヲ

一切レツヘ喰テ藥ヲ服スベシ煎法用法口傳アリ

○楊梅瘡年經テ愈カヌルニ涎藥トテ九藥アリ 輕粉二匁

上茶一匁 梅干黒燒 五分 土茯苓一匁 辰砂五分

右細末ニテ

九スルトニ梧桐子ノ大サニメ碾茶 半グラマ 衣トス用ル寸ニ歯ニ中ラサル

ヤウニメ用レハ齒龈ヨリ血出テ咽爛 ノーナタシ テ病人歎スルホドニ苦ムト雖
五七日ヲ過レハ食氣出テ本復スル者十レ毛多ハ二三日ニノ病人肝
ヲツブメ飲得ルナレ虛弱ナル人ハ必ズ歎スル者也容易ニ用ヒ難
キ方也又輕粉ノ毒ニ中リ内ニ端リ骨ウケキニナル者アレハ能ヒ

瘡毒ノ深キトヲ見分テ用ヒジ用ルト其夜ヨリ涎ヲ出シ咽爛
レ痛三飲食不入言語不聞者也生歎ニワ者ガケト思ハズン
バ不可用

○楊梅瘡年久ク臭藥ト云フ方アリ争が家人祕方ニ水銀ニ

光明朱一匁

缸ニ 二匁

百草霜 見合ニスル

右ノ藥物ヲ細末シ百草霜

ノ細末ニ入テ、セ合セテ厚紙ニテ袋ヲつシラズ其袋ノ中ニ右ノ藥

ヲ入テ隨分カタクヌテ長サセ七寸ニテ一日ニ一寸宛カギ申スヤウ

ニ上ニ刻ヲ付テ置キ此藥ニ火ヲ付テ其煙氣ヲ鼻ニ嗅グナリ

眼ヲ塞キロ中ニ冷水ヲ含テ嗅グ也煙ノ外ニ出ヌヤウニ覆ヒラ

カクベシ其コレラヘヤウ嗅ヤウロ傳多シ一方ニ沈香一匁ヲ加フ

ハ好レ此方ハ奇妙靈方也又涎藥トドノヤウニ中ラルヲ

モ無キナリ總ノ楊梅瘡ハアヤシキ療治ニテナケレバ治レ難シト
知ルベレ故ニ諸ノ秘方ヲ此ニシルスナリ

瞼瘡

○瞼瘡ハ和俗ニハシキ瘡ト云ヒ又雁瘡ト云毎年八九月ヨ
リ發リテ二三月ニ愈ルヲ以テ雁ノ飯^{ハシ}來ニ因テ名付ル也愈カ
スル者也此瘡ヲ治セント思ハバ三年ホドヤレバ根ヲ切ル者ナリ
次第ハ瘡発スルト甚ニ荆防敗毒散ヲ四五十貼用テ後白芷
升麻湯ニ雁來紅^{ガラク}ヲ加テ用テヨシ其辨方考ノ白芷升麻湯ノ条
下ニ有リ可考是^シスハ來感ハ前歳ノ半分ホド發スル也又次
ノ年モ如是スレバ又其次歲三分ノ一二ナル也三年ホド療治スレ
バ根ヲ切ル也初年ハイワモヨリワヨク發スル者也^{ハシ}又三年モ治人

ハ病根ヲ断ト云ヘラ病入ニモトクト云聞セテ後可治ト也外
治ハ少シ瘡ノカワキメニナリタルすニ平胃散ノ粉藥ニ葛根輕粉
三分一ヲ加テ上ヨリ毎度スリヌルベレ總テ汁ノ多ク出ル瘡ハ濕
瘡チハ平胃散ノ粉ヲ用ハシ是予か家ノ秘事也可_レ秘

○瞼瘡四五月ノ比愈テ後足ノ三陰交ニ灸ミベレ奇ニ妙シ

疥瘡癬瘡

○疥瘡ハ分テ云ハ疥ハ皮膚ニアリテ浮淺ナリ多ハ熱ニ属ス
癖ハ深沉ニテ多ハ濕ニ属ス故ニ痒クメ濕ナク班赤点ヲ生スル
也癖ハ痒メ血膜アリ共ニ血熱ノ症也血分熱燥ノ風毒ヲ挾
ム也和俗ノ云フ肥癖瘡也初癥ニハ荆防敗毒散ヲ用テ發散スヘ
シ久キスハ荆防敗毒散ニ四物湯ヲ合シ酒芩酒連ヲ加テ用ヘシ

年久キニハ防風通聖散ニ宜シ

○風疥癬ニハ去勢搜風湯本条ヲ用ヘレ

○皮膚鱗ヒヅルノ如ク立タチテ痒キ者ニ浮萍散本条ヲ用ヨ

○齋掌風癬トテ手ノ内側ク成テ齋ノ掌ノ如ク成ハ症アリ

多ハ虫ニ生スル者ナリ和俗ハサクロト云諸ノ方書ニ洗藥ヲ出ス考合テ用ベシ内藥ハ防風通聖散或ハ荆防敗毒散ニ宜シ病人

虛弱ナラバ白芷升麻湯ニ宜シ

○鴛掌風ニ朝腦樟腦枯礬明礬各等分石灰半分酢ニテ

トキ貼テ宜シ又川芎カヨウヲ香ノ如ク焼テ毎日三度掌ヲ烘ルヘ川

芎カヨウ燒トキ煙ヲ鼻ニ入ラスマウニスヘシ鼻ノ紙ニテ塞クベシ

癰瘍

○癰瘍ハ和俗レラクモト云フ小兒ニ多年症也陰古又ヲ知レハ多クハ不治メ愈ル也純陽ノ斂毒也荆防敗毒散又ハ防風通聖散ニ加減メ用ヨ多ハ内藥ナレニ貼藥ニテ愈ル也回春ノ掃雪膏本ヲ貼テ其効如神又一ノ奇方アリ松ノ青キ松籜シロザサノ黒燒コロヤハ馬マ鹿木ツバキ乾テ各等分細末メ雄黃大黃半分ヲ加テ麻油ニテ解テ瘡ヲ刺刀ニテコブケテ其上ニ貼ル奇妙

○癰瘍アル小兒ニ足ノ廻カクノ折目ノ横々ノ内廉ニ灸スルト各十五壯或ハ十五壯スレ其効如神黑陽ノ野人ノ傳セ

癰風

○癰風ハ和俗ナニツト云白癰風ハ治レ難シ和俗ハ白癰ト云テ天刑病ノ中ニスル也汗班ヒンバンハ治レマスキ也多ハ夏ノニ生スル也蜜陀ミツダ

僧ヲ醉ニテ解貼テ宜レ又一奇方爐灰硫黃雄黃樟腦各少分
酔ニテキ貼ヘレ其効如神

癪風

○癪風一名癩風又名大風和俗カツタイト云此病人間ノ中天道ニモ放タレタル病ニメ佛氏所謂過去ノ因果ノ惡キ故ニ今病ヲ生スト云フ孫真人曰癩風ハ天刑ノ病ニテ治方ナレトシハ其根ヲ切リ難キ病也其人色慾ヲ断チ臭肉塩味ヲ断テ保娘スヨハ生涯見惡ニ不至顔赤ワキ少レイナ者ト人ノ云ホドニテキルノ者也三黃湯トテ黃芩黃連黃柏ノ煎湯ニテ雷丸苦辛ヲ粉テ右ノ飲汁ニテ用ル者アリ其効如神

○癪風ノ藥多ハ奇怪ナル藥物ニテ治スル者多レ此一筋ノ療治ヲヨク覺ヘタル者アリ或ハ下レテ虫ヲ取り或ハ手足面部ニ針ヲ立テ血ヲ出シ或ハ灸治ヲ用トシテ治スルトダシ多ハ中古南蠻人渡海ノ時習傳ヘタル家傳久多レ妙方アル者也諸ノ医書ニモ藥方ヲノス考合ヘシ大抵ハ防風通聖散ニテ爵金大黃苦辛皂角子連翹雷丸各等分ニテ粉藥ナレテ一度ニ二爻宛用テ治ス其効如神

折傷

○折傷ハ身ノ類多レ皆瘀血凝滯スル也打身重キ時ハ大小便不通心腹ヲ攻テ次ニ至シトス先ワ通導散即春ヨ用テ大小使ヲ利スルヲ以テ度トスベシ又一奇方芎藭湯ニ蓀木紅花ヲ加テ用ベレ又一奇方當歸ニ久大黃一枚水煎服ス何モ右ノ方

孕婦小兒虛人ニハ勿用

○打撲打傷ニハ先ツ菴菜湯方考龍王湯同ヲ振出メ用ユ
又青葙子陰于シテ花共ニ及人參二分ヲ加テ振出シ用ヨ其効

如神

○諸ノ方書ニ接骨ノ治方多レ考合テ用ヘレ外ヨリハ楊梅皮
木瓜各等分粉ニメ紺屋糊ニテ推^レセ痛處ニ貼スベシ其効如神
又奇方鯉臭ラスリ碎^レテ貼モヨレ何モ上ニ枚原紙ヲ引サキテ
覆フベシ

○打身ノ砂藥ニ石見川ト云フ方アリ川骨菴菜赤小豆半生
各二兩石見川ノハ神トム神也小石アリ川ニ人参一兩白芍藥蒲黃石
菖蒲百草川芎五味子各一兩右細末メ一度ニ二分ツ酒

ニテ用ユ之ヲ打身ノアイスト和俗ニ云也產後ノ血暈金瘡ニ
モ用ルナリ香月共部少輔經考ノ家方ナリ予カ家ニ傳來スル
ナリ

○高ヨリ墜下メ打撲甚ク瘀血流胸下疼痛不可忍ニ復元
活血湯ヲ用ユ酒大黃芷胡當白各一枚桃仁紅花各三分天粉
穿山甲各七甘艸三分水煎シテ服ス其効如神此方古今医
統ニ出タリ啓益常ニ用ヒ取驗多シ可祕

金瘡

○金瘡ハ先菴菜湯龍王湯石見川芎飯湯ノ間ヲ見合テ疵
ノ多少病人勇怯ヲハカツテ治スヘシ血脫ル多キ時ハ先ツ大料ノ
獨參湯ニシヨリヲ用ヘシ陽長ズレハ陰長ズルノ義ナハ先元氣

ヲ無何有ノ卿ニ引返スヘシ隨分手早ク取廻スヘシ渴スル共飲水ヲタフ勿レ外治ノ医手負ナント切見骨丸者ナラテハ治スルアタワズ之ニ因テ外科ノ医ハ氣勇剛ノ者ニ宣レ

○金瘡ハ先ツ燒酒或ハ温酒ヲ以テ洗フヘシ其後鷄子清ヲスリテ縫合スヘシ馬ノ膏ヲスリタルガヨレ血不止ハ酒ニテヒタト洗フヘレ小疵ハ血留ニテ止ヘレ大ナル手負ハ血留ニテハ血止ル者ニテハニ能ニ可心得也

○血留ノ方土用ノ中ノハシアト鳥四季共ニヨレ取テ首羽毛足ヲ去テ腸ヲ出レ其中ニ當飯川芎蒲黃各一兩人参ニ多紅花一錢入テ糸ヲ以スイ合セテ黒燒ニメ一度三日服スレハ血止ハ也

○四春ノ止痛生肌散本条モ妙ナリ

○少キ切疵ノ血留ニハ鉄蕉木ノ錦ニ蒲黃ヲモミ入テ疵口ニ貼テヨレ革屋ノ革ノカニナクズニ蒲黃ヲモミ入テモヨレ石腸イシワラトム者モヨレ海螺ノ鱗モヨレ刻畑カクバンツツノ貼モヨレ何レモ常ニアル者ニメ急ニ備ヘ易シ重宝ナルヘ毛也何モ可祕

破傷風

○破傷風トハ金瘡ノ口ニ膏藥ヲ不貼其瘡口ヨリ風邪入テ經脉ニ中リ善チ行テ數々變スルニ因テ及張瘻癰ノ狀症病ノ如ク其死生在項刺急ニ治スヘレ先ツ巻活防風湯四季本条ニ加減メ可用又ハ苦菜湯龍王湯ノ類ヲ可用

○破傷風裏ニ邪氣入寸ハ疎導ノ剤フ用ヨ大芎黃湯四季本条ニ加減ノ用ヨ

湯火傷

○湯火傷ニハ蛤蠣壳ヲ灸リ焦レ黄色ニメ細末メ麻油ニテ貼ヘレ其効如神

○湯火ニテ燒タルニハ蜜水ヲスレバ痛立處ニ止也

○湯火傷共ニ石羔黃丹黃柏榆白皮桐木ノ甘皮各等分末メ麻油ニテ貼ヨ其効如神

○湯火傷共ニ痛甚ク大小便不通者火毒下焦ニ傳フ四物湯ニ黃連木通山梔子赤茯苓連翹ヲ加テ用ヨ其効如神

○湯火傷共ニ肉壞テ痛甚キ者ニハ四物湯ニ入參黃芩白芷連翹甘艸ヲ加テ用ヨ敷剤ニメ新肉生ス

蟲獸傷

○狗ノ咬傷ニハ杏仁甘艸ヲロニテ咬碎テ痛處ニ貼ヨ又一方銀杏ヲ研碎テ貼ヨ又一方草麻子ヲ新汲水ニシリテ貼ヨ甚有効又一方蒼耳葉ヲ煎ノ洗ヒ甘艸ノ細末ヲ貼ヨ

○狗咬タルニ倉卒ニ無藥すハ小便ヲ以洗ヒ百草霜ヲ麻油ニテトキ貼ヨ或ハ牛糞ヲ以貼之

○馬ニ咬レタルニハ寒水石雄黃ヲ細末メ之ヲ貼ヨ其効如神又一方馬齒莧ヲ杵キ爛レ煎服ス外ニ益母草ヲ杵テ貼ヨ

○猫ノ咬タルニハ薄苛ノ前火湯ニテ洗ヒ紫金錠万金丹土樞丹ノ類ヲ用ヨ

○鼠ノ咬タルニハ猫ノ毛ヲ燒テ貼ヨ麝香少許加テ妙也又一方茄葉ヲ煎メ洗テ妙也又一方紫蘇ノ煎湯ニテ洗テ妙ナリ

○蛇ノ咬タルニハ雄黃、五靈脂等分細末ノ貼ヨ又一方貝、母ヲ好酒ニテ服シタル佳去心細末メ用也又一方白芷ノ細末ヲ麥門冬、湯ニテ服スベレ

○蛇ノ咬タルニ日本ニ云所ノ椿ノ葉燒テ灰汁ヲタレテ其汁ヲモツテ洗フヘシ腫漸レリニ引ナリ极蛇ノ咬タル所ニ蠅ヲ殺レ五ワ頭糊ニラレセテ貼レハ咬タル口目ヨリ汁出テ痛止腫消スル

ナリ奇々妙々

○蛇ノ咬タルニ藥無キ所ニテハ蒜スルメノ實ニテモ又ハ葉ニラモ又白芷ニテモ杵爛レ咬口ニ貼テ錠子ノ如クニメ其上ニ艾灸スジシ下ニ火氣通スルホドスベキ也

○蜘蛛サザエノ咬タルニハ雄黃、細末メ麝香ヲ加テ貼テ宜レ

○蜈蚣ムカシバチノ咬タルニハ雄黃、南星半夏ヲ細末メ貼テ宜レ又一方五倍子阿仙藥細末メ津液ヲ以テ潤メ貼ヨ其効如神又一方ニ先づ塩湯ニテ痛處ヲ洗ヒ吳茱萸嚼爛メ貼之或ハ井底ノ泥ヲ貼モ宜レ

○蜂ノサレタルニハ小便ヲ以テ洗ヒ拭ヒ乾メ香油ヲ塗テ宜レ又一方雄黃末ヲ貼テ吉レ又蜂房ノ末ヲ搽テ其効如神

○蜥蜴壁虎ノ咬タルニハ大黃雄黃ノ細末ヲ醋ニ磨ノ貼ヨ又白礬ヲスリタルモヨシ

○蚯蚓ムカシバチノ毒ニ中リ或ハ此物ニ小便ヲ仕カクレハ陰莖腫痛レ或ハ大風ノ狀如ク眉落ルニ至ル也石灰ヲ熱湯ニ炮レテ冷メ患ル所ヲ洗ハ治ス浸之久クメ佳也小兒多ク此毒ニ中リテ陰莖隣囊

共ニ腫テ水炮ノ如クニナル者アリ鴨ノ血ヲ塗レハ立ナ処ニ消ス一方ニ

塩湯ニテ洗テ其効如神

○蚕ノ咬タルニハ苧葉ヲ搗テ貼之奇ニ妙
○惣ニ虫獸ノ咬タルニハ雄黃ヲ貼タルカヨシ或ハ紫金錠玉樞丹
万金丹錦袋子ノ類ヲ貼ベシ山家又ハ野陳ノ時ハ雄黃麝香ヲ
蓄テ身ニ帶ベシ邪惡ノ虫獸ノ毒ヲ避ルト奇ニ妙ニ可秘

中毒廿八項骨體

- 毒ヲ解スルノ藥也
- 砒石ノ毒ニ中リタルハ黃丹、水銀青黛菉豆一名胡麻焰硝各等分細末メ調下ス
- 誤テ針ヲ呑ム者ニハ蚕豆一名胡麻ヲ煮熟レ韭菜ト同ク叱下セハ針菜ト同ク大便ヨリ出ル也
- 誤テ金銀銅鉄ノ物ヲ呑テ不能化者ニハ砂仁濃煎湯ヲ服スヘシ其物自ラ下ル
- 誤テ水蛭ヲ呑者ニハ蜜ヲ食フベシ即化ノ水トナル也又濃茶ヲ多服スレハ又効アリ
- 誤テ木屑ヲ呑三咽ニアツテ不下ハ歟有須臾鉄斧ヲ用テ磨水灌キ下セバ立処ニ効アリ

- 誤テ麥稻ノ芒針刺木屑金銀銅鉄ノ類或ハ鷦鷯ヲ食テ
骨咽喉ニ體スハ腫痛シテ久在須臾四春中毒門ノ白衣
丸ヲ用ヨ其妙如神
- 如神
- 茸毒ニハ黒豆汁ヲ用テ奇也紫金万金玉樞丹尤有効
○諸臭ノ骨體ニハ神仙釣骨丹因春本条ヲ用ヘシ効ヲ取ルト多シ
○骨體ニハ砂仁甘艸ヲ絹ニ包ミテ含ミタルガヨシ
○骨體ニハ胄鳥カブトドリト云フ鳥深山ノ川ニ有鳥也頭ノ毛ワカレテ
胄ノ如レ羽毛ハ山鳥ノ如レ山家ノ獵士ハヨク知也鉄鎗ニテ殺
- ス也此鳥ヲ腸ヲ出シ羽毛共ニ黒焼ニメ咽ニ吹入ル竹ノ管ヲ用
ナリ服メモ佳也奇妙ノ物也啓益初メ 中津候小笠原君ニ
仕ヘテ豊前ニ住セシ時此鳥ヲ取ルニ假君命カタマリノミコト山川ノ獵士ニ命メ取
畜ヘタルガ寶永戊子ノ京師ノ火災ニ焼失ス惜ムベシ
- 救急
- 暴死卒死五絶ノ類ニハ半夏ノ末黃豆大許鼻中ニ吹入ハ
即蘇生スル也
- 自ラ縊テ死スル者ハ俄ニ繩ヲ断ルカラス衣物ニテ頑ト谷道
トヲキビシク厚クツミ抱ヘ起テ後繩ヲ解ヘシ扱其項痕ヲ探
和ケ鼻ヲ子リ其両耳ヲ吹テ氣微ク四えチカラ冠ノ血ヲ刺テ口
中ニ滴ハ即蘇生スル也

○水ニ溺ル者ハ竈中ノ灰ヲ取り而垣ニ埋之從頭足ニ至ル如是

○レバ水七竈ヨリ出ル也又皂角ノ末ヲ搗テ下部ニ入レバ須臾ニメスレバ水甦生スルナリ又急ニ溺シノ衣帶ヲトキ腑中ニ灸スルモ又水出テ甦生スルナリ

即術ナリ

○冬月凍死ノ者又ハ水ニ墮テ凍死スル者ハ先づ火ヲ用テ炙ベシ或ハ布袋ニ勢灰ヲ盛リ心頭ニ放ラキ冷バ即勢スルニ換テ

眼ヲ開テ待テ温酒姜湯ヲ用ヘレ

○夏月暑ヲ挾テ死スル者ニハ冷水ヲ以テ冷サレムルヲ古レ熱湯ヲ以テ其心暖ラ摩リ洗ヘシ即甦生スル也或ハ旅途ノ中ニテ急切ノイアス路上ノ勢土ヲ取テ腹臍ノ間ニ置テ其中ニ穴ヲナレテ人ヲメ更ニ其脇中ニ小便セレムヘレ忽甦生スル也

○鬼ニ魘ヒテ死スル者ハ皂角ノ末大豆許鼻中ニ吹入レバ即蘇生スル也

日書軒同某所モ白神大人白人
修教會古漢上書

牛山先生活套後叙



夫醫之為道也大而其書亦博矣
香月先生尤為醫林瓊枝也嘗著
數篇書其叢益於世術亦神焉茲
有活套方考二書繕寫而未聚一
日書肆何某過予曰膾炙人口久
矣不若與衆嗜之乎請校正而以

公之予愧短才以固辭之強猶不
許夫以如庸醫不能衷論文意則
不知奏其功也值片言隻字而難
曉則失其病可赦也繇此加國字
以使易解而便于昧者也若博覽
士覽之而有僉曾之差則非先生
罪予肉袒以謝焉豈安永成冬

泉州後學木村桂菴書於平安第

五街之家塾



平安 南窗 武吉幹書



牛山方考

安永八巳亥年仲冬士旦

高麗攜一丁目

浪速

淺野弥兵衛

佛光寺寺町西今

山田三良兵衛

寺町五條上町

葛西市良兵衛

堀川佛光寺下丁

河南四良右衛門

五條橋通高倉東今

北村四良兵衛

寺町通靖茶師下丁

山本平左衛門