

辨證配劑醫燈卷之一目錄

中風

傷寒

中溫

大熱

鬱

欬嗽

瘧

嘔吐嘔 附惡心

飢逆

痞滿

泄瀉

水腫

痛風

中暑

燥

內傷

痰飲

哮喘

霍亂

噎膈

吞酸

痢

脹

結

頭痛
腰痛
腹痛

心氣
脚氣

辨證配劑醫燈卷之一

一 中風

日東雖知苦齋道三校錄

肥盛者間而有形盛氣衰如此耳

丹溪曰有

氣虛 參 芪 木 苓 甘
血虛 芥 芍 地 芍 桂 姜 汁
痰盛 陳 半 而 生 姜

百病皆因本

緩急則治其本

病退神後當改用丹溪之法

之劑養之

右 左 脉不足 右 左 身不遂主

痰盛三陳導痰

氣血兩虛扶痰八物加南半姜汁枳實升瀝

真元後痰清風邪未退順風湯通聖散之類加

減而用

多 注則更漸

外 無 六經之祇證

內 便溺阻滯 四肢不遂言法邪中經又後

中治不可以標本論宜養血通氣秦尤湯愈

風湯治

不知人傷者身冷為入藏死

身溫和汗自出為入府自愈

遺尿氣虛用參芪

動止筋痛是無血滋筋自筋枯不治

血弱不養筋故不能運動古強不勝言宜養血

而筋自榮桂地并紅

大秦尤湯後 天張加生薑

在 表則辛以散之 藥陳芸桂生薑

肥 衰則苦以泄之 藥知

瘦 人中風 不分左右皆屬痰 半市陳朴

有 陰虛火熱 四物 生薑

類似者

不可藥治誤人非淺

傷熱極卒暴僵仆類中風
夏月卒倒內外大冷炎燔類中風

氣激痰喘心竅宜吐後調理
皆類風狀

尸厥痰厥氣厥血厥酒厥似中風
酒溫之病口喎舌強半身不遂渾似中風溫

毒麻桃苓不可風治

氣中涎塞亦緊似風
但中風脈浮身溫多痰涎

真風中脈中筋中府之說
面加青有刺違脈者急拘急不仁中府也多着四肢
續命散表調以通里辛涼之劑
刺許其麻痺
辛涼

唇緩失音鼻塞眼瞤耳聾便秘中截也多滯九
竅三化通其津
調以十全四物之劑

外無六經之證內無便溺之阻肢不舉口無言中經
也大秦凡補血
如藏府兩中藥必兼用
先表後通之
以養筋

大率主血虛有痰或扶火與溫
治法以痰為先
養次之
滋潤榮血

治風之法
初得之即當順氣
及日久即當活血
醒後小便少不可利汗液外亡
以刺失

先後之戒
熱汗止小便自行
以刺失

不化痰涎氣逆為烏附不化痰涎氣逆為烏附

風

不化血後用防風天麻羌活不化血後用防風天麻羌活

風中膏膠轉用腦麝引風入髓風中膏膠轉用腦麝引風入髓

肥人中者以其氣盛於外而斂於內也為氣出入肥人中者以其氣盛於外而斂於內也為氣出入

通肥者氣必急痰涎雍澁所以急也必先理通肥者氣必急痰涎雍澁所以急也必先理

作不遂

若人自甦能言飲食惟身體不遂急則擊跌緩則若人自甦能言飲食惟身體不遂急則擊跌緩則

軀變經年不愈加減地仙丹常服軀變經年不愈加減地仙丹常服

若飲食坐臥如常但失音小續去附加芎若飲食坐臥如常但失音小續去附加芎

肥人多溫步加烏附行經肥人多溫步加烏附行經

麻痺煩疼眩暈難療脚氣緩弱久病風人遇天色麻痺煩疼眩暈難療脚氣緩弱久病風人遇天色

陰驢即頭小續命加減陰驢即頭小續命加減

經痛

一痛風一痛風

大率因血虛受熱大率因血虛受熱

夜則痛行於陰也地牡膝夜則痛行於陰也地牡膝

治以辛溫治以辛溫

流散寒濕流散寒濕

脉沉而弦脉沉而弦

丹溪云因溫痰濁血流注為病丹溪云因溫痰濁血流注為病

在下焦路遠非烏附不能行改為引經在下焦路遠非烏附不能行改為引經

主治非益益而親主治非益益而親

必行氣必行氣

舒風舒風

外障^上導滯血^{紅散}補新血^{紅散}
有先後須分腫^下不腫^上有^下有^上魚鱗

不可食肉若食肉

大法主南水正苦飯酒苓^{陸荷}

在下^上無桂^下通^上乳^下

氣^下虛^上桂^下桂^上

血^下虛^上桂^下桂^上

有^下疾^上南半^下陸苓^上

肥

肥人^下濕^上注^下經^上脉^下必^上滑^下木^上南^下滑^上苓^下已^上无^下

瘦人^下血^上虛^下与^上熱^下脉^上必^下滑^上赤^下芥^上腦^下核^上壯^下鞭^上

下部^下腫^上痛^下已^上和^下微^上捷^下某^上通^下民^上車^下瞿^上

薄桂^下能^上核^下行^上手^下臂^上額^下南^上木^下至^上痛^下處^上

藏^下治^上上^下風^上虛^下人^上也^下用^上

久^下痢^上後^下脚^上軟^下疼^上或^下腫^上土^下限^上也^下

不可^下死^上作^下風^上及^下燥^上其^下血^上終^下不^上愈^下

涉^下冷^上多^下濕^上取^下風^上虛^下骨^上節^下与^上血^下氣^上交^下搏^上故^下疼^上血^下氣^上虛^下

則^下汗^上

傷^下寒^上

即^下病^上

多^下為^上專^下經^上

傳^下經^上

不當汗而汗者為亡陽為蓄血

為下厥上竭為咽氣為小便因

不當下面下者為結腎為痞

為失血為後熱

太陽者府也自背愈而入人所共知

小低者藏也自息而入人所不知

汗急緩

羌活湯後云名

急汗熱服以養弱投

傷寒下後自汗更熱不已白虎加參水一服如

神汗止身涼

婦人證後皆然惟孕婦三四月及七八月忌硝黃

小兒咸剝服

△惠云世漢曰有外感而無內傷者用仲景法挾

內傷者十居八九

東垣謂內傷者極多

悉指為外傷大誤

有感冒輕病不可便認為傷寒

西北三方

△三陽三陰之證脈

足太陽一二日發熱惡寒頭痛腰脊強

足少陽三四日身熱目疼鼻衄不得臥

足太陰四五日胸脹痛耳聾或手足自溫

足少陰五六日口燥舌乾而惡寒

足厥陰 六七日煩滿囊縮尺寸俱

表裏歌

發熱惡寒身疼痛

脈厚屬表裏君勿

若不惡寒反惡熱

汗多屬裏定無誤

仲景曰

日數多者有表證脈浮尤宜汗

不可執定日數

汗下此之證

尺

脈弱而身大者忌

汗下

俱宜

柴苓參桂
半甘生薑

審察之次序

先者兩目次唇口舌後以手按其心胸至小腹
有無痛滿

開

如目

開欲見

陽

目睛黃愈也

睛不明神水已竭難治。胞陷直視必死。舌上

白胎為熱黃熱甚黑及生芒刺死。凡見厥冷

下利識語者不治

腹痛甚飲涼水一盞熱痛宜清之遠勝硬痛大便寒

煩渴此燥屎痛下食積痛同治

飲水亦痛屬寒過寒和

傷寒衄流不止炒黑梔末吹入鼻中

傷寒發黃用姜枳圓身擇退

惡寒表裏

頭痛身熱惡寒名表惡寒辛甘散之

頭不痛身不熱而惡寒名陰陰臥不

戰慄名裏惡寒辛熱溫

小水不利大便實小脈滿發渴發熱怕熱身目黃溫熱發黃也與血黃不同輕則疎利重則大下天氣太冷人多知避天時溫煖人就疎略或於風涼處輕衣久於坐矣不覺感邪

一中暑

惠云靜

而得為中

暑限證

避暑於深堂大屋得中中暑其病頭痛惡寒身急肢疼煩心狀熱無汗為堂室張寒所逼周

身陽氣不得神數大煩主為未濕湯灸服

行人農夫日中勞役得中中暑其病頭痛發躁

熱惡熱刺之肌膚大熱湯洗汗出泄氣以動乃為未

熱傷肺氣白虎主在判入粳米一撮煮服

辨治

內外俱熱口燥煩躁肢冷不痛白虎

痰逆惡寒橋皮易脫主加升茄不惡寒升桑

石膏湯頭疼煩躁惡心不下不狀五苓

霍亂吐瀉腹痛香薷飲藿香白芷

傳曰夏月生脈散加芒甘令氣力涌出

張真人曰夏月必服玄及以補五藏

張真人曰夏月必服玄及以補五藏

張真人曰夏月必服玄及以補五藏

中溫

或熱則百物溫
或涼則百物寒

宜汗散

或

有濕在肌
有汗在肌

為內傷濕

跡通溪世

或

多食果蔬
多飲漿醪

為內傷濕

跡通溪世

或

濁氣薰蒸
清道不通

故首重以有物蒙之失而不留濕

為熱

熱傷血之虛寒故拘事
溫傷筋不能束骨故痿弱

今人見膝間關節腫物痛為風濕治矣

表表

浮而緩表溫
沉而緩裏溫

下上

溫有上宜微汗
汗多故不用麻黃

溫在中下宜利小便淡後治溫

二陳陳甘酒茶蒼水通光散凡行溫最妙

風寒能勝溫上溫羌活桂枝生薑水

治溫利小便為上策下溫以苓滑利熱藥水

林曰溫熱多以脈證明

脈滑數小便赤澀引飲溫熱已後綿葛腸通水

脈沉緩小便清利大便厚身疼自汗為寒溫桂枝湯

一燥

林曰諸陰枯涸氣動燥屬於燥

大便閉結或消渴之類為表燥

皮膚燥渴乾赤爪枯之類為表燥

於陽結陰結氣血少痰喘風熱可得而審

傳曰諸陰病瘵皆屬肺金燥之化也

是以得血脈者瘵者血裏不能養百骸

皮膚皴揭折裂血出大痛或肌膚燥痒皆火燥肺金

燥之甚也而物去實地加門參玄栢天花

林曰熟地生地白芍黃芩芷羌芩厚骨甘治血

弱陰虛而燥肢不動爪乾

麻仁薤仁杏仁煨尾羌活秦艽大黃芍朴實治脾

胃伏火大便燥全不思食風秘血秘以疎凡固

御

燥和血自然潤通矣

前地紅花為血秘

下焦燥熱小便澀而數

為吉應仁應朴安風秘

熟地牡蠣山茱萸

一大熱

火起於妄變化急則

脈促而洪數重火

陰虛則病

陰虛則死

火可

浮黃連解毒

實者非氣之實也

虛者正氣之虛也

補陰火自降

地栢

氣後左邊散肝水 地相龍

降瀉邪火之劑

木通下行瀉小腸火

人中白瀉肝火又瀉三焦火膀胱火

小便降火極速

梔子散從小便降火上中下焦連瀉

限處發熱四物若地加炒酒知降火補陰之妙劑

手心熱屬脾腎

四物加百馬駐胃降陰火代苓連用

千金麥門冬湯後曰病後肺火虛寒不宜

三黃丸後

連瀉中焦火宜中寒

林曰連瀉心火苓瀉肺火為瀉脾火禁瀉肝火

知瀉腎火此皆苦寒之劑能瀉有餘之火耳

若飲食勞倦內傷元氣火不兩立為陽虛

病以甘溫陰參芪甘屬

若陰微陽強相火盛求陰位日漸甚為血虛

病以甘寒降降地屬

若心火元極降熱內實為陽強之病以鹹冷折之

若腎水受陽其陰失守守根之火為陰虛之病以

壯水劑之生地玄參屬

若右腎命門火衰為陽脫病以溫熱濟屬

以升發發升葛屬

若胃虛胃冷物抑遏陽氣於脾胃為大瀉之病

一内傷

惠曰内傷諸書以飲食或虛損為内傷
東垣以消倦與飲食之病為内傷

內外升舉

傷

外傷人迎脈大氣口證頭在鼻故鼻氣不利故言
壯房寒熱有作而無間惡寒逆烈火不降手背
熱而手心不熱

内傷氣口脈大於人迎頭證在口故口不知味腹中不
知出言懶情惡寒就暖即解手心熱而手背不熱

補養為先

外 兼病脈證必並見

內 證多則以

治法為急

内傷者多有痰痰有挾外邪有熱鬱於内而發者

皆以補元氣為主者証挾而發用藥

禁

傷曰内傷挾痰與食傷氣塞于胃之候驟以補
中益氣等藥一發則氣滿痞塞遂起補藥不宜
於此證改用汗下而死

調中益氣湯後曰宜心溫脈寧心絕思藥必神
効誠補虛之準繩

大便

飲食勞倦而不得腹中逼迫血虛血淡用歸
參或黃芪或地黃或大棗病當用濕手甘多之藥治之

便

升陽補氣湯後曰腹中及窄挾如升
施治方喜食一二日不可飽食

用

用藥之頃飲食行動規矩
須服味甘食或養食助其藥力益升陽之氣滋

其胃氣滿其胃氣慎不可淡食以損其氣力而

助邪氣降沉

可少復體使胃與氣得轉運升發慎毋大節

後使氣後傷

林曰升陽益胃湯後胃氣稍強少食菓以助穀氣

之力星曰五星為星者如之

林云忽得準知治重脈兼按味

一鬱

七情之過

寒熱之侵

酒漿之積

雨濕之侵

熱鬱而或痰服者尿赤脈沉數

痰鬱而或癰動則喘寸脈沉滑

血鬱而或癰四肢無力飲食便紅脈沉

食鬱而或癰腸鳴酸不食脈飽

查神馳針砂暗砂

此六者相因為病也

手足心熱痛大鬱

此六者相因為病也

諸前

春加苦參 柳解前木芍

香附能橫行胸膈間必用童便浸焙否則燥
凡此病又當詢患者因何變而致則當因其變
而解方進藥治

一痰飲

惠曰痰之為病集於脾胃則條然仆地此痰厥也

升於肺則喘急咳嗽 苓陳目姜

迷於心則怔忡恍惚 苓陳甘

走肝則脈助脹滿 青奴莎白芥

聞腎則不哈而多痰唾 冬白半本生薑

由胃脫則嘔瀉而作 陳本生薑

咽膈不利肩肢骨痛 半陳莎

入謁則澀有聲 半本冬

散背則一點痛或冷或麻為半桂為先分導法生薑

辨治

痰曰大盛遊上治天為先冬膏水梔

濕痰多軟如身倦之類 三本无

風痰南星白附 陳半

老痰海石半夏沙五倍 蛤粉

食積痰神麴麥芽山查或化痰丸而半禁辰

酒痰焦姜蜜丸噙化 縮梗易

凡病陰火上升津液生痰不生血宜補血劑

補血劑

虛人中焦有痰胃氣亦賴所養不可便攻其
愈患

藥水不陳

治痰用利藥過多致脾氣下虛痰反易生而多

痰在脾胃可下冬自撰

痰在經絡中宜吐中就有益散之散如芸梔梔

生薑芽茶之類升提其氣便吐也

痰在腋下非白芥子不能達

痰在皮膚膜外非薑汁芥應不除

痰核在咽喉中燥不能出入化痰藥加鹹能軟堅

味薑杏結梨梅名他以朴硝以薑汁蜜丸吞之

蛤粉熱痰能降溫痰能燥結痰能軟頑痰能消未

可入

枳殼溫痰衝牆倒壁

涌

藥

吐

痰證得滿脈此痰腰回脈道阻滯也平難開難治

傳曰兩手關前脈浮弦大而實胸上稠痰宜吐

病人百不効開脈伏而大者痰也

眼胞眼下如烟重黑者痰也

吐法宜先升提其氣先以布勒腰腹於立風處行

之芸梔梔芽茶生薑以探吐

油炒半夏治溫痰喘心痛齋丸姜湯下

芩治痰假其下火梔

天花粉能降胸上熱痰

竹瀝治熱痰能養血清熱有痰痰不消人交元死

者灌升推逆起死回生也

二陳一身之痰都治引上榮風升

引下和通乙

俗

右偏頭痛三陳如芎芷芩羌菊升
左偏頭痛三陳合四物加芩薤芎細紫苓蔓

頭痛三陳如芎芷芩升紫蔓細芎

目間胸膈大痛如刀錐

至脫胸膈痛止而勝胸大痛

山居四要云腹脹服痰茶則痰去

升菴云此者脾胃之津液結為痰者病名也

人皆有之貴乎項行則无倒上之理過思傷食

溫目氣化痰多痰

聚則不利 皆痰可致也 陳種生薑桂
散則有色 苓目根灰

治法 痰為先氣物則津液流通 陳苓苓目

參解為未解實則收約痰飲 本病為參

一欬嗽傳

肺

欬嗽 肺氣傷而不清 杏升云杏枯甘生姜

欬嗽 脾濕動而為痰 半本云云

欬嗽 胃氣動而為痰 目本云云

久不愈加起膠以鵬合桂欬為乾合

脈升

浮脈虛寒欬數實熱陰陽多痰皆屬外感宜

祛邪降火不可補

弦滿少血肺氣散而不收宜斂肺

辨治 膠梅

麻舌 枯生等

風寒（無寒者）主發散行痰（陳述）風入肺久嗽雄雞為末和艾取烟入喉

火爵有急痰少面赤主降火清金化痰（門蘇為）麥蘗蜜結半青海石之類

乳欬火爵之甚（進）治火邪在肺用補陰降火（地生等）不己則成勞（勞）傷風失散痰

痰嗽有痰火熱急（痰）痰咳主豁痰（勞）勞嗽盜汗重痰作寒熱主補陰清金四物加升

陰虛大動而嗽四物加二陳加（尤好）陰虛喘嗽或吐紅四物加（紅）參桑門玄歸

聲嘶血虛受熱蜜蛤粉（紅）上妙令蜜調服

肺脹動則喘滿氣急息重是也主收飲也主朝子（阮）海粉（薄）蜜杏服而爵過不得服治

嗽而服痛者皮疎肝氣後二陳加（薄）蜜姜汁五更嗽胃有食積此時火氣流於肺知歸降肺

火以膏降胃火

上半日嗽多者胃中有火膏升葛午後嗽陰虛四物加知柏（炒）降火（梔）梔

治嗽某切

玄及酸苦有收飲降火之功（嗽）用則因其

杏散肺氣風熱因於寒者為宜（馬兜）去肺熱補肺

功具制某

晚午早

生薑辛，發散去濕，痰止嘔。

姜甘，補肺，因肺降氣。

傳曰：治咳嗽，治痰為先，治痰煩氣為先。

咳而無痰，以辛甘潤其肺。

吸茉莉入喉，姜湯送下。

過冬則發喘，北寒包煎，解表散自降。

九嗽

春里春升，氣舒，舒肝，舒肺，舒脾，舒胃，舒心，舒腎，舒膽，舒大腸，舒小腸，舒膀胱，舒三焦，舒百脈。

肺

肺有火邪，苦辛去之。

治嗽必用玄及然，有外邪者，驟用之，恐閉住。

邪氣先發散，而後用。

二陳治嗽去痰，伐病根之藥也。張虛血虛火盛。

乾咳，勿用。

新

新嗽，按虛用參，風寒邪盛，不用參。

久嗽，將熱切忌寒，久嗽肺虛加乾玄，數腦數。

林曰：自損吐血嗽，後萊藕節。

哮喘

喘促而喉中如米，鎗者，神氣喘。

喘咳

喘而咳，治法天潤之，隔者也。

喘脈

脈數有熱，喘咳吐血，氣不得臥者，死。

喘虛

喘而虛，加橘甘，降氣補陰。

凡喘未發時扶正氣為主。急喘已發時邪氣為主。用蘇門冬栝下。

火證急喘不用苦寒。椒目細末姜湯調下。

患

肺虛喘腰疼。

患喘者肺以清陽上升之氣為六淫七情所傷。

日

患喘者肺以清陽上升之氣為六淫七情所傷。

飲食飽動作戒之不和呼吸之息不得宣暢而喘急。

經

又脾胃俱虛體弱之人發喘。

脾肺

先喘後喘主於脾。

升治

痰者降痰化氣為主。同陳苓甘。

火炎者降心火連情肺金。苓杞門。

喘甚苦寒火氣益放也宜溫初。

後因痰治。

上氣喘而躁者為肺脹欬作風水宜汗。

風寒傷者必上氣急不得伸喉中有音或声不

出三拗湯甘麻杏。防自阻藹子。

虛喘脈微色青黑肢冷尿多五味子湯。

去乾陳甘桂桑。

一施

因

患口外感四氣。

勞役皆已熟。

夜月汗出肢理閉或入水或乘風涼遂閉其汗。

或傷暑至秋新涼可發而發。

或傷暑至秋新涼可發而發。

因飲食者惡聞食氣

有瘦瘠一歲間長却相似

初至時有寒熱併作頭身疼痛類傷寒

但瘧脈弦弦數多熱

亦有久病脈虛微而無力然虛微中見弦

治法

初至未升五積三食後不可遽截但用清脾飲

朴槲實以次加常候截之久則氣虛弱難愈

日久寒多熱少宜入參養胃湯

愈後大忌食煎炒香醴之物犯者後必

丹溪曰

在陽分者難治

治瘧母必毒清之行氣清堅為主

起於

愈後陰陽兩虛夢遺咳嗽不善保養遂致勞

瘵

傳曰夫賊暑在風管外邪故非汗多不解

今遭此瘵者經再三劫就胃氣重傷何由得

意

欲治此瘵者須漸漸取汗得汗而更文行補養

下休傷陰難得汗補養力到汗出至是方佳兆

三日三食邪入三陰

子午卯酉少陰

刀中已支作解

瘵也

忌飲食。各日飲食。病重。

虛者用參朮二貼托住正氣。不使下陷。後用他藥。

刀中已亥日。各度。治例。

一人。登各限中之陽。宜補氣解表。小柴胡。倍。

柴參。如本有陳葛者。

一人。夜登限中。之陰。宜補血。棘肝。小柴胡。合四。

物。加青。

各如寒。姜於未登前二時。服。每日一貼。八日。同得。

大汗而愈。永不。再發。

一霍亂

傳

霍亂

霍亂。變亂。卒起。多因。大食。陰陽。未。隔。上吐。

驗。腹痛。悶。昨。因。鬼。邪。密。飲食。所。致。

先。心。痛。則。失。制。心。腹。俱。痛。則。吐。利。並。起。甚。則。

轉。筋。入。腹。則。斃。

邪。在。上。焦。則。吐。邪。在。中。焦。則。既。吐。且。瀉。

霍當

引。陽。氣。上。升。使。陽。氣。下。降。

仲景曰。熱。多。飲。水。五。苓。散。

或

米。湯。雖。一。啣。下。咽。立。死。待。吐。瀉。止。過。半。日。飢。甚。

或

方。手。稀。粥。霍。亂。已。死。胸。尚。腹。以。指。填。胸。孔。灸。

吐瀉不止

夫在胸膈兩脇之間三寸
氣海在臍下一寸半
中脘在臍上四寸

四穴灸之立愈

熱

多而

陽五苓散五味門冬
不陽生薑理中湯

並服

轉筋屬血熱

四物加水而紅酒芩並服

男子以手挽其乳

乳下不得

乳下不得

乳霍亂最難治

忽然心腹刺痛下不得死在須臾

取傷之物不得出

正氣隔絕多不治死在須臾

史用塩湯雞翎

探吐以挽其氣是良法

一嘔吐噦

思嘔吐噦之類司附更心

傳曰

陽三

嘔陽明多血多氣有聲有物氣血俱病朴葛

吐太陽多血少氣有物無血病

半橘

吐少陽多氣少血有聲無物氣病

生薑湯

氣積寒之三吐

上焦吐

氣厥厚洪吐湯大便結氣上氣痛治降氣

中焦吐

氣脈浮長痛而吐而痛治樞木香行氣

下焦吐

氣脈沉遲饑食多吐小便清大便結治溫寒通

秘桂枝下

秘桂枝下

冬病

冬病之患胃寒甚固數年而吐者冬木陳結節生痰

冬病

冬病之患胃寒甚固數年而吐者冬木陳結節生痰

戒

。生姜近家之聖藥也。氣逆者以辛散之也。

。吐衄不可不下逆之也。

妙絕也。生薑

。胃熱膈痰常吐水噯氣吞酸。

非陳腐

。惠曰吐宜升治。

桂陳編生薑

。寒而吐則喜熱惡寒。

肢寒宜溫

。熱而嘔吐則喜冷惡熱。

煩躁中乾

生薑門陳

。痰水證吐沫恒先。

後吃消痰逐水

生薑門陳

。宿食胸膈脹滿噯腐。

食去積

生薑門陳

。醒睡氣逆惡心吐膿血。

發不消

自愈

戒

。夏月吐不止五苓加生汁。

。吐虫而吐松炒炭灰。

未米飲調服

生薑門陳

。注衄大吐渴暈便熱。

妙飲水即死

生薑門陳

。惡心欲吐不止心中兀兀。

人如畏舟船

生薑門陳

有

生薑

。皆生薑隨證下藥。

生薑門陳

。惡心吐水心胃痛。

得食暫止

飢則痛甚

。嘔也三陳加棟根史君並服。

一噎膈

惠

。惠曰噎。

生於血氣

血陰主靜

內外兩靜則藏府

傳化食宜何噎之有

。傳化食宜何噎之有。

自生腸胃津液

津液

。清水何異。

刺之而熱

可妄以燥熱之劑以大

。清水何異。

刺之而熱

可妄以燥熱之劑以大

。清水何異。

刺之而熱

可妄以燥熱之劑以大

。清水何異。

刺之而熱

可妄以燥熱之劑以大

。清水何異。

刺之而熱

可妄以燥熱之劑以大

升。脉并大率血虚气虚有痰有热

脉弦而有力

沉伏而大痰

寸关尺脉紧而洪其病难治

反胃脉紧而洪其病难治

脉大而弱不治

如羊尿者不治大脉每血散也年高者不治

口中多沫气血俱虚必死

治法

童便韭汁作醃姜汁牛乳

血虚力

四君子

有痰二陈汤为主

大。内有痰火上升而反胃作胀大治

气结用开导之剂芍药陈生姜

有痰血消息去之韭汁去膈上瘀血

血虚瘦弱二陈汤四物加杏桃红韭汁童便

气虚肥人二陈汤四物加杏桃红韭汁童便

七情郁结气逆三陈加芍药木枳姜缩

膈噎大便燥结四物加童便韭汁多饮羊乳为上策

不可以乳代乳肉有京饴之大七情之大也

和胃情快薄味乳汁方佳

上下焦

血少故大便燥

老婢勤女工膈噎半年饮食不进大便结燥不

行十数日小腹膨满六脉沉伏以生桃仁七兮细

将生韭汁一盞送下

田螺殼燒灰為末服蚌殼末酒服同意

一人患噎只服蜜酒五六年方愈

世漢治因酒滯血致病生韭汁每服半盞至二升愈

一飢逆

傷

氣逆也。自膈下直衝上出於口而作噎之名也。依

正法治之者尚不能得其一二而况謬醫者乎

有因食者 因食填胸氣不通也
在膈上 起下氣不伸者
在膈下 氣不伸者

在膈脈強水衆土位難治

升

有

痰
虛
虛

親有餘不足治之

陳年
姜
生

升

或

痰
痰
痰

刺癰飢參水頻服

无別病而偶然致飢逆无害吃熱茶一二口即止

氣海一穴隔下一寸半 各七壯

以紙摺疊噎而止口詐寃盜賊恐而止口鼻熱

傷寒七日熱反飢飢參六脈沉細無力太僕補中

益氣水刺加炮附子炙乳根氣海飢止脈充而安

傷寒滿云欲逆而脈數者家語人各以參極思

嘔一吞酸

如食物在胃裏着酸

連

乾薑

紫石英

肝木自甚故為酸

因

大盛則金不足

平水則

肝木自甚

故為酸

溫藥散之

治

或微而止為中酸

俗謂之酸心

宜

溫藥散之

後以

餅餌寒餅表

空

若久喜酸

不已則

不宜區以寒藥

治之後以

溫藥散之

吐清水

苓滑陳廬土炒之

木棉

忌粘滑油膩

宜

粉食

米蔬

便

宜

粉食

米蔬

一痞滿

虛

痞與否同不通泰也

痞

心膈痞滿而不痛

外無脹急之形

為痞滿

脹

內外皆脹急者

為腫脹

積

聚而成塊者

為積塊

因

痞由陰伏陽蓄

氣與血不運而成

起心下位中央

實

填滿痞寒此土之病也

虛

痞大便

閉能食

厚朴枳實湯主之

利

利不能食

芍藥陳皮木

治之

利

連苓實苦以泄之

朴半生薑

辛以散之

參朮

苦甘溫以補之

苓沢鹹淡以淡之

濕痰

肥

濕痰本寒滑之類

瘦

人多

而作痞濕以化之

陳朴

升

食後冒風寒食不消而作痞濕以化之

治

脾弱轉運不調飲食不化而痞本查芽麵之類消之

治

中焦自覺滿而外空脹急之形勿食甘

治

下虛之人氣上撞膈心下堅滿痞急苦痺如刺不得

治

俛仰名曰胸痞瓜蒌實丸

治

痞按血成寒囊 菴紅莎虎之類

治

雖有當吐之證冬月降沉之令未行之而次年二月

治

行倒倉法平安

治

傷寒下早而痞瀉心湯

治

酒積難消下之過亦作痞宜升胃氣以血茶煎之全

治

用血茶則痞血甚後下之氣愈下降變微脹

治

辨證有

治

中氣虛弱不能運化精微而痞者參朮生薑

治

飲食痰積不能消化者木陳朴生薑

一劑

下利脈微小

生大溲溲無色月

下痢

下痢脈數有微熱自汗者為未解。下痢脈冷天脈者為危。下痢脈如屋漏者為大孔如升。下痢純血如屋漏色者如屋漏水者大孔如升。簡者如米血者俱不治。

治法

先用寒以勝熱

微加辛熱佐之以為發散開

次以苦燥溫

通之用如乾多効何必用熱毒之藥乎

行血則便自安

調氣則後重除

初得元氣未虛必推薄調胃養氣下後看氣血用治九六日後不可下中氣虛故也吐衄

者可下

序藥

初起腹痛因肺氣鬱在大腸之間

痛用溫藥

不可寒本藥氣虛者不可用

腹痛白芍甘草為君

加桂

其

後重

後重積與氣墜下宜利氣

升柴

本杏核枳丸甚表大黃

身熱不思寒小柴胡去參

發熱惡寒身頭痛宜微汗

下血者宜涼血活血

風邪下陷升提

有溫傷血行

血痢久不愈者

桂紅

大孔痛目熱流於下。桂苓連加干姜。
久病身熱。冷自汗。陳。宜。溫。桂。木。
暴。力倦氣少惡食。陳。宜。木。芥。甚者加陳參。
重面而痛自止。
久痢。虛氣弱。諸泄不止。宜。溫。之。詞。慈。黎。半。師。
之。執。用。陳。皮。為。佐。恐。大。快。亦。已。作。疼。
又。甚。者。灸。天。樞。氣。海。
痢後積已盡。轉物未實者。食物多。腹中作
痛。以木陳等分並服。
血和。積少。但重坐努力。為。无。血。倍。歸。身。尾。生
地。桃。仁。依。陳。皮。和。血。生。自。安。
痢後脚弱漸細。木為。追。板。栝。糊。丸。之。四。物。加。陳。

甘並湯下之。

痢在

表惡寒發熱身首俱痛。陳。桂。羌。生。姜。

行。凝。滯。之。氣。用。厚。朴。降。氣。納。行。則。去。

枳。殼。魚。少。後。亦。不。宜。久。服。桃。

止。以。陳。皮。和。菜。可。也。紅。

痢已減十之七八。然積已盡。糊。粉。未。實。用。妙。
為。妙。木。美。甘。橘。為。煎。湯。下。固。腸。丸。若。常。氣。
未。盡。除。者。不。可。遽。用。

積。積。已。盡。而。更。衣。未。息。大。腸。不。行。收。令。改。也。此。

聖。慈。試。殺。人。於。左。掌。之。間。魚。子。死。亦。然。休。息。

痢。二。三。年。不。愈。

禁口痢。口熱甚。故也。
俗用溫熱甘菜。以治之。

內服參連。通門介芽。
惟久二便得利。


用推不及。瞿龍。

折高揚下。

醫林曰。治痢先推其止。運以平其外。

內。察其爵結。以調其內。

審其所傷。而治不內外。



身表熱。內腹之。小便脹者。分利之。盛者和。

去者。以之。至者止。

下利。脈沉弦。表下重。脈大者。為未止。脈微弱數。

者。為利自止。重者。熱不死。

下痢有微熱。而渴。脈弱者。令自愈。

下痢。脈滑而數。表有宿食也。當下之。

下痢。後有燥屎。當下之。

時疫作痢。一家一方。上下傳染。相似。乘運氣。勝於。

不可。抑尼。緊重。更冷。五苓。加陳甘。隨證。用。

一 泄瀉

大抵瀉利小便。清白。不脹。為寒。

赤。為熱。

大便。完穀。不化。身冷。不渴。脈遲細。而微寒。

丹溪云。瀉。有大有小。有虛有實。有食積。

一 濕坐臥偏處或梅雨久陰有之四苓散榑木目
 氣虛食入胃不化完穀不化參朮為升陳紹
 二 大腹脹水厚腸鳴一陣降一陣火熱厚重色赤黃
 三 肚門焦痛煩渴尿淡四苓加苓通五苓車前
 四 瘕或泄或少宜路癭苓蜜糖粉海石
 五 或食積腹痛甚腹後痛咸宜消導疎降麴虎
 傷食必噯氣如敗卵臭於腹中飲傷酒每晨起
 理中加葛根傷熱養中湯加炒蘿蔔子養酒脹
 泄瀉多回溫分利水穀為上策共陳車
 脾氣久虛不受飲食早賜腹脹急下所食物方
 寬快不食无憂經中不愈宜快脾丸經未陳者為甘蓮
 五更便隱脾泄也當補脾為麴綿蓮云
 久泄穀道不合脫肛元氣下陷及大腸不行收冷朮為麴

陳寇訶五倍烏梅為丸四君加芒升並送下

夏月水泄桂苓甘露飲

吐瀉垂死灸天杞氣海立止

泄瀉一證真漢積已消然後可斷若便固止及必

南治宜經中佳分利水穀

經曰脉細皮寒少氣血利前後飲食不入是謂五

虛死其漿粥入胃世注止則虛表治

妙集車前子末米飲稠下一錢治泄瀉不止

一 脹滿

腹曰七情內傷六淫外侵飲食失節房勞致虛脾

傷而轉輸失職胃受穀而不足運化於受清濁
相干遂通壅塞氣化濁血瘀滯必熱久成濕
熱相生遂成脹滿

治法

補脾養肺制肝滋腎以制心火却厚味新

妄想遠音寧无有不妄

治腫脹大法補中

利小便

車通胃

補攻

參門

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝

肝


肝

肝

法

此病之起固非一年根深蒂固致取速効自求禍耳
清心經之火全運化之職脾
其神靜之德有乾健之運

補養脾土
敗渴者在上下為汗以漸分消
清者後回而為氣為血為津液



經曰開鬼門者謂發汗也

又曰陽氣在表則生

林曰脹滿按之不痛為氣

咽燥漱水驚恐痛悶喘急虛汗厥逆尿多大便

黑肚腹脹脹者白血脈荏莪桂芍半

一水腫

一惠曰水始起目窠上微腫頭脈動喘咳陰股

間寒腫脹脹大水已發矣

經曰開鬼門潔淨府治法之權衡也

上腫宜汗

下腫宜利便

陽水腫數煩渴尿赤澀大便秘

陰水腫數煩渴尿赤澀大便秘

病本自中宮人只知治溫利小便之說類用

去水藥導水丸神佑丸舟車丸之類速死之兆也

八案證風腫皮膚厚麻木不仁走注疼痛陳植已言

。氣腫。皮厚而肢瘦。刺服服服。針陳沉著。

。血腫。有紅絲赤痕。紅腫。鞭牡。

。胎水。婦人宿有風濕。娠則脚腫。目昏。先已。

。久病而浮。手足臂腫。發虛氣。妄行。木葉。

。內挾七情。氣為痰。所隔。心下堅脹。服服。腫脹。名。

。曰氣分。流氣。飲水。渴。陳奴。換服。

。先起於。服。而後。婦於。服者。不治。

。大便滑泄。五穀不分。唇黑。缺盆平。胸突。足平。

。背平。或肉硬。手掌无紋。又男後。脚腫而止。女後。

。身上腫而下。皆死。

治法

。喘急。先宜降氣。三和散。加蘇梗。石菖。

。水腫。炒桅。木米。飲下。病在上。若皮用。

。香薷。治水服有微上微下之功。肺得之清化。

。行而水自下。

。針水腫。惟水溝穴。人中。在鼻下。或灸三壯。鍼。

。餘穴水腫。即死。林曰。針分水。殺人多矣。

。傳曰。水病。脈如鼓。肺。實。生。大。生。天。微。細。死。

。唇黑。齒焦。寒裏。俱腫。肺絕。口張。足腫。足跌。腫。

。膝如斗。者死。

。林云。如六月。濕熱大甚。而食物隆。益水腫之象。

。可見矣。故古人。以辛。苦。寒。某。治之。為。幸。以。教。結。苦。以。燥。

。治男女。陰腫。大如斗。按痛。人所不。忍。治者。搗馬。

。鞭。子。數。寸。厚。

一積聚附塊

四

惠曰自氣動而後若如七情所致或飲食勞倦或五藏傳受之熱是也故所積之物不一氣血之聚有積

熱

藏傳受之熱是也故所積之物不一氣血之聚有積

看元氣虛實或

取取後者

并

脉細而附骨沉而有力

母溪云塊是有形之物氣不亡也塊乃痰与

食積死血也

在

中為

食積甘穀積而難化者

痰飲陳年之生等夢子

治法

傳

可

補則

補之母

逆天時

臟以別之

為主

一說

臟以整

若以

行氣

之

養

按

補

全其真氣補益之

隨其利而行

不可專用下藥徒損真氣病亦不去

龜

當清導落化死血塊去須大補

凡婦人塊多愛血宜灸

石髓

食積

瓦壅子

清血塊

解

引

本草云：蚶殼燒以醋淬三度，埋令煖，
膏丸治氣血癰瘕。
茶癖：石膏、蒼升為末，糖水調服。
脾積：在脾、腕右側。
林云：腎積最隱，難療。大忌吐瀉，以其在下。
宜下，肝之積便言，凡也。吐瀉汗結，以廣積，葉調。
治法在上下宜吐。
或以所毒者，請。
以龍足踐右之足上，除心下積。

一頭痛

痛

頭痛

短臨死

風寒濕痺

頭痛大治有

血虛

蒼若肺升

為主

丹溪云

多主有痰

頭痛

多主痰

少屬火，且清痰降火

有

諸經氣滯者

四氣外傷者

勞役所傷者

太陽

太陽經，脈浮，緊，無汗，惡寒，身重，骨節疼痛，脈洪，長，大，分，身，熱，汗，出，渴，飲，水，止。

三陰

三陰經，脈沉，遲，手足厥，身重，骨節疼痛，脈微，細，小，分，身，熱，汗，出，渴，飲，水，止。

少陽經，脈弦，目赤，口苦，咽乾，渴，飲，水，止。

太陰經，脈沉，遲，手足厥，身重，骨節疼痛，脈微，細，小，分，身，熱，汗，出，渴，飲，水，止。

諸經氣滯頭痛分經理之

肥人溫痰半木陳氣虛頭痛如發

瘦人發熱酒苓芒苡血虛形瘦頭痛

凡痰熱肩痛茶芷或羌活甘葛茶酒苓苡

感冒羌活茶芷苡凡執上攻蔓苡酒苓苡

偏頭凡在右偏右偏左偏宜鑒脈并肥瘦

少陽偏頭痛大便多秘下蔓苡汁亦佳

頭痛致死用硝末吹鼻內即愈蔓苡汁

眼見光而痛肝虛也冷桂茶苡

骨痛目不可開凡痰也茶陳苡苡

偏頭痛連脇痛右旁麻粘末茶酒下

難有云久病頭痛畏風感風寒便發寒月厚綿將

起本熱標寒忘辛溫惟當溫大涼血為主

佐以辛溫解表之劑芩地芍牡陳

一婦頭心更換痛自積憂治肺自愈門芩地

年少時依氣弱常灸氣海三里至年老成熱

厥頭痛長冬天寒凡吹之痛止居暖處見烟火

痛後作此灸之過也步於

一心痛

丹溪謂胃脘痛

健曰淫口酸好辛酸朝陽寒按日積月深自胃必積

痰痰火氣鬱血亦妄行痰血相煎妨礙升降故胃腹

疼痛吞酸難寒心胃膈噎之斯者也俗不察例

以辛香燥熱治之以水滑大遂成危劇

審其所由皆在胃脘而實不在於心也

身犯寒氣口得寒物之初用溫散溫利久則成

胃成熱致行溫助熱用梔子主熱散為引

若痛方正即吃物痛必後作歸各於醫局

心痛攻腰脊厥吐諸菜不効探吐出痰痛止

脈堅實不大便者一上一下

海粉蕩末芎芷湯入姜汁下

痛甚脈伏宜溫茱附子之類不効參朮

溫痰作痛白螺殼煨細末酒下

大梔炒末入姜汁令熱熱飲

虫痛面白斑唇紅已食時作時止二陳加棟根

胃脘

寒而痛草豆蔻

男久痛黃瘦胸常如飽痛甚胸悶四陳桃仁

氣大劑二服下瘀血數按而安

患曰心痛者皆

少陰 氣上衝也

有熱厥心痛者身熱足寒痛甚則煩躁而吐額汗

出知為熱肺厚熱當表汁後調理為門連

有寒厥心痛者手足逆冷通身冷汁出便溺清

利而不渴氣微力弱宜溫之桂枝參生薑

是知久病非寒

病久氣血虛

身作勞羸弱之人痛者皆重

真

痛也。城鹽或類粉補之。

夫心為五臟之主，果所干則痛甚，手足青

至，節即死矣。

真

九齡虫症，凡性食飲冷熱未去，受也。雞枝葉汁，

以物挂按而痛止者，乃扶。厘二陳加姜。

真

平日喜食熱物，以致死血留于胃口而痛，莖

仁承氣下之。

時止時作，飲湯水，反者死血下之，鞭莖桂枝。

心脈懷懷，奈作腫聚，往來上下，行痛有休作。

心脈熱，善渴，涎出面，色乍青，乍白，乍赤，嘔吐清

水者，蛇咬痛也。黃史君連栝戟。

上羊月虫頭面，先用肉汁及蜜引向上。

然後用藥茶，糖漿湯，便按柳鷄風草之類。

血

左手脈數熱多，滿者有死血。

右手脈實，痰積大，發胃脘有溫而痛。


治心痛，藍葉搗取汁，投薑服。

婦人惡血入心，脾經，奈作疼痛，尤甚於諸痛，延

胡索炒末，一錢酒調服。

一脈痛

傳曰：痛因種，不同因。



小脈鞭滿而痛，奈判滿血也。

虎紅鞭，蟹壯。

胃中寒，桃杯。

血虛瘦弱液涸傳送失常鬱火燥熱黃芩二腸之間而作痛以枳實大黃之類通滯止痛後四物生血潤燥之類一可也
 并尾背地紅散



升
 大便通後痛止食也 苓木陳朴藳薑
 綿痛無增減寒也 桂 生薑 莢
 甚痛時作時止也 芍 枳 蓬
 常起痛不移死血也 桂 桃 紅 牡 莢
 酒炒白芍治腹痛 思寒加桂

白芍止已治血虛腹痛餘俱不治

有酸寒以飲
 元陽散以加

虛痛 麥冬 薑 桂
 實痛 桐子 相 氣 加 桂

跌扑腹痛瘀血桃仁赤芍加若紅蘆木並入量便
 脈沉尺絕小腹塊痛為結毒治之

食
 凡卒暴腹痛非中惡客忤即飲食過度腸胃不勝
 急不及化傷于太陰脾經而然也宜備急丸

大抵不通則痛凡痛則須通利乃愈
 或曰痼疾作痛丹腹曰痼目氣降而聚確其

通路不傳運故作痛
 斷下忽大痛人中黑危多死

腹痛并治

心脈痛必用溫散其鬱結不行阻氣不運故

初得元氣未重必推蕩之

壯寒之人宜下

連人與久病宜升升桂枝參

氣用血利升升桃紅之類

食痛脈弦痛甚大便後痛減是也宜溫散升陳

更行氣升升或利其吐之升升

有痰脈滑尿尿導痰解胃升升

可重按連宜溫補

飲食過傷而疼木香枳榔丸下之若氣重調胃補

冬并渴導其寒木香枳木芽麴之類

小腹痛青皮行氣因寒桂


肥白人多氣虛氣溫痰參木半

全不思食體弱脈冷痛桂枝湯加桂枝

小兒多飲食傷木陳查芽麴

腹中鳴乃火擊動其水二陳加連梔枳

亦有藏寒而鳴者宜分三陰部而治上



九脈痛忌地黃婦人尤忌之

寒則凝用溫散

芍藥甘草湯治腹痛

右細劉生薑水

脈

諸病皆由氣血不和

外

或戴

木太過 金有餘而木氣被削

皆令人脈痛

傷寒三壯脈痛 是少陽厥陰病也 小柴胡

。雙弦肝氣有餘 兩脈作痛 小柴胡湯為清

。左脈痛 柴胡芍藥 膝為清

。眼痛 芥菜子水研付 白芥子

。右脈痛 奴實桂甘芍 姜黃 莢

腰痛

腰 痛 紅 寄

升

腎虛腰痛 疼不已 杜松桂枝 玄菟地 解龜

濕證 天陰久座 脊腰緩 羌活膝已通

痰滯 脉端与伏 木芍奴陳半 苓防芷 換

凡感胃經 芸麻羌獨

寒邪侵胃經 杜姜附獨

丹溪云 諸腰痛不

人有痛面上忽見紅点者死

冷瘡如帶五千錢 宜食如改小便自利 腰以下

桂曰 治命余利氣治腰痛不可倪仰

治腰痛不可倪仰

治腰膝温痺痛生膝系一斤米三合和煮粥
温温宜服食之

一脚气

源 傳曰經曰 諸温腫滿皆屬脾土
傷于温者下失受之

温熱成熱温熱相搏其病作

脚气有後 外感而得者
內傷而致者

魚有內外之殊為温熱之患則一也

案 各利異切

用 二水治温 知柏苓耆熟 芹 芍地 潤血

水行氣 羌獨 刺國節 已膝通 引莖下所

經曰有通必有一通以去

心 七寸脈 下大下小 若死恍惚 呔食難眠入心

會 左尺脈絕者死入胃則脚腫衣被呻吟目額黑

氣衝胸而喘

防已飲 二水 塩枳 枳而炒 已生地 換芍 犀 屑

通 連甘節 右水並 食前温服

有熱如芩熱甚及時熱如膏 便秘加桃仁

有痰加南姜汁并鹽 尿淡加膝肥人加麝香

掌腫主温熱

枳木節 橘木不拘多少並湯洗之

忌甘草菰菜生冷 伸屈魚腥等物

患口初得 不覺到他病乃始及

先後脚起。或緩弱。或痺。

或行起忽倒。

或兩腿腫滿。或足膝枯細。

或心中忪悸。

或小便不仁。或偏難轉動。

或見食吐逆。

或惡寒。或胸膈氣急。

或偏体痠疼。

其候不同。皆由腎虛。婦人血海虛。未七情。遂成。

此病。

量人證。裏微加滋補。不然氣血日衰。年上遇。蒸。

熱而作。理之必然。

脚氣衝心。乃血虛。而有溫熱。四物加炒柏。用附子。

未津。則湧泉穴。灸。其熱。

轉動。皆血熱。四物加紅酒。芩。

建人脚氣腫痛。枳實大黃。无。并。

治腿脚痠疼。足面赤腫。穀曰。

溫氣周遊脚腿疼。

香薷散煮。忍冬。藤。

木香。芍藥。仍加入。

功効如神。喚得應。

林曰。脚氣。不專主一氣。亦不專在一經。

頭尋三陰三陽病所在。後李脈。重實為治。

自汗。走症。為凡勝。无汗。章急。掣痛。為塞勝。

腫滿。重者。為濕勝。无煩渴。熱。煩者。為勝。

分其表裏。以施治。

勝。足。肌。緊寒。緩細。區。

洪數。熱。

大凡麻者。凡也。痛者。寒也。

腫者。溫也。

忌煩。則心煩。脚氣。各。

禁大語。則傷肺。

亦最動。霜。足。不。得。當。凡。入。水。

辨證配劑醫燿卷之二目錄

痿

消渴

虛損

眩暈

痔漏

淋閉

遺精

癰疽

疔氣

健忘

脾胃

疝

氣

勞瘵

秘結

脫肛

便濁

汗

瘰癧

諸虫

怔忡

驚悸

痺

注夏

諸血
耳病
口唇
牙齒
解毒

眼目
鼻病
咽喉
髮髮
救急

辨證配劑醫燈卷之二

日東 雖知苦膚道三校錄

一癰傳

同

經曰諸癰起於肺熱

年

又曰治癰獨取陽明一經蓋金燥居上

脾土性濕居中而主四肢畏水者也

海南則金清而東不實何脾偶之有

補北則火降而西方不虛何肺熱之有

經風論癰論舊同不同治法迥異苟方以治風

藥通治諸癰何其謬哉

天虛作陽

石味發熱

凡病癰者不淡薄食味必不能安

東垣真經為君黃帝補字為仇

木栢治瘰癧要藥也

△神魂恍惚起便瀝久手足不
瘳難瘦身不遂眩仆筋裏脚膝軟弱四肢無力
質卑肉率不語之法是也

風為外感主發散
寒為內傷主補養
不同治

并
濕熱為痿者不足

丹溪曰脚常覺熱後必患痿

一痘

經所謂知其要者一言而終是也

濕熱拂鬱內甚皆能令人發黃病

下
濕
殺其汁
新小便

黃蘗寸口脈近掌無脈

傷寒熱病陽明內實。下而不得下。

酒疸。目赤。面黃。身熱。汗不得下。利而不得汗。及放黃。

酒疸目赤面黑黃黑皮黃四肢不仁其脈浮弱

顏黑微黃，難治。

浮為傷腎

跌陽脈（緊為傷脾）

食積者量虛腹下之其餘但利小便小便清利

則黃自退

酒疸小便不利心中熱足下熱是其證也

額黑汗出手足心熱則殺膀胱多小便自利名曰

女勞疸腹如水狀不治

黃疸白溺黃赤安卧者黃疸。小便自利大便黑血證

無疑。小便全不利黃名瘰癧

疸證之黃。小便不利

傷寒血證黃。小便自利

輕者小濕中九重者大濕中九熱如連

通門陳本涉疑。黃疸自利者極難治生薑

。濕多者茵陳五苓加食積黃

。黃疸通身面目小便赤黃

。黃汗汗出黃跡衣不濕

。穀疸食已頭眩心中排悶

。諸疸口淡怔忡耳鳴足軟微寒發熱小便白濁此為

虛證可四君八味湯用涼劑強通小便恐腎水耗竭

久而難治不渴可治渴而腹脹

。脾胃穀氣蒸熱身自黃。心滿氣喘今在須臾初不

知死後乃黃

其候但發熱心戰意急黃連用梔子丸

。林日。疸。吃。吐。用。梔子丸

。酒疸脈。治。先。下。八。黃。中。五。苓。加。食。積。黃。連。用。梔。子。丸

。治。先。下。八。黃。中。五。苓。加。食。積。黃。連。用。梔。子。丸

。治。先。下。八。黃。中。五。苓。加。食。積。黃。連。用。梔。子。丸

治要。疏導濕熱於大小便。中。檢。李。相。良。

一消渴

傳曰二陽結。謂消。

津液差。消。則。同。黃。口。乾。津。液。不。足。也。

足。陽明主。

血。差。熱。消。穀。善。飢。血。中。伏。火。血。不。足。也。

脈。微。病。久。可。治。

脈。數。大。者。生。小。者。死。實。而。強。大。死。細。而。浮。短。死。

高消。肺。主。上。赤。裂。大。渴。引。飲。白。虎。加。人。參。

中消。胃。善。食。而。瘦。自。汗。黃。硬。尿。數。

養氣湯。三黃丸。

下消。腎。煩。渴。引。飲。耳。進。尿。如。膏。六。味。地。黃。丸。

惡。

求傳。

能食者必發。脫。症。背。癰。皆。不。治。

心。肺。位。重。

宜。制。大。其。服。如。過。与。不。及。皆。誅。罰。無。

腎。肝。位。重。

過。之。地。也。

丹溪曰。

肺。主。上。

為。主。

肺。多。飲。食。不。消。

皆。禁。半。食。

中。消。

胃。多。飲。食。不。消。

下。消。

腎。多。飲。食。不。消。

又曰三消。

血。虛。不。生。津。液。俱。四。物。為。主。

上。消。

加。參。白。朮。天。花。如。藕。汁。生。地。汁。人。乳。薑。汁。

中。消。

加。青。滑。石。寒。水。石。降。胃。火。升。胃。

下。消。

加。柏。知。熟。地。黃。水。石。降。胃。火。升。胃。

目

神降

又間處飲繖絲湯為上。集勝火引氣咽于口。如馬齒級第得為湯。

患曰三消之疾皆歸于燥熱。滋陰之情飲食過度。神虧。石燥劑之可致也。

養肺降火生血為主。

神腎水強寒之連。浮心大陽熱之實。連降心胃熱之實。連降身中津液之衰。門。能食而渴。白虎加人參湯。

預治

不能食而渴。白散倍黃。

療之

上中既平。不復得下消矣。

若厚先本方妙未調服。

內傷病退後。燐湯不解。值熱在肺。

參黃甘少許。生薑汁調冷服。

天花粉。治消之聖藥也。

中

消渴口乾。用藥葛汁服。消煙脂。肉糜。陽與盛。不交而泄。為強中斃矣。

一氣

氣者人身之根本。順則平。逆則病。



五志之火易起
五味之偏易傷

是以釀成膠痰固積留滯六府將火邪氣充塞三焦使
氣血失其常值府藏不能傳導故外邪乘虛

奔奔

而入清陽不外請急痛朝朝輒發作
男子氣病常少

大抵男子屬陽得急易散是不女子氣病常多

凡此病又當詢患者因何受而致則當因其受而

奇

解方進某治
脈大血氣俱多

然

然欲調氣必先調痰痰氣結則生痰之盛則氣愈

結

結如七氣湯以半夏為主官桂佐之雖用藥痰

深

又要溫中良法也

七

七情相干痰涎凝結如驚如腰咳不出嚔不下

奇

解五藏諸氣益少腹証四炒黑梔子末以生薑汁入湯

同煎飲之其効甚捷

四

治結聚痰癖瘕氣痞滿之法

中焦為痞滿脹急

下焦為奔豚七疝

調氣用木香然味辛氣能上外如氣鬱而不達固宜

續運黃連香木

相和母而少用木香從之

經

經曰一息不運則死

一

一毫不續則死

二陳如

實連薑枯木
枳朴樛木
青紫芍膠
桃查梔面枳核

婦人胎前產後之氣，悉作聖主四物加疎利行氣。

產後發熱，或桂枝湯，或麻黃湯，或承氣湯，或四逆散。

又曰：暴怒傷肝，傷肝則氣逆，氣逆則傷胃，傷胃則氣滯，氣滯則傷脾，傷脾則氣鬱，氣鬱則傷肺，傷肺則氣喘，氣喘則傷腎，傷腎則氣竭，氣竭則傷心，傷心則氣散，氣散則傷神，傷神則氣亡。

外因

△林云：經曰：七情五志，傷於中，氣逆，逆於外。

△子和云：七情五志，傷於中，氣逆，逆於外。

內因

△是下

聖人壽氣如持至寶，人投物及燭大和。

此軒岐所以論諸痛皆因於氣，百病皆生於氣，氣本一也，目所觸而為九。

○悲可以治怒，○喜可以治悲，○恐可以治喜，○怒可以治思，○思可以治恐。

以應彼志，此之言奪之九此五者，必謹詐誦，惟無所

肝

不臣然後可以動人耳目，易人視聽。

○脈來

大血氣俱多，小血氣俱少。

又

大而堅，血氣俱實，細而緩，血氣俱虛。

沈滑氣，煎痰飲。

教

○凡見喜怒悲思之證，皆以平心火為主。

○有者，傷於動，上使屬陽，下使屬陰。

○者，不達此，皆遠有寒涼之證。

今醫自

一虛損傳

目

○為更七情五志之火，皆越男男女色也之故，過是

皆虛損之所由也。

一

△虛損之疾寒熱因虛而得也

感寒則損陽上虛則損陰損自上而下

陽損
一損上肺皮發毛落
二損上心血脉虛少不榮藏府婦人月閉
三損上胃飲食不為肌膚不潤方冬冬時自亡

治宜辛甘淡過於胃則不治

感熱則損陰上虛則陽盛損自下而上

陰損
一損上胃膏肓不能起干床
二損上肝筋緩不能收持
三損上脾飲食不能消耐
治宜苦酸鹹過於脾則不治

治宜苦酸鹹過於脾則不治

心肝損而
色弊
形痿
蛇錄
常此意勝

勞極者七情傷五臟勞極精氣衰生諸證其脈多弦

軟緩微弱細小皆為虛脈脈

人受
故
常
有餘
不足

或重賦素弱又為寒暑勞復所傷或為熱過度俱能

耳聾遺精自汗夢則虛火上攻面紅發喘

切不可用熱神友動虛炎病不能起

△經曰陰之

補氣四君相自行昭烈
人老冬加芪

紅。補血四物春倍膏夏倍膏秋倍地冬倍局

補氣血八物加我如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

補氣血八物加桂枝如法

養

當病之時宜安心靜坐以養其氣以甘寒得其火熱以酸味收其散氣以耳溫神其中氣

鼓

。經曰人不知神之為害也

戒

。時人往往

。耳受酷烈毒而雖死不悔也

全

一勞瘵

傳

精

。氣射虛弱勞傷心腎而得之

主

精竭

血燭則勞生傳變不同骨肉

相傳乃至滅門臟中有虫噓心肺間難以醫治

陰

。陰虛生內熱

陰氣者

靜則神藏躁則消亡

養陰而延生者

心神恬靜而勿躁擾飲食適中而勿過傷

○

主平陰虛疾并血病漸瘦虛火陰火銷鑠

情

。飲食勞傷過傷中

。致多熱或寒熱進退似瘧非瘧

。能救其方

法

。一神其根以絕其根本

○

男勞脈浮大手足煩

○

男脈虛弱微盜汗出

春夏劇秋冬瘥

此則玄桂

治法

脈

。脈沈小遲者，脫氣走行，則喘也。厥冷肢滿，漉漉泄，食不

消

化，此為不化。生薑炒芍，消之。

治

。勞傷四物，加升麻，童便，薑汁，大補，為上。

三

。三因方有取芍藥，其效甚速，不治。

此

。此病大忌用人參，若曾服，多亦難治。此病屬火，大腸

急

多，燥熱必甚，飲食勿令飽，厚治，療之，涼至，其難用矣。

急

。急調脾胃，候胃氣復，用本病藥。

宜

。宜灸患門，四花，它膏，百，三里。

患

。患看參年，思定志，總房室，息妄想，戒怒，第飲食

自

自培其根，否則病鶴，安及矣。若治之於早，易療。若到

肌

肌肉煨爛，沈困着床，難為矣。如汗加嗽者，非芫可

人

。人能平時參護，元氣保有，精血療不可得而傳

。療重食人骨髓，血枯精竭，不救者多。

一

。一眩暈，傳

經

。經曰：諸風掉眩，皆屬肝木。

眩

。眩暈有虛實，風者血與氣也。

血

。血虛清氣不升，或汗多亡陽，而致宜升陽補氣。

因

。因風火動者，宜開痰導滯，重則吐下。

丹

。丹曰：雖云屬肝，本屬痰者多，蓋急痰不能作眩。

雖

。雖因風而必有痰，痰者多蓋急痰不能作眩。

因

。因風火動者，宜開痰導滯，重則吐下。

丹

。丹曰：雖云屬肝，本屬痰者多，蓋急痰不能作眩。

○瘰癧在^上大炎上而動其痰也二陳加本^本羌

○四氣眩暈見證

肥白之人溫痰清拍上陰火起於下是以痰挾風火
上衝頭目正氣不能勝敵故忽然眼黑花甚而至卒
倒多無知

黑瘦之人軀體薄弱真水虧欠相火上炎時上眩暈

○大抵 肥白眩暈痰降火為先養神氣 瘦人眩暈降火為要節抑肝 去地黃丸

○風木太過成眩

○暈眩死血迷心竅而然

脈并 數熱多 微而孔有死血

人溫緩而浮大厲風

○眩暈中風之漸也預服氣行四去痰除風

肥白氣虛痰挾痰四君倍陳半 或四君前加利頭目

瘦人血虛痰火煎盛三陳加本姜汁

○扶元 風 荊 芎 芩 天 麻 陳 半 姜 汁

七情鬱而生痰動火隨氣上厥

吐衄崩漏肝家不握榮氣諸血失道每行

尋致病之因其間以升降 鬱行 不可妄施汗下

一秘結傳

實則津液定而大便潤

本

△腎主五液故曰

虛則津液竭而大便燥

外

○丹溪云

邪入裏則胃有燥氣
三焦伏熱則津液中乾

此大腸挾熱然也

○大法治燥潤之方羌活麻仁郁李之類

風燥加羌活九以煉蜜取其潤燥

或

仍多服神血生津之劑則其真陰底益再結之患

切勿以巴劑峻利攻下

○大便結燥者慎不可發汗汗之重亡津液閉結而死

同燥

在

西北以閉結為主實升芍藥杏麻桂陳枳

外

○風濕而大便不行加煨皂角仁大黃秦元利之

血枯

腸冷而血脈枯

此大腸挾寒然也

或

又云有虛風火溫寒津液不足氣結切不可一例用

或

脾虛風邪傳入腸中為風結麻仁丸

或

年老氣弱津液不足

或

大便秘小便數則為脾約蓋脾血耗散脾金受之

各無提脾津液故易宜養血潤燥折地桂芍

第一能飲食小便清為虛

第二不能飲食小便不通心腹作痛備急丹

第三胃中停滯寒食之物大便不通心腹作痛備急丹

第四大便秘服藥氣不利四物加枳如赤紅

第五導法以蜜煉如飴成指大長二寸

第六細穀道中或生毒大津潤細

第七林日如不得大便以苦厚

二痔漏傳

因元多致自敗以故氣血下墜結聚肛門宿滯不散衝突

未○脾胃虛弱故脾大腸氣弱之肝木得以乘虛為腸

風金失旺養木實分于畏之而為耳

△五痔泄名

肛迎露肉珠如鼠乳時潰膿曰牡痔

肛迎生瘡腫痛突出一枚數曰膿潰即散曰北痔

腸口發痛且痛且痔血瀝曰脈痔

腸內結核寒熱往來每解脫肛曰腸痔

每大便清血隨下而不止曰血痔

大便艱難
強力肝出

又有酒痔每飲酒發痔腫血流

○大抵以調血為先慎口節慾

解熱
原氣

治血為主
地有牡紐木

傷於濕大腸外門

養生地連槐角涼血生血等

當歸和血方

可升穀寬腸陳枳

○腸風痔在胃與大腸出

熱下血清熱脈中痛

清為腸風紫芍牡
湯為膿毒桂枝紅

○服治下第即以此為膳服之不犯胃氣

△諸痔出血肛門間別有小穴數下如血線不与便物共

○漏瘡主參苓歸木為大劑補氣血

○外隔附子末餅炙如用且止次日每多直至因平

洗第
五倍朴硝桑寄生連蓬煎湯先熏後洗

貼藥
木散魚五倍為末付之

塞第
知耳石煨尿淨

又馬齒根研細付土片時着肉平去第稍遲恐

痔核已脫謂之痔漏大便後痛此濕熱風燥四氣合

故
大腸頭底現陽也
大便秘結火邪

林曰腸風血自腸中來
虫痔血肛門邊傍別一小竅射如血線痛血浸淫於
其間化為虫者腐腸口滴血淋漓又不能約而收之
以芫荽艾葉苦楝根葉為之化虫

一脫肛

△惠曰丹溪云脫肛屬

氣虛寒濕外有
血虛四物桂枝湯
熱相火者

○肺主大腸為表裏故肺藏

蘊熱則肛門閉結
虛寒則肛門脫出

源

又

婦人產育用力
小兒學行日久

皆致此病

洗

搽

灸

外五倍子末水煎汁浸洗更入白礬粉蛇床佳後赤石
脂末搽芭蕉葉頻揉入

大人灸長強穴在脊尾窮骨尽處七壯又灸臍中隨
年壯

小兒灸百會三壯又灸長強
水鐵燒存性末搽肛門上接入口愈

一淋閉

△傳曰經曰

清陽出上竅
濁陰出下竅

淋閉之患矣

故清陽不升則濁陰不降而成

閉

先哲以滴水之器懸空

上竅因則下竅不出

故

東垣笑百病
母虛而實者生
虛而實者生

是皆同上之數之法也

脈

目 痛由

濕熱之病
燒酒炙肉

筋渴成痼害脾清渴相混
肺金多則水道不清漸成淋

目 或

用心太過
房勞過度

心胃不交水火急制清渴痞塞

治 東垣

分在氣在血治之
不渴不渴奇

渴而尿澀熱在在氣分肺主之宜淡淡通沃

瞿車苓門

不渴而尿澀熱在下焦血分胃膀胱主之宜氣味

俱隕之知栢類加桂

丹溪云五淋皆屬熱
鮮熱利尿極子妙末白濁下
不可汗汗之尿也

淋五

候

候

汗創

小便

黃黃栢門和
法數以修通冬冬

汗

老人氣虛淋主冬木加通栢之類
氣虛不運神中蓋氣竭加栢栢使清氣升

有氣血作淋用牛膝膏能傷胃量用

淋流血同天蠟下焦意血氣不得降補降火四物

如和栢茅門

。凡遇皆溫熱世人誤用熱藥宜補陰藥亦不宜純涼
故使柏炒之佐以生薑之類炒乃潤和桂

。二湯小腹痛甚宜作寒治同煮當歸丸炒

河陰熱者屬白濁氣弱而升治

脈

。兩尺洪數便渴失精
婦人尺脈滿而弱或洪數而便渴白帶

肝

。胃弱者用參加升柴升胃中清氣
有熱者宜柏滑之類

肝

。肝脈弦用登瀛肝

遺精

遺精

。林曰能遺精者心精氣內守陰平陽秘精元密固矣
或縱慾勞心則心火不安閑鍵不固更有少壯人情動
於中意為於外慾心熾而不遂必有遺精便渴之患也

治法當清心涼水道切勿補之
精滑主遺精

。思慾不遂精氣失往轉而出者其病在心宜安神節補
遺精便渴不可藥作勞治同過酒多房乃濕熱所致

。只四物加炒柏白知柏
。遺精主熱
。傳曰治遺精熱以小便龍虎重勿使搭肉

一汗

心火熱相搏為汗明矣乃慙司耳

傳曰汗主液

汗名

經曰

飲食飽甚
持重遠行
疾走恐懼
持體勞苦

汗出於

心

自汗多時而出動則為甚陽虛胃氣之所司

神陽調衛

神氣不足

盜汗寐中身如浴覺東方知陰虛榮血之取
主補陰降火為桂枝地黃並遠解知門苓銀柏

脈

大而應

者汗

在

寸自汗

九脈

微而濡

者皆主自汗也

丹溪云

自汗屬氣虛屬濕多熱陳精水麥蘗

四傷虛損

之目汗外榮二味蜜水制水煨以殺牙在

胃水

火外降汗自止

自汗

宜參苓白朮桂枝

汗證

禁半夏

牡蠣

散皮麻黃根桑木糯米防風白芷

汗出

髮潤

不治

君子見幾并之不可不早

△別處多獨心孔一片有汗多應汗亦多者曰心汗宜
養心血為桂用青桑牙三葉煨乾末空心米飲調

頭汗 服最止心汗

○身多汗但頭汗出陽氣上脫也須早醫治矣

桂耳蟬本草 荏菴

汗 陰汗濕痒 妒耳石 一石 真蛇粉 半斤

足汗 右細末氣撲患處 楊 蜜色僧黃丹 各等

○治脚汗陰穢氣蟬 樹香 石末

一厥 厥者手足逆冷也

三厥 陽氣衰於下則為 厥

厥 厥補 壯水之主以鎮陽光生地柏芽知方 益火之主以消陰翳附姜末桂炙臍

卒厥不知人 唇口青身冷為入厥死 身溫和汗自出為入府自愈

白麝厥脈 細參衣附 大而托桂芍生薑

外感脈 數

身溫不渴脈細陰

丹溪升 桂參芍苓附 厥也 知門地芍茅

寒厥氣不足手足逆冷 二葉

寒厥氣不足手足逆冷 寒厥氣不足手足逆冷 寒厥氣不足手足逆冷

痺

△林云寒痰迷心四肢逆為毒附陽名瘧厥生毒

痺

○胃中冷即吐噎理中湯加枳椇

痺

○氣厥與中風相似氣中身冷身熱身瘧

痺

○血厥婦人多有之忽如死不動目閉口噤不言或微

痺

知急色眩暈移時方寤此中泄汗過陽上而不下氣寒

痺

而不行黃板桂枝湯

痺

○酒厥頭旋倒不知人生薑汁溫灌立醒

一瘧

何惠林

○風散氣故多汗而不惡寒脈瘧較細弱四休不收或

瘧獨因自合而曰柔瘧陰

○寒泣血故多汗而惡寒發熱脈瘧長弦長五月滿口噤

瘧

即不省麻痺手足攣眼同曰瘧瘧陽

瘧

○瘧之為病瘧乃本王強直瘧乃本靜溫土多汗流濕

瘧

△此外有諸瘧之候表裏不任凡寒亦能成瘧取因亡

瘧

血脈之所寄故邪龍水之

所以或



致之者可見

瘧

是乃瘧乃本耳

瘧

其脈皆沈伏弦緊

瘧

但陽瘧陰急久不拘事

瘧

○去血過多風邪乘虛四物加苦芫荽少加附

瘧

○外證似傷寒但項背及張口常如瘧乃異耳

瘧

二證各異不可不別

屬太陽經

中風

通用小續命湯

凡人字若耳聾者已安

○瘕痼之并

瘕痼身軟急時醒
瘕證強直及張不時醒

一癰痼

痼時作時止

非一類

顛狂失心妄作經久不愈

巨陽之厥頭重足不能行發為暈仆則痼類也

陽明之厥顛疾走呼脈滿不卧面赤熱亡身見亡身

諸甚則竟衣而走至室高而歌罵四言不避親疎得

之於陽氣大盛胃大腸實熱熾火鬱結于中而為

之耳

○大瘕 在為瘕火實盛
病為心血不足

求望高遠不得志者有之

○治 去狂宜平下
還病宜安神養血

陳半
連宗

○瘕 火
瘕分多少治之

瘕第清心連辰
有瘕用吐陳半

吐後安神丸及平肝茶

○狂言妄作經年不愈 心經苦熱清心降熱

○五志之火因七情而起 痰迷心竅去痰寧心

○丹溪云以人受創之非藥石所能療

○怒傷肝為狂為痼 怒傷心為瘕為痼

○喜傷心為癰為痼 喜傷肝為瘕為痼

情七

解勝

憂傷肺為病為顛以悲勝之

思傷脾為病為顛為狂以怒勝之

恐傷腎為病為顛為癲以喜勝之

驚傷膽為病為顛以恐勝之

悲傷心包為顛以熱勝之

又曰多因痰結於心胃間宜開痰鎮心神

亦有中邪者以治邪法治之

九狂病宜大吐下則愈

血氣兩虛

痰客中焦

妨礙升降諸官失職視聽言

動皆有虛妄以邪治之其人必死

邪○先身熱掣筋身冷而後發病脈浮陽病病

陰瀉

先身冷不制多驚身冷而病發脈沉陰病

病在五臟內在難治

九此病肝經有熱吐後復青丸

大率行痰為主用南星薑連

○林云 發發黃中脈在外踝下

後服某

○李華又云下曰治顛癲用艾於臍裏下數道正

神脫而目瞤如愚痴者不語

一諸蟲

○林曰

人元之毒飲食有痰倘飲食不節或傷飢

四

或過飽喜噯腥膈少食生痰嗜嗜

四時不食食肥

耳廣府虛弱致生痰積

○古書云

飲白濁膏肉生毒
桑葉炙羊肉食生寸白蟲
鱸魚與薏米同食生瘡魚

○小兒廣府弱食肥其面腹脹滿倒嘔水涎

面青飲食不進不生肌膚或寒或熱或沈或熱其面

不早治相生不長長一尺則能害大矣若貫心殺火

○傳曰飲食不節朝損暮傷自傷成積之久或熱濕熱

相生諸虛後五行之氣而化生

○諸論上半月下半月月字當作日子蓋中氣之半

月二轉頭之理

先以蜜糖炒肉吃引蟲頭向上然後用殺

散惑

史某

以意大根浸煎汁是藥水煎
青黛黑麴粉丸水下當丸米

○腹內熱腸胃虛寒行求食

上唇瘡或患食積
下唇瘡或患食積

一疳氣

○傳曰用漢楊柳為濕熱

宜驅逐本經之濕熱消導下焦

○痛用之法灸治

○疳痛或在

或

○大抵始於濕熱在經

而至於又寒氣外束不

治因

得散所以作痛只作寒論認為未備
濕熱因寒鬱而作梔子以散寒鬱
不痛屬虛加桂姜汁九服後自此方隨形證加

并

減毫不驟
又濕分濕熱多也。濕多則腫癰病是也
又有熱虛而發者脈沈緊而豁大有力者是也
其痛亦輕者本為君疎導使

治胎

誤收

○子知云俗謂曰膀胱氣小腸氣余必曰內濕熱身外虛寒豈

知皆歸肝經

治

藥

○定痛用油石香附為末姜汁調下
諸痛宜大散宜在足大拇甲後一韭葉聚毛間灸
三壯用針氣胞即消効

第

飲

○吳氏注曰

太陽受寒血凝為癥
太陰受寒氣聚為痞

此言太陽受寒傳

之肝經也

不可溫第

若神者是欲病去

而強拘留也

查梔子壯本氣

吳氏桂枝湯枳朴厚青

一怔忡驚悸

△愚曰人之眼主看心

心之旺養者心血

血一虛神氣不

驚者恐怖謂心虛而

使久有惕之狀病定數為之劑陳神辰華

○怪者怔忡之謂心虛而停水虛氣流動心不自安使

○人有怔忡之狀多由消飲之劑空神門木

○風不過調養心血和平氣而已

宋 益 羅

○雖離云損其心者益其榮宜補榮血為主

并治

有意使動血虛并地桂芍

瘦

○人多是多

血女有地紅牡膠

瘦

○大益物佛安神洗上類瘦欲言平陳本

目治

○目

母能令子虛心血不足桂地膠煇

○或遇憂鬱思慮過多耗損心血虛易膽驚驚悸又

瘦

○惠曰思慮過多耗損心血虛易膽驚驚悸又

一健忘

目

△惠曰思慮過度損心脾

須養理心脾神氣意定其病自除

○精神短乏

者健忘

○林曰補心虛治健忘于日取東引桃枝于枕下令耳

林曰補心虛治健忘于日取東引桃枝于枕下令耳

目眩明
丁方治心孔昏塞多忘喜誤丙午日取故魚甲着衣
節上

一痺

附臂項痛

寒濕

△傳云

寒勝着

如繩扎縛初解之狀不知痛痒

證按

不仁者或

四肢

方名為麻痺

脈證

△脉浮而濡

屬氣虛

同後麻在下上

行經

○脉

浮而緩

濕為麻痺生薑芍附椒楨五麻

行經

○十指麻木

冒濕痺死血三陳加二木桃紅步加附子

行經

○丹溪曰

麻是

氣虛

行經

○治法

氣虛

濕痺死血

行經

○西醫

麻本沈重

底青陳升紫歸紅有沃其煎服

行經

○目則

麻本

退非凡邪乃氣不行也

行經

△惠曰

痺者風寒濕

三氣合而為痺

行經

血氣凝滯

手足拘攣

身體沈重痺本諸波筋酸

行經

○須明

腫身不腫

忌肉食

行

同

治

痛

臂

項

陳生善
痰二木依以亦濕及行氣
目小續今已桂香芳參云

血虛苦
多濕與痰流經絡
木南冬陳羌

肥人
血虛與熱

已勝羌通

下部有濕腫痛知柏騰

患痺腫痛

夏受風寒而發動於經絡之中濕熱流注於
脈節之陰而多也

臂痛是上焦濕橫行經絡

項強動則微痛脈弦數而實熱客于太陽經
二陳如酒芥花紅

戒○禁酒服香麥熱麩煎炒物

血○桂白血痺者身重人骨弱肌膚盛重困疲勞汗出
卧不時動搖如被微風遠得寸間微大小黑身體
不仁如風痺狀甚為桂
生善
大寒

一脾胃

胃○胃中元氣盛則能食而不傷過時而不飢

脾○脾胃俱盛能食而肥
能肥四肢不羸
能食而瘦胃伏火邪於氣分

夫○飲食不節則胃病
脾勞役則脾病
脾中升陽
脾火

胃 胃病則胃經精神少而生熱面黃脈緩
形勞則怠惰嗜卧四肢不收泄瀉脈遲

證 傷食必惡食氣口脈黑盛胃病頭痛發熱但身不痛
二陳加木查可如間食氣即吐二陳加縮青

治 噎氣胃中有火有痰南半施荷膏朴陳
或丸服

脾 脾胃之病大抵是肝木傷脾土也宜以此方為主
經曰 脾旺則諸病除

△ 四君子湯治脾胃不調不進飲食
參苓白朮 右剉煎加陳皮名異功散

有氣 加青麴傷食飲同加查炒實傷冷物
不消肚痛瀉泄去寒加麥姜

○ 平胃散治脾胃不和又名對金飲子
木五朴製陳各三 耳二

右剉姜枣水煎加藿香半名不換金正氣散
脾濕浮加苓通倍宋目朴陳生薑

氣不和快中脫痛加荷縮陳
欲進食加麴牙柳吳茱萸炒 本意

△ 吐清水者木陳壁王妙 苓滑炒 白朮陳煎服
林曰人受氣於水穀以養神水穀盡而神去

水去 入於胃脈通乃行 安穀則昌絕穀則亡
穀消則衛亡 榮散衛亡神安所依

故 衛不可不養 血溫衛和得尽天年

便。淡滲因塞不通則服之得利分再服。

一注夏

○惠曰春未夏初頭疼脚痠食少体微熱脈大倍謂注夏屬陰虛元氣不足也宜補中益氣湯去升柴加炒柏芍藥煨加半夏陳皮。

一諸血

○傳曰肺出心出肝出脾出腎出胃出小腸出大腸出

○口鼻出血有肝火者

○其脈諸虛諸弱亡血脈氣失血

○吐血唾血脈實大矣

○衄血血為主犀角地黃湯入爵金酒苓桅門

○蘿蔔上半段榨汁服丈八重

○韭汁治諸逆血服之最妙

○槐子能清胃脫血

○先吐血後痰嗽陰虛火動白物加療火甚

○暴吐紫血一梳多更爲好四物加清熱藥

○吐血中氣塞上吐便紫血者杏仁養氣紅壯藥

○咳血嗽出痰內有血痰盛熱多血虛先宜清痰

○咳火後八物加微調理

○咳血或勞黃痰湯

○唾血鮮血隨唾而出四物加煨商炒柏芍少加

古

○古上出，連槐花炒米氣，推之。

○吐衄血，後曾來四物，加膏知。

○衄血咳，血痰帶紅紫，皆後肺來四物，加酒芍、茅花。

○補陰降火之劑，四物加知柏之類也。

○咳血痰盛，心挑多，自是血虛，用黛、蜜、訶、貝、蛤、梅、末、姜汁。

○蜜丸，喘化，嗽盛，加香。

○患白濁，血難成，易虧，妄行上則吐衄，裏固外則虛勞。

○忽患○逐於下則便紅，○虛虛陽搏則為崩中，○濕熱

並癰，則為痢，○熱極癰化則為膿血，○畜在下則金在

○吐衄衄血脈，浮大洪數者，難治。

○九血證，上行皆逆也。

○小兒衄血，用灯心或茅針花塞之。

○吐血火，戴血上，錯經妄行，四物加炒槐、童便、姜汁。

○尿血，陰痛，後膀胱來四物，加瞿、滑、藤、梔。

○尿血，不痛，心移熱於小腸，後精室來四物，加連、梅、佛、苓、芍。

○血自，大腸來四物，加。

○血出於口鼻，或加。

○血出於大便，或加。

○血出於小便，或加。

○皆視新久緩急，或行，或停，或止。

○傳云，下四有。

○九血素不。

○必加辛溫升藥。

○必加辛溫升藥。

○必加辛溫升藥。

○必加辛溫升藥。

○必加辛溫升藥。

在如涼藥宜煎煮酒煖寒因熱用之也

茶

○治厚血干槲餅煖存性米飲下二不立止

△惠曰下血鮮紅為熱或內蘊熱毒入于腸胃

○或飲酒過多有燒炙熱物炒梗升元膠并陳

行治

○四物加并姜外苦本

有風邪下陷并凝自生地柏

○腸風脈毒坐臥風濕醉飽房勞致

症清

挾熱血清名血肢痛

熱因

清腸風連紫為腸毒未盡

痛

○瀉血屬熱

如痛為痔

四物加棕灰連其人素病

不痛尿血於冬因血虛四物加牛膝耳膏

○血汗流如蠟由大喜喜則血散血隨氣行故也

黃芪建中湯辰沙炒香散

○傳云一男年四十素飲酒大便下血一日二廁每次便血一升

予四物加芩苓荊芷槐連日手脈不動後搗汁灰二升入

煎服○鏡面草搗汁膏水調服○牛膝一兩水頓服○生地

黃汁各和服○反復有血槲餅煖存性米飲下

○出同血出十著煖煮汁塩水許通寒溫含漱吐之

○同同血不止苦竹茹以醋浸一宿含漱吐之

一眼目也

心之使也

本。目者神之舍

本。目疾。理解胃。養血。安神。

治木之法也

方行木。地桂牡紅。遠辰犀。

并同。丹溪曰目痛屬

肝。肝則為表。肝散熱。暴昏翳。腫。淚。神。勞。速。辰。

河間曰在

府則為表。肝散熱。暴昏翳。腫。淚。散。血。安神。神。水。內。障。腫。散。



血熱。血熱壅痛。四物加膠羌已去。

火盛水竭。地骨為精。老年有此。

有火。火。元氣不足。

五臟。肝。腎。虛。實。論。難。以。述。大。地。目。疾。肝。

熱。肝。腎。心。熱。則。頭。痛。風。濕。血。少。則。後。痛。胃。虛。則。

不。解。視。治。法。當。清。心。神。血。養。解。濕。目。地。桂。牡。紅。

至。中。年。非。有。要。要。不。可。輒。同。老。視。不。衰。

腫。手。散。大。皆。辛。熱。不。連。天。

久。病。皆。暗。熱。地。骨。根。為。君。老。弱。使。其。可。掌。指。

果。發。赤。腫。連。肝。老。弱。使。其。可。掌。指。

倒

毛

明

倒針

酒目

散

理

血氣
多
少
去
血
年

年

洗

洗

洗

洗

洗

○ 養老倒睫而目累為皮繭之取致也去肉熱眼皮緩

則眼毛立出醫腰赤退

○ 眼腫歲久赤爛為赤睛三稜針刺眶外以厚濕熱

○ 目盲生小膜不甚疼者倒針以針刺胞愈視其背

上即有細紅點如瘡者以針刺破目時即瘡故名

倒針實解太陽經結熱

○ 散實過目目昏腫痛酒傷血死其中血凝及掌紫黑

乃添血行而物加紅赤熱木陳調失未服數日愈

△ 林曰腫子散大由食辛熱辛主散上棄腦中其精

故散精散則視物亦散大也

○ 聖人雖言目得血而能視然血亦有過不及也

太過則目壅塞而痛 故 年少多太過

不及則目耗竭而昏 故 年老多不及

○ 目者肝之外候在五行為木木火則藏實裏則枯

○ 治火之法在養神神在上星額會前頂百會

○ 治火在耳 故目昏 兒 水在上 故目明

○ 洗風赤腫痛痒淚眵昏暗

○ 洗風赤腫痛痒淚眵昏暗

○ 洗風赤腫痛痒淚眵昏暗

○ 洗風赤腫痛痒淚眵昏暗

○ 洗風赤腫痛痒淚眵昏暗

種麥

○人年三十以上不發三里金氣上衝目不明取以三里下

增補

常服

洗法

○空心用鹽指畫眼口少時吐津按手中洗目令明

夜見細字

洗

○臘月不落乾茶葉煎湯洗目効矣

一耳病

耳鳴

目

○中年之後胃水枯涸陰火上炎故耳痒耳鳴

大痛之餘

治法在浮而補此補虛降火劑也物加柏

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

陽使

虛下

○黃柏鹽酒炒末為丸
○有氣厥而聾耳有缺爪者有勞傷者有聾耳停耳
○憂思傷心虛血耗而龍耳或鳴或寧心煩氣平補
○鎮心丹地黃門辰草麥冬打龍
○過房胃虛精竭而龍耳或鳴或寧生精神胃肉荏苒各丸

○風龍耳必眩暈流氣微加薑茶白生薑

○臘耳熱氣乘虛隨腦入耳起常牛

○停耳耳中有風熱搏結核塞耳

○治法風者散熱者清之虛者補養痰火清淨

○過個人耳鳴木香板棉丸

格第

耳痛 枯樹末吹入耳

耳聾 臘出用鹽坭枯樹末綿杖送入

耳聾 以菜葉鳥頭末大黃三味為末津調貼


泉定以引火下行 燒存性 右新綿裹塞耳中

一方磁石大穿山甲末之字 耳內爪兩色即効

中食生鐵一塊 耳內爪兩色即効

藥

耳內



用蛇退皮燒存性細研以鵝

灸

耳龍耳蟬 灸聽會 在耳微前陷中上關下寸

張口得之五壯 又灸翳風二穴耳後陷中

外治耳龍耳用芥菜子搗碎以人乳調和綿裹塞耳

水入耳痛奇汁點之

耳中有物不出弓弦三寸打散二頭之應膠着

耳中物上徐綿引出

一鼻病

傳

丹溪曰肺位高体脆性惡寒又惡熱

風寒始傷肺熱久及鼻

勝移熱於腦則為鼻淵鼻則通聖散如奇連

寒寒麻桂表裏 寒傷皮毛氣不利而塞

熱塞芥連梔之類熱應清道

案

面紫黑酒氣薰蒸宜化淨生新回物加酒苓

付

酒瘡鼻血熱入肺服葉同前又拖末蜜丸空心白

經

鼻息肉肺氣盛枯鬱末綿胭脂最

鼻數目自消防風通聖散

鼻為肺竅不利有痰外為通聖散

林云主之血氣壅則通之極背通極已甚陳

鼻中生瘡搗杏仁和乳汁傳之

一口唇

因

傳云口病由七情煩擾而致也

病源云

刺配

治

目

治

目

治

治



赤口瘡

枯凡氣香浸第銅錄未搽

患云脾氣凝滯風熱加則致口瘡

唇緊口小不能開合飲食不得不急治則危名

青布燒灰酒調服

又馬齒莧洗

治

唇緊燥裂生瘡青皮燈灰猪脂調付

本

一咽喉

附古

之病多屬火熱雖有數種惟輕重之

公惠曰喉舌之病

異乃火之微甚也

微而輕者可治重者不可治

甚而急者針刺為上策

急緩

○後人詳其狀強立八名微者以鹹軟

紅壁

○喉痺多屬痰

重者宜用探吐法提其痰

○喉風屬痰熱宜探吐用燈心燒灰吹入喉中

第不下喉由裏中

○唯喉痛刺芥結耳煎湯漱服熱加芥殼

○唯乾燥痛四物加結刺知相立愈

○唯癰心腹脹痛者難治

○一方燈草紅花各燒研酒下腫消

○一方白梅鵬砂綿裹含

○傳曰卒然腫痛水漿不入死在頃臾

○會厭之面傍腫易治皆相火兩衝近耳

○經曰水不能勝火起于其真水易虧相火易動

大赤痛

大熱則

房勞則

火起于

腎之類故知

火者痰之本

痰者火之標

○治法必先大湧其痰或針腫處此急則治標之法也故治喉痺之火多救火同不容少待

從治

宜從治結耳荊芥羌活玄參木香玄參之類少加

當從類

干姜附子等為導

敵

峻用芩連梔柏而正治上熱未中寒也毒乘虛而入喉發喘不止不可治矣

不治

兩寸脈浮洪而盛喉痺也

宜製

喉痺及喉中熱痛等證用上好消梨汁頻頻飲之患者能自嚥吞下可多食為良

○此音不結并藥酒汁入薑汁少許時飲之

紅合

○古毒故血出曰古血香薷汁服之

○古卒腫滿口不治鎔底墨酒塗口下

古脈

○其云古思脈出口外雄雞冠上刺四盡盛浸古就

○一方治重舌喉閉朴硝白乳末捲入喉口

一牙齒傳

宜辨

胃之脈絡上斷

患熱飲

大腸脈絡下斷

患寒飲

止而不動

患熱飲

動而不休

凡痛。有因口咽風則痛甚者胃中風邪也。

有因口則穢臭不可近者腸胃積熱也。

齒齦宣露動搖腎元虛也。

憎寒惡熱口臭胃氣熱也。

四平腸胃之火又安其本。蘇升胃前痛犀芩。

外擦牙誅貴之毒以治其標。蘇升胃前痛犀芩。

治胃實熱齒痛上斷痛甚酒蒸大黃為君知升。

膏為佐頻令含噉即愈。

○多牙痛列缺二穴名也其痛立止永不復發。

○患口者脾之氣數牙者胃之標。

○牙齦齩寒寒則堅牢熱甚則動斷。

○斷股作痛 腎衰則齒齩精固則堅。

大腸虛則齩齩則浮 痔瘡則齩脫。

○丹溪云牙痛出血胃以有熱又有風熱則云椒

○實熱腫痛調胃氣加連。

○風寒不化冷熱牙痛皂莢犀芩房草烏。

○寒元惛熱湯用良棧細。

○熱牙惛者水用硝制雄姜黃。

○有齩者壯才用雄黃石炭。

△林曰陽明多血多氣以宜甘寒助其濕熱故為齒齩痛。

以黃連胡桐洗之苦寒厚奇芬芳燥相合作風寒之氣。

治濕熱為主升麻苦辛行陽明經為使牙齩腎之標。

以羊瀝骨灰補之為佐唐少許八角為引用為末。

擦之痛減半又調胃氣去硝四連以治其本服
之下二三行痛愈遂不復作
○治牙痛用燕屎丸疼牙咬之丸痛愈
○治牙痛嚼薑陸香燕其汁瘡
○又苦薈末先以鹽揩齒令淨然後傳末
○一方馬夜眼煖有性末敷上三愈
○小兒牙疳一時腐爛多有蝕及唇斷俱尽五倍
白霜梅 杉皮 煖 穿山甲 灰 白乳
右細末先用茶清布揩淨小兒睡着撒唇上
即愈

一髮髮惠

○足少陽膽之經其榮在髮
○足少陽之經其榮在髮
○氣衰弱不能榮成故髮落髮禿
○治髮髮用胡公素搗汁煮之即生
○長髮髮髮生髮皮結乾人參等分
右細末生薑一塊切新薑末髮落處搽之
二日一次用
○劉君安燒已髮舍頭垢等分服如豆許三九名曰
還精合髮不白

一解毒林

○解毒用藍根砂糖薄荷汁研水服之

○解毒用藍根砂糖薄荷汁同服

○巴豆毒也蕉根葉汁服

○治食河豚中毒白乳未湯調服

○河豚与荊芥大反故不同用

○中菌毒忍冬草生變遂愈又服地漿

○治盡毒白乳未耳草等分右細末每服

二不復還水調下或黑涎皆効

○凡人有毒之類飲食內先以犀角損試有毒即

白沫珠起多沫即多毒也

○食魚中毒濃煮楊皮飲汁

一救急林

五錢

○破散治癰瘰癧卒死墮壁升木所壓水溺金瘡

卒向發產婦急血衝心 謂主藥

半夏湯泡七次去滑為末吹入白雲中

或以皂角末吹入亦可又痛咬其足跟

○救溺水不醒白雲末末忌汁和凡末核模內下部

中其水自出 又發肺中

○救自縊心下微暖急使醒寬解微熱正喉嚨以

他人手擗其口勿急透氣兩時氣急即活○以藍

汁灌之○又灌冠血男雄

○救凍死口鼻口有微氣大釜炒炭令煖袋盛血尉心

上冷即見目開氣出後以粥清少進之若不先

或溫其心便用艾炷必灰或腳指痛

一方陳皮去白對水煎入生薑汁溫服

救五熱取慈黃心韭黃心男左女右鼻中刺入四五寸

血出即活

中惡

救中惡竹葉灰或蒼廬或出郊或拉空室於然

倒地服於手握鼻口出血切勿移動即親人圍繞

燒艾炷廬尉安息直候記省方可移屍廬尉

辰石為細末每服二升水調灌下

一方雄黃末一升桃葉煎湯調灌下

又灸人中中又灸臍中百壯

雜證配劑醫燈卷之三目錄

外科門

瘡瘍

肺癰

囊疽

瘰癧

癰疽

白癰

疥瘡

湯火傷

骨鯁

跌傷

漆瘡

醫癰

乳核

便毒

疥瘡

癰疽

如精瘡

瘰癧

木炭刺

蛇傷

跌撲損傷

破傷風

楊梅瘡

癰風

老人門

奉養

中風

氣中

虛煩發熱

診治

痿弱

痰證

氣血兩虛精神短少

秘閉

久嗽

小便頻數

積聚

頭眩

喘嗽

中焦虛弱

酸耳宜節

婦人門

月經

久瀉

痢

陰虛陽燥

眼昏

瘡腫

目睛耳聾耳

不審目眩不考

補陰龜鱉

血癥

傳月經
臨前
難產
嗣續

小兒門

扶積
回氣
貼顙
防微杜漸
小兒并治

節下六極
懷產
產後
斷產

刺泡
通便
乳哺
護養
觀形
聽聲

視手紋
傳歌并
兒疾回證
月裏
慢脾風
痰蒸
痰嗽
泄瀉
丹毒赤腫
疔瘡

審外證
惡候歌
驚風
五疳
外感
痘疹
食傷
嘔吐
腹痛
諸汗
小兒雜證
痘疹

辨發配劑醫燈卷之三

外科

日東雖知苦有

道三枝錄

一瘡瘍

傳

外科則

水調火灸

火灸

又云營氣不從逆於肉理乃生癰腫

又云熱勝血則為癰膿

又云地之溫氣感則害人之皮肉筋脈

癰

發

皮膚

之間

根小不過二三寸為癰

癰

腫

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

癰

淺

浮露而淺者為癰宜外消
藏伏而深者為疽宜內托
千古不易定說也

送

九逆見三則危

一。眼白睛黑目緊小一逆。不忌飲食納菜而呃食
不知味二逆。傷痛渴甚三逆。脾項轉動不便
四肢沉重四逆。舌嘶色脫唇黑面目四肢浮腫五
逆。煩躁時咳喉痛泄利无度尿淋六逆。膿血
大敗癰腫尤甚臭敗莫逆七逆。喘急短忪恍惚
嗜臥八逆。未潰先黑陷下青唇黑便污九逆也
噫氣痞塞喘咳身冷自汗目眩耳聾恍惚
驚悸語言錯亂皆是惡證也

五

五逆見三則吉

助身自強飲食知味一逆。便利調勻二逆。

神彩精明語声清朗三逆。膿潰腫肉色鮮
不臭四逆。体氣和平五逆也。

托內藥

目積毒在藏府助氣壯胃固本
行經活血為佐

委經絡時令使毒氣外發
消之早可以內消

奇

皮。紫急重惡而善
緩應重善而惡

△脈弁

浮數應熱不熱而反惡寒瘡疽之證也
乾見膿潰之後易治肺病相應也
滑去渴宜內消既潰宜托裏

始為惡
為熱

肺寒宜急下之。虎龍硝實。

肺洪大瘡疽之病進也。未結膿者宜下。虎寒朴。

潰後洪見難治者自利不可治。

肺微潰後見主自瘡。

緩脈滿遲潰後見。

脈沉伏邪氣深也。

脈濡弱皆宜補。重排膿托裏。

肺長舌短凶。

虛宜托裏和氣養血。參陳本甘地并芍紅

促急下之以陽益也。虎寒朴。

結陰益也凶。代則死。

牢則不可內湯。

河間三法。

外之內脈浮數。癰腫在外。恐毒氣極內攻。宜先托裏。

內之內脈沉寒。發熱煩躁。外无癰腫。痛深於內。其毒深矣。故難通。藏府以絕其原。

內外之中。外无惡癰之甚。內則藏府宜通。知其在此經當和榮衛。

三法已用。雖未即瘳。必无變證。

潰瘍。內外皆。雍托裏表散為主。

頭為諸陽所聚。木柱小而少。

腫痛以手按。然則有膿不熱有膿。

膿出而反痛。為主。宜補之。疽發深不痛胃虛死肉多不知痛。

腫痛時^{毒氣上攻}生薑橘葉

潰後^{腫毒補之}桂枝木門合

癰疽渴血氣兩虛^{生血補氣}忍冬

蒲公英化熱毒消惡腫散結核解食毒散

諸氣入陽明太陽

合歡皮入長肉膏某用之有神効生肌止血定

痛按骨結筋補虛合歡皮常服之驗矣

二便
大便
秘
加
木通車
大黃

諸經惟^{少陽}之經生癰疽宜預防之以多氣

少血也苟不知此速用聖逐利藥以代陰分

血禍不旋踵

此說云不惟初發宜且至如漏若膿水不絕內

注內尤宜隔附片灸之服內托之藥隔三日再

灸不五七次肉長矣

河間治腫嫩于外肺多浮病在皮肉非氣盛

則必侵于內急須內托宜後並散除溫散舒

使胃氣和平^{參黃芪苓}除溫散舒

如大便秘及煩熱少服黃連湯微利^{連根芍苓}

煩退却^{後並散}連根芍苓

針可施小證積毒在藏府使竭其血无益

十全大補湯宜後補血氣進飲食

一肺癰^{之肺證}見虛弱滋補血氣

肺癰^{之肺證}見虛弱滋補血氣

肺癰^{之肺證}見虛弱滋補血氣

先解表邪後瀉肺腸桔梗湯取膿終以黃

芪湯補裏陰

一乳核失治必成癰疽

乳房陽明所經升其正

乳房陽明所經青黛門

目

剪鬚取湯

破陰氣不行竅閉汁不通楊皮

厚味所釀

陽明血沸熱化作膿萬升膏

乳核初搽軟

吹汁二散

戒

忌針刀

生

入少酒煎服即欲睡安得一効也

青葉桃翹芍橘葉皂刺

甘節

若

至瘡破潰陷名乳岩重飲食如四見五內乃死

初覺者皮甘中並服

一囊疽區熱入肝經施治補陰佐之

玄膿潰皮脫畢九懸掛者不死

野紫蘊背紅燥未付黃芩桑白皮生皮作

一便毒一名便癰一名血疔一名驢馬癰

厥陰經區熱曰勞傷而發

流行道路也塗墜而為癰宜導水丸桃仁湯

灸大下之次和血行氣

野干三寸紅花生黃

已結敗膿虎笑翹桃朴甘草生薑並服二三行効

又名路岐衛任為病見於厥陰經之分野其經

臨

臨

臨

多血者熱鬱血聚而凝也
鹿茸於陰後脈能通

初宜疎利之即散
暖後如常用托裏內補桂芍甘並具合益

一療瘰癧
梳要云結核是也

必起於少陽一經不守其志及陽明
在耳並耳後耳下及頰頰在頸下連缺盆皆

或任胸及胸之側或在兩腋皆謂馬刀

手足少陽主多氣少血故大小无定

旦毒白瓜旦熱丸
須分虛實

婦人見此證者月經不來實熱便生

自非斷慾淡食神仙不治尚忌嗔怒愁恨

在
上焦芩 升槐
中焦連 芍藥
下焦芩 芍藥

凡用藥之法不惟瘰癧家

一疔瘡
如丁蓋之狀

五藏內蘊熱毒而致

初起瘡心先痒後痛先寒後熱四肢沉重心驚馬脈

見大其者此逆者難治

凡丁腫者口中頰邊台上有赤黑如珠子者

是也

毒入脈則煩悶恍惚似醉與三日死宜速治之

一癭瘤

癭有五石肉筋血氣不可決破之則膿血滿

積多致大枉

痛有六骨筋石肉膿血惟脂痛可破去脂粉則愈餘五不可枉破

一癰

遍身癰有虫晴明舍之撮虫者用針穿頭如挑出虫即愈

腿膝膠牛皮癰牛皮燒油付

白癰凡小癰石上以鉄燒紅腫出油搽之効

一婦精瘰癧汁淋漓臭煩惡前蛇芷核硝煎洗

連敷先以地骨蛇床煎湯洗帛拭乳藥

津調敷又田螺燒末入麝粉付

一方雞膏為末乾傅雄雞乳好龍付

一疥癩脾肺凡邪客於皮膚渾身癢癩致生

疥癩及不癩硫椒膏搽丸細末油敷

一方加雄雞

一方苦參蛇床白丸末荊芥各等分右劉並湯放溫洗

一瘰癧

取蜘蛛絲經於根下妙

一方用頭髮經於根下妙

灸瘰癧子上二壯，以水瀉之，即去。

一湯火傷

瘰癧口生肌肉，拔熱毒，止疼痛。
欬瘰癧口生肌肉，拔熱毒，止疼痛。右先將房入油。

婦刺黃蠟

各二兩

麻油

四兩

右先將房入油。

並焦黑色，去粗，入蠟，攪放冷，攤貼之。

一方：輕粉

少許，槐樹皮

溫則乾付。

右研細油調付。

一方：赤石脂、寒水石、大黃，右等分末，水塗。

一方：單麻子、蛤粉等末。

湯拔油調塗。

一方：生胡麻杵如泥，厚封。

熱油燒痛，以白蜜塗之。

一方：木簪刺。

沿木針刺在肉中，不出生牛膝莖搗末。

塗之即出。又搗蛭蟥傳之効。

一方：象牙屑，研細，搽之。其刺頭出，用手指甲搽之。

一方：以鼠腦搗如膏，厚塗即出。

一方：野苧根洗搗如泥，丸龍眼大，含喉中，効。

出未出，再服。

一方：取虎骨老末，水服，方寸匕。

蛇傷

初傷針，挑起咬處皮，輕

擗，勿遽用雄黃等粉，未惡毒氣，不泄及攻其肉。

擗，勿遽用雄黃等粉，未惡毒氣，不泄及攻其肉。

毒氣入內眼黑口噤手足強直

白凡

或以貝母末酒服查付

又白凡燒汁熱滴咬處立愈

一獸傷

春末夏初大多狂尾直下不卷起口流涎舌黑
被其傷極毒急於无川處吮出瘡口血若氣
針刺去血熱小便洗

明凡末入瘡口畏之痛止速愈

一方嚼杏仁付

又葱白搗爛貼

又以牛屎塗

馬咬人毒鼠屎燒末猪脂和付

鼠咬

貓咬薄荷汁付之

鼠咬麝香末律調付

一跌撲損傷

跌撲損傷

心機至妙妙振要畧以備急用

理傷續命秘法

一煎水洗

四用力收人骨

七用凡散敷損處

十再洗再用

撲墜及損氣絕不藉取某不及開口以熱小便灌之

凡損一月尚可整理及則不

凡損腫是血熱某水炮洗黑乾敷付

二相度損處

五禁止

八夾縛

九服某

六用黑乾散通

三拔伸

桃葉百草

穿丁皮芹

血瘀 升

右研細按傷處初傷加麝香少許
 鑽不出搗鼠肝久者快氣之鼠腦亦同即出
 杖瘡皮不破內損者蘿蔔搗爛卷之
 跌撲損傷一絲血入心即死
 鷄鳴散墜下結癰瘀血較積痛不可忍
 並以此茶推厚
 虎二兩杏二粒右研細入酒再並煮粗雞鳴時
 脈至曉必取下瘀血
 用舌而不用桃者以行氣中血也

一漆瘡 林

一方薄荷水蒸洗瘡上即寢
 一方以韭菜研傅之妙
 一方以湯落芒硝令濃搗之即愈
 一方蜀椒煮湯洗之妙
 一方用芫荽煮湯洗之
 一方芥菜煮湯洗之

一破傷風溫

若夫破傷風症因受風寒破皮肉注之視為尋常
 殊不知風邪乘虛而入客熱之漸而變為惡候又
 諸瘡久不愈口肌邪亦已內聚或傷風而傷火
 之毒氣亦與破傷風邪無異
 破傷風邪在風則傷風而方一得効
名入三焦則傷風而方一得効
名入三焦則傷風而方一得効

升 升 升 升 升

凡金瘡卒

汗起中風也 也自出表汗者中風也

又瘡不在瘡處者傷經絡亦死

金瘡瘡者由血脈壅滯口急背直搖頭腰反

氣絕汗如雨不及時救者皆死

瘡口未合

血入為破傷風 風入為瘡

脈長而有力陽明下之

浮而強緊少陽和解之

背後羌獨芸甘 苛陳

白芷獨芸甘 葛生薑

兩旁紫芸甘 石菖蒲 石菖蒲

大便秘汗不止脈沉在裏氣下之加枳

林曰破傷風熱燥甚憊當在表而裏氣尚平者善伸教欠筋肺拘急或惡寒或筋惕而搐脈浮數而弦羌獨芸甘 石菖蒲 石菖蒲

一楊梅瘡

附腫瘡

楊梅瘡一名綿花先年而廣有之近年以來梅毒瘡發速勁輕粉丹麝香等毒劑幸而人建實用之可以也

腫瘡者由胃虛肌邪毒氣外攻三重之旁流注

兩脚生瘡腫爛痛臭難步生於腫骨為重者

上由少皮薄致通愈多年无已瘡爛皮爛肉現臭不可聞

治法先取與然後敷藥

五信錫丹雄乳浸芷
連軀栢海蛇龜板凡

一癰風

△患曰大凡有五黑色不怡

集要云病者救

與食

肝有黃葉 芍藥 青 菖
肺有黃葉 芍藥 貝 升 苓
脾有黃葉 芍藥 子 芹 半 蒺
心是虛寒 膝虛腫 苦 連 翅
胃耳鳴 嗽 耳 綠 生 癰 犀 角 地 黃

痛痺如針刺 食身則 皮膚如喪行

逆頂

白

逆下起為逆水

動作勞 大黃 爵金 白牽 皂刺

後以醉仙散或利或不利不必畏怯

丹後云後用通重散更以針委中出血
血已全愈不絕味斷惡皆不免於再發
此偏身患瘡膿流汗陽浴浸半日大効

傳云治要

先

然後

生血 榮血 陰陽升陽

腎為治之急務也

每

八方之肌起回於八方應其時則物生遠其時則物
外陽明一經謂胃與大腸也

柴

治法

先太浮惡毒結積奴虎牽鼻刺已

林曰

又針看肉黑處及委中紫脈刺出血

上先見者在上取涎血於齒中出
下先見者在下取惡物陳患於穀道中出
取重者路殊皆不外乎陽明耳

老人

一奉養

血氣資

惠曰高年之人真氣耗竭五藏衰弱全仰飲食以資氣血

調停

無度動成疾患凡人

食

為人子者得不慎之若有病先詳食醫之法

成

飲食不可煩飽恐腸胃虛不化消納也

床

常令大隨侍不可令孤坐獨寢

枕

枕宜低實以菊葉花散則夜無歸心長則轉不容慢肌

衣

老人多困坐則衣散左右置榻衣散兒免閃側之傷

水

衣服不宜寬長宜窄衣貼身暖氣着休

藥

老人然憐不官泊調在人清養以延遐善宜禁

一發治

奉親無怠無忽方須行休壯之氣恭恪

患

四人生至六七十之後精血俱耗平居无妄已有

常

熱證何者頭眩目眊肌痺弱數鼻牙落隨多寐少
是弱耳聾健忘食不運腸燥面垢髮白眼花久坐兀
睡未几先寒食過易飢矣則有液老境无不有此

常

烏附丹劑不可妄施至於飲食烹炮亦宜有節
倘時有煩渴腸熱大腑秘結但隨時以常平湯

平

茶微清解不得頻用刺胸之革苦寒之劑
宜煩治之過平腹氣進食補虛中和之革

戒

不同少壯用狼虎之劑務求速効
汗之則陽氣世

戒

若此之則胃氣逆立致不虛大戒也
陰之則元氣脫

戒

父母有痰當以迎醫驗方合少革為務
尤為難療

年

或

口大眼二指
口眼歪斜

麻痺

皆中風之兆也

便可服風藥或因
至中則危矣

隨證治之

痿弱

老人精血虛耗使皮肉筋骨痿弱無力故致
痿弱狀與柔風脚氣相類

不可藥作凡治由肺金燥血液衰
百穀故也

後

一氣中者先以藿香瀉之醒後勿再輕用
熱虛寒別調之

逆。

治後疾升

證曰

戒

无故而痛脉不至不治自己謂氣暴逆也急後則

乙

一疾

逆老人至多

大陰冷瘕多成骨

熱疾多煩熱。風疾多成癰瘰。冷瘕多成骨

痺。溫瘕多成怠軟弱。驚疾多成心痛癰瘕。

瘰。溫瘕多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

瘰。瘰癧多成瘰癧。食積瘕多成痞痛腫滿。

一老人久瀉，胃液耗少，元積者必先實脾土，養陰升，
胃氣為主。

一老人久嗽，肺氣不足，滋陰補氣降痰為主，不可驟用
劫藥，滋劑恐凡寒溫等邪，得誤，無由清散。

一老人痢多由溫熱或積滯，但虛實不同。
老人脾弱當補氣，陽世分清則可。

一老人小便頻數，宜滋陰補腎氣為主。
一老人陰虛陽燥，凡七情所傷，五志過極，十居八九，
不可香燥辛熱之劑。

一老人積聚，有原氣，由氣虛表，惟宜攻補兼施。
以陽補後陽之。

一中年以上，眼昏非素有熱證，不可服苦寒之藥。
及燥劑，凡利大抵原氣，陰氣不足。

一已遠視，不己迎視，乃氣虛血盛，老人采榆之象也。
迎視不己遠視，乃血虛火盛，原氣不足而然。
宜甘寒沖淡地黃、山茱之劑，滋陰養氣。
一老人頭眩，
如大瘕，與溫熱七情六勞，宜分治之。

血虛者用 外陽補氣
滋陰補血

一實者，因凡火所動，宜清上降火，茶橘
食宜清導，朴陳枳縮。

一一年高之瘡腫，最忌
若陽虛於陽則為疽，
陰則為癰。

一老人喘嗽

溫補則甚

火來肺

峻補則危

戒

一老人目瞤耳聾

腎水裏而心火盛也若峻補則腎氣固大耗茂矣

中焦虛弱曰證

證因

林曰至於飲食尤當謹節夫老人內虛脾弱陰虧性急內虛胃熱則易飢而思食脾弱難化則食已而再飢陰虧難降則氣鬱而致痰至於視聽言動密敗廢懶而不如意怒火易熾雖有孝子煩瑣亦是動輒扼腕況未必孝順乎
物性之熱者炭火制作者氣之辛辣者味之甘膩者其不可食也明矣

遵頂

一惟飲與食

將以養生不官致疾

若君所養

轉為所害恐非

君子之所親孝與敬

也如之何則可曰

如生如死

人之常情為子為

一不盡壽曰證非孝慈

程子曰病臥於床委之庸醫

比之不慈不孝

醫化无究人之虛實形氣脈證而製方有病之變

俗俗有不同

酸甘宜節

林云酸醃甘以之調和祛陽陰可適口若和單

肉其致病巨

人前不知

肉其致病巨

慎

酸收也人巨遠之亦却瘦之一端也

一補陰龜鑑

俗以肉為補性之物肉无補性惟陽補尔今之
虛損者不在於陰以肉補陰我緣木而求魚何
若由性熱入胃便熱矣之便生瘰多氣便不

降而精證作矣

久病後用作養田氣三非張氣

所以使味為自養之良方
所以安胃使內火不炎之

一月經

婦人

一應日月信

調理應時則病不生
一有邪氣則諸病生

母溪有



香林白濁如

邪氣治之無效之偏
尤差治之無效
朴陳治之無效
若元氣虛弱之偏
若元氣虛弱之偏

過期



納冷下硝攪僕救丸溫酒下下如赤豆汁未下
再服鮮紅丸則止服調血養榮養之

一傳月經

因

經閉不通之證先因心虛不足心血虧耗故之血以

或先或後

因證

燭肝而出納之用已竭
月經金雞腎水既乏則經血日以涸
腎肝之相火扶心火之勢亦從而相弱所以月水錯

經妄行無時而後溢也
不早治至崩中化為白濁

白淫血枯發熱勞極不治
血不足經氣奪也

大抵經閉不行初皆由心虛不足致月經不

正邪恒

調早不調遲直至危最妙手莫亡也

經

寸脈微而隨

微衛不足
隨榮元陰

經

寸脈沉遲

沉水

跌陽脈伏水穀不化脾寒瀉胃寒腫

水

經新後痛水血分難治
病水後經新水易治

身

一婦人帶下六極之病脈

淫腸哈股痛
數脈痛

患

婦人帶下脈厚惡寒漏下者不治

治

七情傷心氣停結故血閉

調心氣

血生而

瘦人子宮无血精氣不聚亦令无子以四物養

血養陰等藥桂紅板蕪等

風雲 戒報

血為氣之配

或現氣之入
行後痛氣血虛
行經氣折氣
禁熱

今將為冰冷行溫
熱禍不旋踵

婦血病宜用當歸瘦人忌服 芎下溫熱白氣 四物加蒲芎止血妙有 摧

○ 帶下溫熱

用當歸 肥白与参芪
瘦人 与商陆
白芍 四物加前苓止
赤芍
氣建 参 芪 苓

二陳加水
血虛者其地為推

斗。下。胃。痰。下。入。膽。胱。當。分。二。陳。加。木。升。柴。

肥人區癯梅拓而半本芎藭陳參生薑

瘦人常此差有熱也陽萎遺精生地栢蛤

經曰陰虛陽搏之崩

當陸陵水本生 去熱芍門連

卯

○益母一名稚治赤白帶下惡露不止婦之仙藥也
△經水常過期而來者

洛舟

瘦多，是血少，而倍折。

加蒸可佐紅桃為生血引用土

經秦過界過新往來各九日
萬里
參戎甘苦半陳隋木

老婦年五十三血崩久不止。請一知柏。

血止不再行矣。有性四物加茅花芷姜。易因民。

立妻妾湯調服

經絡不止其色上
下陷於腎與相火相合

無腫痛或臍下痛見寒也

母宜補脾胃升氣血或四肢困倦心白

之衣
則下
升堂
生要

急則治標白芷湯調而草霜甚者棕灰或五灵

胎 半生 半炒

酒下蓋五灵

緩則治本四物加芩連參芪芍姜或加煨灰荊

國

或

思慮而驚下血

皆為氣血虛損精氣累傷而致其病本一也

宜

又曰思想无究所願不得意淫於外入房太甚

治

發為白淫及白濁男女皆有之不可此為白帶

調結滯槐葉青

宜

陰濕苓目无蛇

者熱芩連栝門

散氣能生要之經

禁

發中兼補

補中兼利

發中兼外發

之例

紅白 麥粒治 紅帶下

量的腑中 轉皆後脊中灸七壯即愈

一胎前

婦人懷孕 心小腸之三經

宜

一月肝脾養之

宜

三月胃門脾養之

宜

五月脾肺養之

宜

七月肺脾養之

宜

九月胃脾養之

宜

至期當養之經

宜

甚則胎落考月數

宜

經之氣血多少

二月脾肺養之

四月三焦脾養之

六月胃脾養之

八月大腸脾養之

十月膀胱脾養之

不調則胎不安

去其

心脉動甚者，妊子也。心主血脉，故也。
脉經曰：腎脉按之不絕，妊子也。腎為胞門，子宮

胎產之病，母犯胃氣，及上二焦，謂之三葉不可辨。

妊婦當純，嗜慾養胎元。

宜動，宜靜，宜涼，宜溫。

性，宜靜，不喜，味，不喜，衣，不喜寒。

古傳曰：不孝有三，無後為大。

古詩曰：无官一身輕，有子萬家足。

脉經曰：婦人三部脉浮沉正等，按之无絕，妊娠也。

左，沉實，男；右，浮大，女。

左，尺偏太，男；右，尺偏太，女。

大陰洪而女孕，胎也。太陽大，爰男娠，勝胎也。

我，丹陰曰：婦人无子者，多由血少，不忌損精，恣意為。

子宮，建冷投辛熱，得施一踵。

或脈又不和，火性至熱。

林曰：之嗣，治婦當養血，抑氣，慮急男當益腎生精。

節，慈。

懷妊嗜物，乃一截之產，如愛酸物，乃肝臟正也。

養胎而產也。

惡阻，乃有子而惡心，阻其飲食也。多後，痰治用。

二陳湯，治每孕，隨水湯，若未調，服安胎聖藥，俗懼，若。

胎動，腹痛，因飲食，冷熱，動風，毒物，因交合，操。

動，因節，傷，犯，胞胎，張，氣，不和，服熱藥，太過，氣。

血相于急服順氣安胎藥有為地木參下大妙

胎痛乃血少四物加前為末藕湯下大妙

腰痛不舒急宜通氣散陳朴柴枳芩枳已

林云平常情鬱氣滯而中脘伏痰由飲乃後經

閉飲血相持氣不通遂心悶頭旋眼花肢倦思食

氣喜酸酸多臥少起甚則吐逆煩氣理痰自安

曰天動胎逆上作喘急用雅芩香附

胎漏氣虛有熱四物加膠木芩縮沙續芩根

胎腫多濕枳殼末末湯調下芩枳桑枳藕

胎淋酒色過度或食積水逆涉少芩版門通燈

轉胞東受怯弱香已致之舉起脈系得

不便不通夏間多食吐急疎水道自行四物加參

水事陳甘生姜蜜心飲之探吐通也

胎瘕榮衛虛脾胃弱或風寒生冷所致急服驅

邪散吳待吐逆惡食難治倘夏末秋初感風

暑納涼而致或清脾湯青朴木紫蘇

胎煩心驚膽怯終日煩悶曰二火為之病門芩升參

有娠月變至末必血盛者榮衛有風則經血土昏動

四物加前陳

胎刺目物視解冷熱不調胎氣不安血氣凝

浮下利赤白後重疼痛宜黃連丸黃芩湯之類

胎傷寒寒熱往來小柴去平門芩葛蘇貴

胎咳九聖心胸滿悶黃芩湯甘桑杏門

胎喘脈痛肩節痠疼朴實木地甘生姜

胎冷多食生冷感風涼三便數渴服急姜木陳

胎

胎

產婦服藥
宜忌

胎熱衣煖迎火食熱頭疼眩暈頭腫四物加蒲黃
胎肥口厭甘肥飽即睡臥行動氣急懷產必難入
月可胎枳殼散之類苦芍甘生薑
木香枳殼芍藥

失音不語无害當十月後自復

隨胎乃屬產一者視其輕重而治之

每值頓仆口噤難起宜湯熨並湯服探之不
損則痛止子母俱安若胎已損立便下

紅莧馬莧俱隨胎順產煮服催生

一 險產

惠曰該產之婦肺魚為經而腰不痛未產也若
腹痛且令扶行或痛或止名弄痛不可手探試
水亦不可屈腰眠臥如腹連腰痛甚即該產也
致其尺脈轉急如如繩轉疎者即產生之脈也眼中

戒法

如見火光此是兒轉也又須令扶行須使物立真
至顛陣痛難以行立乃坐草句太早恐胎難轉
及胞水先破子通氣後皆致難產

一 難產

戒法

傳云難產富貴奉養
安適有之貧賤者未有此也
陰月不可洗頭以免橫生逆產

產母甚痛不肯舒伸行動曲腰眠睡致至難產
產母勸力調養不可妄用力兒身力轉便用
力令兒轉路須待到產門困力此所當用力也
產母不令飢渴致乏力
且煎催生符水
胞漿既破三時後不生當服催生藥本胞內養兒

戒法

種效

因

羊

同

慎告

之水也。並百單。麥子。陽。後。厥。苦。折。鞭。鞭。桂。紅。牡。

難產皆由產婦不遵國性之道理講說。

兒身纏轉而未順用力一遍遂生核逆。

產難數日子死腹中不出母氣數絕。瞿。通。桂。膝。

榆皮。右。懷。並。領。服。已。臨。胎。紅。鞭。赤。未。損。可。安。牡。芍。桂。桃。

或。食。毒。物。傷。胎。下。血。不。止。胎。已。死。而。下。效。九。立。効。

參。各。手。右。細。末。蜜。丸。淡。酒。湯。送。下。效。九。立。効。

難產惡禮。身重。體熱。作寒。面黑。舌青。及。舌。上。

冷。子。母。俱。死。面。赤。舌。青。母。怕。子。死。面。青。舌。赤。口。沫。出。

母。死。子。活。唇。口。俱。青。吐。沫。子。母。俱。死。不。可。不。審。預。

與其家言之。

胞衣不可待待稍久非難產母疲憊且血流入胞中。

多血。腹上。衝。心。喘。急。痛。悶。必。至。危。殆。宜。急。剖。隔。帶。

效

索

獨

獨

獨

巨。步。物。繫。墜。之。尤。宜。用。意。拴。縛。然。後。割。斷。不。

熟。則。胞。上。挽。心。而。死。其。血。不。入。胞。自。萎。縮。綿。延。至。

數。日。亦。不。害。惟。婦。心。懷。鬱。悶。則。不。可。妄。用。手。法。致。阻。產。

麻。雄。黃。研。膏。塗。母。在。足。心。下。即。脫。去。

胞。衣。未。下。灸。右。腳。小。指。尖。頭。三。壯。

橫。逆。多。因。坐。草。太。早。努。力。過。多。兒。轉。未。速。破。水。其。血。

氣。致。核。逆。宜。白。芷。百。單。最。同。其。血。脈。之。如。魚。得。水。

運。故。也。胞。子。五。六。分。月。紫。蘇。煎。加。補。氣。藥。

盤。腸。產。者。限。產。則。子。腸。先。出。產。後。其。腸。不。收。用。醋。

半。盞。冷。水。七。分。調。停。噴。面。每。噴。一。縮。三。噴。收。盡。

良。法。也。或。半。夏。末。搗。臍。中。即。收。

才。胞。衣。又。下。死。胎。并。腐。肉。一。不。重。便。熱。脹。

同

如軍散腹產脈則易產并治胎偏胞乾難產痛劇
赤蓮芍藥花焙末二小酒下死胎紅花酒下

一產後

傳

胞衣未下粗率之婦摘取破尿管致終身之害
或取下肝系強命

極本

丹溪云產

常清熱養血為主
後宜大補氣血為要

有雜證以未治

升

其病多變血虛之發表
產後亡津液胃燥故大便難
產後亡陰血虛陽氣独盛故頭汗出

升宜

產後血暈

目下血過多
若係敗血衝心
又應發火作暈

宜分治

絕強

肺虛

產後補建用參芪朮陳歸芍可
微加扶苓陰痿類
甚熱加干姜

大熱而用干姜何也曰此

熱非有餘之邪熱乃陰虛生內熱耳益干姜入肺利
肺氣入所引藥生血必與補陰藥同用也此造化
之妙非天下至神其孰能與之
產後惡寒發熱或口服喝料等證皆血氣虛甚
當以補氣血為主切不可用表散劑
左 手脈不足補血氣多於補氣藥
右 手脈不足補血氣多於補氣藥

兼服痛者當去惡血
若脈滿者非惡血也

惡露方下忽然斷絕寒熱往來

日輕

狂言見鬼

此藥入血室小柴胡加生地

產後敗血乘虛流入四肢面目四肢浮腫作水氣

治殺人四物加減血行則腫消

惡血不盡小腹痛苗尖桃仁莢并尾桂酒芍生薑

積血刺痛桃紅并尾

產後血暈猝倒及磚石燒紅投醋中薰鼻

新產後禁芍藥十日內以養代芍

惡露不盡小腹痛五靈脂并桃紅并

大便秘結津液暴渴橘杏丸桃紅壯

脈脹滿悶吐逆因惡露下少敗血乘虛散於脾胃

抵聖陽芍半蘭陳參甘生薑

口鼻黑起鼻衄緣氣滯血破榮衛不理虛熱變

生此證不治名曰胃絕肺敗

不消

喉中氣急而喘因下過多榮血暴竭氣无所主独

聚於肺故喘名孤陽絕限不可藥救

產後五六日強力下床月裏房交發怒得病之初

脈洪口燥肌由動漸致腰背筋急強直者不治

產後汗出多而發熱虛汗凡邪搏之口燥強直

出如雨手不反抵不治

產後虛氣血俱傷或飲食不消冷熱不調止吐下

利

產後咳嗽惡露上攻流入肺經起見甚危

乳母小水短少即憂病生調理桃紅并尾

收生者不獲損破尿管而致淋瀝并芍桃陳

養養草木並極危

一月而安益氣血驟長

蛇蝎犀

宜忌 其胎自完恐遲難成印

催乳 通乳汁之劑瞿通紫柏桔芷青為麴甘門姜

治兒枕痛并桂延右末童便下沒鞭紅牡

產後限虛發熱日間明了四物加柴

產後限痛四物加藁朮

產母子腸不收八物加升莖芒

產後中凡口目不正八物加附前少加

一嗣續 患云女子經過一日三日限血無年精腰血屬志男

或有感而不孕蓋男精四日六日限血無年精腰血屬志女

有孕而墮者或男貧陰无度故常梁之婦与教霍不金

或女嗜慾性剛

然女人當補血抑氣以陰怒地并為

男子宜節房勞胃強精地蛇餘

受通有度陰陽均平則有子矣

肥婦素厚又恣酒食親之軀益閉子宮宜行痰

燥臨而平木芽先類朴苓陳

瘦婦性急子宮乳脹无已振枋氣宜涼血滋陰

四物加芩芍樞門第

卜男女合卦法

以父年止為上文

以母年止為下文

九遇

一三五七九為陽為單

二四六八十為陰為折

女成男壽亦不過五六七
抑氣散氣益於血所以无子或眩暈怔忡体疼

胎滿密治 陳茯苓 芩 妙甘

右細末空心白湯下

一断孕

惠云新孕之流非惡其生亦救非理殞余為也。每見婦人生理不順怕產。亦有中年多子而不孕。往服毒藥或用外術。胎多致殞。絕反傷其生。故錄四方以備。新孕丸 芩 半斤 砂黑末入水銀三斤水調丸 茶湯下

一方用蚕布紙一尺燒灰醋湯下永不產紅粉桂并尾際芷牡蛎蘇木 升如陳 酒水煎

各藥各即服常有即起燒灰水服不化新產无子

一找穢法 小兒 穢

嬰兒在胎中有穢液生下俱出多急用帛軟拭淨然後連汁灌之

一刺泡法

初生下即死急看口中上膠有泡以手指摘破用綿拭淨便活血入喉不治

一四氣法

初生氣逆起不啼蓋因難產氣悶或冒寒所致多驚寒者可斷臍帶且將胞衣置炭火上燒之

他藥如煎油燒臍帶得火氣入臍腹便更
氣回方可以治新胎者

一通便法

初生二便不通腹脹欲絕急令婦人熱湯漱口
吸吮兒前腹後陰并臍下手足心共七處每處凡
三五次嗽口吸吮紅赤為度

一貼臍法

出胎時被爪鼻塞而星末姜汁調麝香貼
于臍上痛去即除

一乳哺法

凡初乳先須捏去宿乳每晝夜即吞集之啼末
來勿与之

乳後亦身食哺後不與乳脾胃怯弱乳食不
相併難以消化

細

大則成

而結於腹中作痛

一防微杜漸

疳成廣成癰成積後始

小兒難

同證

藏府凝結而峻

耳

夫孺子在襁褓

內無七情六欲之文戰

疾業多與考其證

外元大凡大寒之相侵

惟勢姑息不忌

防微杜漸

或水

滿而脾與肺

一護養法

數週歲與肥甘而病由是而生

戒

。夫氣和腹抱之使。見風且血氣凝。肌肉硬可。
耐風寒。常令氣着地氣。筋骨壯。
若厚衣過燂。傷胃損脈。卒瘡癰汗出膿。
理開風邪易入。
十六歲已前。張氣未成。不宜過溫飽。下体主。
陰得寒涼則。張易長。
又腸胃脆而窄。由果麵燒炙稠粘等物。宜忌。
苟務姑息。所歎即与轉。成痼疾。悔何及。

一 小兒升法

凡小兒之疾。不亡自言。惟審脈觀形察色。听毫。
視手紋。詳外證。
。變蒸之時。身熱汗不出。不食。食之即吐。吐者。
此其參差也。

一 觀形

先視其眼。无光精不運轉。目睛无精芒如魚眼。
猶眼者。不治。或神藏於內。而外若昏困。神。
氣不脫者。无妨。
一 察色。

面黃俱黃。眼睛窳視。此驚邪入肝。
面紅唇赤。晝夜啼。此入心。

面青。栗辟喘。此入肺。

面色淡白。喘息。此入脾。

面黃。吐乳。不食。此入胃。

又腦背百會穴。下有二椎。青脉下對耳尖。久。

而愈者。不治。

一 聽聲。

下對耳尖。久。

惡

喘急 浮者易治 沉者難治

如鴉虫彈不活

一視手紋

三歲已前有患後看虎口

男左女右 次指才節爪圖

天 脉 病輕 可革治

有 脉 病輕 可革治

歌云 紫爪紅傷寒 青驚白色痢

黑睛目中惡 黃即困脾端

一審外證

咬牙甚者發驚。口吐涎沫叫表裏痛。昏睡善

驚將瘡疹。吐瀉昏睡露睛。胃虛熱也。吐稠

涎。無脈。不露睛。胃實熱。瀉青白數

不代胃冷。吐瀉乳不化傷食宜下。身熱飲

水熱在內。瀉赤黃胃熱毒。呵欠面赤爪熱也

身熱不飲水熱在外。呵欠面青驚風。呵欠面

黃解虛驚。呵欠面多睡肉熱

一傳歌并

廟瘰眉頭微

陽赤唇赤

先望孩兒眼色青

陽男插左无事妨

女插右邊我一口治

喘口眼斜為言

顛門肚起定為水

身熱或玩如盡足

驚凡面頰紅

毒熱眼脹

次看背上冷如水

搖右金父甚可驚

若逢搖左痰非輕

蝦有仙丹也

此候應知

去過七日人全愈

鼻門黑燥渴難禁
肚大青筋俱西候

面黑唇青命莫存
更煩脈有直身紋

一惡候歌

眼上赤脾下貫瞳仁
鼻乳黑燥肚大青筋
指甲黑色忽作鴉聲
魚口氣急喘不作聲
用羊屎救十无一生

顙門腫起兼及作坑
目多直視視不轉睛
塵古出口噓嚙咬人
蛇虫既出必受死形

一兒瘕曰瘕

小兒大率病有由吐瀉驚疳曰有二三飽白煖
治小兒業與大人同止剗剗小耳
小兒死後驚起忽然大叫是大火發其氣重甚

故也必死

一臍風撮口

新臍常後水溫風冷入於臍
脈臍腫身體重者而肢柔直日夜啼叫不止吮
乳甚則索為爪搖
若臍邊青黑及爪甲黑者不活

臍中汗出并痛拾丸末或黃朽末付之
一月裏

臍中受驚故未滿月而發驚上視肢硬搐搦手

足角弓反張痰壅舌胎多宜辰砂研牛黃少許
乳汁調蘇入口中母服防風通聖散
生薑生下通体通黃身熱二便不通乳食不進
藥出母回受溫熱或衣被太厚所致漸減至綿

服聖地黃湯子

先中黃散托裏

生赤如丹塗者

次用益母散塗外
乳母服清涼散子

鼻塞乳食不用
牙皂草烏葱涎杵成膏
貼額會甚妙

驚風

驚

八歲已前真水未旺心火已炎金受制无平木
故肝木常有余脾土常不足

飢飽失節中氣損傷
衣服不調外邪侵襲

故急慢驚風作矣

治升

急驚風屬

肝木風邪有余宜清涼苦寒瀉氣
脾土中氣不足宜中甘溫補中

急驚風屬陽名驚熱於心脾外驚有驚門前

丹溪云屬熱痰宜降火下痰養血

東垣云急發壯熱肢搐痰壅面赤曰大急大驚而
發搐發過如鼓此元陰也

或食生冷油膩隔寒有痰肝有風熱而致涼驚
凡主之虎連苦芳芳膽寒辰槐花
今立神方先瀉火補金大補其土

蒼參甘甘區區元氣

白芍酸寒酸仁厚肝補肺

經曰熱淫于內以甘瀉之

慢驚風屬陰受病無靜乃危似搐不搐不其搐
丹溪云類厚利將成慢驚白朮散加減

東垣云面青无脈口急冷多啼不寐上視牙緊

如教

嘔涎或汗多因病後或吐瀉中虛身冷昏睡露睛此元陽溫白丸

或腹冷吐瀉如嗽面黑唇慘胃脘鳴聲口舌白瘡發

直頸搖喘廢口眼手足一逆牽引者不治

丹溪云脾虛乃為慢驚多死當養脾

急驚為元陽之證十生一死

慢驚為元陽之證十死一生

急驚痰熱養血葉煎湯下降火清痰之九子

慢驚脾虛參朮並湯下安腎丸

急陽之動而速合涼降

慢驚靜而緩合溫補

一慢脾風為吐瀉損脾逐凡則无凡茲驚則无驚

凝洋而然

小兒頭面溫而足冷或

一五疳犬肝羊心牛脾雞肺猪腎也

五色丸主之

又有凡食

一痰涎有十痰五痰

長血肺全精神意智

之服胃虎之轉瓜

母漢云定胎毒散

重

腎臟府由受金也

此時看唇只上唇微腫如

臥蚕或有疎泡子切不

痘疹

食傷

三證

外感

傷寒

喘急悞寒口中氣熱而欠頓

胸項急鼻窒

痘疹腮赤聲多噴嚏後動昏倦耳股冷睡中驚
傷食大便酸臭肚腹堅緊乳食不消化宜下

痰嗽

治大法久病下
量虛實寒熱加減

肺

後喘面腫身熱浮白散知曉車陳批
咳而膿血表肺熱食後甘桔湯

久嗽者肺亡津液阿膠散補之肺萎桂合合

一嘔吐

吐乳不止恐脾凡白朮散驚吐目赤而吐
乳面黃安神凡冷吐蓋薑散姜米煮

積吐脾胃傳食不化而吐酸臭蓋薑散熱吐薑燕
作湯發吐小柴加姜交精時喘乳吐乳服慢黃

一泄瀉

母厚云類厚利將成慢驚白朮散驚瀉
目赤而厚用丹厚方之核厚

積冷海藏有虛冷洩泄如水白朮散熱瀉日陽
瀉赤五心熱益元散疳瀉厚如爛泥肚草

一腹痛

母厚云多因邪正交爭厥府相擊而作
有熱熱扶冷多是飲食所傷

治法不而執按三

熱痛面赤肢煩手愛心熱頭清涼加奴膏。
挾冷痛面赤冷甚而色變則面黧爪青。

蛇蟲咬痛宜詳證治。

一丹毒赤腫身熱如火由風熱毒在於腠理搏於血榮於外皮熱而赤如丹腫如名不得法肌爛毒氣入收則殺人蓋毒散。虎硝末付。

赤瘡熱毒胃結肉間發皮膚赤如楊梅許學士云十種丹毒三日不愈入腸胃則不治。

一諸汗

發熱自汗虛煩人參黃芪散。
盜汗睡而汗出肌肉虛止汗散。胃虛汗項下至腋益黃散。六陽虛汗上至頸下不咽。

一瘧

風暑之邪宜發散然後扶持胃氣為本又須辨陰分陽分而用藥。

邪瘧及

新發者宜散可截。

過截傷脾胃則綿延不已此柴中。

陳少甘。隨證加減於後。

若一日一發午邪在陽分加蒼苓事。

若間日或三日一發午後夜發邪入陰分加四。

物如。紅升酒拓振起陽分截之。

若四物以補血。陽瘧多汗用參木芪以飲。

若汗紫二木苓葛以發之。限瘧多汗并芍地。

枳以磨之无汗柴木青红升以發之

有汗要无汗扶正為主

故曰无汗要有汗發邪

傷食痛悶

若胃弱或截傷中食少加參酒為芽

或食積加麩芽實連有痰加半而實苓連

烏梅肉

若發截之加枳常青苓

若日久虛癰寒熱不多或无寒而但微熱者邪氣已去去用八物加柴苓芪陳而後補血氣

癰後衰成癰後連治用補脾胃芽

縮陳苓連芽木

木為生薑水並服

一、小兒雜證

或進或退乳或啼時未定每乳与氣相逆

痢疾逐積解熱同大人

霍亂与大人同宜詳證未後母

得寒已衰四君加陳

外腎厚而小便不通五苓

秘已初生台上或鼻外白如米屑不乳先用發

重舌重鰓重眼心脾熱皆刺去血蒲黃或髮灰

付

解熱母氣虛每熱四君四物加連並服

手足極細頭小脊高尾削体痿臍突胸陷喘

建熱困末頸骨分開及食吐黃頰渴吃咤名哺

八

十全丹

露_下者最難治。十金丹。
脫囊腫大墜下不收用紫蘆荳系為末水調
付荷葉包之。

脬中汁出痛。枯凡或柘末付之。

夜啼燈草燒灰。附乳母之。

耳後月蝕瘡。連枯凡末付之。

白禿瘡。先刺頸去癰。死血出。河水洗候
乳。麵粉。細粉付。又連髮。髮塵末付。

一方治白禿及髮中癰。然脂付。

治精肌癰。疹癰。痒不止。苦草耳。

花子菜。為末。豆淋酒調服。二不。治三喪腸痔。心脈

脹。同。食。七日。後。便。粟。樣。此。凡。毒。出。也。

鰓。腫。風。也。腿。瘦。似。紫。紫。膝。蓋。腫。大。行。走。不。得。

一疳。血。咯。血。吐。血。龜。骨。末。豆。許。吹。鼻。立。止。

數食。肥。金。人。肉。批。

同。慈。食。肥。甘。及。生。冷。果。蔬。煮。融。漸。次。積。滯。

或。飲。乳。粥。飲。太。早。積。滯。形。氣。延。及。止。月。五。疳。之。候。

五。疳。推。背。疳。為。要。最。速。蓋。受。不。足。腎。虛。受。

熱。血。逆。出。牙。脫。落。宜。急。治。

肝。疳。眼。腫。睛。搖。頸。汗。流。腦。熱。合。面。臥。筋。青。髮。

立。肉。黃。瘦。地。山。革。黃。淡。壯。苓。

心。疳。面。黃。赤。身。熱。臉。赤。頰。滿。口。瘡。虛。驚。門。連。

八。心。疳。面。黃。赤。身。熱。臉。赤。頰。滿。口。瘡。虛。驚。門。連。

角起黃陽
白若
方寸

卷之四

調榮水

氣虛參朮

力

芩連
良火
荊
荷
升
葛

瘡

閩學區正志

大便秘實

學小

為紫

小便赤澀生疳。外熱。小兒加奴。
大便秘結。肉煩外熱。小兒加奴。

二便。有秘結。則腸胃壅遏。
胎結。毒氣無從泄。
氣滯。

肝結
氣滯

毒氣無後泄

肌肉黧黑，玉旋踵而变。

壞瘡三證

一內虛泄瀉
二外傷風寒

一內虛泄瀉
二外傷風寒

三鞭黑歸腎

製用人不入特入不起故辛散之則

○瘧熱鬱於內而不得出者，乃考運氣誤人多矣。

如馬之奔奔，然紅活可愛而

黑烟咽閉聲死

未出聲

出素象形氣俱有也

然不足三

大德堂

不燥不寒 益氣養血 補腎壯陽 益精固本 益氣養血 補腎壯陽 益精固本

冬
補
桂

一發便密如針頭稠密无縫七孔面目皆

皆有極重合輕其表而涼連翹升麻湯

瘡出五日大不有紅活而血疱先沃明堂者不煩服

表裏俱實瘡難出表裏俱虛瘡難出

時嚴寒已起發散寒溫表

發若煩渴昏迷瘡出不快辰砂五苓散

涼藥換中或胃虛吐利理中湯溫中

外寒虛為厚肉密毒氣雖發泄回出不快宜

身體溫暖煩已食大便寒煩

外證輕重利逆

一看出耳中无大小不一根窠紅頭面少胞滿沃堅輕

不著六證堅重

瘡脚稀少根窠紅綻不浮不渴

乳食不減四肢溫和身无大熱

調解之法活血調氣安表和中輕清清毒

涼之劑二者得兼而已

如升其水滋養者精无通提其則調逆身

惡

不

二

限陽二疹

赤疹陽過清涼而得

白疹限過溫而得

逆候正出面利者困。已出發惡候。便
 乳食不化脾虛已死。瀉血瘡爛无膿不治。二
 便秘目閉身腫肌黑死。遍身黑陷目閉死。燥
 面色青黑死。瘡後發背危。面鼻黑氣不治。燥
 渴尿後世得不食危。頭面腫瘡尽抓破臭爛不治
 逆或足冷至膝不治。面腫鼻陷目閉咬牙不治
 瘡黑焦爪攻顙頂腫硬或胸膈高突不治
 身腹脹咬牙喘渴進治。瘡塌突戰咬牙渴甚不治
 痘紫黑喘渴不寧。不灰白色陷頂腹脹不頭暈是
 陰陷也飲水治。不氣促得渴治。

康

實表劑加涼血藥

欲

腦之間不食腹脹煩渴忌密水

本考欲佳

瘡黑陷青紫者百祥丸下之

大戟單用

不黑

下後

身熱氣溫飲水可治

後溫

水熱不消或寒戰為逆

四五日

不大便宜藏府潤液瘡易腐為安下

走日壯熱不大便煩劇脈洪微利之兆

門桅桃

將成時面色淡紅而血毒者其方紅
色紫宜涼血解毒藥冬連升翹葛

解毒絲瓜升查可犀酒為黑豆赤小豆

十三日瘡癰已落其癰似黑或凸肌肉尚嫩
不可洗淨亦忌炙燒有毒之物恐熱毒攻眼

當腐癰致落之時不為逆身熱者精利之以
防餘毒身不熱或腹脹或泄黑切敬

癰脫落之後无他證壯熱經日不除亦无岩嵒胡
門冬散

身熱大渴腹脹浮氣急寒戰咬牙飲水不已即非
熱脾胃肌肉虛津液衰少故也 木香散

癰後二便利下黃黑則毒氣已減不必用藥一或閉
者則賜以麝香散結毒無毒无後而厚服閉者

咽肌黑不放踵而告喪宜消息

瘡後餘毒不解入胃便血日夜无度腹痛喘
哭宜牛黃散

身壯熱下痢黃赤膿血胃肌腸
小便赤而煩寧赤散

瘡入目蓋心熱毒生肝肝主目熱毒衝之淫肝
丸勝虎肝黃梔先時奈皮散洗連滑桐膏

一方淫痒張乾未食後溫湯服二不
赤脈侵睛者珍羊角丸

瘡瘻或割大黃散服之
瘡毒者毒氣當出而不得出流於眼縫則壅

毒散眼藥未成瘻者以紫加減
瘻瘻者毒氣當出而不得出流於眼縫則壅

瘡後發痛是餘毒未解熱積傳蘊不之教
熱動肝風而發搐（退乳）而已（紫苓膏）

瘡癰太盛膿水出不止者席不可轉側

痛者薑土末付便乾或以麥麸撲席
毒氣流大腸則便膿血或下腸垢或大便結

宜犀角地黃湯
瘡後癰毒不問何經紅腫用黑棗赤豆
以醋浸研爛啗之以推領刷之隨手退去其効如神

乳嬰養胎就母清和氣血節調飲食以通氣調
衆之劑藥其乳癰心肥滿无臨伏

童幼切脈審表裏虛實汗下之不寒不虛但
得其中和脾氣流暢則肺金藉母之助速於成

無元側漏之患

。壯盛而膚勝厚密无須預為汗解

大便結者宜利

。婦人發瘡八物減地黃加紫葛桔苓
陳同叔紫葛芷縮糖並服

一方八物去地加陳蒲縮腹紫糖並服
身起甚參薤散

。瘡癰後再作瘡者此亦餘毒未盡也宜解
利之得平安

一革剝

參人參

芹當歸

麻天麻

鹿大鹿

椒蜀椒

牡牡蠣

第第

門門

黛黛

合合

合合

合合

合合

合合

地地黃

紅紅

知知

朴朴

瓜瓜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

龜龜

木木

陳陳

樞樞

柘柘

尤尤

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

五五

苓苓

半半

芸芸

自自

烏烏

通通

桃桃

附附

腰腰

華華

鵬鵬

曲曲

蛤蛤粉 沒沒生 益益生 蛇蛇生 史史生 天天門冬 巴巴豆 炸炸甘石 雅雅母

什什生 漆漆生 戰戰生 神神生 錫錫生 賊賊生 蒼蒼生 穿穿生 貴貴生

版版生 策策生 葵葵生 芩芩生 查查生 龍龍生 貝貝生 錫錫生 蛻蛻生

良良生 寄寄生 檀檀生 鶴鶴生 核核生 牛牛生 忍忍生 苦苦生

一診察辨診

撮收正傳惠謝醫林之至要而或辨陰陽表裏
 或察虛實寒熱或別血氣或益衰或分貧賤苦
 寒或異上下左右或區老少男女或明吉
 凶順逆而師先賢微深以墨記之身來予
 親用而每効配劑以藍記之治病用藥之暗
 數便姪孫一覽如指掌而已
 曾元龜弟二
 未年冬月而至此十五歲
 老眼寒究

日東洛下

雖知苦耐

盡靜翁道三

愛陸院 就安老