

止方輿輓

平

中華書局藏書

校正方輿輓卷十目錄

脚氣 瘰癧 一張

小枳榔湯

枳蘿湯

廣濟療脚氣方

茱萸湯

越婢加朮湯

大防風湯

虎脰骨酒

紫胡厚朴湯  
礬石湯

大枳榔湯

文仲療腳氣方

同療腳氣急衝心方

黑豆湯

六物附子湯

虎脰骨湯

紫蘿子湯

集驗瘡證方

卷之十  
十六

烏頭湯

痛痺  
甘艸附子湯

桂枝芍藥知母湯

附子湯

柞木皮湯

犀角湯

蒸藥方

中寒

中濕  
六張

麻黃加朮湯

桂枝附子湯

麻黃杏仁薏苡甘艸湯

不換金正氣散

暎

三張

一張

五物香薷湯

目錄

消暑湯

五苓散

生脈散

理中丸及湯

清暑益氣湯

瘡

六張

白虎加桂枝湯

常椈湯

鱉甲白朮散

紫胡去半夏加桔梗湯

七棗湯

紫陽散

文  
集

卷之三

五  
卷

十一

校正方輿輓卷之十

桂里有持先生口授

成醫大本草卷五 雜論門  
門人 奥州盛岡八谷文恭子良筆受

平 安 其 鮎 松 田 宗 誠 意 之

欽定四庫全書

脚氣爲瘞蹙之又蓋以熱體之發於一處也

醫書失全云脚氣者上古名厥兩漢之間名緩風宋齊名脚氣

醫學叢書卷之二 第二自醫難堪缺著云實二

然則不用仲景方而何用今世之方耶  
○李東垣脚氣ノ說ニ自晋稹始ト云實ニ  
然ルベシ仲景論備之ト云ニ至テハ幾シド  
信ズヘカラズ蓋シ脚氣ハ稹敬ノ論之ヲ始  
トシ孫真人ノ說コレヲ備ヘ此レニ亞グ者  
ハ唐王刺史ナリ然則脚氣ノ治ハ孫王二家  
ノ提撕ニ熟セバ其擴用ニ於ケル適ニ思過  
半矣

名醫方考卷五脚氣門ニ叙レテ曰ク脚氣類  
傷寒則察之難脚氣能令人死則治之難一病  
处五而有二難是非可以淺淺論脚氣考方八首同

志者尚教我哉ト惟フニ此時脚氣盛ニ世  
三行ハレザル乎不然シバ吳氏ノ敏達胡ゾ  
此言ヲ叢セル今按スルニ脚氣ハ察之易治  
之易モノナリ醫者早ク此レヲ察レテ孫王  
二家ノ方ヲ考テ以治之ニ百ニ一失无カル  
ベシ只延遲スル者ハ實ニ難イカナ希藻按  
スルニ脚氣症候不一ト有ヘドモ候之ヲ專  
キハ其病ヒタルト其病夕々サルト及ビ緩  
急吉凶皆悉ク手下ニ明ラムベシ其危症ニ  
至テハ又一候治アリ曰ク脈關尺均シク應

文集

卷之十

流春園

スルニ左寸口獨り沈伏スル者ハ命在旦夕  
ユダンスペカラズ是レ昔賢未<sup>レ</sup>矣孫王二家  
卒不道及タゞ我數十年來廣ク視多ク療ス  
ルノ際自得スル所ノ真訣ナリ有志ノ士親  
シク病者ニ徵シテ余カ言ノ浮誕十ラザル  
ヲ知ルベシ

小枳榔湯即蘿蔔紫蘿湯

橘皮各一  
生姜三兩

紫蘿莖一兩  
甘艸炙

枳榔五枚

右五味水煎

○此方輕症ヲ治スヘシ後世香附子木瓜ヲ

大枳榔湯即唐侍中方、外臺第十九卷引

橘皮各一  
生姜三兩

散腫氣極驗

橘皮各一  
生姜三兩

文  
獻  
庫

卷之三

トモ良工トハ謂フベカラジ  
ノ奥旨ヲ得ザルナリ如<sup>キ</sup>此ハ縱ヒ病ヲ愈ス  
ルニ今ノ醫流利尿ノ品ヲ加フル者ハ此方  
トモ良工トハ謂フベカラジ

枳蘿湯

湯  
大黃二分木香

甘艸分各一生姜五分

**大黃**

校  
卷三

橘皮水

紫蘿分

二  
合

右九味以水二合煮取一升

○脚氣病  
キモノナリ此ハ原千金ニ一方トアリテ七味ノ方ナリ山脇東洋桂枝紫蘿ヲ加ヘテ療ス

右六味、以水一斗、煮取三升、分三服、大效、破毒氣。

尤良

○是レ内ニ斑毒有リテ心下ニ結聚レ、上ニ背膊ニ攻ムル症ナリ方下ニ冷毒ト云ヒ方中ニ犀角アリ方後ニ破毒氣ト言フニテ此方ノ毒ヲ制スルノ劑タルヲ知ルベシ或ガ曰ク脚氣上攻ニ一角效アリト即犀角同意乎

廣濟、療脚氣、心煩悶、氣急、卧不安、方外臺第十八卷所引  
半夏一升生姜八兩桂心三兩換榔半末

右四味、以水八升、煮減半、內換榔人末、煎取二升

八合、絞去滓、分溫三服、服後相去如人行五六里、  
乘進一服、微利為度  
○心煩悶氣急、卧不安ハ頗ル重症ニテ即チ  
大換榔湯ノ所治ナリ此方ノ平淡豈ニ以テ  
敵スベケンヤ案スルニ換榔劑不一トイヘ  
ドモ其意大抵相同シ唯症候ノ緩急ト方藥  
メ大小トヨ考ヘテ此レヲ用ヒバ並ビ行ハ  
レテ恃ラザルベシ  
廣濟、療脚氣、急上衝心悶欲死者方外臺肝引  
換榔三顆生姜汁三合童子小便二升、新者不須煖

右三味、攬頓服、須臾即氣退、若未全愈、更服最佳、

利三兩行、无所忌

○此方枳榔未一度ニ一箋ヨリ一箋半ヲ攬テ頓服スベシ方後ニ未全愈更服ト云ヘルハ此レヲ服シテ差ユルガ如クナルトモサツパリトセザル者ハ仍未此レヲ服シテ止マザルベシ然テズンバ功缺于一簣トナリ余嘗テコレヲ嘔吐アル者ニ与ヘテ効ヲ得シフアリサテ脚氣ニ嘔アル者ハ大凡不治ナルナリ

茱萸湯千金卷之治脚氣入腹困悶欲死腹脹方長蘓

史

吳茱萸六升

木瓜兩顆

右二味以水一斗三升煮取三升分三服相去如人行十里久進一服或吐或汗或利或大熱悶即癢此起死回生方案我邦醫家用此二味為丸及

散惟似大殺藥力近讀景岳全書亦有此例矣

○脚氣衝心ニ至テハ藥ノ救フベキ无シ只千金ニ賞譽シテ此起死回生方ト云ヒ外臺亦毒氣攻心手足脈絕此亦難濟不得已作此湯十愈七八ト云ヘリ京極街穢種戸宗右衛門内人嘗テ此症ヲ患フ吉益南涯之ヲ療ス

テ曰夜已ニ瀬ナリ黎明マデニ此三貼ヲ服  
シ盡レ不知バ吁ソレギリノ事ヨ如シ瞑眩  
セバ使ヲシテ報レ之ゼヨト懇囑シテ帰ル既  
而黎明ニ使人來テ白ス病者三劑ヲ服シ了  
リ尋イデ大汗流漓透衣ト余意氣揚揚トレ  
即刻往診スルニ沈伏ノ脈正ニ浮敷ニ變シ  
且ツ困悶頗安ニ似タリ由テ復夕前方五貼  
ヲ與フ次早往テ診視スルニ諸症叢キト易  
ハリテ甚々緩ミ穩カナリ合家戚族欣抃不  
啻爾後大汗湯ヲ作テ金服ノ浹旬ニシテ  
竟獲全愈タリ又三條驛舍大坂屋某妻脚氣

一 ドモ不應シテ上攻既ニ極マリ脈沈手足  
厥ニ至ル病家必死トナシ枕頭ニ一幅ノ來  
迎佛像ヲ掛焚香邊僧病者ニ佛理ヲ演ベ聽  
カレムル處へ余其親戚ノ請ニ應ジ往テ診  
視シケルガ家主人曰病人既ニ死ヲ分トセ  
リ然リトイヘドモ如シノ取ルベキ所モ  
アラバ乞貺ト余惟ヘラク脈絶體厥危劇  
己ニ極マル然レドモ南涯投<sup>元</sup>藥蓋シ木防己  
入湯ニ過ギシ今已ニオクレタレドモ孫真人  
茱萸湯ヲ與ヘバ或ハ萬ニヲ燒倖スベケン  
ト言テ三劑ヲ作テ之ヲ與ヘ且ツ病家ニ謂

腫滿ヲ患フ之ヲ診スルニ將上攻ノ勢ヒア  
レドモ脈狀凶候ナラズ寢浮數ナリ遍身洪  
腫シ小便通スルヲ僅カニ勺ヲ以テ數フ余  
越婢加朮湯ヲ投スルヲ三四日一朝衝<sup>キ</sup>心テ  
氣急喘滿無脈ニ至ル依テ不治ト告ク小林  
芳春來リ視テ茱萸湯ヲ與ヘシガ大熱悶シ  
テ即チ瘥タリ嗚呼此方神良也トイヘドモ  
ナルモノナリ因テ舉出シテ證ト為ス吾邦  
醫家木茱ヲ以テ丸及散トシ或ハ錠粉等ヲ  
加ヘテ應用トスルヲナレドモ二味煎服ノ

妙ナルニハ如カズ  
黒豆湯外臺第十九卷 所引文仲方 療脚氣滿、小便少者  
黒豆八錢去皮 桃榔桑根白皮各一錢  
茯苓八錢 ○湯、吾門所名  
右四味以水四合先煮黑豆減二合內諸藥煮取  
一合日三劑心煩悶、或嘔者加吳茱萸、生姜  
○脚氣遍身洪腫小便短少ノ者ヲ治ス心煩  
悶或嘔スル者ニハ必ス吳茱萸生姜ヲ加フ  
然ヘシ前條所載ノ大坂屋妻脈浮數トイヘド  
湯ヲ與ヘタランニハ衝心ニモ及ブマジキ

ニ越婢ヲ投ゼシハ余ガ味經傳之過也ト追

想レテ臍ヲ噛メリ

越婢加朮湯治風痺腳弱方

麻黃六兩石膏半斤生姜三兩甘艸二兩

白朮四兩大棗十五枚

右六味以水六升煮取三升分溫三服惡風加附

子一枚

○此レ脚氣腫滿ヲ療スルノ聖藥ナリ主治  
ハ越婢湯本條下ニ于テ參酌レ用フヘシ金  
匱ニ裏水越婢加朮湯主之ト曰トトイヘドモ  
裏水ニシテ豈ニ麻黃ヲ用フルノ理アラン

ヤ外臺ニ皮水越婢加朮湯主之ト云ヘリ  
此言義近キニ似タレドモ皮水ト云ベキ  
症ナラバ是レ麻黃甘艸湯正當タルベシ即  
チ外臺ニ皮水一身面目悉腫甘艸麻黃湯主  
之トモ有リ越婢湯ノ症ニ金匱ニ風水千金  
テ此ニ風痺ト云ヘリ風ハ乃チ陽症ノ謂ナリ由  
婢損益之方ナリ亦可レ用左ニ鈔ス  
益聖惠方麻黃散治風水遍身腫滿骨節痠疼  
於越婢加朮附湯丹去甘艸加漢防已桑根

白皮湯 三因寒濕脚氣、疼痛不仁、兩尺脈來沈

六物附子湯 方細者、此方主之、此痺症也

防己 各四分

附子

桂心

茯苓 各三分

右六味水煎、冷服

○此レ仲景甘艸附子湯ニ防己茯苓ヲ加ヘタル方ナリ先是孫氏四物附子湯七味附子湯ナドモ皆類方ニシテイヅレモ甘艸附子湯ヨリ來ルモノナリ故ニ其主治各大同小異ナリ七味附子湯方下ニ治濕痺緩風身體

白朮

茯苓 各三分

疼痛欲折肉如錐刺ト云濕痺トハ湿氣ニ所申テレビル、ナリ緩風ハ手足緩弱ナルナリ濕痺緩風名ハニニ分ルレドモ要之ニ脚氣ノ緩症ナリ三因方ニハ此レヲ綜概シテ痺症ト云タルナリ

崔氏八味丸 方具瘡門 治脚氣、上入小腹不仁。

○脚氣上入小腹不仁ノ症ニ此方ヲ用ヒシノ症ツヨキハ臍上マデ不仁スルモ有ル者ナゾ又病瘥後久レク麻痺痿軟不能起者長

方集解

卷之十

澤漆湯 方具 水治脚氣腫滿、小便不利、方

澤漆湯 腫門

○脚氣腫滿其症不實者ニ此湯甚ダ良レ千

金方下ニ内虛不足ノ字アリ可考

常枳湯

方具後  
瘧門

○脚氣寒熱往來不止或ハ再三發シテ瘧ノ如キ者宜レク此方ヲ與フベシ是レ世醫ノ知ラザル所ニシテ千金脚氣門ニ治例アリ

左ニ録ス

常山甘艸湯

千金卷  
之七

寒熱日再三發者

常山一錢

甘艸七分

半

右二味以水二合煮取七勺半此症桂麻柴

女十芩輩八效少辛王之ナリ

桂枝芍藥知母湯 方具 痛

大防風湯

百一選方  
風門

祛風順氣活血脈壯筋骨除寒濕逐

冷氣

正氣參

白芷

杜仲

當帰

熟芍

今用

芍藥居黃芪各二

羌活

牛膝

乾芍

芍藥居黃芪各二

羌活

川芎各一

兩半

杏葉煎、藻按脚氣日久脚脰枯細或痛或痒或

腫毒潰爛膿水不絕其入虛羸者皆用之効

○脚氣大半瘡テ麻痺痿軟不<sub>レ</sub>止者上ノ二方  
採擇シテ徐徐ニ之ヲ服スベシ此症古方ニ  
テハ腎氣丸新方ニテハ本事方ノ續斷飲ナ  
ド用フルモノアレドモ右ニ湯ノ勝レルニ

如カズ

虎脛骨湯治癰瘡脚氣痛痺一切毒瘤於脚膝步履

不能者方

通艸各一川芎

虎脛骨五忍冬

牛膝當歸

大黃木瓜

桂枝三分

抹身附子各二甘艸門分

右十一味以水二合煮取一合

○瘻瘡自毒來ル者コノ方神妙ナリ虎脛骨  
ハ小ニシテ色白ク臭氣无キヲ佳トス往年  
藥舗藤本長右衛門虎ノ全骨骸悉ク具ハル  
タル者ヲ貯フ余其脛骨ヲ購ヒ藏ム時ニ三  
條槁東淀屋某癰毒後為瘻瘡種種藥ヲ服ス  
レドモ不應余ニ治ヲ請フ即チ此方ヲ調シ  
與フルニ不日ニシテ曳筇起行レ五六旬ニ  
方得平復タリ爾後復タ虎脛骨上品ノモハ  
ヲ得ズ

虎脛骨酒

生芻十六牛膝七克

官桂二木瓜

鹿脛骨 各五

蝮蛇 二錢

右六味、漬醇酒八合、三日去滓、每飲一杯、日二夜

不堪酒者、不必在此限

○兩足痠軟不能起行者、桂枝芍藥知母湯八味丸、大防風湯等應用ノ劑タレドモ皆寬緩ノ藥ナリ、此酒劑能ク血氣ヲ順導ス、副用シテ藥力ヲ助クベシ

赤小豆藥 方具水

交涉

○脚氣腫滿スル者、互用此方乾脚氣ニハ役

灸

凡脚氣緩急、總互艾灸

八所 承山

○脚氣緩症、大言フニ及バズ衝心ノ急症ニ

續方

紫蘿子湯 千金卷治脚弱上氣

昔宋湘東王在南州患脚氣困篤、服此湯大得力

紫蘿子

半夏各一升

甘草

當歸各一錢

生姜一斤

桂心四兩

右十味、㕮咀以水一斗三升、煮取三升半、分為五

服、日五夜二  
○脚氣咬喘上氣ノ者宜此方。方下ニ因篤ノ  
症ニ服此湯大得力トアレドモ因篤ニ至テ  
ハ此方ハ力微ニシテ及ビガタシ古人之言モ  
不可悉信此レヲ後世ニテ蘿子降氣湯ト名  
ツケ凡テ涎潮上氣ノ者其病因ヲ論セズレ  
テ一切用之

紫胡厚朴湯

紫胡

厚朴

枳榔

紫蘿

陳皮

茯苓

右水煎服

○此方外臺瘡癬間ニ見ニ吾門脚氣腹滿ス  
タル者ニ運用シテ効ヲ得ルト多シ  
瘡證方秘方集驗  
當歸 芍藥 紫朮 杜仲 肉牛膝  
黃芩 白朮 茯苓 地黃 大棗  
右九味、水煎服  
○太防風湯ノ症ニシテ熱アル者此方ニ宜  
蓼石湯治脚氣痿弱不仁者方  
蓼石二錢 芍藥一錢 甘艸各五  
當歸一錢

右以水二升、煮取一升半、將患足浸<sup>ヨ</sup>入湯内淋洗、或和酢内鹽、或加附子皆良。

○脚氣痿弱經久不愈者ニ良レ中風痛風等

ニモ可用

附記

手島堵菴久レク脚痿弱ヲ患フ時ニ世ニ鳴リレ  
古野法眼三角法眼諸名醫オノノ術ヲ盡セ  
ドモ效功ヲ得ズ城州西岡農夫偶來リ之ヲ視  
テ曰ク我ニ治瘻症スル一方アリ加牟<sup>カ</sup>夢不拘  
多少水煎温服屢經試用君徧ク都下名流ノ良  
薬ヲ服ス豈ニ山翁野夫人議スペキ所ナラン

ヤ雖然諺ニイハズヤ敷ニモ剛<sup>ト</sup>者ト敢テ試ニ  
コノ薬ヲ用ヒタマハゞ萬一ヲ僥倖スベケン  
ト堵菴固ヨリ篤厚ノ仁者ナレバ蕎蕎ノ言ヲ  
モ弃テズシテ服用之遂得起癒之功タリ其後  
前ノ數醫相會レテ醫事ヲ談ズル時ハ間此事  
ヲ言ヒ出レ愧ラクハ洛<sup>カ</sup>醫金汁使ニ如カズト  
一笑セリ

痛痺

喻嘉言曰痛風一名白虎歷節風實即痛痺也  
痛痺ハ痺論ニ出ツ痛風ハ蓋シ元以辨ノ稱  
呼ナリ朱丹溪格致餘論ノ痛風論ヲ讀テ知  
ルベレ  
○此病舌胎有テ乾燥シ熱熾シナル者ハ石  
膏ノ症ナリ若シ舌上胎アリトイヘドモ能  
ク潤澤シ熱アリトイヘドモ煙艸ヲ喫ニ臭  
カラズ味噌醤油味ヲ失ハザル者ハ是レ附  
子ノ症ナリ此說淺近ナリト雖療<sup>ヒ</sup>痛痺ノ吃  
緊要法ナリ

甘艸附子湯、風濕相搏、骨節疼痛、不得屈伸、近之則痛劇、汗出、短氣、小便不利、惡風、不欲去衣、或

身微腫者

甘艸炙二兩 附子炮二枚 白朮二兩 桂枝四兩

右四味、以水六升、煮取二升、去滓、溫服一升、日三服、初得微汗則解、能食、汗出復煩者服五合、恐一升多者、互服六七合為妙

○痛風ノ狀態コノ一短條中ニ盡キタリ方法亦奇古

烏頭湯、病歷節疼痛、不可屈伸

麻黃二兩 芍藥二兩 黃芪二兩 甘艸炙各三兩

右五味、㕮咀四味、以水三升、煮取一升、去滓、內蜜煎、中更煎之、服七合、不知盡服之

○徐氏蘭臺軌範ニ煎法精妙可師ト云ヘドモアマリ遵從シスギタルト思ハル一老醫曰此方煎法非古、互ク烏頭桂枝湯ニ倣フテ可ナリユ、ニ内蜜煎中更煎之ト舉グレドモ四味煎汁中へ烏頭ヲ煎シタル蜜ヲ内ル、ヲ可トストチラモ再煎スルハ非ナリト此說可ナリ方中甘艸諸本ニ兩數ナレ一本ニ三兩ト云姑ク從之テ可ナリサテ仲景

方中川烏ト云ハ獨リ此一方ナリ川烏頭ハ  
附子ト同種ニテ母ト子トノチガヒナリ附  
子ヲ裁ヘテ四邊ニ子ヲ生スレバ子ハ漸ク  
大ニナリ母ハ反テ小クナリテ烏頭ノ形ト  
ナル是レ川烏頭ナリ川ハ蓋レ地名ナリ吾  
邦ニテハ金剛山烏頭是即ナ川烏ナリ剖テ視  
ルニ中白色ニシテ艸烏頭ノ中黒キトハ異  
ナルモノナリ

附子湯少陰病身體痛手足寒骨節疼脈沈者

附子八分茯苓芍藥各六人参四分

白朮八分

右五味以水一合六勺煮取六勺溫服

○千金附子湯正因六物附子湯皆此方ヲ祖

桂枝芍藥知母湯諸肢節疼痛身體尪羸脚腫如脫、  
頭眩短氣溫溫欲吐

桂枝四兩芍藥三兩附子炮甘草

大根麻黃各二兩

防風各四兩

生姜一兩白朮各五兩

知母

右九味以水七升煮取二升溫服七合日三服

○此方品味殊不備コトヲ以テ如今ニ至ルマ  
テ措テ用ヒザリレガ近來屢試屢効アリ名

フニ興軒

護屋丹水曰今脚氣痛風及鶴膝風捨茲用獨活寄生湯當歸拈痛湯等劑其効甚遲誰知之用之耶ト名護屋氏醫教未聞ノ時ニ方リテ

己ニ發言如レ此大醫ト謂フベシ

大防風湯方具脚氣門一切麻痺痿軟、風濕挾虛者、保命歌括卷之一中風門載此方云治氣血兩虛挾風熱成癱瘓之神方也又治痢後脚弱不能行步者名鶴膝風有効

○痛風後痢病後脚氣後或ハ鶴膝風トナリ  
痿蹙トナル者此方ヲ用ヒテ應ゼザルモノノ

古ナシ治一切麻痺痿軟ト云フ非虛言其功緩

クシテ其効遠レトイヘドモ竟是不可廢ノ  
方ナリ

古今錄驗續命湯方具中風門

○痛風脈浮數口中不知食味苦々覺へ常ニ  
所嗜ハ煙草モ臭ク覺ヘテ吮フノ能ハザル  
者ハ此湯及ヒ越婢湯等可選而用イヅレニ  
モ石膏劑ノ所至ナリ近ゴロ一老醫アリ痛  
風ノ一方ヲ傳フ即敗毒散加桂枝石膏ヤ方  
ニシテ功驗非常外云フ即此亦續命越婢ノ

越婢加朮湯方具脚氣門露水無モ此スハ固ニ申矣

○越婢湯ノ脚弱水腫ヲ治スルハ固ヨリ其  
分ナリ痛痺ニモ其効亦相如ケリ夫痛痺ヲ  
療スルニ續命越婢甘艸附子湯同ク是レ誤  
汗ニ係ルトイヘドモ一ハ石膏一ハ附子ニ  
シテ冷熱<sup>ヒヤク</sup>炭ナリ石附并セ用フル者モ推  
シテ例知スベシ

涼膈散

方具口舌門

○熱毒深ク入り歎節腫痛スル者此方ヲ與  
フベシ如シ應ゼザルトキハ孫氏犀角湯ニ  
宜シ

犀角湯千金卷治熱毒流入四肢歎節腫痛

十全犀角二兩 羚羊角一兩 前胡一兩 黃芩  
梔子<sup>大</sup>射干各三兩 大黃升麻各四兩  
豆豉一升

右九味以水九升煮取三升去滓分三服  
○此レ熱毒深重ノ症ニシテ方書ニ結陽ト  
稱スル者是ナリ入門ニ治結陽肢腫便閉ノ  
犀角湯アリ其方相似テ不同

桔木皮湯

柏木皮

防己

通艸

羌活

牛膝

忍冬

防風

右丸味以水二合煮取一合

○此レ和州杏村賣藥ノ方ニシテ世ニ名高キ藥ナリ賣藥ノ「ナレバ彼ノ家ニテハ痛風通治ノ劑トスレドモ醫門ニ在テハ熱解シテ疼痛不止者ニ用フベシ毒ヲ挾ム者ニハ最佳方ナリ

金鈴散

○此レ治痛風ノ奇藥ナリ表症去ルヲ待テ後之ヲ用フベレ或ハ加大黃或ハ加巴豆テ其效殊捷

十瘡丸

○痛風年ヲ經テ癰瘤スル者此丸ヲ用ヒテ斑疹ヲ癒スルトキハ治ヲ得ルナリ丸子必シモ多ク與フヘカラス毎服僅ニ六七九ヅ、日ニ三服シテ効驗彰然タリ

灸

隔蒜灸法具瘻

熨法

葱熨法入門

灸餘腫尚存用此熨之以助氣血行壅滯其功甚大又跌撲損傷止痛消腫散血之良劑也生葱搗爛炒熟頻熨患處至冷再換

○痛風後或ハ痢後ニ雀膝トナル者ハ藥モ  
應ジ難クナガビクモノナリ隔蒜灸捷効ア  
リ餘腫尚<sup>ホ</sup>存シテ消セザルハ此レヲ用ヒテ  
之ヲ熨ストキハ壅滯ヲ動シ氣血行リテ更  
ニ一段ノ功アリ

### 黑膏

○傳藥モ亦頗<sup>ル</sup>止痛消腫散血

### 續方

#### 治雀膝風蒸藥方

烏頭

雲母

防己

甘艸

桑寄生各等分

右五味、盛囊、水煎、蒸患所

附記

世ニ痛風ト云ニ水飲ニ因ルモノアリ其証固ヨ  
リ有熱骨節疼煩掣痛不得屈伸汗出短氣小便  
不利或身微腫全ク痛風ト異ナルナシ唯其  
脈滑或沈緊ソノ他腹中有水氣力喘咳スルカ  
アルモノナリ此症ク診スルトキハイヅレ水毒ノ候  
ハ其人我レ痛風ヲ再三病メリト言フトモ是  
レ真ノ痛風ニハアラテ水毒ノ病ナルモノナ  
リ治方ハ十枣湯控涎丹三花神佑丸舟車丸導

水丸禹功散方皆具儒門事親ノ類病ハ輕重劇易ニ隨テ撰ヒ用フベシ此症通例痛風療治ニテハナホラヌモノナリ

一書生云痛風夜ニ入レバ痛劇シキ者ハ之レヲ瘀血ニ取テ踈經活血湯ト云方ヲ用フルト同春及ビ諸書ニ見ユ欲以古方治之如何余曰桂枝茯苓湯桃枝承氣湯紅藍花酒ノ類アリ應當酌而用焉

風毒ト稱スル者痛風ト相類シテ風毒ハ走注セズ痛有定處而シテ赤腫焮熱遂ニ膿デ瘡癰トナルモノナリ初起敗毒湯ヲ與ヘ膿成テ後ハ

治瘡癰法ト同シ

金匱ヲ始メ諸方書風濕痛風論中多クハ脈ニ道ヒ及ボサズ今此病ヲ診スルニ石膏症ハ浮數附子症ハ沈遲ナルモチロンナリ一種浮洪大ト見ヘテ按之微細ナル者アリ當用附子果シテ効アルモノナリ其他ノ精審ハ吾人ノ工夫ニ在ルベシ

中寒

諸皆可見變

○寒邪ハ四時皆有之其輕キ者ハ醫ノ諫總  
スルニモ至ラザルホドナレドモ冬時ノ中  
寒至劇ナル症ニ至テハ卒カニ倒レ或ハ手  
足拘急一身強直厥逆脈絶ニ至ル有リ方書  
ニ直中ト稱スル是ナリコレラノ症ヲ治ス  
ルモノ力子ノ心得置ベキナリ因テ其槩  
略ヲ舉ク

當帰四逆加吳茱萸生姜湯

腹至陰疼痛脈細欲絕者

方具

療治

手足厥寒小

○此方寒邪ニ中リテ腹痛スル者ニ良ナリ

徐大椿曰此四逆証乃從太陽誤下所致非厥陰少陰之四逆也故仍以桂枝湯為主

附子理中湯治五藏中寒口噤四肢強直失音不語昔有武士守邊大雪出帳外觀瞻忽然暈倒時林

繼作隨行医官灌以此藥兩劑遂醒

三因卷二  
中寒門

四逆湯方具傷食門治四肢強直厥冷或自利者

○コレ中寒至劇ノ症ナリコノ方ヲ用ヒテ尚ソノ上ニ葱熨ヲ施レ或ハ氣海丹田ノ灸ナドスベレ

灸及熨

寒畢其踵半晝ハ醫

中寒腹痛者宜葱熨

中寒臍腹苦痛極垂死者灸之

神闕

丹田

氣海

○中寒危証右等ノ術ヲ用ヒテ手足温燠ニナル者ハ可得生若シ其厥極マリ唇青ク舌卷キ囊縮リ無脈者ハ死不旋踵

中濕

○中濕ノ病ノ起ルトイツト云フ時モ無ケレドモ大率夏秋ノ際ニ多キモノナリ其症大畧風寒ノ邪ト相似テ只關節ダルキト甚シク或ハ痛ム者ヨ此病ノ準證トス小便不利レ大便快キ丁金匱中濕ノ條ニ言フ所ノ如シ然ルニ反ニ反シテ小便常ヨリモ利シ大便難キ者モアリ凡百ノ病正脈症アレバ變脈症アリ一概ニ守株ベカラズ羅謙甫曰守常者衆人之見知變者智者之事ト醫ハ其レ通変ナクンバアルベカラズ

林關

冉田

葉樹

○中寒

中寒

中寒

中寒

中寒

中寒

麻黃加朮湯、濕家身煩疼、可與麻黃加朮湯、發其汗

為宜慎不可以火攻之

麻黃 三兩

桂枝

甘草 兩

杏仁 個

白朮 四兩

右五味以水九升先煮麻黃減二升去上沫、入諸  
藥、煮取二升半去滓、溫服八合覆取微似汗

○中濕ノ症惡寒發熱頭痛欬喘小便不利等  
モ有レドモ關節疼痛最主症タリ故ニ此ニ  
唯其主症ヲ挈テ餘症ハ畧スルナリ按スル  
ニ古人風濕ニハ忌轉渴發汗ノ說アレ母モ  
中脈浮者ハ不可不微發之但多汗ニ至ラザル

ヲ要トスルナリ

金匱云風濕相搏一身盡疼痛法當汗出而解  
值天陰雨不止醫云此可發汗汗之病不愈者  
何也蓋發其汗大出者但風氣去濕氣在是  
故不愈也若治風濕者發其汗但微微似欲出  
汗者風濕俱去也

喻昌曰麻黃加朮湯則雖發汗不至多汗而朮  
得麻黃并可以行表裏之濕  
麻黃杏仁薏苡甘艸湯病者一身盡痛發熱日晡所  
劇者名風濕此病傷於汗出當風或久傷取冷所  
致也

甘艸二兩外  
臺同

麻黃半兩外  
臺作四兩

杏仁五個外  
臺作二兩

薏苡仁半升

右剉麻豆大、每服四錢匕、水盞半、煮八分、去滓、溫

服、有微汗、避風

○此レ古方ナル乎トイヘドモ劑小ニシテ  
煎法又文例モ他ノ諸古方ト比セズ蓋シ後  
人ノ手ヲ經テ傳ハレル所ナルベシ外臺脚  
氣門ニ所引薬量重ク水律ヨリ服法マデ正  
シ却テ是レ原方ノ真ナルモノナラン蓋シ  
此湯ノ症ハ麻黃加朮湯ニ較ブルベバ濕邪滯  
ルヲ稍深シ因テ薏苡等ノ品ヲ用フル歟夫

レ薏苡ハ本經云治風濕痺別錄云除筋骨中  
邪氣ト余曾テ此方ヲ以テ癥毒痛痺等ニ運  
用シキ

五芩散方具後

醫說引信効方云春夏之交人病如傷寒其人汗  
自出支體重痛轉仄難小便不利此名風濕非傷  
寒也陰雨之後卑湿或引飲過多有此症但多  
服五芩散小便通利濕去則愈切忌轉瀉誤汗活  
人書云若小便不利大便反快當利其小便宜五  
芩散

○至真要大論ニ云治濕之法不利小便非其

治也ト此語中温ニ五苓ヲ用ル心法トス按  
此方ハ汗自出ト云ヒ後方ニハ脈浮虛ト云  
ヘリ麻黃ヲ用ヒズレテ桂枝ヲ用フル所以

ナリ

桂枝附子湯、風湿相搏、身體疼痛、不能自轉側、不嘔  
不渴、脈浮虛而濇者、桂枝附子湯主之、若大便堅、  
小便自利者、去桂加白朮湯主之

桂枝八分 生姜六分 附子

甘艸各四

大枣六分

右五味以水一合八勺、煮取六勺、溫服

○此症麻黃加朮湯ノ症ヨリ來ルモノ多シ

麻黃加朮ニテ汗ヲ發レ表症ハ退キテモ身  
體疼痛不止不能自轉側脈浮虛者ハ此方ニ  
瓦レサリナガラ此症ハまだ少し表症ヲ帶  
ルモノナリ表証全ク去リテ只其疼ミノミ  
ニナルトキハ桂枝ハ去テ朮ヲ加フルナリ  
即後方是レナリ

桂枝附子去桂加白朮湯

於桂枝附子湯方内去桂枝加白朮四兩煎法

○コノ方金匱ニ白朮附子湯ト稱スルナリ

方同フレテ量數異ナリ

白朮附子湯方後云右五味以水三升煮取一升去渣分溫三服一服覺身痺半日許再服三服都盡其人如冒狀勿怪即是朮附並走皮中逐水氣未得除故耳

不換金正氣散局方治惡寒發熱吐瀉腹痛身體沈

重等症

厚朴

陳皮

藿香

半夏

蒼朮各一

甘艸

生姜各半

右七味水煎旅行不服水土亦可

○李挺曰不服水土與瘴同源過饑過飽卧處有穢氣半夜失蓋早行沾露空腹出外皆能發

瘴仕官商賈遊外俱宜節飲食謹起居以防之  
ト又醫學入門ニモ霜毒ナド云フ事ヲ言ヘ  
リ此レ亦皆瘴氣ノ類ナリ

喝

子良上命丸諸家方

二十五

○喝ハ中暑ノ古名ナリ左傳ニ云陰喝人於

樾下

五物香薷湯

直指

驅暑和中通用

香薷

三

兩

白荳豆

姜製

厚朴

製

白茯苓

各

一

兩半

甘艸

炙

一

右剉、每服三錢、水煎、溫服

○此方能ク喝ヲ治ス如レ平人ニテモ此レ

ヲ服スレバ胸中清爽ヲ覺フ以是之ヲ觀レ

バ香薷ハ暑熱ニ聖藥ナリ

○黃連香薷飲方攻

香薷一

兩

厚朴

炒

白荳豆

三

流

春

園

三

十一

方

與

貌

卷之十

各半 黃連炒 三钱 夏至後暑熱吐利煩心者此方  
冷服。曰此方也於伏熱之時自覺酷暑蒸炎或  
遠行而歸自覺傷於暑熱服一二劑誠為切當  
ト此香薷八十キナタト稱スル者真ナリ。  
消暑湯易簡方原為九治中暑頭痛發熱心下有水氣乾嘔。

者。

半夏

茯苓

生姜

各八 甘艸 二分

右四味水煎服

○中暑心下ニ水氣有テ乾嘔スル者此方甚  
ダ良レ熱甚シキハ加石膏サテ此方局方ニ  
モ見ユ喻氏說アリ抄于左。

醫門法律卷之四云元豐朝立和劑局草集  
醫家經驗之方於中暑一門獨詳以夏月暑  
症五方歷試見聞廣耳其取用小半夏加茯  
苓湯不治其暑額治其濕又以半夏茯苓少  
加甘艸名消暑丸可見治暑在消其濕名正  
言順矣方後又云夏月常服止渴利小便雖  
飲水多亦不為害應是暑藥皆不及此若停  
五芩散脈浮小便不利微熱消渴者

澤瀉一錢 茯苓二錢 猪芩

枝四分

甘草六分

水各六

右五味為散以白飲服方寸匕日三服多飲緩水汗出愈又以水一合二勺煮取六勺溫服亦得

○此方暑濕ニ所傷發熱頭痛小便不利煩渴スル者ヲ治ス又所謂霍亂症ニ用フルノアリ傷寒論卷末ニ云霍亂頭痛發熱身疼痛熱多欲飲水者五芩散主之寒多不用水者理中九主之

名医方考卷二霍亂門五芩散方下云邪在上焦則吐邪在下焦則瀉邪在中焦則既吐且瀉名曰霍亂霍亂責之裏邪裏邪責之水穀是方也桂能建中求能安穀茯苓猪芩澤瀉能安水

水穀得其安則霍亂自止矣此五芩治霍亂之意也正考見傷寒門ト此說的當ニ非ル乎トイヘドモ復タ庸劣醫人ノ語氣ニ非ルナリ因而表備志士之一覽焉

白虎加人參湯方具前

金匱要略云

太陽中熱者喝

是也汗出惡寒身熱而渴

○此方ノ正証ハ汗ジタト出テ微惡寒

アリナガラ身ハ熱レテ大渴引飲スルモノナリ愚案スルニ凡ソ白虎可與症ナラバ脈長洪ニアルベキニ喝ニ在テハ却テ虛微ノ甚多シ是レ喝ソ傷寒ト異ナル町ナリ由是

思之素問云脈虛身熱得之傷暑甲乙經云熱傷氣而不傷形所以脈虛金匱云弦細芤遲ト芤ハ即虛豁ナルナリ弦細遲ハ即熱傷氣ノ應ナリ此等ノ古訓以テ病暑之脈ヲ徵スベシ

竹葉石膏湯

○徐大椿曰治傷暑發渴脈虛又曰暑病有虛熱者互レ

口中熱霍亂暴利心煩脈數欲得冷水者方二千金卷新汲井水頓服一升立愈先患冒口冷者勿服

之

生脈散東垣辨生津止渴

麥門冬 人參各二 五味子十五  
麦 杏 枣

水煎不拘時服渣再煎則可充一日茶湯藻曰渴甚者宜加石膏是倣深師五味麥門冬湯意也○此レ渴ストイヘドモ白虎湯ノ症ニ非ズ又五苓散ノ症ニモ非ズ蘭臺軌範ニ醫錄ヲ引テ治熱傷元氣氣短倦怠口渴汗出ト云ハ好主治ナリ諸熱ニ此症アリ傷暑後ナドニ尤多キモノナリ故ニ此方ヲ載ス雖然如レ以此暑病ヲ治スル專藥トセバ大ナル誤ナ其徵ハ方下ニ一字ノ暑病ヲ論ズルノ无

キヨ以テ知ルベシ  
毎遇春末夏初、頭疼、脚軟、食少、體熱、名注夏病、治之

方入門卷九

補中益氣湯去升麻柴胡加黃柏芍藥五味子  
麥門冬補中益氣湯  
方具癃症門

○希藻按金匱要略云勞之為病其脈浮大手足煩春夏劇秋冬瘥卜即是季世二所謂注夏

病ナルモノナリ

理中丸及湯

人參

甘艸

白朮

乾姜

各三兩

右四味搗篩為末蜜和丸如雞子黃大以沸湯數

合和一丸研碎溫服之日三服夜二服腹中未熟益至三四丸然不及湯湯法以四物依兩數切用  
水八升煮取三升去滓溫服一升日三服外臺云霍亂吐利不止者

○此方五苓散ト俱ニ喝門ニ舉レドモ霍亂

ハ傷食ノ一症ナリ詳カナルハ傷食門ニ  
於テ可考

續方及灸

清暑益氣湯同春

治長夏濕熱蒸人

倦精神短少懶於動作胸滿氣促肢節疼痛或氣高而喘身熱而煩心下膨悶小便黃而數大便溏

而頻或利或渴、不思飲食、自汗體虛  
人參 白朮 陳皮 神曲  
黃柏 甘草 澤瀉 當歸  
麥門 乾葛各 三五味子粒 黃芩  
蒼朮 外麻各 一  
右水煎溫服

霍亂已死有暖氣者、灸承筋七壯起死人、又以鹽內  
臍中灸二七壯 同上

瘡  
○劉宗厚曰病勢如凌虐人之狀所以名瘡ト  
蓋シ瘡ノ理言ヒ難シ古人論說モアレドモ  
治療ニ取リテハ強テ穿鑿スルニ及バヌ  
ナリ証ハ諸書ニ之ヲ詳カニシ脈ハ金匱ニ  
所舉據ルベシ  
紫胡桂枝湯

○瘡症一ナラザレドモ尋常隔日一發ノ症ハ  
四五發ノ間ハ此方ヲ服セレメ而シテ十日  
後乃チ截藥ヲ用ヒテ可ナリ蓋シ瘡ハ傷寒  
時疫トチガヒ變化少キ病ナレバ醫者三タ

肱ヲ折ルホドノ症ニ非ス大都紫胡ヤ常山ニテ濟事スルナリ然ルニ近代古醫流ノ說ニ瘧疾トテ別ニ治術ナシ唯傷寒ノ治ニ從フトテ漫ニ汗吐下ノ法ヲ行ヒ事ヲ壞ル者往往有之此レハ匹夫匹婦ノ爭<sup>シテ</sup>擊ヲ鎮ムルニ弓矢鐵炮ヲ提<sup>シテ</sup>運シ向フガ如クニシテ手重キ事ニアラズヤ

瘧ノ夜間ニ發スル者ヲ陰瘧ト云フ陰瘧トテ別ニ治法アルナラズ只是紫胡桂枝湯ヲ用ヒテ候ヒ居レバホドナク畫ヘマワリテ陽瘧トナルモノナリ陽瘧ト成リテハ截藥

神驗アリ後世家陰瘧ニハ紫胡芎帰湯ヲ用フ是モ亦一方ナリ

小紫胡湯

○胸脇サレツカヘテオチカヌル瘧ハ此方ニ常山二錢ヲ加ヘ用ヒテ神効アリ是張介賓治驗

紫胡桂枝乾姜湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱服一劑如神

○寒多微有熱或但寒不熱ノ瘧ニハ此方實ニ効如響按スルニ傷寒論服後ノ例ニ初服微煩復服汗出便愈ト云微煩ハ即藥煩ニテ

不興轉

藥中病ナリ如<sub>レ</sub>此トキハマヌク前劑ヲタ  
テカケテ用フベシトナリ又久瘧瘧勞ニモ  
頻々此方加<sub>レ</sub>鱉甲或恒山ヲ加ヘ用ヒテ甚良シ

白虎加桂枝湯溫瘧者其脈如平身无寒但熱骨節

疼煩時嘔

知母六分甘艸二分石羔一錢梗米四分

桂枝三分

右五味以水二合煮取一合去滓內梗米再煮取

六勺

○此レ白虎湯ノ活用ナルベレ然ニ方下ノ  
論及ビ桂枝ヲ加フル意ナドハ吾儕獨學固

陋ノ解得ベキニアラズ丹溪心法附餘ニ活  
人方白虎加桂枝湯ヲ引ク其言簡ニシテ要  
ナリ錄于左備参考

活人方白虎加桂枝湯治瘧但熱不寒及有  
汗者

知母六兩甘艸炙桂枝

梗米各三兩石膏一斤

右㕮咀每服五錢水盡半煎至一盞去渣溫  
服

藻按スルニ瘧ハナニホド熱ツヨクテモ舌

ニ胎ヲ生セヌモノナリ瘧ニシテ胎アラバ  
方與兒

所挾アリト知ルベシ此等傷寒時疫ト異ナル所以ナリ

常換湯截瘻方

常山ニキ換榔一錢甘艸五分

右三味水煎温服

○按スルニ本艸ニ談壘翁試験ノ方ヲ引ク此レト同フシテ更ニ黒豆有ルノミ其他截リ藥ノ方法甚ダ多レトイヘドモ此湯ノ最簡最效ナルニ如力ザルナリ常山ハ黃潤ノモソヨ擇之用フルニ臨テ令剉ベシシカラサレバ效ナレ一老醫曰瘻經年不已者常山

飲方内加雄黃半錢為妙久瘻ニハ亦一法ナリ吾師家截瘻一妙劑アリ禁祕トスルヲ以テ茲ニ不載

鼈甲白朮散

楊氏方

常山

白芍藥

紫胡

各一兩

鼈甲

醋炙方

白朮

二兩

牡蠣

火煅半兩

右件咬咀每服五錢水二盞生姜五片煎至一盞去渣溫服不拘時候

○瘻解レソクレタルニ間コノ方ノ症アリ可考用

救急紫胡鱉甲湯

方具瘻門

瘻久不癒結成癰瘻在腹

脇者腰巣甲感外風之氣也。入而藏焉。則成爲癰。或曰。此方予每每瘡母ニ用フ。或ハ消黃丸ヲ副用スル。トモアリ。サテ一高醫ノ說ニ。凡ソ母ト云フハ物ノ魁タル者。ヲ指ス。カ又ハ由テ生ズル所ノ義ニ取ルナリ。韻書ノ字。母暦書ノ紳母ナドハ其義通ズ。レドモ瘡癖カヌヲ指シ。テ瘡母トハ言ヒ難シ。何ントナレバ。先ヅ塊癖カクヲ病デ。後肋下ニ塊形カク出來ルナリ。先ヅ塊癖カクヲ生シテ。後瘡カクヲ病ム者ハ未之有也。ト此說太ダ是ナルニ似タレバ。余壯年コレノ信セシガ後衆病客ニタゞサハリ能ク考之ス。凡

瘡疾其人固有塊癖。又多ク瘡カクヲ病ムニ似タリ。又瘡母ト指ス者。瘡ニ因テ始テ生シタルニアラズ。固有ノ癖物。瘡ニ因テ增長痼結スルナリ。然レバ瘡母ト稱シタリトモ。敢テ悖ル。トアルマジ。有久後藤艮山翁ニ瘡ノ病因。タルナリト答。ラレタリトゾサナガラ大醫ノロ氣ナル哉。外臺ニ破癖ノ一方アリ。紫胡白朮枳實ノ三酒服方寸ヒト此二方以テ此方ノ意ヲ解ス。

ベレ

紫胡去半夏加括蔞湯治瘧病渴者亦治勞瘧  
於小紫胡湯方內去半夏加括蔞根四分餘如

紫胡法

○外臺ニ紫胡ノ上ニ小ノ字アリ可從勞瘧  
トハ瘧オチソククレ寒熱不止或欬嗽或盜  
汗漸漸羸弱シテ遂ニ劳瘵ノ如クナルモノ  
ノ稱ナリ

補中益氣湯方具後  
瘡疽門

○瘧若シクハ發汗若シクハ吐若シクハ下  
皆不為功久シテ劳怯スル者此方ヲ多ク服

灸

三甲散方具勞  
瘡疽門

○瘧勞腹中攣結ノ者ニ用ヒテ効アリ

○瘧ニ灸スルニ二妙アリ一ハ劫カシテ此  
レヲ斷シ一ハ久瘧勞瘧ヲ治ス此レヲ斷ス  
ルニハ鬼哭七壯大敦湧泉各三壯

方  
醫  
輔

大推尖頭 多壯等良レ久瘡勞瘧ニハ

肩背

諸穴

章門

痞根

等多炷

長灼スベレ

景岳全書卷二十四瘡疾門云若痞成難消者須灸章門水道等穴炷アツ稍大多灸或連灸二

三次方得全愈

續方

七枣湯

丹臺玉案

治瘡疾、但寒無熱

附子泡

一個以鹽水浸

煎藥

分為二服、水二鍾、枣七枚、姜七片、煎七分、臨晨日

空心服

○濟生方獨寒ノ瘡ヲ治スルニ薑附湯アリ

即チ此方ニ同フシテ草菓仁アルノミ但分量製法等ハ少異アルナリ

紫陽散、截瘡方

六月土用前ニ

紫陽花ノ葉ヲ採テ陰乾シ置

キ用フルニ臨デ未ト為シ其量大底大合ヒニ一ツホドヲ間日ノ夜一服レ<sup>ヒ</sup>日ノ早曉ニ一服ス薬リノ煎汁及ビ白湯十ドニテ送下スレバ惡心シホドナク嘔吐ヲ為ス但レ十人ノ中一人ハ嘔吐スルヲナク只一二行シテ效著シ花モ効アレドモ葉殊ニ勝ルト

云是レ元ト豊前ノ國民間ヨリ出シ方ニシテ今天下ニ流傳ス余ガ門人筑前州松岡養順ノ家之ヲ數百人ニ試ミレニ无不効者若レ一度ニテ截レズンバ復タビ投ズヘシ但十五歳以尗五十歳以外ハ之レヲ用フベカラズト曰フ

附記

古來厭勝治瘡ノ法アリ杜子美カ日月抵秦樹乾坤繞漢宮ノ詩句ヲ以テセレ事文類聚ニ見ヘ顧光實獅子ヲ畫イテ陸漑力疾ヲ愈ス事竊怪錄ニ見ヘ晋ノ桓石虔小字鎮惡ト南齊ノ桓

康トコノ兩人勇猛過人由テ或ハ其名ヲ呼ビ或ハ其形ヲ画イテ以テ瘡疾ヲ愈ス事アリ鎮惡ノ事ハ世說ニ舉ゲ桓康ノ事ハ史ニ載セタリ外臺祕要ニ許仁則曰此病別有祈禱厭禳而愈者ト吾邦俗モ亦祈禳符咒或ハ水ヲ灌キテ之レヲ劫カシテ治セントレシ或ハ石佛像ヲ繩縛シテ以テ之レヲ愈サントスルノ類アリ俗ニ瘡ハ鬼アリテ是レヲ病マレムルナリト云仁齋直指云瘡方來与正叢及將解不可投藥耗其真氣投藥當於未叢以前兩時之先或遇叢日凌

晨空心與之  
醫門法律云凡用截瘻之法不俟瘻勢稍衰輒求速止者醫之罪也又云在壯盛之體三四歲後瘻勢少減可以截之其虛弱之人始終不可截也誤截致腹脹者每多壞事即服藥亦有避忌瘻勢正盛可服藥阻其來將退可服藥追其去若瘻勢正盛服藥與之混戰徒自苦耳但瘻之來去既遠藥不相及五不當一故服藥妙在將來將去之時○此說詳ニシテ悉セリ仁齋直指ノ論ニ比

ブルハ更ニ精審ヲ加フ矣

又云凡用吐法妄施惡劣之藥並各種丸藥傷人藏

府者醫之罪也○吐法止可用清芬之氣透入經絡引出瘻邪如酒浸常山不用火煎之類其膽礬信石等丸吞入腹中粘著不行攪亂腸胃藏府究竟無益戒之戒之

○俗醫烟艸莖ヲ用ヒテ吐方トスル者アリ是レ惡劣ノ甚シキナリ

校正方輿輓卷之十終