

正義輓

士

嘉

癸丑新鐫

桂里有持先生著

校方輿輓

京攝書房 五書堂合刻

正

白山亭藏書

校正方輿輓卷十二目錄

卷十二

目一

卷十二

目二

卷十二

目三

卷十二

目四

卷十二

目五

卷十二

目六

卷十二

目七

卷十二

目八

卷十二

目九

卷十二

目十

卷十二

目十一

卷十二

目十二

卷十二

目十三

卷十二

目十四

卷十二

目十五

卷十二

目十六

卷十二

目十七

卷十二

目十八

卷十二

目十九

卷十二

目二十

卷十二

目二十一

卷十二

目二十二

卷十二

目二十三

卷十二

目二十四

卷十二

目二十五

卷十二

目二十六

卷十二

目二十七

卷十二

目二十八

卷十二

目二十九

卷十二

目三十

卷十二

目三十一

卷十二

目三十二

卷十二

目三十三

卷十二

目三十四

卷十二

目三十五

卷十二

目三十六

卷十二

目三十七

卷十二

目三十八

卷十二

目三十九

卷十二

目四十

卷十二

目四十一

卷十二

目四十二

卷十二

目四十三

卷十二

目四十四

卷十二

目四十五

卷十二

目四十六

卷十二

目四十七

卷十二

目四十八

卷十二

目四十九

卷十二

目五十

卷十二

目五十一

卷十二

目五十二

卷十二

目五十三

卷十二

目五十四

卷十二

目五十五

卷十二

目五十六

卷十二

目五十七

卷十二

目五十八

卷十二

目五十九

卷十二

目六十

卷十二

目六十一

卷十二

目六十二

卷十二

目六十三

卷十二

目六十四

卷十二

目六十五

卷十二

目六十六

卷十二

目六十七

卷十二

目六十八

卷十二

目六十九

卷十二

目七十

卷十二

目七十一

卷十二

目七十二

卷十二

目七十三

卷十二

目七十四

卷十二

目七十五

卷十二

目七十六

卷十二

目七十七

卷十二

目七十八

卷十二

目七十九

卷十二

目八十

卷十二

目八十一

卷十二

目八十二

卷十二

目八十三

卷十二

目八十四

卷十二

目八十五

卷十二

目八十六

卷十二

目八十七

卷十二

目八十八

卷十二

目八十九

卷十二

目九十

卷十二

目九十一

卷十二

目九十二

卷十二

目九十三

卷十二

目九十四

卷十二

目九十五

卷十二

目九十六

卷十二

目九十七

卷十二

目九十八

卷十二

目九十九

卷十二

目一百

卷十二

目一百零一

卷十二

目一百零二

卷十二

目一百零三

卷十二

目一百零四

卷十二

目一百零五

卷十二

水真草
卷

滋腎丸耳湯

治耳聞之

鼻
張二
十

葛根紅花湯

鼻瘡擦丸

瓜礬散

齒四張

清陽散火湯

松葉煎

文方

治牙痛方

取虫

舌

涼膈

當道

時候

甘
艸

利咽

牛革

卷之三

卷之二

喉痺方

卷之二

升麻湯

破棺湯

集車

卷之十二

口古三十一

陳連太

校正方輿輓卷之十二
桂里有持先生口授

門人

奧州盛岡

八谷文恭子良筆受

甲賀元棟

校訂

眼實卷之十二
○眼科人書ニ五輪八廓七十工症ナド云ア
事アリ五輪八廓八目ノ部分ナリ七十二症
心泪人疾ヲ總ダ余嘗テ臆ヲ以テ度之二眼
心

片見

卷之十二

卷之十二

患數多トイヘトモ虛實ノニニ過ギズ此レ
ヨ考ヘテ療スレバイカナル症ニ會ヒテモ
技窮スルコトハ有ルマジ實トハ素問ニ血
實者決之ト云フノ症ニシテ大凡暴赤腫痛
弩肉瘀突ノ類是レナリ虛トハ血液耗損ス
ル者ナリ又云目得血而能視ト血液耗損ス
ルトキハ視ルトウトシ其症ハ不腫不赤不
痛不痒而無光是レ療目患ノ大略ナリ如シ
内障金鍼撥轉瞳仁等ノ法ノ如キハ別ニ是
レ專科ノ技倆其人ニ任シテ可ナリ近ゴロ
歎五二三子ト醫學入門ヨ會讀スルニ有言曰ク

眼目不過虛實而已ト此レ能我意ヲ獲タリ
嗟乎李氏ハ往時ノ名師我ハ末代粗工賢愚
異等古今隔世而ルニ道相同情ケレバ物相
與ニ謀ルヘシ不知專門塾裡更ニ有言ヤ否
眼科書中ニ小兒眼患多是胎毒及食毒ト
千金方卷之六目病門云春生云生食五辛
熱餐粥食房室無節數看日月夜視星火極目遠視

卷之三

夜讀細書

月下看書

博奕不休
泣淚過多
刺頭出血過多
右十六件並是喪明之本養性之士宜熟慎焉
又有馳騁田獵冒涉風霜迎風追獸日夜不息
者亦是傷目之媒也恣一時之浮意為百年之
痼疾可不慎歟

○眼目暴赤腫痛或天行風毒攻衝スル眼目等症
總テ此湯ニ宜シ古ニ好ミシ艮山翁サヘモ

敗毒

瘟門

1

四

海

三

卷

詩

凡眼病ハ敗毒ノ劑神方ナリト賞美セシ
此實ナリ余嘗テ一女孩頭瘡大ニ發シ眼目腫痛
眵オビタ、レク出ツ因テ子和ノ芎黃湯ヲ
用ヒシニ瘡ハ早ク愈エタレドモ目閉テ見
エズ於是敗毒湯ヲ投セシニ瘡復タビ濕濤
レ目ハ開キテ日ヲ逐ヒ故ニ復スルコトヲ
得タリ

連翹湯方具 毫芩麻桂甘桔白芷

○敗毒ヲ服レツレドモ熱毒不除或久翳膜
ヲ生スル者ハ此湯ニ宜シ一婦人眼効ヌミ
テ漸ク昏暗ナリ服用藥コト百餘貼ニシテ

不見寸効余診之癥毒ノ然ルヲ致スト告
久婦人曰妾未嘗患這箇之疾師ノ診恐ラク
ハ誤ルトナシヤト余曰女曹何ヲカ知ン我
レ吾法ヲ以テ診視スルニ十無一失然リト
雖幸ニ脈浮數ニシテ未ダ沈小トナラズ連
翹湯ヲ服セハ不日ニ雲霧ヲ披テ青天ヲ覩
ルヲ得ベシト婦人伏シテ藥ヲ乞フ因テ
此ヲ與フルト月餘余ガ言ノ如クニシテ愈
タリ

通聖散方具癥治眼目赤腫疼痛或生翳膜脈數者上
毒門

○眼目赤腫レ疼痛シ翳膜力、ルノ類脈

數急ナル者ニハ此方速効アリテ前蓮翹
湯ニ優レリ又風眼暴劇ノ症急ニ治サレ
ハ一二日ノ間ニ吹キ破リテ眸子龜臺元終
大無身明ヲ失ス此方瀬數相用一日ニ五貼ヨリ
十貼ヲ服セシムベシ神驗

謝道人大黃湯外臺第療兩眼痛

大黃芩三分細辛蘚甘艸各六芍藥七分細辛
右五味以水二合煮取一合溫服甚妙
○此方眼ノ痛ムヲ主事シ用フ又通艸朮昔
ヲ加ヘテ能療赤腫

本草集解

卷之十二

大紫胡湯

茱萸 三枚 大黃 黃連

黃芩

茯苓 細辛 甘艸各二分

右七味以水二合煮取一合服

○此方赤眼腫痛眵淚多者ヲ治ス風眼痛
劇キ者モ一日ニ五七貼ヲ服スレハ痛止テ
目損スルコト无レ

大紫胡湯

○大人小兒眼疾紫胡ノ症多シ其候專ラ胸
脇ニ在リ大紫胡聖劑ナレトモ不必拘此ノ
方隨症テ諸紫胡劑擇用フベシ一男兒年十

四五久患眼疾種種投藥佳ナラザルニ非レ
ドモ全效ヲ不得心ヲ潛メテ診之スルニ胸
腹滿シ煩驚ノ狀アリ因テ紫胡竜骨牡蠣湯
桂枝ヲ去テ之ヲ用フルニ稍快ク日ヲ經テ
全愈セリ眼患不必用眼藥蓋醫ハ活術而已
廣濟決明子湯外臺第十一療客熱衝眼赤痛淚出
決明子 外麻 枳實炙 柏胡
黃芩 芍藥各三兩 桑子十四枚 竹葉一斤
車前子四升 甘艸一兩
右十味切以水九升煮取二升五合去渣內芒消
溫服分爲三服

○赤眼痛胸肋妨脹スル者此方ニ宜シ或ハ

加大黃

補肝散證治準繩治方卷七下

黃白黑赤、或一物二形難辨、方

羚羊角

防風各兩

人參

茯苓各兩

玄參

細辛

羌活

黃芩炒

車前子各一兩

右為末食後米飲調服一錢藻按煎服亦可

○此方內障不痛不痒ノ眼疾ニ用ヒ又眼花
或ハ一物二形ニ見ユルノ症ヲ治ス此等ノ

症見ハルゝ者方書ニ呼テ肝風ト云、肝風ト

外本號クルトテ外來ノ病トハ思フベカラズ總
テ病名ニ風字ヲ用フルハ方書例多シ其說
詳于隨筆

夏枯艸湯方具療

○此方目力スミテ明カナラズ或ハ痛ミ或
ハ血縷ナド有ル者ニ可用方書ニ夏枯艸ハ
治兩目血縷或貫瞳人薄暮則痛者ト云ヘル
主症モアリ又本綱夏枯艸附方ナドヲ参考
シテ用ヲ弘ムベシ三條搞東畔格屋吉右衛
門平日心ヲ勞シ肝氣亢ズル人ナルガ偶爾
眼疾ニ罹リテ後ハ一物ニ形ニ見ヘ且眼力

甚ダウトク外晝ニ少レ赤ニアリ諸藥无效
余夏枯艸湯ヲ與フルノ三四十日ニシテ愈
エタリ近コロ金蘭方ヲ得テ閱之ニ一方ア
リ方治太ダ相類スルヲ以テ左ニ鈔ス
玉虎湯金蘭方治素穠虛弱、勤勞、眼目昏暗

夏枯艸 地膚子 山梔

白朮 桑實各三兩

右五味、㕮咀、水煎

夏枯艸湯ハ本逍遙散去加ノ方ニシテ多味
ナリ此方ノ簡ヨ優レリトス

茯苓桂枝白朮甘艸湯方具眩暉門

○此方眼疾昏暗不赤不腫者ニ良レ常ニ柴
葛ヲ加フベレサテ赤眼痛ニハ世醫多ク桂
枝ヲ忌ム又平素俗ニ云ノボセ症ニ桂枝ヲ
服スル日ヲ嫌ス人アリ余初年有客氣惟ヘ
テク桂枝治上衝ノ藥ナリ何害之有ト由テ
強用之シニ赤眼腫痛ハ赤腫ヲ益レ痛ヲレ
テ甚シカラシメタリ又ノボセ症ニ桂枝ヲ
與フルトキ現ニ目赤ク成リ或ノ暎コム者
數人ヲ見タリ又眼科則話並虛眼音療セシ
シムル法アリ其方桂枝君藥ナリ桂枝無チ
トスルニ熏蒸ヲ用テ一旦目ヲレテ赤腫セシ

レハ眼赤腫ヲ致スト不能ト云吁天下之理
有不可誣如此

一書生難シテ曰ク赤眼痛並ニ上衝ニ桂枝
ヲ忌ムノ說謹テ聞^イ之大ニ謂レアルニ似タ
リ然レトモ東洞翁ノ眼疾ヲ療スルヲ視レ
バ槩レテ芩桂朮甘湯ヲ用フ若レ師ノ言ノ
如クナラハ翁豈ニ用^シ之乎ト余曰ク翁ノ桂
芩朮甘ヲ用フルヤ毎ニ芎黃散ヲ副用セサ
ルトナレ桂枝ノ害ヲ為サバルハ多ク大黃,
峻利ヲ副スルニ因テナリ然則病之治^{スル}其効
在芎黃散不^レ在桂芩朮甘湯也子思諸常ニ

滋腎明目湯回春卷五治勞神、腎虛血少、眼痛昏暗

當帰

川芎

白芍

桔梗

人參

山梔

黃連

白芷

甘艸

蔓荊

菊花

細茶燈心水煎

○虛損血少レテ眼目昏暗或ハ痛ム者徐徐
ニ之ヲ服スヘシ素問云目得^レ血而能視ト四
物ヲ用フル所以ナリ

玉屑湯

黃良

茯苓

滑石

薄荷

方輿說

卷之十二

八

統集圖

山紫 各中車前

通艸 各大荊芥

防風

木賊 各中山梔子

甘艸

玉屑 各少

以上十三味、煎服

○癥毒眼ニ痼スル者此方神驗アリ服薬中
塩味ヲ減スヘシ余用此療^キ眼科不能療治者
數十人矣

鶯黃散

○打目撞目爛目頭痛目結毒目風眼痛等一
切血實ノ眼疾ニ用ヒテ有效

洗眼方

白藜 「甘艸 黃連

黃蘗

紅花

黃連

右五味以水一合半煮取一合頻頻洗眼

○是レ目赤ク腫レ痛ム者ヲ治スルノ方ナ
リ眵コム者ナドハ此方ニテ洗ヘハ眵去テ
眼中清爽ニ覺ユルモノナリ若シ疼痛甚シ
後方ヲ用フルモ良シ

又方後方ヲ用フルモ良シ

乾地黃

甘艸

右二味等分水煎洗眼

○此方ハ眼目疼痛ヲ和ラズルヲ為主

一物瓜蒂散

○眼目暴癢或疼痛此レヲ以テ鼻中ニ入レ
嚏セレムベシ是レ一小吐法ナリ

辰砂膏治翳膜方

辰砂 巴豆各等分

右二味合研以麻油及蜜少許和勻塗額會乾則
換之二三日稍覺熾痒隨喫細泡者不過七日有

効

○目ニ星ノ入りタルニ早ク此ヲ施セバ即
消スルヲ得痘毒入眼亦奇

治誤傷目方

生通艸葉搗絞汁滴入眼中若無生者以乾者
細剉水煎頻頻洗之亦效

○眼目被物撞打ニハ此藥ヲ施用スヘシ痛
立止而不見迹絶妙

又方

生水仙根搗絞汁滴入眼中

○コノ方モ亦妙ニシテ其功通艸葉ニ劣ラ

鍼

○素問ニ目得血而能視ト云

能ヲ説タルナリ血實者決之ト云ハ是レ物ニ繫ケテ曰之ナリ凡ソ血實ノ眼患ハ總テ鍼刺ニ宜シ儒門事親眼目ヲ療スルニ專ラ鍼ノ功ヲ稱セリ夫鍼ノ德モ亦大ナルカナ然ルニ李挺曰鍼刀火烙古人忌用唯太陽經熱生^{タガ}偷鍼瘡可刺出血ト嗟乎李挺ノ博識ニシテ猶此言アルハ何如ンゾヤ惟フニ達者モ兼備該洽ハ甚ダ難キ事ニコソ然バ此等ノ細事不可深責之也吾門ニ於ル猶五十歳以後ノ人忌去血如レ少年ニ在ルモ出血過多ハ忌之ナリ此説千金目病門ニモ在リ鍼

治ノ穴處ハ大都ソ頭額眼邊顴骨上項下尺澤手ノ八關等見合セテ刺スベシ驗ノ裡面ヲ刺スアレドモ此レハ老練ノ手ニ非レバ甚以アブナキ場處ナリ先輩鼻中ヨリ草莖ヲ以テ血ヲ出スノ法ヲ言ヘドモ鼻中ハ葉ヲ以テ嚙シテ可ナリ赤目暴翳及ヒ頭目昏痛等ニ嗜鼻方甚良レ外科正宗ノ翠雲散并錠其他群書並ニ諸家所藏ニ嗜鼻ノ方法不少宜擇用外反紅爛ハ治シ難キモノナリ李東垣曰目瞳赤爛歲久俗呼赤瞎是也常以三稜鍼刺目

外以洩濕熱立愈ト字書ニ云ヘラク瞎ハ眞ノ義也タゞレ目ハ眞ニ非ズ然ラバ目赤ク爛レテ淨カラザルヨリ眞ニ同ジト云ノ義ナルベシサテ此症ハ鍼ニテモ治シ難キモノナリ夫^カ鑽肉スラ無効何ニ况ヤ微飲微湯ニ於ルヲヤ故ニ鍼刺ノ不可治ヲ知ルベシ但嬰孩ニ在テハ子和ノ牛黃通膈丸徐徐ニ之ヲ用ヒテ治セシ者一ニアリ

○一醫ノ談ニ女子眼患經久不愈ヨク之ヲ視ルニ一條ノ細紫筋項背ヨリ繞リテ眞ニ流連セリ即チ膏肓ノ邊ニテ筋ノ原トオボ

シキ處ニ針ヲ刺スノ二三本又燈心ヲ以テ内眞ニテ血ヲ取り而シテ藥ヲ投スルノハ子僅ニ五六貼ナリシカ歲餘ノ眼患頓ニ愈エタリト
續方洗肝散入門治風毒上攻、暴赤腫痛、隱澁多淚等症薄荷五分當帰
大黃防風川芎各一甘艸三分
右八味水煎服、或加石膏
○赤眼腫痛ニ最佳方ナリ
雀目ニ四芩散芩桂朮甘湯等皆效アレドモ余カ

家別ニ一方アリ日數ヲ期シテ愈ユ妙妙

菊花丸

治外反赤爛眼方

膽礬或用ドロ

枯礬

右二味、水解、洗患處、極効

附記

倫針瘡京都ニテ目ガサ阿波ニテマロード、云
又目ボレト云フ國モアリ此症藥ハ應ジ難キ
モノナリ俗間ニテ其根ヲ灼クトテ背スヂニ
于テバチト焼ク事アリ捷効アルナリ此
ノ說準繩倫針眼ノ條ニ見ヘタリ一醫曰此症

耳後ニ紫筋見ハル、モノハ其筋上ニ三五壯
ヲ灸スルニ火味消ニ痛頓止矣但シ筋ノ赤
キモノニハ効ナレト又曰、目ガサニハ列缺ニ
灸シ或ハ又少商ニ鍼スルモ良レ少商ノ針ハ
目イボニモ亦ヨレト也

準繩曰目病肝膿ニ毫鍼スル甚良シ出血モ亦
効アリト

耳

耳○耳聾ハ大都氣閉邪閉毒閉虛閉竅閉ノ五道ニ過ギス氣閉ハ氣逆ニ因ル者ナリ雷ナドニ驚キ或ハ忿怒ニ因テ閉ル者モ氣閉ニ竅閉屬ス可レ邪閉ハ傷寒溫疫後ニ在ルモノナリ毒閉ハ大人ハ癥毒小兒ハ胎毒痘毒麻疹等ノ餘毒ニ因ル者はナリ虛閉ハ內氣虛損或ハ老衰ニ因ル者は是也竅閉ハ或ハ耳ダレ耳垢填塞或ハケガナドシテヨリ竅ヲフサグノ類ナリ凡ツ耳ハ聰ニモ障リ生スレ

バ鳴リ且ツ聞エヌ者ナリ近クタトヘバ平
ナル人モ耳竅へ指ヲ入レテ見ヨ乍ニ聲ヲ
ナシ聞エヌナリ况ヤ耳中腫レ或ハ頸項耳
中ノ絡脈怒張スルニ於テヨヤ常ニ耳鳴ル
ハ是レ聲聵スルノ根基ナリ早ク治ヲ施シ
テ佳ナリ

連翹湯 瘟方 具門

瘟方
門具

通聖散 方具瘡門

方具癥
瘡門

○兩耳腫痛或膿水出ル者ニ良レ此症後世
方流ニハ荆芥連翹湯ノ設ケアリ

一散瘡門

○癥毒ニテ耳鳴或聾ト為リ脈數ナル者ハ

7

此方ヲ措テ別ニ劑ナレ如シ其應ゼザルト
キハ酒製ニシテ用フベシ効アラザルト無
シ是レ吾門歷試ノ法ナリ

犀角飲子。入門治風熱上壅、兩耳聾閉、外內腫痛、瞼。

犀角

犀角

赤小豆 甘菊各五分
甘艸三分

○石菖蒲生ノ者效大ニマサル、量數モ多シ
用フベシ

葛根湯方
具門

湯方門具

方集解

卷之十二

海藏園

小紫胡湯

並方具

大紫胡湯

并方具

○耳鳴耳聾胸脇妨満スル者ハ其因ヲ論セ
ス紫胡ヲ用ヒテ胸脇ヲ和スルトキハ聾閉
不制シテ自ラ通ス古方中ニ於テ紫胡湯劑
何病ヲ不問シテ關係スルコト多キヲ知ル
ベレ

紫胡桂枝乾姜湯

方具全上

○耳鳴ニ間コノ方ノ症アリ此レハ動氣上
リテ耳ニ響クナリ

鷓鴣菜湯

方具炎門

○小兒蛻蟲ニ因リテ耳聾ル者アリ善久診
察シ得テ此レヲ用フルトキハ二三貼ニ不
過シテ効功アリ
一物瓜蒂散
○耳聧毒閉ノ者ヲ治ス斯キ人以て取與
中ニ吹ベシ或ハ鼻ニ嗜スルモ良シ凡ツ藥
ヲ吹入耳中必ス息ヲ穩カニ舒緩ニ吹久ベ
シ激勢彈急ナルベカラズ鐵膜一敗則終身
耳聧可慎夫

小兒兒

治耳內腫痛方 外臺

用小薊根洗淨取汁灌入耳中膿血出而愈
○耳內腫痛不可忍者此藥ヲ耳中ニ灌入テ
妙ナリ小薊和名アザミ白花ノ者ヲ良シト
ス如レ此無キトキハ必シモ白花者ニ限ラ
ズ赤色ノ花用フルニ堪ヘタリ生者ノ根ヲ
採リ細ニ剉ミ濃煎シテ注キ入ル、ニ須臾
ニシテ耳裡痒クナルナリ其時ニ乘ジ耳ヲ
下方ニ傾クルニ内ヨリ瘀血惡汁流レ出テ
即チ愈ユ薊根乾枯ノ者ニテハ功ナシ此是
杉浦老翁ノ傳ナリシガ後チ外臺ニテ見ア

此二錄スル即外臺ノ文ナリ

蛇蛻散

又中○如シ小薊ナキトキハ此散ヲ用フベシ頗

有效功

治聰耳流濃方

土用菖蒲根水洗淨取汁先以綿搾將耳中膿水
耳盡攬淨然後將菖蒲汁灌入盪洗數次全愈最妙
○諸般耳膿ヲ為斯症ハ其膿汁出ルヲヨシ
トス醫ノ之ヲ療スルニ或ハ是ヲ乾カサン
トルハ失策ナリ乾ケバ變ジテ眼患ト為
リ又ハ頭瘡ト為ラン其内治ハ排毒托膿ノ

手段ヨシ其外治ハ枯礬烏賊骨赤石脂ノ類
ヲ用フルコト莫レ唯菖蒲汁功アリテ害ナ

シ

灸

耳邊ヨリ頸項ノ間絡脈ノ努張セルヲ看定テ其
上ニ灸スヘシ壯數ハ移多益佳ナリ凡ソ耳病
ヲ治スルノ術此レヨリ良キハナシ

鍼

尺中ヲ刺シテ血ヲ放出スベシ

續方

滋腎通耳湯

卷五

腎虛則耳聾而鳴也

黃柏
白芍
白芷
當歸
川芎
香附
知母
炒生芽
各酒
分等

古剣一劑水煎溫服胸膈不快加青皮枳殼少許
治耳閉不明全上

用真麝香為末葱管吹入耳內後以葱塞耳孔
內耳自明矣

○葱ノ白根輪切ニシ其レニテ耳ヲ塞クハ
麝香透徹ノ氣ノ洩レザルヤウノ為ナリ此
方結毒家ナトニハ最良シ按スルニ麝八耳
閉ニ神功アリ小兒胎毒ニ因テ耳聾ル者ニ

余消毒方ニ麝香ヲ加ヘテ救療セシ者數十人アリ

治結毒耳閉不明方

以龜尿滴數點入耳中神驗

○此レ俗間祕傳ノ方ナリ錄レテ他日ノ試

驗ニ備フ

附記

凡耳竅或損或塞或震傷以致暴聲或鳴不止者即以手中指於耳竅中輕輕按捺隨捺隨放隨放隨捺或輕輕搖動以引其氣捺之數次其氣必至氣至則竅自通矣凡值此症者若不速為引導恐

因而漸閉而竟至不開耳

景岳全書卷二十七

凡卧不宜厚被覆塞耳氣久則不通故養生者常摩耳廓以防聲也

入門卷之十二

○耳廓ヲ摩スルハ甚ダ快キモノナリ養生

家ハ常ニ宜ニ為ノ佳法ナリ

百虫入耳用清油灌入虫吸氣久自出全上

蠅蚊諸細虫入耳以麻油滴數点入竅虫自死取出
蜈蚣蜜蜂等大虫入耳以肉炙香安耳邊其虫聞
香自出有虫夜間暗入耳者宜正坐點燈光向耳
邊其虫自出

丹臺玉案

阿藩富田有寡居老嫗買一婢以助薪水婢兩耳聾

開不便使用問其所由則曰嘗病麻疹爾後閉如
此築石遍嘗无一奏効茲再祈天幸而已嫗曰我
有一術今幸施焉乃將精香油滴入於右耳中至
次日將剜耳匙子徐徐探耳內挑出凝垢一箇大
如芽兒小指其狀內面空鬆而有底限宛似唾壺
邦俗截竹筒下邊留節以充唾壺通稱灰吹右耳忽覺清聰又將香油
滴入左耳中次日如前法挑出凝垢一箇其狀其
大同于前者矣左耳亦清聰久患頓除實可謂奇
術里中无不感其神手者我輩業在濟世而反不
如老嫗也遠矣嗚呼薦堯之言聖人猶擇而不廢
此可不記以自警哉

鼻

○鼻ノ病大畧四アリ鼻フサガルヲ覿ト云
ヒ時時濁涕多ク流テ臭氣アルヲ鼻淵ト云
フ一二脳漏ト稱ス續醫說卷之九ニ古方鼻
淵即今之腦漏是也ト云ヘリ鼻竈ハ鼻中ニ
息肉ガ生ジテ鼻ノ氣道ヲ塞ク也一二鼻痔
ト名ヅケ俗ニ鼻タケト云フ酒查鼻ハ鼻頭
紫赤色ニナルヲ俗ニザクロバナト稱呼ス
コノ四ノ者乃チ鼻疾ノ大綱ナリ此餘鼻衄
鼻扇噴嚏ノ如キハ皆鼻ニ在レドモ鼻疾ニ
ハ非ルナリ

通聖散方具瘡門 儒門事親云、因風鼻塞者、使服通聖散、入生姜葱根豆豉同煎三兩服、大發汗、鼻立通矣、藻按鼻痔、鼻渊、酒查鼻等、皆効

○鼻ノ塞ガルニ此方ヲ用ヒテ汗ヲ取ルハ子和ノ高案ナリ余又コレヲ鼻病ノ諸症熱ニ屬スル者ニ試用スルニ皆効アリ此方劉河間ノ町立ニレテ品味冗雜トイヘトモ善ク用フレハ功效著甚ナル剤ナリ湯ト為シ散ト為ス並ニ可ナリ酒製ニレテ用之更ニ奇ナリトス

葛根紅花湯、療酒查鼻劇症

草大黃

黃連

梔子

葛根

芍藥

生芻

紅花

各一

甘艸三分

右八味以水四合、煮取二合、渣再以四合、煮取一合半、日二劑、服湯數日、覺患所痛痒、則將四物硫黃散擦鼻上、當大發熱、此毒欲盡也、熱既發之後外擦則須止、內服則不須止也、若病輕者小劑減水、不用外擦藥

○酒查鼻ノ劇症ハ鼻頭イボノト、怜王佛

頬ノ如クナル者ナリ數日コノ湯ヲ與へ後四物硫黃散ヲ擦ベレ此レヲ擦ルトキハ大ニ發熱シテ痛ツヨク成リ鼻落ルカト思フ

ホドナルコアリ此レハ傳ケ葉ノ瞑眩ニシ
テ病瘳ント欲スルナリ熱出タレハ傳葉ハ
休メテ唯葛根紅花湯ヲ連進スヘシ此レ
劇症ニ施スノ法ナリ輕者ハ小劑ニシテ用

ヒ外擦藥ハ用ヒズ

黃連解毒湯方具丹

○酒查鼻甚シキハ兩顧ツクダマテモ紫赤ニナリ
或ハ鼻長大ニナルモアリ此方ニ大黃ヲ加
ヘテ用フヘシ或曰酒查鼻輕輕ニ鍼刺スル

コト良シト

辛夷湯

辛夷又防風細辛川芎

白芷

右五味以水一合半煮取一合或擇加大黃石膏

類

○此方鼻渊及ビ鼻痔ヲ治ス熱アル者ハ玉
靈ヲ加ヘ大便祕スル者ハ將軍ヲ加フ入門
ニ辛夷清肺飲ト云フ方アリ此方ト正相類
セリ

芎黃散

一物凡蒂散治鼻塞氣息不通方

千金卷六

○千金ニ凡蒂末少許吹鼻中亦可綿裹塞鼻

方興兒

卷之十二

二十二

統鑑

中ト云ヘリ輕症ハ指頭ニツケテ鼻ニアテ
吸之テモヨレサリナガラ息肉アル者ハ吹
クモ皺フモ不_管^{ヤクニタス}藥氣透ラザルナリ故ニコ
レニハ將_テ藥水或香油ヲ以テ練之綿ノ薄キ
ニ裹ミテ鼻中ニ入レ置クカ又ハ直ニ息肉
上ニ擦ルガヨレ詳カナルハ後ノ仄聲散
方下ニ在リ

四物硫黃散

○酒查鼻劇症ニ鼻上ツブ_クレタルモノ
テキ或ハ天刑ニ類スルニ至ル此症葛根紅
花湯服スルト數日ニシテ後此散ヲ擦ルベ

シ此藥ノ瞑眩ハ鼻痛ミテ熱大ニ發スルモ
ノナリ大熱疾セハ則チ是レ毒盡ルナリ此
ニ至テ擦藥ハ休ムヘシ此擦藥ニテ鼻皮剥
ルコトナド有レドモコレハ畏ルベカラサ
ルコトナリ如シ輕症ノ者ハ硫黃杏仁ニ味
等分為末滾湯ヲ以テ煉之夜毎ニ之レヲ擦
テモ可ナリ内服ハ小劑葛根紅花湯或黃連
解毒湯ナド擇ヒ用フベシ
鼻中生瘡黃蘗換榔末猪脂和擦本綱引
○此症ニシテ乾燥ツヨキ者ハ黃芩杏仁各
等分為末麻油調内鼻中モ為可

續方

瓜礬散入門卷之十二

○此藥鼻痔ノ重症ヲ治シテ効アリ

附記

平人ニ鼻ノ子デレタル人アリ此ハ多ク癪氣ニ
因ルトナリ此症後ニハ癧ヲ發シ及ヒ大病ト
モ為ルトアリ

牙齒

○夫レ牙齒ノ病ヲ視レバ毎ニ胃熱ノ所為
トスルコト口癖叶名ノヤウナルナレドモ其因
殊別ニレテ不_レ止_レ一ベレ或ハ酒肉食過多ナ
ルニ因リ或ハ毒ニ因リ或ハ邪氣客熱ニ因
ル者アリ蛀牙齦齒アリ又俚言ニ氣齒ト云
フ者アリ學士ハ夜燭曉窗ニ書ヲ檢シ商客
ハ算盤紋簿ニ心ヲ屈シテヨリ氣コヽニ相
逆シ齒痛ヲ為ス等ノ類方書ノ未ダ道及ボ
サヽル所ナレドモ世ニ多キ症ナリ其他走
馬牙疳骨槽風ノ類ニ至テハ尋常牙齒患ノ

比ニアラズ

葛根加石膏湯

○牙痛ノ病項背強リ發熱惡寒スル者先ツコノ湯ヲ以テ發越スヘレ赤水玄珠ニ牙齒ノ患初發ハ發表劑ヲ用フヘレ寒涼劑ニ互シカラズト說キレハ有理之言ナリサレゴ

石膏ハヤハリ初發ヨリ加フルガヨレ

涼膈散

方具

舌門

口治

牙根

腮頷

作腫

齒多痛者

○陳實功曰陽明經濕熱作痛者其患腮頷浮腫甚者牽引太陽疼連頸項口中熱氣大便結燥互當涼膈加石膏治之ト按スルニ此レ是

劑大都唇舌牙齒咽喉諸病ニ泛々用ヒテ曲

ニ當ル所ナリ

黃芩

殊臻

清胃散

脾胃論

治上下牙齒疼痛

引頭腦

發熱大痛

、當帰

地黃

黃連

牡丹皮

分各三

升麻一錢

右五味、水煎、稍冷服、痛甚加石膏、細辛、細茶、大黃、黃芩

○此レ後世家牙齒疼痛ノ治スルノ總司主薬ナリ外科正宗此方ニ山梔子甘艸ヲ加ヘテ七味ト為シ名シカテ清中散ト謂フ犀角地黃湯、陳實功曰、治陽明積熱、牙齦腐爛、出血

不^レ止

○此レ牙疳ニ多キ症ナリ

瀉心湯以上二方
諸失血門

○牙疳出血不^レ已者以上ノ二方以テ緩急ノ用ニ應スヘシ並ニ妙

大柴胡湯方具痙

○牙齒痛胸脇妨脹スル者コノ方ヲ服レテ以テ其胸脇ヲ和暢スレバ牙痛自安

甘露飲局方
六治牙疳去血、口臭、齒齦腫痛腐爛大齒

枇杷小石斛

黃芩

枳殼

麥門冬

生芍藥

茵陳

甘草各等

天曲

右八味水煎服原方有天門冬、熟地黃、今刪之、一方加犀角

○牙疳ハ齒齦ヨリ膿血出テ口臭ク齦腫レ
痛ミ漸ク腐爛シ終ニ齒落ツル是ナリ其急
劇ナルヲ特ニ名ツケテ走馬牙疳ト云フ走
馬ハ駿速ナルニ由テノ稱ナリ此症多クハ
瘡痘餘毒ニ幾ス不^レ累日シテ致穿腮破唇此
レ難治ノ症ニシテ黃連解毒湯梅肉散ナド
用ヒテモ及ヒガタレ況ヤ此方ニ於テヨヤ
ルニ其名雖異畢竟牙疳ノ輕症ナルヌ故

ニ皆甘露飲可_レ五枚_リ或ハ六味丸副用又丸

モ亦可_レ清陽散火湯_{之四}正宗卷治牙根盡處結腫連及耳項作

痛名骨槽風也

升麻 白芷

黃芩 牛蒡

連翹 石羔

防風 當帰

荆芥

白蒺藜各一

甘艸 五分

右水二鍾煎八分食后服

○骨槽風イマダ久レキヨ經ザルモノ此湯
効アリ一ニ穿腮毒ト名ツク

六味丸治口臭牙齦赤爛或口鹹

於腎氣丸方中去桂枝附子_マ薑_マ子_マ大_マ
○洛下有一女醫牙疳_ヲ治スル二名アリ嘗
テ其方ヲ求メント欲スレドモ祕シテ傳ヘ
ズ余カ友佐野元達有_レ故テ其方ヲ得テ傳之
於余ソノ方即六味丸是レナリ日後同春ヲ
閱スルニ六味丸治口臭牙齦赤爛ト云蓋レ
女醫ハ固ヨリ昧者ニテ何ノ意旨ナク唯家
傳試験ノ名方トセナルベシ龔氏之ヲ用
フルノ意齒者腎之餘ト云ヘルニ出ヅル
ナラン余嘗テ牙疳_ヲ患フ涼膈渴心其他種
種ノ方劑遍ク服スレドモ一モ功效ナレ偶

方與韓
女醫ノ名方ヲ傳ハリ又龔氏ノ方論ニ其說
ヲ得ルヨリシテ其藥品ノ精良ナルヲ擇ビ
製シテ以テ試之ニ日ニ功ヲ獲四五旬ニレ
テ全ク愈エニキ此等ノ事古醫流人ト不可

與語

松葉煎

青松葉二十花椒

桂枝

中

丁香小

右五味水煎頻頻含之

○治方在男婦ノ別ナシトイヘドモ此レ是
方婦人殊ニ所好外藥ニモテ應効モ亦マサ

五倍子小

蘆薈散方具口

人中白散

鍼灸

○牙疳擦藥ノ最上良方ナリ

壯四五壯灸スヘレ陽谿合谷ニ二三
腸經ナリ合谷一ニ虎口ト名ツク

○又頸項ニ於テ脈絡ノ凝結處ヲ摸索レテ
直ニ其上ニ灸ス甚タ捷法ナリ口舌咽喉ノ

患ニ總ヘテ良レ

續方

一方

烏賊骨 七分 丁子 二分

右二味為末醋ニテ濕浸和調セシメ之ヲ耳中ニ滴リ入ルベシ

一方

輕粉 四分 蒜 六分

右二味為末合谷ニツクリコト凡一 夜次早彼擦藥處アツツヅブクレニ成ルヲ針ヲ以テ潰破之水出テ乃チ痛止ム

○此藥ヲツケタル上ニ蛤殻ヲアテ其上ヨリ絹片ニテ捲キ置クナリ但水泡スルマデノ間臂甚ダシタバルク難堪モノナリ

祖訓治牙痛方

梅肉 五個 茄子香物二個 山蘭三個

右三味燒黑シ為末指頭ニツケテ齒齦ヲ擦推スルトキハ惡血コニ出デ愈ユ是レ我祖先ヨリ歷試ノ神方也

取虫法

○先ツ盤ニ水ヲ入レ其中ニ石ヲ安キ又別ニ一石ヲ以テ火中ニ放チ能ク燒ケタル

時ソノ石ヲ盤中ノ石上ニ載セ而レテ蒜ヲ
以テ燒石ノ上ニ放ケバ灼^{クスボル}炭ス其時ニ乘レ
テ痛ム齒ヲ藥氣上灼ニアテ其氣ヲ吸フベ
レ暫クアツテ之ヲ視ルニ有虫水上ニ浮ブ
如レ此シテ牙痛隨止ム但吸フ時衣ヲ以テ頭
上ヨリ覆ヒ垂レテ氣ヲレテ洩サバラシム
ベシ是レ吾カ同學越智氏試驗ノ法ナリ此
方又癬瘡ニモ良シト云フ我家叢書中ニ口
科一編アリ牙痛取虫方ヲ載ス丁子雄黃韭
實以上三味ナリ用法上ニ同レ

附記

鑽^ビ齒痈外科正宗ニ治術ヲ舉クレドモ都會ニテ
ハ專業ノ者ニ任シテ可ナリサテコヽニ一ノ
談アリ往年一男子傷寒大熱ヲ患フ其人素ト
ナスビ齒ニテ甚タ黒カリシガ傷寒中其齒反
テ色白クナリタル事アリキ白キ齒モ邪熱ニ
會ヘバ黒クナルベキニ黒カリシ者ノ白クナ
リシハ奇事哉ト評シケリ

王宇泰ノ醫鏡牙齒ノ論ニ齒ハ痛ムモノニ非ス
痛ムハ齦ナリト云ヘリ確言ナリサテ醫鏡ハ
後人ノ偽撰トイヘドモ間可^キ取事アル書ナリ

口舌

涼膈散局方治口舌生瘡、咽喉腫痛、燥渴便閉者

薄荷二分

甘草半分

連翹一分

大黃半分

芒消

梔子

黃芩各五分

右七味以水二盞先煮五物取一盞二分去滓內

大黃芒消煮取一盞

○此方熱毒ニテ口舌ニ瘡ヲ生シ尚便閉ルモノニ宜シ重舌ニモ亦用フ又服輕粉丸後口中糜爛スル者コノ方ニ石榴皮ヲ加ヘ用ヒテ大ニ功效アリ儒門事親ニ黃連半兩ヲ加ヘ黃連清心湯ト名ツク

集車

如減涼膈散同春治三焦火盛、口舌生瘡

連翹
黃芩
梔子
桔梗

黃連

薄荷

甘艸

枳殼

水煎、食遠服

○前方ノ症ニシテ消黃難用者ハ此方ヲ與

渴心湯方具失舌腫滿、口不能聲、飲食不通、名重舌

フベシ

者、內服此方、外用碧雪、頻刷舌上

○コノ方重舌舌齶ソノ他口舌諸症ヲ治ス

灰屋茂右衛門妻舌腫テ口内ニ盈ツ食餌不

下語言不能醫涼膈加石羔ヲ與フルコト百
餘貼其他諸治一モ應セズ余渴心湯ヲ作テ
之ヲ与フルニ日ニ漸々得效浹旬ニシテ全
ク愈ユ此湯ノロ舌ニ於ケル真ニ是レ玉液

仙丹ナリ

升麻煎千金卷之六治膀胱熱不已、口中生瘡咽腫者

升麻

玄參

薔薇根白皮

各四兩

射干

大青

黃蘖

各三分

右七味以水七升、煮取一升五合、去滓、下蜜、更煎

兩沸、細細含咽之

○薔薇ハ野薔薇ナリ野生スル白花ノモノ

ヲ佳トス根莖葉皆可用和名イバテ
大青ハ藍葉ナリ醫學正傳ニ藍葉即大青葉
ト云ヘリ若シ藍葉ナクバ清缸花ニ代フル
モ可ナリ青缸花ハ藍甕ノ上沫ヲ取テ乾力
シタルモノナリ此方口瘡咽腫牙齒ノ病ニ
皆効アリ

一方全上治下口中瘡久不癒入喉中并生瘡三年以上不愈方

濃煎薔薇根汁含之又稍稍咽之日三夜一冬
用根夏用莖葉

按孫真人治口瘡多用薔薇根論曰凡患口瘡

及齒禁油麪酒醬酸醋鹹膩乾東瘡後仍須慎
之若不久慎尋而再發則難瘡薔薇根角蒿
為口瘡之神藥人不知之也

當道飲

茱萸葉 夕向カサウエ各二

右二味以水二合煮取一合去滓內蜜四錢烊消

溫服

○舌傷レテ瘡ヲ生スル者此湯奇効アリ
清熱補氣湯准繩治中氣虛熱口舌如無皮狀或發
熱作渴

人參

白朮

茯苓

當帰

方輿觀

卷之十二

三十三

疏證闡

芍藥分各五升 麻分各二

玄参

甘艸分各二

右十味、水煎服、不差者加附子、
按產後口舌痛者消黃朱石類多無功效、吾師

毎用此方真良、

○口舌如無皮狀トハヒトカハ剥キタルカ
ゴトクニ赤ク糜爛スルヲ云フ諸疾ニコレ
有レドモ產後ニ最モ多キモノナリ愚案ス
ルニ此舌ニレテ其乾矢ル者ハ加減涼膈散
ニ宜シ其潤ホヘル者ハ清熱補氣湯ニ非レ
ハ治ヲ得ザルナリ或ハ附子ヲ加フル症モ
ハ治ヲ得ザルナリ

アリ李南澧曰口舌生瘡脈洪疾速若見脉虛
中氣不足ト今按スルニ脈洪疾速ハ陽症ニ
シテ涼膈渴心ノ所主ナリ脈虛ハ陰症ニシ
テ即チ此レ補氣加附子ノ主ドル所ナリ
錢氏白朮散方具泄渴門龔氏云中氣虛熱、口舌生瘡、不
喜飲冷、服之即効

○虛熱ト云ヒ不喜飲冷ト云フ宜ク心ヲ著
クベキ所ナリ尚齧口門中ニ説アリ當ニ參
攷スベシ

理中湯方具治渴門

○舌ノ患寒冷ノ劑ニテ治セズ大便不實者

夜鷦鷯轉

可與此湯

八味丸方具瘡

八味丸閉門云舌者心之苗也ト凡リ舌病ハ芩連石
○經云舌者心之苗也ト凡リ舌病ハ芩連石
羔ノ類ヲ用ヒテ心熱ヲ瀉スレハ治スルモノ
ナリ如レ治セザル者ハ是レ心移熱於少
腸ノ症ナリコニ至テハ五芩散ヲ用フ五
芩應ゼズバ八味丸ニ五レ

碧雪

○重舌木舌ソノ他口舌ノ諸患總ベテ此藥
ニ五レ舌腫テ滿口或ハ舌上無故レテ出血
如線者ナドハ蒲黃一品ニテモ効アルナリ

蘆薈散

○此藥ヨクロ舌糜爛スルヲ治シテ神效ア
リ舌疽ニモ亦用フベシ蓋レ此散ハ瘡ノ腐
爛ヲ遏止スルノ妙劑ナリ故ニ口中諸患ニ
不限下疳蠟燭發及ビ諸瘡癰疽腐蝕ノ者以
此洗ヒテ佳ナリ

城南散

○コレ治舌疽ノ方ナリ蓋シ舌疽ト云フ
何レノ代誰人ノ言ヒ始メシナルヤ漢人
ノ書ニハ其名見ヘズ金鑑清溪祕傳比庭丹
方下ニ舌疽ノ字アリ回春黃白散方下ニ口

中瘡瘍ノ目アリ此ニノモノ舌疽ニ近似ス
レドモ是レ的覈ニモアラザルベシ今克ク
此病ヲ視ルニ初メ腫ヲ作レ漸ク瘡蝕シ終
ニハ巖屈ノ如クニ成ル其劇甚ナルハ血大
ニ流レ出ルモアリ信ニ口患中ノ最大險惡
ノ症ナリ治方涼膈三黃升麻煎犀角地黃當
道飲等及正熏洗搽擦ノ諸藥アリトイヘド
此散尤モ絶妙トス若レ遺毒結毒ノ所為
ナレバ玉屑丸五寶散土茯苓劑等ヲ與ヘ外
此散ヲ傳クベシ此餘牙齒咽喉口中一切諸
薦瘡疾用ヒテ効アラザルハナレ真ニ濟世ノ神

鍼

紫雲條

○結毒舌瘡ヲ治ス

千金卷之第六云治舌卒腫滿口溢出如吹猪
胞氣息不得通須臾不治殺人方急以指刮滑切刮削又摩也破舌兩邊去汁即愈亦可以鍼刀決
兩邊破之以瘡膏傅之又云刺舌下兩邊大脈
上治不愈或出血數升則燒鍼蓖冷赤熨瘡數
過以絕血也

龔廷賢曰凡舌腫脹甚。宜先刺舌尖或舌上或
邊傍出血泄毒以救其急。惟舌下濂泉穴此屬

腎經雖宜出血亦當禁鍼慎之

陳毓仁曰治重舌木舌紫舌脹等疾腫脹疼痛
硬強不語又兼舌根併兩齒合縫盡處作瘀血
金塞口噤難開俱用此法刺之用鼈線針扎在
筋頭上在患所點刺出血紅紫毒輕紫黑毒重
患甚者數十刺皆可血盡溫湯漱之

萬全曰兒有重舌重齦者宜用三稜針刺去血
內服東垣涼膈散。凡口內諸病唯針最捷。

張子和曰余治一婦人木舌脹其舌滿口諸藥

不愈余以銛鍼小而銳者砭之五七度腫減三
日方平計所出血幾至盈斗

○大樹屋阿柳舌根肉壅腫シテ短少如舌モ
ノ疊出シ言語氣息モ通シ難キコト數日ナ
リ來テ診ヲ乞フ余才モヘラク此レ重舌ノ
症ナリト即チ鍼ヲスムルニ懼怖シテ不
服止ムトヲ得ズ只涼膈散ヲ與へ日ヲ經ル
ノ間再三鍼刺ノ利ヲ説クニ病婦モ意領ズ
ルガ如ク且ツ病ノ延纏ヲ憂ヒテヤ遂ニ鍼
刺ヲ請フ乃チ門人某ヲレテ之ヲ刺サレム
血少許出即愈重舌トハ舌下腫實シテ其狀

又舌ノ一層スルカ如シ故ニ謂之重舌真ニ
兩舌アルニハ非ルナリ

續方

斑龍散

○產後口中糜爛ヲ治ス

附記

余カ所識浪華一男子舌瘡諸藥无効賀州君精製
ノ紫雪ヲ得テ傳之其冷氣舌心ニ透ルノ錐ニ
テモムガ如クニ覺テ愈ト云

咽喉

○咽者胃管主納水穀而居後喉者肺管專主
呼吸而居前誠ニ飲食ノ門戶呼吸ノ橐鑰ナ
リ若シ微恙アラバ忽略ニ為スベカラズ咽
喉ノ病凡テ一十八種アリトイヘドモ要ス
ルニ不過四五症ノミ初學病名ノ多キニ眩
スルコト莫レ

麻黃升麻湯治咽喉腫痛憎寒壯熱者

麻黃

升麻

黃芩

石膏

當帰

知母

右八味以水二合煮取一合溫服汗出而愈

○咽喉腫初發熱毒盛シナル者互ク此方ヲ用フヘシ表症已ニ退キ腫痛不消者ハ方ヲ

轉スベシ

升麻鱉甲湯、陽毒之為病、面赤斑斑如錦文、咽喉痛

唾膿血、五日可治、七日不可治

升麻二兩、當歸

蜀椒各一
半兩

鱉甲手指大

雄黃研半兩

右六味以水四升、煮取一升、頓服之、老少再服、取汗

○余初年金匱ヲ閱セシ頃意ニ謂ヘラク若

後世ノ搆議スベカラサルモノナリ

因

個ノ方藥豈ニ能ク咽喉ノ劇症ヲ治シ又能

三ク汗ヲ發セシヤト後此症ノ流行ニ會ヒシ

禁ガ一タビ試之ニ功效大出

意表一鳴乎古方ハ

後世ノ搆議スベカラサルモノナリ

涼膈散

方具口

○熱毒攻咽腫痛シニ便祕閉スル者コノ方

用ヒテ无不効

防風通聖散

方具口

○此方口瘡ヲ療シ又咽腫ヲ治ス
升麻煎

方具口

甘艸湯、少陰病二三日、咽痛者可與甘艸湯、不差者

興桔梗湯

甘艸二钱

右一味以水三合煮取一合半去滓分温再服

○此方咽喉痛ニツヨキホド能ク癒ナリ蓋シ甘艸ハ咽喉ノニ不限諸凡ノ痛ヲ能ク

ヤハラグルモノナリ

桔梗湯

桔梗一钱甘艸二钱

右二味以水二合煮取一合去滓分温再服局方第七卷咽喉門如聖湯即是也三因方加荆芥二

三錢名荆芥湯尤効

○甘艸湯ヲ服シテモ腫痛不差者ハ是レ必ス膿ヲ催ホスナリ此ニ至テハ痰涎ナド漆フベシ此症桔梗湯ニ非レバ功ヲ成スト能ハズサテ後代多ク此方ニ基キテ製セル方不少甘艸桔梗ハ咽喉病ノ要藥ナリ

利咽解毒湯活幼

山豆根

麥門冬各一毫

玄參

桔梗

右七味生姜水煎服

○此レ痘毒咽喉ニアツマリテ腫痛スルヲ治スルノ劑ナリ借テ以テ一切咽喉腫痛ヲ

治スヘシ
苦酒湯、咽中傷生瘡、不能語言、聲不出者

苦酒湯、咽中傷生瘡、不能語言、聲不出者

半夏劉一雞子一枚去黃停白苦酒二合

古二味、内半夏著苦酒中、以雞子殼置刀環中、安火上令三沸去滓少少含嚥之、不差更作三劑

徐大椿曰此等煮法必有深意、疑即古所云禁方也、ト禁方ト云事、醫學源流卷上ニ詳説ア

リ其文繁ヲ以テ茲ニ不錄

○此湯煮法余曾テ此レヲ種種ニセレガ近一老醫ノ試驗ノ訣ヲ得タリ服シ易ク且ツ利アリ如左

雞子殼太苦酒ヲ盛リ太半夏切丁片トナセルヲ五枚剥レ別天銅線又似手刀鑑様正製マシテ其中ニ置キ火上ニ安イテ三四沸セレメ滓ヲ去リ又雞子一個白バカリヲ其三箇ヲ取テ苦酒中ニ内ヒ又煮ルコト二三沸シテ咽門ニ放チ入ル如此スルヲ一日ニ三次ス有捷効

牛蒡子湯入門卷之十二治風熱上壅、初發牙關緊急、已發

咽喉腫痛、或生瘡癰、及愈後復攻胸膈、氣促身熱、不能言卧

牛蒡子二玄參

犀角

升麻

黃芩

木通

桔梗

甘草

各一

咽喉解毒湯

甘艸

桔梗

大黃

石羔

川芎

奇良

木通

右七味水煎溫服

○癰毒咽喉ニ癥スル者此湯神驗アリ不應
者ハ熏法ヲ施スレシム手癰毒咽喉口鼻ニ

黄芩スル者ハ多クハ父母ノ遺毒ニ係ル熏絲
以テ其厄ヲ救フヘシ

加味四物湯同春卷五治虛火上升喉痛并生喉瘡喉痺
熱毒最能降火甚効

當帰

黃柏

知母

花粉

川芎各二分

桔梗

甘艸各七分

熟芻

右九味以水一合半煮取一合入竹瀝同服
○此方咽喉病日久經テ不愈其人困憊脈微
數ナル者ヲ治ス天花粉ハ咽ニヒツクリト
シテ飲ミゴロノヨキモノナリ水藥モ通

リガタキ症ニハ量ヲ倍シ多分與スヘシコ
ノ品ニハ大ニ美惡ノアルモノナレバ上品
ヲ擇テ用フヘシ伊賀州廣岡文臺家世口科
ヲ業トス其家方ニ甘花散トテ甘艸天花粉
二味ノ吹薬アリ甚夕奇効アリ

山豆根本綱云解咽喉腫毒極妙

○凡ソ咽喉腫閉ヲ治スルヨト此藥ヨリ捷
キハナレ真ニ開關ノ神藥ナリ此品舶來ア
リ本邦產アリ皆真ナリ但舶來ノモノ其功
殊ニ優レリ

雄黃解毒丸

○咽喉腫レ塞リ垂死者コノ丸ヲ服レテ吐
下ヲ得レハ即チ愈エ方書ニ是ヲ開關藥ト
曰ヘリ凡ソ咽喉急症ニ巴豆組ミ合セタル
丸若散等種類之レ多シ若シ丸散ナキトキ
ハ巴豆末少許ヲ以テ吹キテ之ヲ開通セシ
ムルモ亦速効アリ

碧雪

○咽喉腫痛輕症ヲ治ス

蓼巴散治繆喉風急喉閉

急迫ノ者ハ巴豆ノ一品峻効萬彙ニ記タル
ヲ見ル

治走馬喉痺

用巴豆去皮以綿子微裹隨左右塞於鼻中立透如左右俱有者用二枚

玄衣散

○頸項ノ際ニ於テ發泡スヘシ捷効

鍼

喉痺宜用三稜針刺少商穴放去毒血此唐成綽項腫如斗喉閉欲死甄權刺之出血立愈法也少商穴在手大指內側去爪甲角如韭葉藻按スルニ此法喉塞輕症ヲ治スヘシ病勢既ニ逼リ急ナルニ八刀針ヲ用テ直ニ之ヲ決

古スルヨ妙トス孫對徽喉痺論云煎劑卒難奏功丸散安能施效病勢既逼將立而視其死矣必須用刀針以決之庶可以洩其毒而救其急然後以藥乃可愈耳ト此レ直ニ喉ヲ刺スナリ此症項背ニテ放血スルモ良シ

吳氏醫方考卷之五云凡患人喉中紅赤反用鍼從傍鍼之出血即愈所以必欲傍針者避夫症門穴犯之令人失音故耳又云名醫錄云李王公主患喉瘻數日痛腫飲食不下召到醫官盡言須用鍼刀潰破公主聞用刀鍼哭不肯治痛迫水穀不入忽有一草澤醫曰某不用刀鍼

只用筆頭蘸藥，瘡上霎時便潰。公主喜，令召之。
方兩次上藥，遂潰出膿血一盞，餘便寬而兩日不
瘡無事。令洪其方，醫云乃以鐵繫筆，心中輕輕
劃破而潰之爾。他無方也。

續方

外麻湯療咽喉生瘡引古今錄驗

廿
四

升麻

石
羔

卷之二

分

右四味水煎服

破棺湯

桃仁 嫩安 杏仁 桑相白皮

右三味以水二合煮取一合

THE HISTORY OF THE AMERICAN REVOLUTION

10

—

○此治咽喉痛尤奇方

喧騒ニモ亦良レ方完璧

モ效意外ニ出ヅ初學故

一醫人咽中疼痛ニ患

ナル百計スレドモ不_安

ル余追思スルニ早クト

伊倖セシモノ

○此方能ノ痛ヲヤハラグ竹木刺魚骨硬ナ
ドニテモ痛ム者ハ此散ヲ吹キニ可

附記

喉痺急症ニ巴豆ヲ吹ク前ニ云ガゴトシ又膽
礬ヲモ吹キテヨシ此等イヅレモ開關ノ仙藥
ナリ然レドモ須待膿成吹之不然不唯無功却
テ人ヲレテ煩セシメン

往年咽喉ノ病天下一般ニ流行セシ事アリ其症
熱毒酷烈ニシテ一二日ノ間ニ嗌白ク膨脹或
ハ紫黒赤穢色ト成ル治ヲ急ニセザレバ二三
日ニ命ヲ殞シ又醫此レヲ急喉痺ト稱シ又ハ
喉瘻ト呼ビ或ハ纏喉風或ハ天行猛疽トシ稱
呼不レ余モ亦初メハ其鮮ヲ得ザリシガ療ス

ルト五七人ニ及ビ偶爾ニ金匱ノ陽毒陰毒論
ヲ心ニ會シ惟ヘラク此レ瘟ノ一症ニシテ即
是痧ナリトシ其ヨリ治法モ定マリ初起ハ先
麻黃升麻湯ヲ與ヘ二三日ヲ經ル者ハ雄黃解
毒丸ニテ大ニ下之或ハ鍼刺放血ナドレテ大
半救活ヲ得タリ金匱ニ五日可治七日不可治
ト曰トイヘドモ此時ノ重症五日ヲ過ギシ者
一人モ不見之誠ニ至劇至急ノ暴病ニシテ死
セシ者不知數近日唐迎川吳医彙講ヲ讀ムニ
爛喉丹痧論見タリ曰々近來丹痧一症患者甚
多患而死者亦復不少世人因方書未及治亦無

從措手或云辛散或云涼解或云苦寒泄熱俱師
心自用各守專門未嘗探其本源按仲師金匱書
陽毒之為病面赤斑斑如錦紋咽喉痛吐膿血五
日可治七日不可治升麻鱗甲湯主之文細繹其
義實與此症相類何會心者之絕少耶惟是升麻
鱗甲湯蓋以升麻升透厲毒鱗甲泄熱守神當歸
和血調榮甘艸渴火解毒正內經熱淫於內治以
酸寒佐以苦甘之旨而內有蜀椒雄黃似當加於
陰毒方中或因傳寫之訛耳一轉移間則於陽毒
陰毒之義尤為貼切而人之用之者亦鮮疑畏矣
今如遇此丹痧一症當於經義詳之毋謂古人之

未及也不揣愚陋用敢質之同人ト此說少シク
得失モアレドモ此病ノ大義ヲ得タリ爛喉丹
痧ノ名モ亦的切ト謂フベシ

靈樞癰疽篇ニ瘡瘍中ニ發スルヲ名ツケテ猛疽
ト云ノ猛疽ハ速ク治セザレバ化シテ膿ヲナ
シ膿渴セサレバ咽ニ塞リテ半日ニシテ死ス
猛ハ烈也其毒猛烈ニシテ暴急ナリ喉瘍ハ蓋
シ此レノ緩症ナリ

校正方輿輓卷之十二終

人或云淮海財小歸大之
歸夫子之子十五世蘇人大義之餘父兄顯榮也