

校
興
輓

十三

東山先生藏書

校正方輿輓卷十三目錄

頭痛 一張

川芎茶調散

麻黃附子細辛湯

防風散

一方

塩湯取吐方

肩背痛 七張

頭風神方

提肩散

椒附散

擦藥方

心痛 胸痺

舒筋飲

桂枝生薑枳實湯

結胸 十二張

千金陷胸湯


小陷胸湯

方輿輓

卷之十三

目一

疏春園



枳實薤白桂枝湯

茯苓杏仁甘肅湯

枳縮二陳湯

疎肝湯

薏苡附子散

附聖惠薏苡散

聖惠括蕞薤白半夏湯

腹痛 二十張

桂枝加芍藥大黃湯

黃連湯

高良薑湯

大建中湯

意表湯

腰痛 二十張

甘肅乾姜茯苓白朮湯

腎著散

葛氏療腰痛方

小品療腰痛積年者方

打撲 金瘡

破傷風

三十張

千金服尿方驗

雞鳴散

服曼陀羅實方

蟲獸傷 三十張

甘肅解毒湯

雄香飲 一名雞

通聖散加雄黃方

治毒蟲蟲獸咬傷方

治鼠毒方

東洋療風犬毒方

治蜘蛛蜈蚣貓傷等方

湯潑火傷

灸瘡 四十張

方輿覽

卷之十三

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯

四順清冷飲 救治烟薰方

治湯火傷方 治灸瘡方

又方 三首

漆瘡 四十張

內服方 敷生蟹方 療方 三首

防漆瘡方

魚骨硬

竹木簽刺 五十張

治骨硬方 三首 祖傳奇方

竹木刺咽 食糕硬咽 魚骨硬方類

校正方輿輓卷之十三

桂里有持先生口授

門人 奥州盛岡八谷文恭子良筆受

平安 松田宗誠意之 校訂

甲賀元棟 梁

頭痛

方輿兒

○頭痛ソノ因一ナラズ、傷寒温疫ハ言フニ
及バズ、癩癧虺虫癰毒ノ諸雜病、皆頭ヲレテ
痛マシムルナリ、又食齕ノ者アリ、痰厥ノ者

卷之十三

流家園

二、身事

アリ、婦人ハ血ノミチミ因ル者アリ、當推究
其所由而治之、方書ニ頭痛頭風ノ兩名アリ
頭痛トハ淺近ナル者ニ係リ、頭風トハ其痛
ニ於テ作止有テ、一應ナラザル者ヲ謂フニ
似タリ、此症ニシテ核塊ヲ起ス者ヲ雷頭風
ト稱セリ、眞頭痛ト謂フニ至テハ、痛引、腦顛
陷至泥丸宮、手足冷至節、夕發朝死、朝發夕死
ユダンスベカラザルノ劇急症ナリ、コノ餘
厥頭痛偏頭痛、腦風等ノ目レドモ、皆無用
ノ剩名不足取

川芎茶調散 局方治偏正頭痛

薄荷

荊芥

川芎

羌活

白芷

甘草

防風

細茶、水煎服、或為末、茶清調下

○此方內因外因及ヒ偏正ヲ論セズ、一切頭
痛ニ用ヒテ効驗アリ

小柴胡湯

大柴胡湯

二方並具
痰癖門

○頭痛脇下硬滿スル者ハ其因ヲ論セズ大
小柴胡ヲ撰用シテ効アリ、症ニ隨テ細辛薄
苛石膏ノ類ヲ加ヘ、或ハ多ク菊花ヲ加ルモ
亦得タリ

方輿記

卷之十三

二

流泉園

逍遥散 方具勞

○婦人、チノミチ頭痛ニ良シ、老師常ニ加候

蒺藜荷

大承氣湯 方具大腹滿、偏頭痛者、不拘新久、服之

○頭痛、食鬱ニ因ル者アリ、コレ胃家實スレ

バ氣不下降ノ致ストコロナリ、此症新久偏

正ニ拘ハラズ、下之立瘥然シ大承氣ハ便閉

シ腹滿甚シキ者ニアラザレハ不可輕用、ヤ

微ナル者ハ小承氣ソハ又微ナル者ハ平

胃散モ亦用ユベシ

白虎湯 方具

瘟門

○頭痛劇クシテ如破、或ハ目ニ連ナリ牙齒
マテモ痛ミ脈長洪ニシテ、舌黃黒ノ者、此方
速功アリ

防風散 本事方 治頭目不清、神志不爽、常服去風明
目

防風

川芎

香白芷

甘菊花

甘艸

右各等分為細末、每服二錢、荊芥湯調下、藻按水
煎亦可

○頭痛久不止者、予コノ方ヲ用テ間コレヲ
愈セリ、菊花ハ分量他、四味ニ倍スベシ、不爾

方輿記

卷之十三

三

流泰園

本草綱目

菊

効ナシ、案スルニ菊花ハ、神農本草ニ味苦トアリテ苦キ味ガ本ナリ、陶弘景コノカタ、甘ヲ以テ真菊トスレドモ不可從、宜ク味苦、花小、色黄ナルモノヲ採テ水ニテ洗淨メ、蒂ヲ去リ日ニ乾シテ聽用スベシ

通聖散 方具癰瘡門

○結毒頭痛脉數ニシテ熱アル者ハ、此方甚ダ良シ、經久ノ者ニハ酒ニテ製シ用フレバ更ニ功力ヲ副フ、張潔古曰、凡病在頭面及皮膚者、藥須酒炒、李東垣曰、凡治至高之病、加酒煎

麻黄附子細辛湯、頭痛足冷、氣逆、其脉沉細者

麻黄 細辛 各六分 附子 五分

右三味、以水二合四勺、煮取九勺

○此方頭痛脉沉細ニシテ、或ハ惡寒シ、手サキ足サキ冷ユル者ニ良シ

吳茱萸湯 方具嘔吐門 乾嘔吐涎沫、頭痛者

○嘔吐アル頭痛ニハ、コノ方ヲ少シヅ、與フレバ早ク治マルモノナリ、婦人氣逆ノ甚レキ者、及ヒ藥汁嚥下レ肯ンゼサル者ナドニハ、宜クコノ消息ヲ用フベシ

方輿覽

卷之十三

四

施 泰 園

備急葛氏、主卒頭痛如破、非中冷、又非中風、是胸膈

身車

中痰厥、氣上衝所致、名厥頭痛、吐即差、療方

以塩湯吐、不吐擦出

○李東垣曰、頭痛久不已、則令人喪目、胸膈有宿痰之致然也、先以茶調散吐之、愚案スルニ後方モ亦可用

一方

常山 二錢 甘艸 二分

右二味、以水二合八勺、煮取一合五勺、服、不吐更服、內蜜半升

頭風神方 先醒齋華記

沉觀頤中丞傳自一道人、予僕嬾患此痛甚、欲自縊、二劑、數年不發

土茯苓

忌鐵

金銀花

三錢

蔓荊子

一錢

玄參

八分

防風

天麻

各壹錢

辛夷花

川芎

各五錢

黑豆

四十粒

燈心

二十根

芽茶

五錢

河水井水、各一鍾半、煎一鍾服

○癰毒頭痛、經久不止者、宜與此方、或ハ玉屑丸ヲ副用シ、鍼刺兼子行ノ事モ有リ、或曰ク方中ノ土茯苓炒黒クシ用テ殊效アリト、不知然ルヤ否ヤ張氏醫通ニハ即山牛湯ト名ケタリ

芎黃散

○此レ頭痛通治ノ良藥ナリ、癰毒ヨリ來ル

方見兒

卷之十三

五

施家園

身車
身車

者ニハ殊ニ効アリ、茶清、又ハ温酒ニテ送下

ス

一物散

李挺曰、濕家鼻塞聲重頭痛者、令病人先嚙水一
口、勿嚙、次將瓜蒂散一字入鼻內、搐出黃水為度
○コノ症、タゞ濕家ノミナラス、痰飲ノ甚シ
キ人ニモアリ、ソノ他諸般ノ頭痛ニ泛ク用
フベシ

鍼

醫方考卷五曰、唐高宗苦風眩頭重、目不能視、
疾甚、召秦鳴鶴、張文仲診之、鳴鶴曰、風毒上攻、

若刺頭出少血即愈矣、天后自簾中怒曰、此可
斬也、天子頭上豈是試出血處耶、上曰、醫之議
病、理不加罪、且吾頭重悶、殆不能忍、出血未必
不佳、命刺之、鳴鶴刺百會及腦戶出血、上曰、吾
目明矣、言未畢、后自簾中頂禮拜謝之、曰、此天
賜我師也、躬負繒寶、以遺鳴鶴、崑謂諸痛為實
理、互瀉之內經言、出血者屢矣、必以血變而止、
今南人惡於鍼石、每畏出血、北人猶然、行之經
曰、惡於鍼石者不足與言至巧、故醫之巧者、必
兼鍼石、嗚呼、丹溪之賢、不知鍼石、今世人羣然
以醫之大成稱之、此子禽之賢、子貢也、使翁作

方身轉
方身轉

於九原則一言以為不知、必於斯人而未之矣

續方

石亭丸

○是レ沈存中硫黃圓ナリ、原方ハ硫黃消石
二味各等分ナリ、與村翁硫黃ヲ倍シ荷葉黑
ヤキヲ加ヘテ石亭丸ト名ヅク、冷茶ニテ送
下、諸凡頭痛ニ良シ、耳聾ニモ亦用之

肩背痛

葛根湯方具項背強凡凡者

○凡凡トハ項背強リテ首モマハラヌト云
バカリナルヲ形容シ言フナリ、コノ症ニシ

テ脈浮數ナル者ハ其病因ヲ問ハズ、此方ニ

テ發之ベシ、隨症大黃烏頭ノ類ヲ加フ、如シ

小柴胡湯方具症

○肩臂痛其人脇下硬滿スル者ハ、此方ヲ與

テ脇下ヲ和スベシ

逍遙散方具勞

方具兒

不
身
轉

每
精
開

○後世腎痛ノ論ニ、肝火血虛ト云コトヲ言
ヘリ、コレ肝火ニ因テ血燥クノ症ナリ、宜道
遙散

鳳翥飲

○瘀血上逆、肩背ニ攻ムル者ヲ治ス、所謂ハ
ヤケンベキナドニ最良

提肩散

柞木皮十五

柞木葉

千屈菜

莖葉並用
各七錢

右三味、同炒、每貼三錢、以水一合半、煮取一合、溫
服

○此レ本朝方ニシテ、治肩背痛ノ奇藥ナリ、
本病因ヲ不分シテ、泛ク之ヲ用フレドモ、今
親シク試ムルニ、毒ニ因ル者、殊ニ効アルニ
似タリ

治腎氣上攻、項背不能轉側、椒附散本事

大附子一枚六錢以上者、
炮去皮臍末之

右每末二大錢、好川椒二粒、用白麝填满、水一盞
半、生姜七片、同煎至七分、去椒入塩、通口空心服

○コノ方項背轉側モナラヌバカリニ強ル
者ヲ治ス海傳正次吐血ス、予瀉心湯ヲ與ヘ
テ吐血ハ止ミシガ、其項背強バリテ回顧ス

身軀
之軀軀

ベカラズ、因テ種種ニ方ヲ轉ズレドモ、不應
於是醫ヲ更フルコト數人、痰ト言フ者アリ、
毒ト稱スル者アリ、或ハ癰ト呼ビ、或ハ酒毒
也トシテ各其技ヲ盡スニ一モ効アルコト
ナシ、最後ニ荻野元凱至テ是、方ヲ用フ、四五
貼ニシテ即瘥ユ、本事方醫門法律等ニ治驗
ミエタリ互參考

控涎丹、治項背強痛、或臂不能舉者

○膈間有頑涎、肩背コレガ為ニ強痛シ、或ハ
臂不能舉者ニハ、此丸多ク用ヒテ下ヲ取ル
ベシ、モシ攻下ニ勝ヘザル者ハ、毎ニ十九ホ

ドヅ、稍稍服^ス之片ハ、不下トイヘドモ、水氣
暗ニ散除シテ遂ニ愈ルコトヲ得ルナリ、此
亦妙術ナリ

芎黃散

○肩背痛、瘀血血毒ニ因ル者ハ、葛根加大黃
湯、敗毒散、提肩散ナド服セシメ、此散ヲ副用
セシム

臂腕痛、塗藥方

樟腦 四錢 茴香 紅花 各二
右三味、燒酒ニ浸置テ、時時塗擦之

○圖翼ニ云、肘之上下皆曰臂、又云腕、臂掌交

方集

金匱要略

也ト、臂ノ痛ニハ藥ノ達シガタキモノナリ、
ワキテ中年以後ニ在テハ、ナホサラ治シカ
スルナリ、俗ニ此レヲ四十カヒナ、五十カヒ
ナ、或ハ長壽カヒナ、又ハ長命痛ナド云ヒテ、
方土ニヨツテ其稱サマ^ムナリ、或曰クコ
ノ症ニ、杜仲續斷五加皮ノ三味為末、清酒送
下甚効アリト、未試録シテ以テ萬一ノ用ニ
備フ

鍼

○凡、肩背強痛ハ、鍼刺最捷ク最效アリ、案ス
ルニ無病ノ人、忽然トシテ、肩キビシク凝リ

テ急變ナルコトアリ、此レハ是、痺氣上衝ニ
ツレテ、瘀血ガ上^ホリテ然ル所ナリ、俗コレヲ
ハヤケンベキト云ヘリ、俚言ナガラ義ニ愜
ヒタル稱呼ナリ、此症ニ會ハバ唯早ク放血
法ヲ處スルニ互^ニシ、不然禍在反掌^ニ
續方

舒筋飲 蘭基軌 治臂痛不能舉、由氣血凝滯、經絡不
能行所致、非風非濕、腰以下食前服、腰以上食後
服

片薑黃 二匁、如無以
海桐皮 去粗皮 赤芍
白朮 各一匁

方集

卷之十三

十

虎

不具事

羌活

炙甘草各毫

右七味、加姜三片、煎服、磨冲沈香汁少許

○姜黃ハ根ニ枝節アリテ生姜ノゴトク、其色鬱金ヨリ淺シ、葉鋪ニ多シ真ナリ、皆鬱金莖朮ノ中ヨリ擇ヒ出スモノニシテ、琉球ノ産ナリ、海桐皮ハ舶來一品真ナルアリ、藥店ニ貨ル者多クハ刺楸ノ皮ニシテ偽物ナリ

附記

世ノ老醫ノコノ病ヲ療スルヲ視ルニ、九味羌活湯ヲ用ル有リ、行氣香薷散ヲ用ルアリ、戴元禮導痰湯ニ木香姜黃ヲ加フルノ説、症治要訣ニ

每集
卷之十三

方輿記

卷之十三

十一

流泉園

載也、許叔微桑枝ノ治驗、本事方ニ舉ク、近ゴロ吾ガ東武雨森氏松蔭醫談ト云書ヲ讀ムニ、肩背痛ニ、薏苡仁多ク效アルヲ説ケル類、此等ノ諸藥皆迂緩ニシテ不充于用ニ似タレドモヨク其竅ニ透ラバ、功效亦偉ナランカ、曩キニ一高僧信州玄向律師、上病症多端、其最所苦、肩背強痛ナリ、日ニ小沙弥ヲシテ按摩セシメ、甚レキ時ハ、鍊鐵尺ナドヲ以テ之ヲ打ツ、如此二三年、服藥刺絡灼艾、千百ノ治ヲ施スコト至ラザル无シ、而ノ一效ヲミズ、余診之、其症全シ是柴胡桂薑湯ノ所主也、余ガ謂ク肩背ノ患ハ、我

無術智、只桂姜湯ヲ用テ、本症ヲ治セバ、肩背モ
亦或ハ安カルベケン者耶ト、即チ作劑與之、服
スルヲ僅カニ六七日ニシテ、諸症十二六七ヲ
去リ、經久ノ肩背強痛不制シテ自愈、其效功實
ニ意表ニ出ヅ、師大ニ雀躍シ、贈ルニ繒寶ヲ以
テ懇ロニ謝セラレタリ

心痛

胸痺 結胸

○心痛ト胸痺ト結胸ト、其脈其症、異同モア
レドモ、皆心胸ノ病タリ、脇痛亦外ナラズ、故
ニ茲ニ包括シ共ニ一門トナス、蓋シ胸脇痛
ノ源ヲ尋ヌルニ、痰飲ヨリ來ル者アリ、痰癖
ヨリ起ル者アリ、虻虫ヨリ發スル者アリ、又
真心痛ト稱スル者ハ、別ニ是一種ノ劇症也、
即チ靈樞厥病篇ニ、真心痛者、手足清至節、心
痛甚、旦發夕死、夕發旦死ト云ル是ナリ、此症
マレニハ二三日モ連聯スル者モアレドモ、
イヅレニ危急ノ症ニシテ、其痛ニ不凡、反覆

顛倒シテ苦シムモノナリ、痛ミ多クハ膈中
ニアレドモ、左右ニ寄リテ痛ムモ間之レ有
リ、左右ニヨレバトテ忽諸スベカラズ、本ヨ
リ此症ニシテ脉結代スル者ハ極惡候ナリ、
○胸痺モ、ム子ノイタム病ナレドモ、其輕キ
ハ胸中氣塞ガルバカリニテ不痛者モ有リ、
即千金鑑ニ胸中急痛、胸痺之重者也、胸中氣
塞、胸痺之輕者也ト云ヘリ、又曰、胸痺之病、輕
者、即今之胸滿、重者即今之胸痛也トコレラ
ハ治療ニ太有益ノ注文ナリ、斯ク無造作ニ
解會スル寸ハ、藥法方モ自在ニ運用ガ出來

ル也、胸痺ト云トテ奇異ノ病ト思フベカラ
ズ○結胸ハ、其痛ミガ心下ヨリ少腹マデモ
及ブモノ有レドモ、心胸ガ主タル故ニ結胸
トハ名ヅケタルナリ、結胸ノ事ハ傷寒論ニ
詳カニ舉テ、諸子、朝夕講習スル所ナリ、故ニ
復和繹セズ

桂枝生姜枳實湯、心中痞、諸逆、心懸痛

桂枝 生薑各九 枳實一分

右三味、以水一合八勺、煮取九勺、服

○心中痞ハ、即チ胸痺ナリ、諸逆ト云コト、マ

キラハシキ字ナリ、故ニ諸家ニ說多シ、或ハ

水逆火逆ト為レ或ハ上逆吐逆嘔逆之謂也
上逆者桂枝之所治吐逆嘔逆者生姜之所治
也ト云ヒ又ハ諸逆該痰飲客氣而言トモ注
セリ皆各理アルニ似タレドモ未ダ的確ナ
ラズ愚案ズルニ桂苓朮甘湯ニ心下逆滿ト
云ヒ枳實薤白桂枝湯ニ脇下逆搶心ト云ノ
類其因ヲ定メズ心脇ニ逆スルヲアルヲ皆
是ヲ逆ト云ヘバ諸逆即是ナリ諸トハ何物
ニ拘ハラズ總テ心脇ニ逆スルト云ノ義ニ
見ルベシ懸ハ物懸リテ上ニ在ルナリ故ニ
上ニ心胃ニ在ルノ痛ヲ懸痛ト云タルナリ

然レドモ此方ハ必シモ痛ニ拘ハラズシ
テ唯其心胸痞塞スル者ニモ用之ベシ凡テ
心胸キウクツニ覺ユルト云フ症コレヲ服
スレバ忽得寛鬆一老醫積聚諸病心胸エカ
ル者ニ泛ク此湯ヲ用ヒ或ハ隨症方中ニ
此二味ヲ加ヘ用ヒシ人モアリ
○嚴用和此方ニ依テ姜黃甘艸ヲ加ヘテ推
氣散ト名ツケ右胸痛甚脹滿不食ノ者ヲ治
ス余嘗テ數試用スルニ其功不差左胸痛ニ
モ亦可

小陷胸湯小結胸病正在心下按之則痛脉浮滑者

千金要方

黃連 一兩半 夏 半升 瓜蒌實 大者一枚

右三味、以水六升、先煮瓜蒌取三升、去渣、內諸藥、煮取二升、去渣、分溫三服

○正在心下トハ、心ノ真下ニ在ルナリ、此レヲ大陷胸ノ症ニ較ブレバ、上不至心、下不及少腹、按之則痛、大陷胸ノ不可近トハ天淵ナリ、脈浮滑コレヲ大陷胸ノ沈緊ト較ブレハ、ソノ邪不深ナリ、此症ニシテ若シ胸脇連痛ム者ハ、小柴胡或ハ大柴胡、症ニ對シテ合シ用フ、更ニ妙

千金陷胸湯治胸中心下結積、飲食不消方

括蒌實 大黃 黃連 各八分 甘草 四分

右四味

○此レ大小陷胸間症ニ良キ藥ナリ、主治ニ胸中心下結積トシアレドモ、痛ム者ニモ亦効アリ、一婦人胸腹痛ヲ患フ、高良姜湯ヲ服セシムレドモ效ナク、如之項又強痛ム、予惟ヘラク此レ仲景氏結胸條ニ、如柔痙狀ト言ヘル者也ト、因テ此湯ヲ與ヘタリシニ、一貼ニシテ神効アリ、其他老少、一切胸中心下大陷胸湯

方與兒

卷之十三

十五

施家園

大黃

大黃二分 芒硝二分 甘遂二分

右三味、以水一合八勺、先煮大黃取六勺、去渣、芒硝煮一兩沸、內甘遂末、溫服、得快利止、後服

○此レ結胸劇症ヲ療スルノ方ナリ、詳ナル
「ハ本論ニ考フベシ」

甘艸乾姜湯 方具勞
療門

○疝癥水飲ニテ心胸痛ミ苦味ノ藥ヲ服ス
レドモ不差者ハ、コノ甘味ニテ意外ニユル
ムコトアルモノナリ

枳實薤白桂枝湯、胸痺、心中痞、氣結在胸、胸滿脇下

逆搶心

大黃 黃芩 八分 甘艸 四分

枳實 廿兩 厚朴 薤白 各八分 桂枝 二分

括蕢實 六分

右五味、以水二合、先煮枳實厚朴取八勺、去渣、內諸藥、煮數沸服

○此方ハ、心中痞シ氣ガ結ボレテ胸滿シ、脇下ヨリ、オリノ心エツキカケル者ヲ治スルナリ、金匱ニ人參湯亦主之トアレドモ、一病ニ二方ヲ注スルコト、仲景氏ノ法ニハアルマジキ事ナリ、先輩此レヲ評シテ、一病二治、因人素稟而施、兩不移易之法也、張氏通ナドト理窟ナンド附クルナレド、一病ニシテ豈

方輿

卷之十三

十六

疏

方輿輿

二治ノ理アラシヤ、又因人素稟而施ト云コ
ト、既ニ仲景氏モ強人羸者ノ別ハ言ヘドモ、
要スルニ但其藥量ヲ増減スルノ義ノミナ
リ、治ヲニニスルノ謂ニハアラザルナリ
原本、瓜蒌ノ下疑ラクハ實、字ヲ脱セリ、故ニ
今補之、瓜蒌實ハ、キカラスウリノサ子也、世
ニ玉ヅサト稱スルハ、コレハ玉瓜ウカラスノ
仁ニシテ用ニ任ベカラズ、又括蒌實ニ搗ト
云フ注アレドモ、此品ハ完用ヲ可トス、是古
ノ法也

茯苓杏仁甘艸湯、胸痺、胸中氣塞、短氣。

茯苓九分 杏仁七分 甘艸三分
右三味、以水三合、煮取一合五勺、服

○此レ胸痺ノ輕症ヲ治ス、然レ短氣ノ症、胸
痺門ニテハ、タゞ此方ニノミ有ル也、心ヲ著
ベシ、橘枳姜湯亦主之ハ、人參湯亦主之ノ例
ニシテ吾黨ノ所不取ナリ
枳縮二陳湯同春 治涎在心膈上、攻走腰背、嘔噦大
痛

枳實	砂仁	陳皮
香附	半夏	延胡
木香	厚朴	乾姜
	草豆蔻仁	
	茴香	

方輿輿

卷之十三

十七

阮家園

不與轉

甘艸

右生姜水煎加竹瀝

○涎在心膈上ト言フトイヘドモ、是レ素ト
疝アリテ其ヨリ水飲ヲ蓄ヘ胸痛ト為ルモ
ノナリ、腰背痛嘔噦ナドハ有ルモアリ無キ
モアリ不必拘

檳榔鶴虱散 方具虫門

○此方、蛔虫ノ心痛ヲ治シ、又腹痛ヲモ治ス、
方下注文互考

小柴胡湯治胸滿脇痛

疎肝湯 同春 治左脇下痛、肝積屬血、或因怒氣所傷、

或跌撲閃挫所致、或為痛

柴胡

當歸 各半 桃仁

枳殼

青皮 各一 川芎

芍藥 各七

黃連 吳茱萸煎

紅花 五分

右水煎食遠服

薏苡附子散、胸痺緩急者

薏苡仁 十五

大附子 十枚

右二味、杵為散、服方寸匕、日三服

○緩急ノ緩ハ助字ニテ、但是急ヲ云モノ也、

案スルニ附子胸痛ヲ治スルノ功アリ、九痛

方輿覽

卷之十三

十八

疏家圖

每病者
老補
園

不與轉

亦可ナリ、聖惠ニ其例アリ録于左

薏苡仁散 方聖惠治胸痺、心下堅痞緩急

薏苡 二兩 附子 炮二兩 甘草 炙一兩

右搗篩為散、每服三錢、以水一中盞、入生姜半分、煎至六分、去渣、稍熱頓服之

九痛丸治九種心痛

○九痛ノ目ハ千金ニ詳ナリ、金匱程注ニ云、雖分九種、不外積聚、痰飲、血結、虫注、寒冷、而成ト、此說療事ニ於テ尤為的切、コノ方外臺ニ千金ヲ引テ附子丸ト名ツケタリ、附子ハ能ク胸痺心痛ヲ治ス、附子丸ノ名義、古ニシテ

允レリト謂フベシ
失笑散

○此方能ク瘀血痛ヲ療ス、疝ノ痛ニモ亦佳續方

聖惠、括婁薤白半夏湯、治胸痺、不得卧、心痛徹背、方括婁實一枚、桂心三分、半夏一兩

右件藥搗篩為散、每服三錢、以漿水一中盞、入薤白半分、煎至六分、去渣、稍熱頓服

○此レ金匱括婁薤白半夏湯ノ變方ナリ、薤白ハ生ノ者殊ニ效アリ、漿水ハ粟ヲ以テ製スルモノニシテ、即チ藥用ノ酢ナリ、製レ様

方輿兒

卷之十三

十九

施家園

本草綱目

ハ本艸綱目ニ詳悉セリ、今尋常ノ水ヲ用フ
ルモ亦可ナリ

○案スルニ眞心痛ト稱スル者、多クハ平卧
スルコト能ハズ、一二脊推五俞ノアタリエ
徹シテ痛ムモノナリ、ヤハリ此方ヲ用フベ
シ

一ヒ散治心胸痛方

○コノ方、其症ニ對スレバ、一服ニシテ即效
アリ余屢經驗スル所ナリ

附記

張介賓曰、凡胸膈大痛、連及脇背、藥不能納、到口即

吐者、此則無論諸藥皆可發吐、因就其勢、探而吐
之、則最易最捷、吐出邪滯積痰、痛可立止、若邪猶
未盡、痛猶未止、則再以前藥與之、務盡其邪、無不
愈者

方輿記

卷之十三

夫腹中急痛者、陽脈溢、陰脈弦、腹中急痛者、先與小建中湯、不差者、與小柴胡湯、
○腹中急痛トハ、拘急^{ヒキル}シテ痛ム是也、小建中ノ所主ナリ、凡^ヒ小建中ノ腹候ハ、ワカリ易キ者ナレドモ、稀ニハ柴胡所主ニ混^{マギ}レテ、マギ

腹痛

○腹痛ハ病症ニシテ病名ニハ非ズ、諸病ニ兼ル所ノ症候ナレバ、別ニ門ヲ設ケズシテ可ナリ、然ルニ先哲方書ニナ特^ニコ篇目ヲ立ツ、余モ亦倣^{マナ}ズ、其槩略ヲ示サンガ爲^ニナルノ

小建中湯、陽脈溢、陰脈弦、腹中急痛者、先與小建中湯、不差者與小柴胡湯、
○腹中急痛トハ、拘急^{ヒキル}シテ痛ム是也、小建中ノ所主ナリ、凡^ヒ小建中ノ腹候ハ、ワカリ易キ者ナレドモ、稀ニハ柴胡所主ニ混^{マギ}レテ、マギ

方輿記

卷之十三

二十一

疏

本草綱目

ラハシキ者アリ、本條所論蓋言之而已

小柴胡湯 方具瘕

○凡、腹痛ノ左肋ニ附スルハ、是レ柴胡ノ主治スル所ナリ、大柴胡心下滿痛四逆散或腹中痛柴胡桂枝湯心腹中卒痛ノ類、參酌シテコレヲ用フベシ

桂枝加芍藥湯、腹滿時痛者

於桂枝湯方中、更加芍藥六分、通前共一錢二分、餘依桂枝湯法服具痢門

○此レ即チ桂枝湯ニ芍藥一倍ヲ加ヘテ、別ニ又一方ト成シ、以テ腹痛ヲ治ス、分量多少

高身ノ關係モ亦大ナリ
桂枝加芍藥大黃湯

於桂枝加芍藥方中、加大黃二分

○此レ桂枝加芍藥ノ症ニシテ、内ニ實スル所アルヲ治スルノ方ナリ、痢病初起腹痛太甚ナル者ナド、此方ヲ用フレバ隨手而愈、又疝瘕ノ腹痛、或ハ外邪宿食兼テ痛ム者、或ハ瘡疹欲發腹痛スル者、皆用ヒテ効アリ、醫說卷五ニ云、舒王解痛字云、宣通而塞則為痛、此極有理、凡病須通利臟腑、乃能隨其冷熱而須用巴豆大黃牽牛、此最要法ト、此說以テ加大

不與轉

黃ノ義ヲ發揮スルニ足ル故ニ引テ以論初學

黃連湯、胸中有熱、胃中有邪氣、腹中痛、欲嘔吐者

黃連 甘草 乾姜 桂枝 各三

人參 二兩 半夏 半升 大棗 十二枚

右七味、以水一斗、煮取六升、去滓、溫服一升、日三夜二服、傷寒類方云、治上焦之病、故服藥宜少而

數

○此方、心下中脘ノ間ニテ痛ミ、ムカノト嘔氣アル者ヲ治ス

高良薑湯 千金方 治心腹絞痛如刺、兩脇支滿、煩悶

不可忍方

高良姜 一錢 厚朴 四分 當歸 桂心 各六

右四味、以水一合六勺、煮取四勺、溫服、若一服痛止、便停、不須更服、強者為二服、劣者分三服

○此方、腹ヨリ心脇エカケテ、ハゲシク痛ム者ニ用フ、痛ハゲシキニ能ク利ク藥ナリ、方後ニ若一服痛止、便停、不須更服ト云ヒ、又強者為二服、劣者分三服ト云フハ、諒ニ此藥ハ飲ニクキガ為ナリ、古人諄諄示諭可亦感佩ナリ、今日ク少許ヅ、用ヒテ可也

大建中湯、心胸中大寒痛、嘔不能飲食、腹中寒上衝

方與兒

石身神

皮起出見有頭足上下痛而不可觸近

蜀椒 四分 乾姜 一分 人參 八分 膠飴 三分

右四味以水一合六勺煮取六勺去滓內膠飴微火煎取六勺溫服

○大建中ノ痛ハ腹バカリノ者アリ胸エ力カル者モアリ有頭足トハ其異形奇狀ナニカ生物デモ腹中ニ居ルヤウニアルト云フホドノ形容ノ辭ニシテ其實ハ疝癥カ虵虫カニアルベシ此方其症ニ對シテ之ヲ用フル寸ハ誠如響之應桴如影之隨形奏功特如神

附子粳米湯 方具症 腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿大嘔吐

○腹中寒氣ハ病因ナリ雷鳴以下ハ病症ナリ今コノ病ヲ視ルニ多クハ水飲ト寒疝トニ因ル是レヲ腹中寒氣ト言ヒタルナリ三因方ノ附子粳米湯方中ニ乾姜アリ互從之又解急蜀椒湯安中散ナド參考スベシ

甘艸粉蜜湯 方具 虫門 ○此レ本虫痛ヲ治スルノ方ナリ吾黨水飲ノ腹痛ニ活用シテ得效者甚多シサテ此藥應ズレバ手足身體腫ヲ發スルモノナリコ

不與轉

胃氣復スルノ佳兆ナリ、浮腫ストテ遷ニ
 利水ノ劑ヲ用フベカラズ、日ヲ經レバ自ラ
 消スルモノナリ、若シ或ハ消シカヌルトキ
 ニハ腎氣丸ナト與フルモ可ナリ、大凡一旦
 腫ヲ發シテ愈ル者ハ永不再發百試百効、真
 ニ神方ト謂フベシ、此事古書ニ未ダ嘗テ道
 及ボサズ、乃今復古ノ大醫先生モ不知事ナ
 リ、余秘惜セズ記シテ、以テ同志學士ノ識見
 ニ備フ
 大承氣湯方具大承氣湯便閉門卒腹滿而痛、煩悶、口噤欲死者
 ○卒腹滿而痛、方具大承氣湯便閉門卒腹滿而痛、煩悶、口噤欲死者

婦科

カラズ、凡、腹大滿シ痛テ煩悶スル者、大承氣
 ヲ用ヒテ可ナリ、如シ其真ノ卒病ニテ、口噤
 欲死者ニハ、備急圓走馬湯ノ類、用ヒテ可ナ
 ルベシ

手捻散方具痘疹門

○此レ痘疹結痂ニ及ンテ、腹痛スル者ヲ療
 ズルノ方ナリ、予諸瘡毒內攻ノ腹痛ニ、運用
 シテ往往得効

五靈脂湯方具婦人門

○是レ治產後腹痛方ナリ、余活用シテ男婦
 血瘕腹痛ヲ治ス、嘗テ有一丈夫結毒ヲ患フ

方輿記

卷之十三

二十五

流泰園

ル₁久シ、後腹痛ニ變シ、湯九種種雜へ服ス
レドモ不差、余一診シテ即チ此方ヲ與フル
ニ、四五日ニシテ痛失スルガ如シ、又有一娼
婦、同症ヲ患フ、亦此方ヲ与フ、二十劑ヲ不出
シテ全ク愈ユ、コ、ニ一二舉ル治驗ノミナ
ズ其他無算

檳榔鶴虱散 方具 虫門

○此方虻虫ノ心腹痛ヲ治スル₁實ニ如神
凡腹痛ニ頭痛ヤ嘔氣ナド添ヒテ、又痛ニモ
休作アレバ、誰モ此レヲ虻虫ノ候トハ為ル
ナリ、而ルニ稀ニハ頭痛モ嘔氣モ無キ者ア

リ、如是ハ何ヲ以テカ分曉センヤ、茲ニ吾黨
ニ察視_{スル}虻虫候、有脈訣、在十、不失_レ一也、コノ症
世醫鷓鴣菜湯、椒梅湯、大建中湯、甘艸粉蜜湯
ノ類、ソノ外種種丸藥等ヲ用フル₁アレド
モ、此方ノ効アルニハ如ガ_ル也、峨山慈濟院
主僧、久患腹痛、百計不治、羸劣日加、余作檳榔
鶴虱散與之、遂得全癒、此餘試驗、不可盡述、亦
神哉

靈索散

○瘀血又ハ疝ニテ、心腹ノ痛ム者、不問男婦
用効アリ

備急丸

○傷食、痧病、ソノ他一切暴劇ノ腹痛ニ用フ

鍼

○癰疽痛甚シテ不止者ニ毫針ヲ下シテ、ソノ効神ノ如キコトアリ、痲痺疽門ニ治驗ヲ載ス、參考スベシ

灸

○癰疽及ビ傷食ノ腹痛ニ灸炳大ニ効アリ、若夫虚痛ハ薰臍ニ善シ、吾黨用之有法、説已見于前

薑熨

○腹痛其因ヲ論セズ、総テ姜熨ニ互シ、陳復正曰、一切疼痛、或寒或熱、或積食、或積血、証莫能辨、藥不能施、有起死回生之妙、用生姜一觔、搗爛、略擠去汁、入鍋内炒熱、用布分作二包、先以一包熨痛處、冷即換熱者、勿令間斷、如姜已乾、畧加前汁拌之、又炒又熨、痛止乃已

續方

意表湯

蔚金

木通

甘艸

橘皮

莎艸

右五味、水煎、溫服

皇國神傳藥方也、元ト治宿食腹痛
ト云、癥疝諸痛ニモ亦可用、良ニ意外ニ效驗
アル妙藥ナリ、故ニ吾塾名ツケテ意表湯ト
云フ

附記

丹臺玉案卷四云、凡痛互用芍藥、甘艸、乃腹痛要用
之藥、蓋芍藥味酸、能於土中剋木、甘艸味甘、甘能
入脾、而能緩痛、曲直作酸、酸者甲也、稼穡作甘、甘
者己也、甲己化土、此仲景之妙法也、故芍藥、甘艸
名曰戊己湯、紓治諸腹痛、而血虛腹痛者、猶效為
甚也

腰痛

○腰痛、寒疝ニ因ル者アリ、腎虛ニ因ル者アリ、
打撲ニ因ル者アリ、婦人ハ帶下瘀血ニ因
ル者アリ、各ソノ義、其門ニ見ユ、又痘疹、中濕、
傷寒ノ類ニモ有之トイヘドモ、此レハ是レ
客症ニシテ、別ニ之ヲ制スルニ及ハズ、故ニ
此等ノ症ハ茲ニ載セズ

甘艸、乾姜、茯苓、白朮湯、腰以下冷痛、腰重如帶五千
錢者

茯苓

乾姜 各八分

白朮 各四分

右四味、以水一合、煮取六勺、溫服、腰中即溫

不與轉

○男子ノ疝、女人ノ帶下ナドニ、此症多シ、皆積冷水濕ノ病ナリ、此方藥品平淡ナリトイヘドモ殊ニ妙理アルノ劑也、外臺ニハ腎著

湯ト名ツケタリ

經心錄、腎著散外臺第十卷所引

杜仲 桂枝各三分 白朮

茯苓各四分 乾姜各二分

甘艸 澤瀉 牛膝 右八味、搗篩為散、每服三方寸匕、酒一合煮五六

沸、去渣頓服之、日三、藻按水煎溫服、後飲好酒亦

可 ○上方ト藥品煎法少シク變ズトイヘドモ

功ハ一揆ナリ、千金衍義云、此於腎著湯方中、加杜仲、桂心、牛膝、澤瀉、乃曲竅徙薪、從權適俗之法、而主治未嘗稍有不同也

腎氣丸方具癰閉門 虛勞腰痛、小腹拘急、小便不利者

○腰ハ腎ノ所在ナリ、故ニ房勞節ナラズシテ、真精ヲ竭ストキハ、腎臟空乏ニシテ、腰ココニ痛ム、其痛悠悠不已シテ、脉ハ洪大ナルナリ、又衰老ノ人、今房勞ナケレドモ、腰ノ常ニ痛ムハ、是レ少壯時自恃雄健、以テ其元ヲ斷喪スルニ因テ、患ヲ暮年ニ遺セル者ナリ、夫レ虛勞之為、腰痛ノ理カクノ如シ、然リト

人身車

イヘ氏腎藏於内何ヲ以テ力之ヲ知ラン、於

是仲景氏コレヲ證スルニ、小腹拘急、小便不

利ノ二症ヲ以テスル也外臺引

文仲葛氏、療卒腰痛、不得俛仰、方外臺引

附子 三分 桂心 二分 牡丹皮 六分

右三味、治下篩、酒服、一斗、圭、日再、此主脇肋氣痛

如打者、按千金方中載、此云治腎虛腰痛

○此方煎服シテモ可ナリ、主療大氏腎氣丸ハ

ト相同ジ、タゞ其少シク異ナルハ、腎氣丸ハ

多品ニシテ功ヲ遲キニ圖リ、此方ハ單味ニ

シテ效ヲ捷キニ望ムナリ、方下卒ノ一字、并

ニ不得俛仰ノ四字、腎氣丸ノ症ヨリハ、一段

急劇ナル處ニ心ヲ著クベシ、方後ノ脇肋氣

痛如打ト云ニハ、此方ヲ用ヒンヨリハ、大黃

附子湯可ナルベシ、一男子、年二十餘、患水腫、

更醫二三人、皆无成功、余診之、病在陰位、因テ

真武湯ヲ與ヘシニ、小便日ニ利シテ愈ヘシ

カド、後腰骨軟弱ニシテ不得俛仰、病者歎ジ

テ曰、骨疼セリ、竟ニ起ツコトヲ得ベカラズト、

予其然ラザルコトヲ諭シテ、此方ヲ投ズル

ニ不日平復

大黃附子湯

方具痰癖門

不身車

○此方不啻脇下偏痛、腰痛ニモ亦效アリ、然レドモ脉沈緊、便秘ノ者ニアラザレハ不用之、是レ我家ノ法

禹功散

○此方、疝氣、水飲、中濕等ニテ腰痛スル者ニ用フ

無憂散、腰膝疼痛、拜跪艱難、久坐不得、嚔食无味、但服一二服見功效

○此方、腰バカリニモ限ラズ、股膝臍臀ノ邊ノ痛ミマデニ捻テ効アリ

温泉

○腰痛ニハ温泉効アリ、輕症ニハ塩蘘ナドヲ煮出シタル湯ニテ、日日腰湯スルモ可ナリ、吾門藥湯ノ方アリ、當歸三斤、水ト酒ト合セ煮テ、腰以下ヲ温ム、名、當歸湯、酒ハ水十分ノ一ヲ加ヘテヨシ、多則人ヲシテ逆上セシム、若酒ヲ惡ム人ハ不用此、酢少加モ亦可

鍼

保命歌括卷四、腰痛門云、委中二穴、主瘀血痛、互用三稜鍼刺出血、大効

灸

灸腰目第七壯、在尻上約左右是、又灸八竅及

外傷
續方

外踝上骨結中千金

續方

小品療腰痛及積年痛者方外臺引 乾漆 五分 桂心 八分

乾芋 十分 白朮 五分

甘艸 五分

右五味、搗末、以酒服方寸匕、日三

○病積年二至ル寸ハ、方技モ竭ルモノナリ、
嘗有一男子、患此症、余用此方、得效

打撲 金瘡 破傷風

跌撲ハ已ニ破ルト、未破トノ分チ、又亡血ト
血瘡トノ別アリ、治方次下ニ條列ス、如シ骨
節跌斷ニ至テハ、整骨家ニ札縛等ノ術アリ、
其打撲ノ重症ニ於テハ、久キヲ經テモ脈ト
動氣ト俱ニウチギレシ、或ハ倫次ト、ノハ
ズ瀋脈ノモノ多シ、可知

金瘡微小ノキリキズハ、擦藥等ニテ、スメド
モ、其大ナルニ至テハ、針線約之ニアラザレ
バ、不能收功、當委任瘍科醫治之
證治要訣云、破傷風者、因皮肉、曾有破傷處、風

不集轉

從瘡口入、其証項強、牙關緊急狀如發瘧、不似
中風、又似產後、角弓反張、蓋此病夕、風二
傷ラル、ノミニアラズ、雨ヲ侵シ水ヲ渡リ
テモ發ス、多クハ手足小瘡ヨリ起ル、瘡小ナ
リトテ、アナドルベカラス
千金方云、凡被打損、血悶搶心氣絕、不能言、可劈開
口、尿、內令下咽即醒、又墜車落馬、及車碾木打、已
死者使死人安著、以手袖掩其口鼻眼上、一食頃
活、眼開與熱小便二升、薛已曰、予在居庸、見覆車
被傷七人、仆地呻吟、俱令嚙此、皆得無事、凡一切
傷損、不問壯弱、及有無瘀血、俱宜服此、若脇脹或

作痛、或發熱煩躁口渴、惟服此一甌、勝以他藥、他
藥雖効、恐無瘀血、反致誤人、童便、不動、臟腑、不傷
氣血、萬无一失、軍中多用此、屢試有驗、本外綱目
引外科發
揮

○墜打損傷、血悶氣絕者、急ニ口ヲ開キ、熱
小便ヲ以テ、之ニ灌クヘシ、即チ甦ルコトヲ
得ベシ、ウチ打撲ニ小便ヲ用フル事ハ、千金方ヲ
始メ諸方書ニ多ク言ヒ及ボセリ、俗間ニハ
ウチタル處ヲ、小便ニ漬スコトハ為セドモ、
內服スルハ、多ク人ノ知ラヌ所ナリ、內服ハ
頓ニ効アリ、童便尤ヨシ

之身車

瀉心湯方具諸瀉打損傷、昏眩不省人事、及血出不已者、大宜此湯、或兼用寬中丸、金瘡者、唯用此湯

可也

○墜打トテ、高キ處ヨリ墜キ、或ハ物ニ打タレ物ニ壓レナドシテ、身體損傷スル寸ハ、氣逆シ昏眩スルモノナリ、此症マツ急ニ瀉心湯ヲ与フルヲ妙トス、血出テ不已者益可

獨參湯方具崩漏門

不醒者

○打撲金瘡等、出血オビタ、シクシテ昏沈シ、脈欲絶者ハ獨參湯ニ宜シ、手足厥スル者

ハ附子ヲ配ス、即是參附湯ナリ、以上ノ二方、一ハ昏眩不省ニ約シ、一ハ昏沈不醒ニ約ス、昏眩ハ閉証ニ係リ、昏沈ハ脫症ニ係ル、如シ其肯繁ニ中ラズシテ、治ヲ錯ツトキハ、禍在目下慎乎

回生湯方具產前後門

○打撲金瘡、輕症ニ用ユ

雞鳴散方三因治墜壓傷損、瘀血凝積、痛不可忍

大黃 杏仁各一錢二分

右二味、以水一合半、煮取一合、溫服、後飲酒醉為度

入身車

○墜打損傷腫痛スル者、コノ方ヲ服スレバ、痛立トコロニ止ミ、腫隨テ消ス、其効如神、コノ藥、原ト酒ニテ煎スルナレドモ、人多クハノミニクガルモノナリ、故ニ今水煎服シ、服後微醺スルホドニ、温酒ヲ飲ムヲ得タリトセリ

桃核承氣湯

方具經閉門條

墜打損傷、大腫痛者

○前方

ノ症ニシテ

腫痛ハゲシキ者ハ、此湯

ニ互シ、功力勝

於雞鳴散

芍歸膠艾湯

方具經閉門條

治墜打傷臟、微者唾血、及金瘡

傷經者、方

○墜打臟ヲ傷テ血出テ、或金瘡ニテ經脉ヲ傷テ血出ル等ハ、皆コノ湯ヲ與フベシ、千金打撲門、大膠艾湯ハ、即此方ニ乾姜一味ヲ加フルノミ也

葛根湯

○金匱瘧論曰、病者身熱足冷、頸項強急、惡寒時頭熱、面赤目赤、獨頭動搖、卒口噤、背反張者、瘧病也ト、此章詳カニ瘧ノ症狀ヲ說キタリ、又云、太陽病無汗、而小便反少、氣上衝胸、口噤不得語、欲作剛瘧、葛根湯主之ト、此レ汗ヲ發シ邪ヲ去リ、瘧ト作ラザレムルノ治法ナ

方集

リ、破傷風瘧ト作ラント欲シ、或ハ既ニ作レ
ル者モ、同ク葛根湯ニテ發スベシ、或曰烏頭

ヲ加ヘテ益佳ナリト
大承氣湯、瘧為病、胸滿、口噤、臥不著席、脚掌急、必斷

齒

大豆紫湯 方具婦人門
○此湯、破傷風ニ効アリ、如聖散併用ルモ可

ナリ

寛中丸
○打損劇症、服之得安、但シ氣少血弱ノ者ニ

ハ難用

失笑散

○打撲後、腹ニ瘀血出來^{デキ}テ、積聚ノ如クニ、惱
ミヲナシ、或ハサシコミ、或ハ痛ムモノ、此方
ニ宜シ

斷血方

○此レ斷血ノ至良方ナリ、狗脊一物モ亦妙、
アル大家ニ頒チ施シタマヘル名方ハ、即チ
此也ト云

續方

治打撲

曼陀羅 用實三五個

方輿覽

卷之十三

三十六

流春園

身車

右一味、水煎服

○打撲悶挫、身體轉側スルコト不能者、此方ヲ一貼用フレバ、狂ヲ發スル一二日、醒來

テ即愈

楊桐散、治打撲、骨節跌斷等

○ウチミ、クジキヲ治ス、ホ子ツギニモ用

接骨効方

熨

熨法、治打撲傷損、痺門方具痛

○打撲、藥ヲツケテモ、血ヲ放テモ、仍ナホ治シカスルモノハ、慈熨ヲ施セ、コレ止痛消腫散血

之良法

附記

血ドメニハ、石灰即効アルモノナリ、三条通杉浦

氏家製ノ一方アリ、鼠ノ子ノ腸ヲ去リ、其腹中

ニ石灰ヲ填滿シ、黒燒ト為シ、末シテ乾擦ス、捷

効アリト云、又醫學入門ニ陣王丹トテ、石灰ヲ

主トシ制セル一方アリ、是陣中ナドニ在テハ

便方タルベシ、而レドモ尋常ニハ、アマリ遏止

スギテ、其痕却テ腫レ或ハ痛テ治マリアシキ

モノ也、故ニ石灰ハ吾門不用之

破傷風ニ一奇談アリ、本能寺中源妙院ニ病者ア

不身車
リ、余往テ療之、時ニ主僧語テ曰ク、野衲童タリ
シ時、蠶ヲ捕得タリ、戲ニ錐ヲ以テ蠶ノ膚ニ孔
ヲアケ、其孔エ吹火筒ヲアテ、極力吹キタリシ
ニ、カノ蠶忽腹脹シ、手足ヲ悶ヘ反張シ、痙狀ヲ
ナシテ遂ニ死セリ、凡ッ人ノ破傷風モ、其創口ヨ
リ風冷ヲ受テ、角弓反張スル、此蠶ノ患狀ト
同一理ナルベシト

蟲獸傷

甘艸解毒湯

甘艸

忍冬

白礬

右三味、以水二合、煮取一合、獬犬咬傷、加番木別
子、雞冠石、煎成、内鍊漿水少許、溫服、兼灸之、數十
日、甚者併用寬中丸、頻頻下之、嘗治數十人、莫一
誤者、其他諸蟲獸毒、皆能解之、此越前國、奥村翁
方

○此レ獬犬咬傷ヲ治スルノ聖藥ナリ、其餘
諸蟲獸ニ傷ラレタルニ、スベテ良シ、犬毒ニ
ハ、馬錢、雞冠石、鍊漿水、組ニ合スヲ妙トス、馬

錢ハ生ニテハ瞑眩ツヨシ、老師ハ製シテ用
ヒラレタリ、其法此品ヲ水ニツケ置トキハ、
水面ニ烟艸ノアクノ如キモノ浮ブ、是即チ
油膩ナリ、ソレヲトリアゲテ乾シ細ニ剉ミ
用フ、如此シテモ服後ニ奇症出テ、多クハ犬
ノ態ヲ為ス事アルモノナリ、但シ此ハ是藥ノ
病毒ニアタリタルニテ佳事ナリ、雄黃ハ主
一切蟲獸傷、鐵漿ハ本綱ニ人為蛇犬虎狼毒
刺惡蟲等嚙服之毒不入肉也ト云、蝮蛇傷、白
ハ白芷ヲ加フ、洪邁夷堅志云、治毒蛇傷、白
芷末以麥門冬湯調、仍以末搽之、大妙、新汲水

送下亦可

○凡蟲獸所傷ニハ、艾ヲ用テ灸スベシ、又杏
仁ヤ蔥白甘艸ナド敷ク方モアレドモ、直ニ
灼テ可也、二三十壯宛七八日モ可灼、劇症ハ
灸スルコト數十日ニ至ル、醫說卷二云、朝野
僉載記、毒蛇所傷、用艾灸當鬻處灸之、引去毒
氣即差、其餘惡虫所螫、馬汗入瘡用之亦効
○凡蟲獸ニ傷螫セラレタル時、瘡口ノ早ク
合セザルヤウニスベシ、艾灼即チ其法ナリ
然ルニ以水灌之、或ハ愈シ膏藥ナドツクル
ハ、大ニ不可ナリ

○瘕狗ニ咬レタル人ハ、愈ルコトヲ得ルト
モ、生涯、赤小豆ヲ食フヲ大ニ忌ムナリ、但
シ其咬レタル即坐ニ赤小豆ノ煮タルヲ食
ハシムレバ、後ニ食赤豆トモ、クルシカラズ、
コレ從治ノ一策ナリ、醫人亦預メ知リ置ク
ベシ、事急ナル時ナレバ、世上常ニ鬻ク、羊羹
饅頭アン餅ノ類ニテモ可多用

通聖散加雄黃

方具癰瘡門

○虫獸咬傷、寒熱脉數ナル者、大互此方、余少
壯時、一朝早起セシガ、指頭微痛ス、コレヲ視
ルニ血少シク出ヅ、即其血ヲ拭ヒ去レバ、下

ニ齒痕アリ、コレ前夜ニ必ズ鼠ニ咬レシ事
ト察シ、即チ搽藥服藥ナドシテ、痛既ニヤミ
齒痕亦消セシガ、七八日ヲ經テ、彼ノ咬傷ノ
處ヨリ紅絲アラハレ大ニ寒熱ヲ發シ、肢節
疼痛頗ル心煩セリ、因テ先紅絲ヲ切り、種種
解毒ノ藥ヲ服スレドモ不安、時ニ尾州醫官
竹田三雄來リ診シテ、通聖加雄黃湯ヲ服セ
ンヲヲス、メ、且ツ懃口ニ從來ノ治驗ヲ説
ク、余喜ンデ即チ劑ヲ作リコレヲ服スルニ、
二三日ニシテ寒熱疼痛如失、諸症退去不復
發、三雄曰、我家治虫獸傷不出于此一神方ト、

身車

コレヨリ以來、余モ亦以此治數十人、無一誤

者

鼠毒モ初メ傷處ニ灸スベシ、灸シテモ、アツ
キヲ覺エガル者ハ、覺ユルマデ灸スルヲ可

トス

雄香飲 一名雞麝散

雄黃搜肝氣、瀉肝風、消涎積、解百毒、辟百邪、殺
百蟲、理蛇傷、能化血為水

○此レ吾門諸虫獸傷極險症ヲ治スルノ禁
方ナリ、茲ニ一治驗ヲ舉グ、阿藩一武弁アル
時壁櫛ノ戸ヲアケレニ、鼠忽然ト内ヨリ飛

出タリ、即チ坐右ニアリア、フ錐ヲオツトリテ、
コレヲツキトメタリ、時ニ適有事牽テ、内人
ヲ呼ビ、代ツテ錐ヲ持タシメントセシトコ
ロ、カノ鼠内人ノ手指頭ヲシタ、カニ咬タ
リ、所謂窮鼠ニテ、其毒ノ劇シキ乎、内人ソレ
ヨリ、ヤミツキ多惱多苦不可言、於是衆醫力
ハル、技ヲ盡セドモ一モ不應、後寒熱如
瘧ニナリ、又羸弱シ如勞ニナリ、最後ニハ遍
身洪腫不_レ_レレテ、衣裳ニツ連子著シテ、ヤウ
ヤク身ノ前打チ合ハスヲ得ルト云ホド
ノ事ニテ、毛孔ヨリハ水漏レ、衣衾ヒツキテ

コレガ為メニ肌膚損傷スルユヘニ作意シ、
日日凍子ヲ其牀褥ノ厚サニ作ラシメ、以テ其
上ニ坐卧セシムルニ至ル、誠ニ未曾有ノ病
狀ナリ、時方ニ歲暮、親戚相集リ議シ、迎春春
餅及ビ門松嘉儀ノ用意ニモ及ブマジトシ
テ、帝ニ其死ヲ待ツバカリナリ、阿藩ハ固ヨ
リ良醫多キ地ナレバ、治療无所不為、予ガ老
父モ力ヲ竭シテ劑ヲ投スト雖、亦一方ノ効
ヲ奏スル無シ、時ニ余京師ニ遊學セリ、老父
書ヲ贈傳テ、具サニ其患狀ヲ記シ、令ニ不肖處
方、因テ雄香飲ノ方ヲ寫シ進ム、老父此レニ

遵ヒテ作劑用之シニ、日日ニ利水シ、洪腫速
カニ消却シ遂ニ起死ノ功ヲ得タリ、此方本
綱ニハ治風狗咬傷トアレドモ、吾門諸虫獸
傷ニ累試累効、誠ニ無比神方、不敢自專、今公
諸世

寬中丸

○犬毒劇症ニ用フ

狗咬傷、杏仁甘艸、口嚼搽傷處、又互銀杏嚼爛塗

○獠犬咬傷ニ、此二味ヲ研末シツクベシ、輕
キハ銀杏一味モ可ナリ、コレヲ擦ケテ其上
ニ灸スルモ好シ

方集

治毒鼠及諸蟲獸咬傷痛不可忍方

麝香 三錢 丁香 五倍子 百艸灰 各一

右四味合末、麝膠和勻、傳之、甚者加雄黃為妙

○繭膠ハ、スヒアゲル者ト見エテ、此藥ヲツ

クレバ、閉ヂタルロモ開クホドノモノナリ、

代指痛ナドモ繭膠ニテ卷キ置ケバ、發揚シ

テ愈ユルモノナリ

治鼠毒、發熱振寒、煩躁譫妄、如見鬼狀、方

薰陸 大黃 巴菽 石灰

雞矢白 各三 伏龍肝 七分

右六味、為末、取生鯽魚、擣爛和藥末、傳之

○此方、伊豫州、谷了閑所傳ナリ、了閑曰、我嘗
テ鼠毒ヲ療スルニ、十二一失ナシ、是他ナシ
此方アルヲ以テナリコレヲツクレバ服藥
ニモ及ハヌホドノモノナリト

續方

犬毒ニハ生蟾蜍ヲ膾トナシ食ハシムベシ、甚効
アリ、如シ膾ヲ食ハザル者ニハ、豆油ヲツケ燒
キニシ與フ、本艸綱目、蟾蜍發明曰、肘后、治獠犬
傷、每七日一發、生食蝦蟇膾、絶良、亦可炙食之、勿
令本人知之、自後再不發也ト、蝦蟇ト蟾蜍ト、本
綱ニハ各別ニ載セアレドモ、藥用ニハ混シテ

方輿覽

卷之十三

四十三

虎

不與轉

可ナリ、或曰隨症方ニ乾蟾ヲ加フルモ亦可ナ
リト
瘡口合ハント欲シ、或ハ未合トイヘドモ、腫減ジ
テ、痛ハ反テハゲシクナリ、或ハ寒熱シ、或ハ犬
ノ慾ヲナス者、是内攻ナリ、如_レ此ハ早ク草麻子
ヲスリツブレテ、ソノマ、瘡口ニ傳クベシ、是
ヲ貼レバ、一旦ハ痛モ亦ハゲシク、腫亦増セド
モ、毒外ニ浮キ出テ、死ヲ免ルベシ、鍼刺モ亦佳
ナリ
蚊蚋其他諸微虫ニサ、レテ、腫痛者ハ、枯礬一味
為末、津涎調塗ベシ

蜘蛛傷人、雄黃末傳之 朝野僉載

蜈蚣咬、用雞屎塗之良 全上

猫傷、用薄荷揩

療風犬毒方 養壽院方

杏仁 三錢 桃根皮 二錢

右二味、以水二合、煮取一合、日二劑、別杏仁蔥白
俱杵成泥、敷瘡口、灸數十壯、令口不合、甚妙

附記

虫獸傷、毒一身ニ散漫スルハ、委中尺澤ヲ刺スニ
宜シ

不與輔

五
 一
 二
 三
 四
 五
 六
 七
 八
 九
 十
 十一
 十二
 十三
 十四
 十五
 十六
 十七
 十八
 十九
 二十
 二十一
 二十二
 二十三
 二十四
 二十五
 二十六
 二十七
 二十八
 二十九
 三十
 三十一
 三十二
 三十三
 三十四
 三十五
 三十六
 三十七
 三十八
 三十九
 四十
 四十一
 四十二
 四十三
 四十四
 四十五
 四十六
 四十七
 四十八
 四十九
 五十
 五十一
 五十二
 五十三
 五十四
 五十五
 五十六
 五十七
 五十八
 五十九
 六十
 六十一
 六十二
 六十三
 六十四
 六十五
 六十六
 六十七
 六十八
 六十九
 七十
 七十一
 七十二
 七十三
 七十四
 七十五
 七十六
 七十七
 七十八
 七十九
 八十
 八十一
 八十二
 八十三
 八十四
 八十五
 八十六
 八十七
 八十八
 八十九
 九十
 九十一
 九十二
 九十三
 九十四
 九十五
 九十六
 九十七
 九十八
 九十九
 一百

每春園

湯潑火傷
灸瘡

○凡火燒損、勿_下以冷水洗之、火瘡得冷、熱氣更深、轉入骨壞人筋骨難差、初被火燒、急向火更炙、雖大痛強忍之一食久即不痛、神驗、治火燒、悶絕不識人、以新尿冷飲之、及冷水和蜜飲之、口噤_六校開與之、然後以下方治之、千金

○巢氏病源云、凡被湯火傷者、初謹勿以冷物、及井下泥、尿泥、及蜜淋撮之、其熱氣得冷、則却深搏至骨爛入筋也、所以人中湯火、後苦攣縮者、良由此也。

桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯、火邪者

桂枝 三兩 甘草 二兩 生姜 三兩 大枣 十二枚

蜀漆 三兩 龍骨 四兩 牡蠣 五兩

右為末、以水一斗二升、先煮蜀漆減二升、內諸藥

煮取三升、去滓、溫服一升

○一男子室屋ニ入テ憩息セシガ、ソノマ、
伏シテ眠睡セリ、少時アリテ目覺タルニ、汗
流滴シテ動悸甚シ、救逆湯ヲ與フルコトニ
三貼ニシテ、安ヲ得タリ

柴胡龍骨牡蠣湯 方具

○一老嫗、灸ニアテラレ發熱惡寒喘急シテ、
横ニ卧スコト能ハズ、胸滿煩驚、動悸頗甚シ、

柴胡加龍蠣ヲ與ヘシガ、二三貼ニシテ即チ、
安シ

四順清冷飲 外科治湯潑火燒熱極逼毒入裏、或外
被涼水所汲、火毒內攻、致生煩燥、內熱口乾、大便
祕實者

連翹 芍藥 羌活 防風

當歸 施子 甘草 各一大黃 二

右燈心、水煎

○湯潑火燒熱毒內ニ逼ル者ヲ治ス、此方輕
症ニヨシ、如シ重症ハ白虎湯可ナリ、或ハ苓
連大黃ヲ加フ

龔廷賢曰、一人夜間、回祿烟薰致死者、以蘿蔔搗汁

灌之、即甦

三白散、以香油調敷、如冰仍無痕跡

○湯火傷ニ、此散ヲ麻油ニ調ヘツクレバ、ヒヤリト覺エテ、心ヨク痕モツカジ、湯火傷通

治ノ方ナリ

治湯火傷方

胡瓜

右搗絞取汁、塗患所、最要捷之方

○湯火傷治方多シトイヘドモ、胡瓜汁ニ如クモノナシ、若シ生胡瓜ナキ寸ハ、塩藏ノモ

ノヲ水ニ浸シ塩氣ヲ去リ、其ヲ揉テ汁ヲ取リ傳テモ亦効アリ、大町淳伯云湯火傷ニハ麥門冬一味ノ煎汁甚ダ良シト、蘭學醫云フ麥門自然汁殊ニ妙ナリト、予門生文碩ハ外科ヲ岩永繼齋ニ學ブ、岩永家方、湯火燒ノ輕症ニハ雞子白一味塗之、重症ニハ馬油塗之ト云

千金治灸瘡腫痛者、搗竈下黃土、以水和煮令熱漬之

一方

豆腐スリツブシ、瘡上ニ傳クベシ妙

流
春
園

每春園

方集

方具癰

防風通聖散方具癰 漆瘡用生蟹取黃隨瘡大小遍敷之雖治方固多莫

如于此者外臺第二十九引備急云或以水浸之

取水數數洗之亦効

○凡療漆瘡方多シトイヘドモ蟹コレカ最

タリ蟹ハ生ノモノニテサヘアレバ必其品

類ヲ擇ハズ其黃ヲ取テ遍クコレヲ敷ベシ

如シ滿身被瘡モノニハ黃ノミニテハ不足

由テ蟹ノ全軀ヲスリツブシ可敷之外臺所

引ノ備急方以水浸ノ方モ亦用フベシ

本艸綱目引相感志云凡至漆處嚼川椒塗鼻上不

生漆瘡

廣濟療漆瘡方

以下三方外臺第二十九所引

煮椒湯洗頻三五

度又嚼糯米敷上乾即易之頻四五度即差

肘後療卒得漆瘡方

以雞子黃塗之乾即易之不

過三五度

又方

煮柳葉湯適寒溫洗之桺皮尤効

附記

人ノ稟質ニ漆ヲ嫌フト嫌ハザルトアリ其甚シ

キニ至テハ驚漆鋪ノ門外ヲ經テモマケルモ

ノアリ其理推シガタシ恂益北山醫話云人之

見漆生瘡者不關于虛實勇怯按古吳薛鎧保嬰

方輿記

卷之十三

四十九

疏

撮要云、漆木之屬火者、故脾胃土虛者、不耐木火之毒、恐拘於物理也、李夢陽謂、木人見漆則瘍者、亦益深僻、

魚骨硬

竹木簽刺

治骨硬方

蓬砂

右為末、吹入咽中

○洪邁夷堅志云、鄱陽汪友良、因食誤吞一骨、哽于咽中、百計不下、恍惚夢一朱衣人、曰唯南蓬砂最妙、遂取一塊、含化嚥汁、脫然而失

一方、治魚骨入咽 王璆百選方

縮砂、甘草等分、為末、綿裹、含之嚥汁、當隨痰出矣、今更加象牙屑、三味水煎服、最妙

二鼻車

○誤テ金銀銅錢諸物ヲ吞テ不出不化者ニ
モ濃煎縮砂湯飲之即下ル事危氏得効方ニ
見ユ

又方

酒ニ塩少シ和シ服スレハ立ニ下ル便捷ノ
方ナリ是レ山田某所試

祖傳橄欖湯治骨硬方

橄欖

右一味水煎温服

○嘗テ一丈夫アリ恣ニ松魚ヲ食フ其骨咽
ヲ刺ス種種ニ藥ヲ服スレドモ骨大ナルヲ

以テ拔ケ去ラズ七日ニ至テ死ニ垂ントセ
リ余ガ祖父コレヲ用フルニ痛頓ニ和ラギ
骨即ヌケ去ル橄欖ハ舶來真ナリ和産ナシ
吳氏方考卷四云舟人以橄欖木為櫓凡魚觸
之無有不死又嘗以橄欖木為卓以魚骨置之
少時柔軟今後凡遇食魚而傷者及噎魚骨者
皆互用之

治竹木刺咽方

當歸不拘多少

右一味水煎温服

○案スルニ當歸ハ喉腫ヲ治スルモノナリ

子息事

金鳳散

子和ノ消毒散、和方破棺湯ナドノ咽喉ニ効

アル、宜ク參考スベシ

金鳳散、治魚骨硬、及竹木金銀銅鍍等、刺身體不出

者、一服見効

○此方、骨硬諸物、咽ニ刺シ、身ニ刺タルヲ治

スルノ妙方ナリ、又多紀醫伯ノ醫賸ノ中ニ、

鍍釘ノ咽ニ刺テ不出、諸醫手ヲ束子タルヲ

一人來リテ酢答ヲ用ヒテ、頓ニ出デシ事ヲ

載ス、其治驗甚ダ妙ナリ、後學宜ク試ベシ、醋

答ハ馬腹中ノ石ニテ、之ヲケヅリテ用フ、蠻

名ヘイサラバサラ、今馬夫バサラノ玉ト云

積氣留飲、疝氣ニ効アルモノト云ヘリ

治食糲不下咽方

嚴醋急吹鼻中、又治小兒吞錢類

附記

魚骨硬ニ、邦俗、口ニウノノドト言フ、又々

チタル魚ノ骨ヲ、別ニ取テコレヲ其人頭上髮

間ニ挿ミ置コトアリ、此亦漢土ニモ為ル事ト

見ユ、録于左

療食諸魚骨硬方外臺第八
引張文仲

以魚骨撞頭上則立下

千金療魚骨硬方

方與兒

卷之十三

五十二 虎象圖

附錄

飲食無不四時

校正方輿輶卷十三終