

卷十

儒門事親

四

儒門事親卷之四

戴人張子和著

新安吳勉學校

風一

夫風者厥陰風水之主也諸風掉眩風痰風厥涎潮不利半身不遂失音不語留飲殮泄痰實嘔逆旋暈口喎搐搦僵仆目眩小兒驚悸狂妄胃脘當心而痛上支兩脇咽膈不通偏正頭痛首風沐風手足攣急肝木爲病人氣在頭

防風通聖散

防風天麻湯

防風湯

祛風丸

宣明論

排風湯

小續命湯

遺精當
作消

逍風散

暑二

脾疑當
作脾

夫暑者為少陰君火之主也。諸痛痒瘡瘍癰疽腫毒及胃煩熱隘乾欬喘唾血泄血。胸腫有脾皆內痛。心痛肺脹腹脹鬱悶風溫病多發風傷于榮。溫傷於衛血為榮氣為衛。其脉两手多沉。自汗出身重多睡。必汗三日以裏。且宜辛涼解之。或辛溫解之。如不已裏症未罷。大不可下。如下則胃中虛空。四日之外表熱入裏。則譫語口乾發疹。潮熱直視。失渡者十死八九。

下裏表字
疑表字

但疑為作似

肺金為病人氣在胸及小兒瘡疹丹燥但發人氣在腹

白虎湯

桂苓甘露散

化痰玉壺丸

益元散

玉露散

石膏散

濕三

夫濕者為太陰濕土之主也。諸濕腫滿霍亂泄注。胸臃骨痛及腰膝頭項痛風痺痿厥。唾有血心懸如飢熱痛始作。三陽受之一日。太陽二日。陽明三日。少陽可汗而已。如四日太陰五日少陰六日厥陰可下而已。或七日不愈再傳至十三日大邪皆去。六經悉和則愈矣。腎水為病。

五苓散

葶藶木香散

白朮木香湯

益元散

大橘皮湯

神助散

桂苓白朮丸

火四

夫火者少陽相火之主也。諸暴外發熱惡寒痛病大作。傳爲水腫。面黃身痿。泄注膿血。赤白爲利。癰腫疽毒。丹癩瘍疹。小兒疳瀉。腹脹暴下。如水。心胸中熱甚。則孰胸脇皆痛。耳聾口苦舌乾。與臟毒下血米穀不化。腸鳴切痛。消渴上喘。肺金爲病。

涼膈散

黃連解毒湯

瀉心散

神芎丸

八正散

調胃散

調胃承氣湯

燥五

夫燥者是陽明燥金之主也。諸氣憤鬱。腸胃乾涸。皮膚皴揭。脇痛寒瘡。喘咳腹中鳴。注泄驚澹。脇肋暴痛。不可反側。噤乾面塵。肉脫色惡。及丈夫癰疽。婦人少腹痛。帶下赤白。瘡瘍瘰癧。喘咳潮熱。大便澀燥。及馬刀挾瘻。之瘡。肝木爲病。

神功丸

脾約丸

麻仁丸

潤體丸

四生丸

寒六

夫寒者，是太陽寒水之主也。諸寒冷濕痺，肘臂攣急，秋濕既多，寒咳爲嗽，痰厥心痛，心中澹澹大動，胸脇胃脘痛，不可食，食已不饑，吐利腥穢，屈伸不便，上下所出不禁，目盲，堅痞，色炁，渴而飲冷，積水足，浮腫囊縮，四肢冷，爪甲青，心火爲病。

薑附湯

四逆湯

二薑湯

木附湯

大已寒丸

理中湯

解利傷寒七

人冒風時氣，濕病傷寒，三日以裏，頭痛身熱，惡寒，可

用通聖散，益元散各五七錢，水一大椀，入生薑十餘片，葱白連鬚者十餘莖，豆豉一撮，同煎三五沸，去滓，稍熱，先以多半投之，良久用釵子於咽喉中探引吐了，不宜嗽口，次用少半，亦稍熱投之，更用葱醋酸辣湯投之，衣被蓋覆，汗出則愈矣。如遇世亂，內經曰：歲火太過，炎暑流行，火氣太盛，肺金受邪，上應熒惑，大而明現，若用辛涼之劑，解之則萬舉萬全也。若遇治世人安，可用升麻湯，葛根湯，敗毒散，辛溫之劑，解之亦加葱根、白豆豉，上涌而表汗，內經曰：因其輕而揚之，揚者發揚也，吐汗發揚，寒熱之邪既吐汗之後必

大將息旬日之後其邪不復作也

又一法或於無藥之處可用酸薑汁一大椀煎三五沸去菜葉猛服訖少間用釵子咽喉中探引吐了如此三次後煎葱酸辣湯投之以衣被蓋覆汗出則解內經曰酸苦涌泄爲陰涌者吐也傷寒三日頭痛身熱是病在上也在上者固宜涌之然後以淡漿粥養之一二日則愈矣

又一法可用不卧散解之於兩鼻內啗之連嚏噴三十次以衣被蓋覆用此藥時當於暖室中嚏罷以酸辣漿粥投之汗出如洗嚏噴者同吐法也此法可

與雙解散爲表裏也

又有導引一法可於一間處用之先教病人盤脚而坐次用兩手交十指攀腦後風池風府二穴乃是風門也向前叩首幾至于地如此連點一百二十數急以葱醋粥辛辣湯投之汗出立解

傷寒溫疫時氣冒風中暑俱四時不正之氣也人若初感之皆頭痛惡寒身熱及寒熱往來腰脊強是太陽經受之也內經曰可先治內而後治外先用生薑葱白豆豉煎雙解散上涌及汗出則解如不解者至五六日或不大便喘滿譫語實熱兩手脉沉可用調

胃大小承氣湯下之慎不可用銀粉巴豆霜杏仁荒
花熱藥下之則必死此先治外而後治內也如大汗
之後慎不可食葵羹藿菜羊猪雞犬魚兔等肉惟不
先明必致重困後必難治也傷寒七八日發黃有斑
潮熱腹滿者或痰實作止雖諸承氣湯下過者仲景
曰寸口脉浮滑者可用瓜蒂散吐之然傷寒寸口脉
浮滑者可用雜病寸口脉沉者可吐叔和云寸脉沉
今胸有痰啓玄子曰上盛不已吐而奪之是也

風八

夫中風失音悶亂喎斜口眼內經曰風之爲病善行

而數變故百病皆生於風也可用三聖散吐之如不
省人事牙關緊閉粥菜不能下者煎三聖散鼻內灌
之吐出涎口自開也次服通聖散涼膈散大人參半
夏丸桂苓甘露散等大忌雞猪魚兔酒醋蕎麵動風
引痰之物吐痰之法在方論中

頭風眩運手足時復麻痺胃脘發痛心腹滿悶按之
如木聲可用獨聖散吐之吐訖可服辛涼清上之藥
仲景曰此寒痰結於胸中之致然也

痺九

夫大人小兒風寒濕三氣合而爲痺及手足麻木不

仁者可用鬱金散吐之吐訖以導水丸通經散泄之
泄訖以辛溫之劑發散汗出則可服當歸芍藥乳沒
行經和血等藥如不愈則便不宜服此等藥

痰十

夫男女年少面黃身熱肌瘦寒熱往來如瘧更加涎
嗽不止或喘滿面浮此名曰肺痰可用獨聖散吐之
吐訖次用人參柴胡飲子小柴胡飲子加當歸桂苓
甘露散之類內經曰男女之病皆同也男子精不足
是味不化也女子血不流是氣不用也又曰形不足
者溫之以氣精不足者補之以味是也

厥十一

夫厥之爲病手足及膝下或寒或熱也舉世傳爲脚
氣寒濕之病豈知內經中本無脚氣陽氣衰于下則
爲寒厥陰氣衰于上則爲熱厥熱厥爲手足熱寒厥
爲手足寒也陽經起于足指之表陰經起于足心之
下陽氣勝則足下熱陰氣勝則足下寒熱厥者寒在
上也寒厥者熱在上也寒在上者以溫劑補肺金熱
在上者以涼劑清心火則愈矣若尸厥痰厥風厥氣
厥酒厥可以涌而醒次服降火益永和血通氣之藥
使粥食調養無不瘥者若其餘諸厥倣此行之慎勿

當疑似之間便作風氣相去邈矣

癰十二

夫癰病不至於目瞤如患者用三聖散投之更用大盆一箇於暖室中令汗下吐三法俱行次服通聖散百餘日則愈矣至於目瞤患者不可治內經曰神不得守謂神亂也

瘡十三

夫富貴膏粱之人病瘡或間日或頻日或作熱或作寒或多寒少熱或多熱少寒宜以大柴胡湯下之正過三五行次服白虎湯至露散桂苓甘露散之類如

大癰當作火

不愈者是積熱大甚宜以神芎藏用丸三花神祐丸調胃承氣湯等藥大作劑料下之下訖以長流水煎五苓散服之或服小柴胡湯數服亦可如不愈復以常山散吐之後服涼膈散白虎湯之類必愈矣大忌熱麵及羊肉雞豬魚兔等物如食之瘡疾復作以至不救

貧賤芻蕘之人病瘡以飲食踈糲衣服寒薄勞力動作不可與膏粱之人同法而治臨發且可用野夫多効方溫脾散治之如不愈用辰砂丹治之則愈矣如服藥訖宜以長流水煎白虎湯五苓散服之不宜食

熱物及燥熱之藥以瘧疾是傷暑伏熱之故也內經曰夏傷於暑秋必痃瘕可不信哉忌物同前

泄痢十四

夫大人小兒暴注瀉水不已內經曰注下也注下者水利也火運太過之病火主暴逆之故也急宜用水調桂苓甘露散五苓散益元散或以長流水煎過放冷服則愈慎不可驟用罌粟殼乾薑薑薤聖散子之類縱瀉止則腸胃不通轉生他疾止可以分陰陽利水道而已

痢利十五

夫病痢利米穀不化日夜無度腹中雷鳴下利完穀出可用導水丸禹功散瀉訖一二日可服胃風湯不愈則又可與桂枝麻黃湯發汗則愈矣內經曰久風入中為腸澼飧泄啓玄子云風在腸中上薰於胃所食不化而出又云飧泄者是暮食不化也又經云春傷於風夏必飧泄故可汗而愈內經曰風隨汗出痛隨利減若服豆蔻罌粟殼之類久而不輟則變為水腫以成不救也

臟毒下血十六

夫臟毒下血可用調胃承氣湯加當歸瀉訖次用芍

通評虛實命文十卷
大角口陽海其詳也者
七日記
藥葉皮九黃連解毒湯五苓益元各停調下五七錢
服之內經曰腸癖便血何如答曰癖者腸間積水也
身熱則死寒則生熱為血氣敗故死寒為榮氣在則
生七日而死者死於火之成數也

下利膿血十七

夫下利膿血腹痛不止可用調胃承氣湯加生薑棗
煎更下藏用七八十丸量虛實加減瀉訖次用長流
水調五苓散五七錢或加燈心煎調下亦得調益元
散五七錢亦可大忌油膩一切熱物則愈矣

水泄不止十八

夫男子婦人病水泄瀉注不止因服豆蔻烏梅薑附
峻熱之劑遂令三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體
否腫面黃腹大小便赤澁兩足按之陷而復起內經
曰諸濕腫滿皆屬脾土可用獨聖散吐之如時月寒
涼宜於暖室不透風處用火一盆以藉火力出汗次
以導水禹功散量虛實瀉十餘行濕去腫減則愈矣
是汗下吐三法齊行既汗下吐訖腑臟空虛宜以淡
漿粥養腸胃二三日次服五苓散益元同煎燈心湯
調下如勢未盡更宜服神助散舊名葶藶散可以流
濕潤燥分陰陽利小便不利小便非其法也既平之

後宜大將息忌魚鹽酒肉菓木房室等事如此三年則可矣如或不然決死而不救也

痔漏腫痛十九

夫痔漏腫痛內經曰因而大飽筋脉橫解腸澼爲痔痔而不愈變而爲漏同治濕法而治之可先用導水丸禹功散瀉訖次服枳殼丸木香檳榔丸更加以葵羹菠菜猪羊血等通利腸胃大忌房室雞魚酒醋等物勿食之

霍亂吐瀉二十

夫霍亂吐瀉不止者可用五苓散益元散各停水水

調下五七錢如無水水可用新汲水調下桂苓甘露散玉露散清涼飲子調下五七錢或香薷湯調下五七錢亦可如無已上諸藥可服地漿三五盞亦可地漿者可於淨地掘一井子用新汲水一桶並於井子攪令渾候澄清連飲三五盞立愈大忌白朮湯薑桂烏附種種燥熱之藥若服之則必死矣巢氏云霍者揮霍而成疾亂者陰陽亂也皆由陰陽清濁二氣相干故也

大便澁滯二十一

夫老人久病大便澁滯不通者可服神功丸麻仁丸

四生丸則愈矣時復服葵菜菠薐菜猪羊血自然通利也內經云以滑養竅是也此病不愈令人失明也

五種淋瀝二十二

夫大人小兒病沙石淋及五種淋瀝閉癢并臍腹痛益元散主之以長流水調下八正散石韋散依方服用此三藥皆可加減服之

酒食不消散二十三

夫一切冷食不消宿酒不散亦同傷寒身熱惡寒戰慄頭項痛腰脊強及兩手脉沉不可用雙解止可用導飲丸五六十丸量虛實加減利五七行所傷冷食

宿酒若推盡則頭痛等病自愈也次以五苓散生薑棗長流水煎服五六服不可服酒癰進食丸此藥皆犯巴豆有熱毒之故也

酒食所傷二十四

夫膏粱之人起居間逸奉養過度酒食所傷以致中脘留飲脹悶痞滿醋心可服木香導飲丸以治之夫勞瘵之人飲食粗糲衣服寒薄勞役動作一切酒食所傷以致心腹滿悶時嘔酸水可用進食丸治之

沉積水氣二十五

夫一切沉積水氣兩脇刺痛中滿不能食頭目眩者

可用茶調散輕涌訖冷涎一二升次服七宣丸則愈矣木香檳榔丸導飲丸亦妙不可用巴豆銀粉等藥

諸積不化二十六

夫諸積不化可服無憂散每月瀉三五次可用桂苓白朮丸散妙功丸大忌生硬粘滑動風發熱等物

骨蒸熱勞二十七

夫男子婦人骨蒸熱勞皮膚枯乾痰唾稠粘四肢疼痛面赤唇乾煩燥睡卧不寧或時喘嗽飲食少味困弱無力虛汗黃瘦等疾內經曰男子因精不足而成女子因血不流而得也可先以茶調散輕涌訖次以

導水禹功散輕瀉三兩行後服柴胡飲子桂苓甘靈散搜風丸白朮調中湯木香檳榔丸人參犀角散之類量虛實選用而用之如咯血吐血便血此乃亡血也並不宜吐吐之則神昏內經曰血者人之神也故亡血則不宜吐慎不可服峻熱薑附之藥若服之則飲食難進肌肉消削轉成危篤也五勞之病乃今人不明發表攻裏之過也大忌暑月於手腕足外踝上着灸手腕者陽池穴也此穴皆肌肉淺薄之處灸瘡最難痊可及胸次中脘臍下背俞三里等穴或有多數者及以燔針終無一効病人反受苦可不思之勞

疾多饒所思之物但可食者宜食療本草而與之菰菜葵羹水水涼物慎不可禁以薑水穀入胃脉道乃行也若過忌慎則胃口閉胃口閉則形必瘦形瘦脉空乃死之候也諸勞皆可倣此

虛損二十八

夫病人多日虛損無力補之以無比山藥丸則愈矣

上喘中滿二十九

夫上喘中滿醋心腹脹時時作聲否氣上下不能宣暢叔和云氣壅三焦不得昌是也可用獨聖散吐之吐訖次用導水禹功輕瀉三五行不愈更以利膈丸

瀉之使上下宣通不能壅滯後服平胃散五苓散益元散桂苓甘露散三和散分陰陽利水道之藥則愈

一切涎嗽三十

夫富貴之人一切涎嗽是飲食厚味熱痰之致然也先用獨聖散吐之吐訖可服人參散通聖散加半夏以此止嗽更服大人參半夏丸以之化痰也大忌酸醢油膩生硬熱物也

咳嗽三十一

夫貧難之人咳嗽內外感風冷寒濕之致然也內經曰秋傷於濕冬生咳嗽可服寧神散寧肺散加白朮

之類則愈矣忌法同前

欬逆三十二

夫男子婦人欬逆俗呼曰乾忒乃陰陽不和也乃傷寒亦有欬逆者並可用既濟散治之忌寒熱物宜食溫淡物以養胃氣耳

風痰三十三

夫風痰酒痰或熱在膈上頭目不清涕唾稠粘或欬嗽上喘時發潮熱可用獨聖散吐之吐訖可服搜風丸涼膈散之類內經曰流濕潤燥是也

咯血衄血嗽血三十四

夫男子婦人咯血衄血嗽血欬膿血可服三黃丸黃連解毒湯涼膈散加桔梗當歸大前劑料時時呷之內經曰治心肺之病最近藥劑不厭頻而少時時呷之者是也

消渴三十五

夫三消渴內經曰三消渴者肺消膈消風消也右以繅絲煮蜜湯澄清頓服之則愈或取生藕汁頓服之亦愈矣

雷頭三十六

夫雷頭懶子乃俗之謬名也此疾是胸中有寒痰多

沐之致然也可以茶調散吐之吐訖冷痰三三升次用神芎丸下三五行然後服愈風餅子則愈矣雷頭者是頭上赤腫核或如生薑片酸棗之狀可用銚針刺而出血未除根本也

頭痛不止三十七

夫頭痛不止乃三陽之受病也三陽者各分部分頭與項痛者是足太陽膀胱之經也攢竹痛俗呼爲眉稜痛者是也額角上痛俗呼爲偏頭痛者是少陽經也如痛久不已則令入喪自以三陽受病皆胸膈有宿痰之致然也先以茶調散吐之後以香薷散白虎

湯投之則愈然頭痛不止可將葱白鬚豆豉湯吐之吐訖可服川芎薄荷辛涼清上搜風丸香芎散之類仲景曰葱根豆豉亦吐傷寒頭痛叔和云寸脉急而頭痛是也

兩目暴赤三十八

夫兩目暴赤發痛不止可以長流水煎鹽湯吐之次服神芎丸四物湯之類內經曰暴病皆屬火也又曰治病有緩急急則治其標緩則治其本標者赤腫也本者火熱也以草薢鼻中出血最妙

目腫三十九

夫目暴赤腫痛不能開者以青金散鼻內搐之鼻內出血更捷

病目經年四十

夫病赤目經年不愈者是頭風所加之令人頭痛可用獨聖散八正散之類赤目腫作是足厥陰肝經有熱利小便能去肝經風熱也

風衝泣下四十一

夫風衝泣下者俗呼風冷淚者是也內經曰太陽經不禁固也又曰熱則五液皆出肝熱故淚出風衝於外火發於內風火相搏由此而泣下也治之以貝母

蛙蟻膏
作貼

一枚白臘者胡椒七粒不犯銅鐵研細臨卧點之愈

風蛙牙疼四十二

夫風蛙牙疼久不愈者用針插巴豆一枚於燈焰上燎煙未及及存性於牙窩根盤上薰之則愈

口瘡四十三

夫大人小兒瘡唇緊用酸漿水洗去白痴臨困點綠袍散如或不愈貼赴筵散又不愈貼鉛白霜散則愈
喉閉四十四

按十二卷
未當作者

夫男子婦人喉閉腫痛不能言刺兩手大拇指去爪甲如韭菜葉是少商穴少商是肺金之井穴也以針

針刺血出立愈如不愈以溫白湯口中含嗽是以熱導熱也

癭四十五

夫癭囊腫悶稽叔夜養生論云頸如險而癭水土之使然也可用人參化癭丹服之則消也又以海帶海藻昆布三味皆海中之物但得二味投之於水瓮中常食亦可消矣

背疽四十六

夫背瘡初發便可用藏用丸玉燭散大作劑料下臍腑二十行以銚針於腫焮處亂刺血出如此者三

後以陽起石散傳之不可便服內托散內犯官桂更用酒煎男子以背爲陽更以熱投熱無乃太熱乎如瘡少愈或口瘡未合瘡痂未斂風痒時作可服內托散以辟風邪耳

癰癤四十七

夫人頭目有瘡腫癰癤及胸臆肘脇之間或有瘡痂腫核不消及有膿水不止可用滄鹽一二兩炒過以長流水一大碗煎放溫作三五次頓服訖候不多時於咽喉中探引吐涎三二升後服和血通經之藥如玉燭散四物湯之類是也內經曰鹹味涌泄爲陰涌

者吐也瀉者泄也銅人曰少陽起于目銳眥行耳後
下脇肋過期門癰癰結核馬刀挾癰是少陽膽經多
氣少血之病也

便癰四十八

夫便癰者乃男子之疝也俗呼爲便癰言於不便處
害一癰故名便癰也便癰者謬名也難素所不載也
然足厥陰肝之經絡是氣血行流之道路也衝任督
脉亦屬肝經之傍絡也難經曰男子有七疝是也使
癰者血疝也治之以導水丸桃仁承氣湯或抵當湯
投之同瘀血不散而治大作劑料峻瀉二十行次

世之疑者
俗世人也

以玉燭散和氣血通經絡之類則是也世之多用大
黃牡蠣而已問有不愈者是不知和血通經之道也
惡瘡四十九

夫一切惡瘡久不愈者以木香檳榔散貼之則愈
下疳五十

夫下疳久不愈者俗呼曰臊瘡是也先以導水禹功
先瀉肝經外以木香散傳之曰上三兩度然後服淡
粥一二日則止

儒門事親卷之四

儒門事親卷之五

戴人張子和著
新安吳勉學校

瘡癰腫五十一

夫大人瘡癰小兒赤瘤腫發之時疼痛不止肉經曰
夫諸痛痒瘡瘍皆生於心火可用一呪法禁之法者
是心法呪曰

龍鬼流兮諸毒腫

癰瘡膿血甚被痛

忘心稱念大悲呪

三唾毒腫隨手消

右一氣念呪三遍望日月燈火取氣一口吹在瘡腫

丹瘤之上右手在瘡上虛收虛撮三次左手不動每
一氣念三遍虛收虛撮三次百無禁忌如用之時心
正爲是此法得於祖母韓氏相傳一百餘年用之救
入百發百中若不食蠶酒之人其法更靈病瘡腫者
大忌雞猪魚兔發熱動風之物此法不得輕侮無藥
處可用之

瘡腫丹毒五十二

夫大人小兒瘡腫丹毒發熱疼痛不止又有一法面
北端想北海雪浪滔天冰山無際大寒嚴冷之氣取
此氣一口吹在瘡腫處立止用法之人大忌五辛之

菜五厭之肉所病之人切忌雞猪魚兔酒醋濕麵等
物無藥之處可用此法救之

凍瘡五十三

夫凍瘡者因寒月行於冰雪中而得之有經年不愈
用破野中淨土曝乾以大蒜搗如泥和土捏作餅子
如太觀錢厚薄量瘡口大小而貼之泥餅子上以火
艾炙之不計艾壯多少以泥乾爲度去乾餅以換濕
餅貼定灸之不問灸數多少有灸一二日者直至瘡
痂肉覺痒微痛是凍瘡活也然後不食漿水澄清用
雞翎一二十莖縛作刷子於瘡口上洗淨以此而洗

之後肌膚損痛也用軟帛拭乾次用木香檳榔散傅之夏月醫之大妙

金瘡五十四

夫一切刀箭所傷有刀箭藥用風化石灰一斤龍骨四兩二味爲細末先於端四日採下刺薊菜於端午日五更合杵臼內搗和得所團作餅子若酒麴中心穿眼懸於背陰處乾陰搗羅爲細末於瘡口上搽貼亦治裏外癰并諸瘡腫大効

又有呪法 呪曰

今日不祥 正被物傷 一禁不疼

二禁不痛 三禁不膿不作血

急急如律令奉勅攝

又每念一遍以右手收一遍收在左手中如此七遍則放手吹去却望太陽取氣一口吹在所傷處如陰晦夜間望北斗取氣亦得所傷之人大忌雞猪魚兔酒醋熱麵動風之物如食之則瘡必發

又一法 默想東方日出始取氣一口日出一半取氣一口日大圓滿取氣一口吹在所傷之處如此三次則止用法之人並無所忌所傷之人禁忌同前可於無藥之處用之

誤吞銅鐵五十五

夫誤吞銅鐵以至羸瘦者宜用肥猪豚與葵菜羹同
飧數頓則銅鐵自然下也神驗如不食葷腥者宜以
調胃承氣湯大作其劑下之亦可也

魚刺麥芒五十六

夫魚刺麥芒一切竹木籤刺咽喉及鬚髮惹伴在咽
噎中不能下者內經曰不因氣動而病生於外可用
道藏經一呪法治之

呪曰

吾請老君東流順

老君奉勅攝攝

攝法毒水吾託大帝尊不到稱吾者各各現帝身急

急如律令奉勅攝一氣念遍又以左手屈中指無名
指作三山印印上坐淨水一盞右手掐卯文作金鎗
印左手在下右手在上左手象地右手象天虛挽虛
卓九次爲定左足橫右足豎作丁字立如作法時望
日月燈火取氣一口吹在盞內此法百無禁忌用法
之時以正神氣是也如所傷物下不可便與米湯米
飯喫恐米粒誤入瘡口中潰作膿也姑以拌麵塗養
之數日可也

蛇虫所傷五十七

夫犬咬蛇傷不可便貼膏藥及生肌散之類謂毒氣

不出也。內經曰：先治內而後治外可也。當先用導水丸，禹功散或通經瀉十餘行，即時痛減，腫消，然後用膏藥生肌散傳貼，愈。此是先治內而後治外之法也。

杖瘡五十八

夫一切虫獸所傷及背瘡腫毒，杖瘡爛發，或透入裏者可服木香檳榔丸，七八十九至百丸，或百五十九至二百丸，生薑湯下，過五七行，量虛實加減，則可矣。

禁蝎五十九

夫禁蝎有一呪法，呪曰：

玉女傳仙攝

勅斬蜘蛛滅

用可當
作可用

右如有蝎螫之人來求治者，於蝎螫處望而取氣一口，默念七遍，怒着作法，吹在蝎螫處。內經曰：蜂蠆之毒皆屬於火，用可新水一盆浸之，如浸不得處，速以手帛蘸水搭之，則痛止也。用法之人，大忌五厥肉。

落馬墜井六十

夫一切男子婦人落馬墜井，因而打撲便生心恙，是痰涎發於上也。內經曰：不因氣動而病生於外，可用三聖散空心吐訖，如本人虛弱疲瘁，可用獨聖散吐之。吐訖可服安魂寧魄之藥，定志丸、酸棗仁、伏神之類是也。

婦人月事沉滯六十一
夫婦人月事沉滯數月不行肌肉不減內經曰此名
為癥為沉也沉者月事沉滯不行也急宜服桃仁承
氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用四物
湯補之更可用宣明方檳榔丸

血崩六十二

夫婦人年及四十以上或悲哀太甚內經曰悲哀太
甚則心也系急心也系急則肺布葉舉而上焦不通熱氣
在中故經血崩下也心也系者血山也如父不愈則面黃
肌瘦慎不可與燥熱之藥治之豈不聞血得熱而流

婦人月事沉滯數月不行肌肉不減內經曰此名為癥為沉也沉者月事沉滯不行也急宜服桃仁承氣湯加當歸大作劑料服不過三服立愈後用四物湯補之更可用宣明方檳榔丸

散先以黃連解毒湯次以涼膈散四物湯等藥治之
而愈四物者是涼血也乃婦人之仙藥也量虛實加
減以意消息用之

腰膝疼痛六十三

夫婦人腰膝疼痛兩腳麻木惡寒喜暖者內經曰乃
是風寒濕痺先可服除濕丹七八十丸量虛實以意
加減次以禹功散投之瀉十餘行清冷積水青黃涎
沫為驗後以長流水同生薑棗煎五苓散服之風濕
散而血氣和也

頭風眩暈六十四

夫婦人頭風眩暈登車乘船亦眩暈眼澁手麻腰退
健忘喜怒皆胸中有宿痰之使然也可用瓜蒂散吐
之吐訖可用長流水煎五苓散大人參半夏丸兼常
服愈風餅子則愈矣

經血暴下六十五

夫婦人年及五十以上經血暴下者婦人經血終于
七七之數數外暴下內經曰火主暴速亦因暴喜暴
怒憂結驚恐之致然也慎不可作冷病治之如下峻
熱之藥則死止可用黃連解毒湯以清於上更用蓮
殼灰稷毛以滲於下然後用四物湯加玄胡散涼血

和經之藥是也

赤白帶下六十六

夫婦人赤白帶下或出白物如脂可服導水丸禹功
散或單用無憂散量虛實加減瀉訖次用桂苓丸五
苓散葶藶木香散同治濕治瀉法治之或用獨聖散
上涌亦可也室女亦可

月事不來六十七

夫婦人月事不來室女亦可內經曰月事不來者是
胞脉閉也胞脉者屬火而絡於脬中令氣上迫肺心
氣不得下通故月事不來也可用茶調散吐之吐訖

可發當
作同

可用王燭散當歸散或三和湯桂苓白朮散柴胡飲
子量虛實選而用之降心火益腎水開胃進食分陰
陽利水道之藥是也慎勿服峻熱之藥若服之則變
成肺痿骨蒸潮熱咳嗽咯膿嘔血而喘小便澀滯寢
汗不已漸至形瘦脉大雖遇良醫亦成不救嗚呼人
之死者豈爲命耶

婦人無子六十八

夫婦人年及三三十三者雖無病而無子經血如常或
經血不調乃陰不升陽不降之故也可獨聖散上吐
訖冷痰三三升後用導水丸禹功散瀉訖三五行及

十餘行或用無憂散瀉十餘行次後與葱醋白粥三
五日胃氣既通腸中得實可服王燭散更助以桂苓
白朮丸散二藥是降心火益腎水既濟之道不數月
而必有孕也

若婦人有癰閉遺溺噎乾之諸證雖服藥針灸亦不
能孕也蓋衝任督三脉之病故不治也表證見內證
及熱論中

小產六十九

夫婦人半產俗呼曰小產也或三月或四五月皆
爲半產已成男女故也或因憂恐暴怒悲哀太甚或

因勞力打撲傷損及觸風寒或着暴熱不可用黑神散烏金散之類內犯乾薑之故止可用玉燭散和經散湯之類是也

大產七十

夫婦人大產十月滿足降誕者是也或臍腰痛乃敗血惡物之致然也舉世便作虛寒以燥熱治之誤人多矣難經曰諸痛爲實實者熱也可用導水丸禹功散瀉五七行慎不可便服黑神散烏金散燥之同一產治之則可矣

產後心風七十一

夫婦人產後心風者則用調胃承氣湯一二兩加當歸半兩細剉用水三四盞同煎去滓分作二服大下三五行則愈如不愈三聖散吐之

乳汁不下七十二

夫婦人有本生無乳者不治或因啼哭悲怒鬱結氣滯閉塞以致乳脉不行用精猪肉清湯調和美食於食後調益元散五七錢連服三五服更用木梳梳乳周回百餘遍則乳汁自下也

又一法用猪蹄湯調和美味服之乳汁亦下合用熟猪蹄四枚食之亦効

又一法針有井二穴亦効

產後潮熱七十三

夫婦人產後一二日潮熱口乾可用新汲水調玉露散或水調服之亦可或服小柴胡湯加當歸及柴胡飲子亦可慎不可作虛寒治之

乳癰七十四

夫乳癰發痛者亦生於心也俗呼曰吹乳是也吹者風也風熱結薄於乳房之間血脉凝注久而不散潰腐爲膿也可用一法禁之

呪曰

謹請東方護司族吹妳是灰妳子

右用之時當先問病人曰甚病病人答曰吹妳取此氣一口但吹在兩手坎字文上用太拇指緊捏定面北立一氣念七遍吹在北方如此者三遍若作法時以左右二婦人面病人立於病乳上痛擦一二百數如此亦三次則愈

雙身大小便不利七十五

夫婦人雙身大小便不利者可用八正散大作劑料除滑石加葵菜子煎服內經曰膀胱不利爲癃癃者是小便閉而不通也如八正散加木香取効更捷經曰膀胱氣化則能出然後服五苓散三五服則愈矣

雙身病瘡七十六

夫雙身婦人病瘡可煎白虎湯小柴胡柴胡飲子等藥如大便結硬可用大柴胡散微瀉過不可大吐瀉恐傷其孕也內經曰夏傷於暑秋必病瘧

雙身傷寒七十七

夫雙身婦人傷寒時氣溫疫頭痛身熱可用升麻散一兩水半椀大煎劑料去滓分作二服先一服吐了後一服不吐次以長流水加生薑棗煎五苓散熱啜之汗出盡頭痛立止

身重瘡瘕七十八

夫婦人身重九月而瘡瘕不言者是胎生絡脉不相接也則不能言經曰無治也雖有此論可煎玉燭散二兩水一椀同煎至七分去滓放冷入蜜少許時時呷之則心火下降而肺金自清故能作聲也

懷身入難七十九

夫婦人懷身入難月可用長流水調益元散日三服欲其易產也產後自無一切虛熱血氣不和之疾如未八月則不宜服也以滑石滑胎故也

眉煉八十

夫小兒眉煉在面曰眉煉在耳曰輒耳在足曰靴痒

此三者皆謬名也。內經曰：諸痛痒瘡瘍皆屬心火。乃心火熱盛之致然也。可用銚針刺之而出血，一刺不愈當再刺之。二刺則必愈矣。內經云：血實者宜決之。決者破其血也。眉煉者不可用藥傳之。其瘡多痒則必爬。若藥入眼則眼必損矣。

牙疳八十一

夫小兒牙疳牙疳者齒齲也。齲者是牙斷腐爛也。上下牙者是手足陽明二經也。或積熱於內或服銀粉巴豆大毒之藥入於腸胃乳食不能勝其毒毒氣循經而上至於齒斷齒斷牙縫為嫩薄之分反為害也。

可以射香玉線子治之。乳母臨卧當服黃連解毒湯一服疳病則愈。

夜啼八十二

夫小兒夜啼不止者當用燈花一枚研細隨乳汁下併三服則每服用燈花一枚服罷此藥於淨室中卧一兩日則止也。

丹瘤八十三

夫小兒丹瘤浮赤走引或遍身者乃邪熱之毒在於皮膚以磁片撤出血則愈。如不愈則以拔毒散掃二十度必愈矣。內經曰：丹燦赤瘤火之色也。相火之

病是也

疳眼八十四

夫小兒疳溢眼數日不開者乃肝木風熱之致然也可調服涼膈散數服眼開而愈

身瘦肌熱八十五

夫小兒身瘦肌熱面黃腹大或吐瀉腹有青筋兩脇結硬如枕之狀名乳癰癖俗呼曰妳脾是也乳癰得之綿帛大厚乳食傷多大熱則病生肌大飽則必傷於腸胃生於肌表者赤眼丹瘤疥癰癰眉煉赤白口瘡牙疳宣爛及寒熱往來此乳母抱不下懷積熱

薰蒸之故兩手脉浮而數也傷於腸胃者吐瀉驚疳嘔氣腹脹肌瘦面黃肚大筋直喜食泥土採鼻竅頭髮作稔乳癖不化此皆大飽之致然也久而不愈則成乳癰兩手脉沉而緊也此其辨也已上諸症皆乳母懷抱奉養過度之罪癖之疾可以丁香化痺散取過數服牛黃通膈丸甘露散益黃散等藥磨之如不愈者有揉脾一法

呪曰

日精月華

助吾手法

勅斬滅消

驅毒勅攝

右用法之人每念一遍望日取氣一口吹在手心自

搽之如小兒病在左壁上用法之人亦左手搽之在右壁以右手搽之亦吹在乳脾上令母搽之男孩兒用單旦女孩兒用雙旦大忌風雨陰晦產婦孝子見之用法之時宜於日中前晴明好日色則可矣

大小便不利八十六

夫小兒大小便不利通者內經曰三焦約也約者不行也可用長流水煎八正散時時灌之候大小便利即止也

久瀉不止八十七

夫小兒久瀉不止者至八九月間變為秋深冷痢瀉

泄清白時復撮痛乳瓣不化可用養脾丸丸如黍米大每服二三十九米飲下日三服則愈若治蕩堯之兒萬舉萬全富家且宜消息

通身浮腫八十八

夫小兒通身浮腫是水氣腫也小便不利者通小便則愈內經曰三焦閉溢水道不行水滿皮膚身體否腫是風乘濕之症也可用長流水加燈心煎五苓散時時灌之更於不透風暖處頻治汗出則腫消腫消則自愈內外兼治故也

發驚潮搐八十九

夫小兒三五歲時或七八歲至十餘歲發驚潮搐涎如拽鋸不省人事目睛喘急將欲死者內經曰此皆得於母胎中所授悸惕怕怖驚駭恐懼之氣故令小兒輕者爲驚吊重者爲癇病風搐爲腹中積熱爲臍風已上證候可用吐涎及吐之藥如吐訖宜用朱犀腦射清涼墜涎之藥若食乳之子母亦宜服安魂定魄之劑定志丸之類如婦人懷孕之日大忌驚憂悲泣縱得子必有諸疾

拘哭不止九十九

夫小兒拘哭不止或一二日或三四日乃邪祟之氣

湊于心拘哭不止也有藏經一法以綿絹帶縛手足訖用三姓婦人淨驢槽卧小兒於其中不令傍人知而覷之候移時則拘哭自止也

身熱吐下九十一

夫小兒身熱吐下腹滿不進乳者可急用牛黃通膈丸下過四五行則愈

風熱涎嗽九十二

夫小兒風熱涎嗽可用通聖加半夏多煎少服之不過三五日愈

水瀉不止九十三

夫小兒水瀉不止可服五苓與益元各停用新水調下二錢不拘時服

瘡疥風癬九十四

夫小兒瘡疥風癬可用雄黃散加芒硝少許油調傳之如面上有瘡癬不宜擦藥恐因而入眼則損目矣

甜瘡九十五

夫小兒甜瘡久不愈者俗呼曰香瘡是也多於面部兩耳前有一法令母口中嚼白米成膏子臨卧塗之不過三五上則愈矣小兒并乳母皆忌雞猪魚兔酒醋動風發熱之物如治甜指亦可

白禿瘡九十六

夫小兒白瘡瘡者俗呼爲雞糞禿者是也可用甜瓜蔓煎頭不以多少河水浸之一宿以沙鍋熬取極苦汁濾去瓜蔓以文武慢火熬成如稀飴狀盛於磁甕中可先剃頭去盡瘡痂死血出盡着河水洗淨却用熬下瓜蔓膏子一水盞加半夏末二錢生薑自然汁一兩匙狗膽一枚同調不過三兩上立可大忌雞猪魚兔動風發熱之物

瘡疾不愈九十七

夫瘡疾連歲不愈者可用呪菓法治之果者謂桃杏

棗梨栗是也

呪曰

吾從東南來 路逢一池水 水裏一條龍

九頭十八尾 問伊食甚的 只喫瘡病鬼

右念一遍吹在菓子上念七遍吹七遍在上令病人於五更雞犬不聞時面東而立食訖於淨室中安困忌食瓜果葷肉熱物此法十治八九無藥處可救人

腰痛氣刺九十八

夫一切男子婦人或因欬嗽一聲或因悲哭啼泣擡昇重物以致腰痛氣刺不能轉側及不能出氣者可用不計散噀之汗出痛止如不食可用通經散導水

九瀉十餘行瀉訖服烏金丸和血丹痛減則止矣

赤癰丹腫九十九

夫小兒有赤癰丹腫先用牛黃通膈丸瀉之後用陽起石掃傳則丹毒自散如未散則可用銚針砭刺出血而愈矣

瘡疱癰疹一百

夫小兒瘡疱癰疹失瘡丹標等疾如遇火運勝時不可使用升麻湯解之升麻湯者是辛溫之劑止可用辛溫之劑解之太平之時可用辛溫之劑發散後便可用涼膈加當歸白虎湯化斑湯玉露散煎服之甚

上溫字

者解毒湯調胃承氣湯投之古人云瘡瘍者首尾俱不可下此言誤入久矣豈不聞揚湯止沸釜底抽薪內經曰五寅五申歲多發此病此病少陽相火之歲也少陽客氣勝丹煙瘡疱癰疹之疾生矣又內經曰諸痛痒瘡瘍皆屬於心火由是言之皆明心生不可用辛溫之劑發散以至熱勢轉增漸成臟毒下血咳牙搖搦爲太熱之症明矣如白虎湯加人參涼膈如桔梗當歸不論秋冬但有瘡疱之症便可用之亦且瘡疱癰疹丹煙跌瘡者是天之丁氣以傷人也且如瘡疱癰疹以少爲吉以稠爲凶希少者不服藥而自

愈稠密者以寒涼藥捨死而治之十痊其二二弊家親眷相知信服此藥獲効多矣

