

提耳譏

一

提耳後序
齒壯董先生而善搃平
於一帙能免家尚不無世
之業寧幸志在索隱仍昭言
實矣乞用系注怪人先生
望你為之厚厚種意所特

マウ子レヤ

薦用ニ

橙皮

小茴

脣附

橙皮

小茴

脣附

橙皮欠

虛人心下广

アリタレ

酒湖日夜妙強博施徒功
其所以者善也去之方也
乃子修也於以國字多
艾其易棲也一見先生固
以有此深且切至矣哉我不同
字矣之他流專為平名御湖

在此書近行于世但生於齊
不精殊深極多德孝有懷難
通予注乎手略又技亦詩半行正
魯曲凡藥物以一字称者悉
復本名也一日素拂
凍翠堂主人李清刊行因

河淵自夜妙強博施鍾功
其所是者盖在去古之方也
乃考之於故以圖字多
文其易棲也一見之先生爾
以成深且切至家故不同
字矣之他源事為平名御淵

在此書近行于世但生於齊
不精殊深極多德孝有懷難
通予生平略無技焉詩平行止
魯魚凡藥物以一字称者悉
復本名也一日素婢
凍蟹堂主人李清列行因

提耳談目錄

卷之一

元氣辨

先天腎間動氣

中風

改正奇方

追加

類中風

傷寒

發汗及兩感之劑

止汗之劑

灸熱之劑

實熱必用之劑

通利之劑

和解之劑

虛熱必用之劑

汗下之後虛寒必用之劑

小便不通必用之劑

虛煩必用之劑

再敍言以應重云

文化丁卯三月上漸

尾蕩加藤正門撰



血熱或有瘀血必用之劑

不語

斑疹之劑

瘡

不食

腹痛

頭汗

盜汗

吐蛇蟲

咳嗽

狂言妄語實熱虛煩熱之格

極熱之格

不治之熱

清熱之格

斑疹漸退時之格附熱病兼斑疹初中後之格

畜血之症

自利

喘急挾痰傷寒

嘔吐

發狂

渴

衄血

咳逆

下膿血

勞復

戰慄

狐惑

熱入血室

夾痰傷寒

不治傷寒

似前症可治之症

舌帶黑色

熱病吐而不納藥諳言甚

傷寒附錄

色脉

中寒

卷之二

是耳炎

目錄

中暑

感冒

傷寒溫熱補遺

內傷

鬱症

咳嗽

瘧疾

痢疾治法改正

泄瀉

霍亂

翻胃附膈噫

嗳氣

中濕
瘟疫
火證
飲食
痰飲
喘急
痢疾
追加
補遺
嘔吐
呃逆

卷之三
吞酸吐酸
諸氣

鼓脹

積聚
瘀疹

虛勞

吐血之工夫

眩晕

癲癇

怔忡驚悸

水腫
五疸
發熱
汗症
失血
吐
衄
咬
咯
唾
瀉
便
麻木
健忘
虛煩

辨症

目錄

卷之四

濁症

淋症

遺精

遺尿

小便閉

大小便閉

大便閉

痔漏

脫肛

頭痛

腹痛

脇痛

背痛

三

頭痛

</

癰疽疔之次第 附 風毒

風毒腫
腸癰

婦人科

調經
血崩

虛勞

胎前

小產後

乳病

小兒科

經閉
帶下

臨產
產後

慢驚
癖疾
感冒

腹脹脹脹

泄瀉

瘡

痘

脉法

急驚
疳
諸熱
傷食
嘔吐
痢
咬
疹子
諸症

提耳談目錄終

是再炎

目錄

五

論益

卷五

卷五

卷五

提耳談卷之一

元氣辨

夫陰陽合為一元氣。一丸紅日陽而溫。漫漫海水陰而寒。水火生土而為地也。其為地也。火太過則水枯竭。地枯涸則萬物不生。陽火衰則地為寒冷。萬物不育。陰陽如權衡則陽溫陰潤。而萬物自生矣。人亦如此。陰陽常則脾土亦常。飲食消化而五液生。流行於一身矣。液中溫者陽。而液者陰也。約言之則陰陽合而為一元氣。形而為水火。水火位于心腎。脾土在中州。元氣分而為神氣。為精氣。為胃氣。其舍在心脾腎。先天元氣合于後天。

穀氣而化飲食生五液而養先天元氣人初生消化乳汁者先天之胃氣也後天之穀氣合之先天後天胃氣共滋養五藏也。分之則精氣神也。統之則一元之氣也。程良吉曰。脾土為中州。陰陽交濟。而萬物生也。此語盡矣。予因之施於寒熱虛實補瀉溫涼之治也。

先天腎間動氣

○姪胎四ヶ月五ヶ月。動氣初テ生。六七ヶ月ニ及テ。兒ノ形備ル。熱飲アル時ハ。胎中ノ兒驚キ。產出則消化乳汁者是元氣也。是ヲ先天ノ胃氣トモ云。後天ノ養ヲ待スメ。先天ノ氣乳汁ヲコナシ。為呼吸。一身ノ動氣ノタス。是動氣ノツリ合也。木偶人ノ歩ムハ。自鳴鐘カラクリニテ自由ニ動ク。自鳴鐘ハツリ合ハ。輕重ノ重リ也。此動ハ自陽ノ温ナル氣ハ無レ

氏輕キト重キトノツリ合ノ氣ニテ動ク也。療治ニ取テ云時ハ。溫藥ノ動クニ非ス。人參ノ氣ニテ動キ動ク也。古人ノ說ニ。虛而無寒者唯補之。虛而有寒者溫補之。ト如是道理ガ工夫ノ第一也。予按スルニ。腎間ノ動氣ハ。難經ニアレ臍下腎間ノ動氣也。命門ノ火ノ衰不衰ヲ知リ。有熱無熱ノ動ヲ察スルヲ格トスル事也。動氣ノ次第八。醫譚ニ詳也。○一醫。啖血晡時。或微熱或憎寒。其父火動勞症カ一疑フ。依テ名掌診セシム。脉少進ム。然メ脉指下ニ満ル處。俗ニ巾ノ有ト云狀也。是火動ノ脉ニ非ス。臍邊ノ動ヲ考ルニ。是モ巾有テ進ミ。脉ノ洪大ニメ無力ト云様ナル動氣也。予曰。予力醫談ノ論ヲ見テ。史メ火動ト思玉フ也。然レヒ醫談ニ書タ

心、腎間ノ動氣火動ハ進テ小ク火衰レハ進テ散ト書タリ。今公ノ動氣散ル狀アルハ陽氣不足シタル處有テ真ノ火動ニ非ズ。啖血ハ公壯年ノ時清啖湯ニテ治シタリト云ヘハ。今此啖血ハ上焦ニ瘀血アル故也。火動ノ火血ヲ載テ來ルド云トハ違フト云テ八物湯、茯苓補心湯、或ハ時ニ胸痛又胸中熱メ啖アル時ハ順氣和中湯ニ半夏ヲ去リ貝母ヲ加ヘ此三方ヲ以テ交ヘ與ヘ或ハ補氣或ハ清火和痰半年ニメ全ク瘥ニ。

中風

○脉緩和虛弱間有痰火當察其腹脉虛弱而腹動氣有力則不宜溫補宜降火潤痰之劑。

○脉虛弱或洪大或如有力可察其腹動氣靜則宜溫補。○中風之因多因心腎之虛而上焦痰不順下焦生相火。

○醫學正傳云一氣之微汗或一旬之通利治須少汗亦少下。○正傳醫按曰中風三四日大便不通則不能言語即以東垣導滯丸或潤腸丸微利之則語言復正。

○愚按保養劑可考大便之通有多少之品大便通多而不殘則無故大便通少而殘則健忘痰喘諸症發矣諸藥劑之中加大黃桃仁杏仁潤燥之方可也病人雖虛大便五六日不通脣邊凝則不可畏大黃大便通為度而去大黃結甚則加大黃丸散可兼用保養之劑也。

○大便少之症脣邊不凝症宜溫補則不可用通利之劑宜十

神湯

心力本復也。不語ハモトヲリテ元ノ如ク能言ル也。

老婦七十六。左半身不遂。不能步行。脉按而弱。加味大補湯數貼ノ後。以杖步行ス。

○左半身麻痺。當歸。芍藥。白朮。茯苓。陳皮。烏藥。人參。羌活。貝母。前胡。黃柏。桔梗。甘草。生薑。右補血順氣化痰燥火ヲ治ス。中補ノ劑也。熟地黃不應症ナトニ用ユ。

○中風八以一不可論。必竟氣血ノ虛ニ依テ發ス。其ニ有痰也。或死血。或痴氣ヲ薰ルモ有リ。虛ヲ本ニメ。邪氣ハ標也。

○論云。風中經絡則口眼喎斜也。宜復正湯。

壽世保元
中風門

○論云。中風等症。因內傷者。非外來風邪乃本氣自病也。多因勞役過度。耗散真氣。憂喜忿怒。傷其氣者。而卒倒昏不知人。則為左癱右瘓。口眼喎斜。四肢麻木。舌本強硬。語言不清等症。宜此方。補中益氣湯。加黃柏。以滋腎水。瀉陰中之伏火也。加紅花養心血。

○中風卒倒。因勞傷者。過勞後。耗損元氣。脾胃虛弱。不任風寒。故昏冒也。宜益氣湯本方。

○左癱右瘓者。益氣湯。加防風。羌活。天麻。半夏。南星。木香。言語塞澁者。加石菖蒲。竹瀝。

○口眼喎斜。益氣湯。加薑炒黃連。羌活。防風。荆芥。竹瀝。薑汁。

○中風痰喘。因中氣虛。飲食素少。忽痰壅氣喘。頭搖目劄。揚手擲足。難以候脉。視其面色。黃中見青。此肝木乘脾土。益氣湯。加

茯苓半夏水煎臨熟加薑汁同服。

○中風面目十指俱麻乃氣虛也前方加附子木香羌活防風烏藥麥門冬。

○善飲舌本強硬言語不清此脾虛濕熱前方加神曲麥芽乾葛澤瀉。

○按中風有虛中之實者實去而可補虛七分實三四分者可補也半虛半實者和ノ虛見則補意ヲ以スヘレ實ト云ハ風寒暑濕ノ外邪或濕熱或熱痰或食滯虛中ニ滯アルヲ云。

○中風半身或麻痺或沓風養生藥六君子湯去人參加當歸川芎烏藥沈香木香宿砂薏苡仁防己天麻生薑因症加入參或加黃芪肉桂羌活防風語澁大便結去防己加酸棗仁枳殼

○中風補劑ヲ用テ不効者虛中ニ實火有力ト可心付心熱有テ語澁不語用補劑加薑炒黃連可也加減溫膽湯ノ症多溫補應スル症ハ治シ易フノ虚中實火アル者て、アリ。可心付知母黃柏加ル事モアリ。

○中風ノ漸ヲ知ルハ手足麻痺或沓風トテ沓ノ脱ヲ不知或語澁或ビクメキナドスル1皆書ニ見ヘタリ。予中風ヲ患タル人ノ話ヲ聞ニ未發以前ニ食スル時下斷中ニ飯残リタルニ食スル度毎ニ異ナ事ト思タルト云如此事中風ノ漸ヲ知ル目當也何トナレハ唇緩リ唇舌ノマワリ常ノ如クナラサル故ニ飯口内ニ残ル也湯ヲ飲タルアトニ飯口内ニ残ルハ口眼喝斜或不語スル漸ト知ヘシ

湯

君子湯

○或醫飯スル時クヒユボスト.有ヤト問.是モ中風ノ漸ヲ
問タル也.唇緩故クヒコボス也.肥人ノ物忘レスルモ.中風
恍惚ノ兆モテトナルトアリ.

○七十三ノ老人.中風手足浮腫.メ.小便少.不治ト思タルニ.
滲濕湯ヲ用テ.小便利而腫退.年ヲ經タリ.

○七十三ノ老人.上唇不動.眼カスミ.右手足背風語澁.予是
ヲ保養スルニ.六君子湯加當歸川芎烏藥沈香宿砂薏苡仁
杜仲或肉桂.冬ノ間ハ能應ス.上氣面黒ム時ハ.或ハ人參五
厘程入氣衰ル時ハ.人參一分.或一分五厘入.強テ補陽せん
ト思テ.桂附乾薑ヲ入.人參二三分入タレハ.痰火動ク.故ニ
此方之解法.當歸川芎烏藥沈香宿砂薏苡仁竹茹黃連.人參.桂附.乾薑.牛膝.古方.六味丸.八味丸.竹茹黃連.黃柏.加減.泥.合.可.知.六味丸.八味丸.屬.兼.用.テヨ.シ.痰多.キ.故.泥.者.多.シ.有.熱.者.ハ.竹.茹.黃.連.ナ.ト.加.ヘ.黃.柏.ヲ.加.ル

熱アルト多シ.溫膽湯ニ當歸黃連ヲ加用ルトアリ.或六君子湯加當歸川芎烏藥沈香宿砂薏苡仁竹茹黃連用エ.脉和
シ氣衰ル時ハ.去黃連.如此ノ全シ.那須心庵.予力黃連ヲ用
ルトラ呵メ.急ニ溫補シタレハ却テ惡ク成テ.又予力治ヲ
求ム.心庵ハ溫ニ泥テ.虛中ノ火ヲ知ラヌ醫也.如此類ノ醫
多シ.能能可辨.

○中風不問老若.予常投ノ効アリ.六君子湯加當歸川芎木
香宿砂肉桂薏苡仁之屬.手へ藥ヲ行ラサント思ハ.烏藥
少加ヘ.腰脚へ藥ヲ行ラサント思ヘハ.牛膝ヲ加ヘ.古方ノ
加減ナト見合テ可知.六味丸八味丸ノ屬兼用テヨ.シ.痰多
キ故泥ム者多シ.有熱者ハ竹茹黃連ナト加ヘ.黃柏ヲ加ル

下モアリ。

○萬病回春ノ加減除濕湯大暮光湯三和散防風通聖散降火湯明醫雜著ノ加減枳朮丸以上中風十分ニ仕覺タル主方也然レ止此劑皆標ヲ治スル劑也中風ノ根元ハ真陽虛而發ズルコナレハ六君子湯ノ加減決ソヨシ加味大補湯妙アリ故ニ改正奇方ヲ見ス。

改正奇方

○六君子湯加當歸川芎木香宿砂肉桂薏苡仁牛膝烏藥右有痰熱加竹瀝薑汁黃連黃柏虛冷者倍肉桂加熟附子有熱則去附子面風加天麻

加味大補湯有神萬病回春

○不語心神恍惚加減溫膽湯

萬病回春
痰飲門

溫膽湯
神恍惚

○面風口眼微喎斜勾氣散

○中風八癥ヲ兼ル也真陽虛而痰不行塞ル故ニ為中風也故ニ六君子湯ノ加減初中後可用熱アラハ熱ノ加減虛寒ナラハ溫藥ノ加減可差別

○大便結則六味丸八味丸可兼用通カヌル時八潤腸丸

萬病回春大便閉門脾約丸格致餘論

七味白朮散

加當歸枳殼桃仁大便通則止服六君子湯加減メ用ニ

○小便不通則八味丸加木通或金匱腎氣丸煎湯加減ス東垣加牛膝車前子

○手足麻痺或左癱右瘓補中益氣湯加肉桂附子木香

○中風ノ順氣ト云ハ少氣ノ滯リタルヲ順スル也。故ニ木香宿砂肉桂ノ類也。助ケテ氣ヲ減セヌ様ニ氣ヲ益メ順スル意也。故ニ氣鬱ノ順氣トハ格別也。

○一身不遂中風。左右癱瘓ニ似テ。不分左右。麻木不仁者。冷濕也。或濕熱也。此是類中風也。中濕為此症。世人為中風治療無効。

追加

○中風暈倒困睡ノ間ハ獨參湯一二錢。但人參一錢ノ時ハ生薑三分入ル。正氣出來テ痰多キハ獨參湯加竹瀝薑汁。後ニ六君子湯加木香宿砂肉桂。人參二三分入レテ。獨參湯ト互シ用ス。此意ハ困睡ノ中ハ不宜順氣。經云法者氣者而不

行トアリ。中風ノ順氣ト云ハ弱キ氣ヲ順スル也。故ニ困睡ノ中ニ順氣スレハ却テ正氣ヲ散シテ不宜也。故ニ木香宿砂肉桂當歸川芎ノ五味。溫和メ怯キ氣ヲ順スルモノナル故ニ六君子湯ニ加テ用ル也。左右ノ手足不遂ニハ目ハ付ヌ也。困睡サメ氣正ク成テ後。左癱右瘓ニ拘手ヘ引藥ニハ烏藥殼蠶足ヘ藥氣ヲヤルニハ薏苡仁牛膝杜仲ヲ加ル也。六君子湯ニ木香宿砂肉桂殼蠶烏藥當歸川芎薏苡仁杜仲牛膝ヲ加ヘ。虛冷ニハ加附子。有痰火ニハ加薑炒黃連或酒炒黃柏。此劑ニ火參一二分入テ用ヒ。連ニ二人參ヲ減スル也。輕キニハ人參少シ入レ。此六君子湯ノ加減ヲイツモ用テ本復スル也。半年一年二三年モ用テヨシ。于此理

ヲ得テ此一劑ニテ常ニ施治シテ有効。痰火ニ六味丸煎湯、虛冷ニハ八味地黃湯兼テヨシ。中風ハ怯キ氣ノ滯リタル故順氣ト云字ニ泥ム時ハ却テ元氣ヲ散スル也。故ニ補中ニ少シ順氣スル意也。此理ヲ不知人ハ困睡ノ中ニハヤ烏藥順氣散ハ味順氣散ナトヲ用ユ。是ハ理ヲ不知故也。元氣疲レタル故ニ困睡スル也。故ニ補氣ソ元氣ニ力カツケバ、目ハ醒ル也。トクト目ガサメテ後六君子湯ニ木香宿砂肉桂ニテ氣ヲ助テ痰ヲ和シヨキ程ニ氣ヲ順スル也。五七日十日彌氣ガヨク成テ後此加減ヲ用テ治スル也。百發百中ノ治法也。

頤中風

- 病症不分明則先用藿香正氣散。
- 類中風看様ニ品アリ卒倒昏睡ノ卒中ト見ル。根元非中風氣虛而夾痰ニ依テ如此也大補メ手足ニ子細ナキハ中風ニ似タル也手足ノ中左右不自由ナルハ中風也。
- 氣虛血虛或氣鬱痰氣痰鬱食滯蟲積ノ類ニテ身不自由或卒倒而不省人事之症有之是亦類中風也然レ疋邪方湊レ處其氣必虛スト云丁内經ニアリ後ニハ真ノ中風ニ成ル也微風ト云ニ同シ萬病回春類中風諸論可見治法ヨシシキアリ瘤ハ痰沫ヲ吹出シ冲上メギクくトメ如死其脉ヲミルニカサ有テ緩也痰熱アルハ滑數ニノロ眼喝

斜擣搦メ發シタル處ハ中風ナレモ持病ニ如此アリヤ否
ヤト問テ時々發ルト云トヲ聞テ中風ニ非レヲ知ル也

○癇症モ一兩日不語スルアリ癇ハ痰心肝ニアリ脾腎不
疲中風ハ心脾腎虛ノ痰塞リ發スル也癇ハ心肝ニ痰鬱メ
アリ依之發シ心胸ニ冲上ル退則根元不病故ニ無別儀

○癇症或鬱痰鬱氣ニテ絶入テ死スルカ如キニハ沈香五
分或一錢人參五分或一錢生薑一片右煎服有痰竹瀝薑汁
臨服入沈香能ク氣ヲ流通ス人參補氣沈香ハ人參ニツレ
テ上下スル意也中風ニテモ良シ然レバ真中風ハ氣虛ヨ
リ發スル故ニ沈香久ク用ヒ難シ却テ真氣ヲ耗散スル也
張強ク寒口ニハ竹瀝ト沈香トニテ夜ヲ開ク故急ナル時

八用テ可也

傷寒

發汗及兩感之劑

○升麻發表湯 九味羌活湯 防風通聖散 牛房芩連湯
芩連消毒飲 小柴胡湯 加知母芍藥茯苓或黃連黃柏
止汗之劑

○汗出不止則亡陽而死故急止汗溫補之 跖邪實表湯
加減冲和湯 十全大補湯 加附子 補中益氣湯 加附子肉
桂 參附湯 柴芩湯 有濕熱汗不止小便澀少或間遠者
利小便汗止

灸熱之劑

○輕者小柴胡湯 香葛湯 重者防風通聖散 黃連解毒
湯治熱病同之。

和解之劑

○柴胡雙解散 柴芩湯 升麻葛根湯加知母黃柏 九味
清脾湯加人參麥門冬知母黃柏山梔子葛粉 或去草梔加橘
榔子

通利之劑

○六一順氣湯 涼膈散 大柴胡湯 桃仁承氣湯 大承
氣湯

實熱必用之劑

黃連解毒湯

葛根芩連散

知母白虎湯

京開散加知

虛熱必用之劑 或兼痰火

○安神益志湯 滋陰降火湯 清離滋坎湯 四物湯加黃
芩人參麥門冬陳皮知母 八物湯合六味丸 六味丸加知
母黃柏 生脉散 熟附子方 參連湯

和之時必用之劑

○五苓散或加清熱之藥一二味 溫膽湯 滋陰至寶湯
二陳湯加山楂子黃連 消熱平肝 逍遙散合溫膽湯加山梔子 四物
湯合小柴胡湯 茯苓補心湯加黃芩 柴胡雙解散 八物

湯

小便不通必用之劑

○汗下之後真陽虛而氣不下行小便不通
八味丸加木通
金匱腎氣丸煎加木通 獨參湯 參附湯

汗下之後虛寒又用之劑
十全大補湯加附子一付

○十全大補湯加附子 附子理中湯 補中益氣湯加附子
內桂 四君子湯加附子 獨參湯 參附湯

虛煩必用之劑

○竹葉石膏湯 竹茹溫膽湯 加減溫膽湯 玄培方

血熱癰瘍

卷之三

清江

○三乙參氣湯 六一順氣湯 加桃仁紅花 桃仁承氣湯
犀角地黃湯 加味犀角地黃湯 壽世保元 生地芩連湯
加味逍遙散 加犀角 加味四物湯 四物湯加黃芩黃連

勞役傷寒初發必用之劑

加減冲和湯
芩連消毒飲 傷寒六書

斑疹之劑

○防風通聖散

母當歸散壽世保元

和劑四物湯加犀角麥門冬

加石膏知

斑疹後煩渴，白虎解毒湯。

斑疹後煩渴。白虎解毒湯。

湯.

是耳炎

卷一

卷之三

不語

○瀉心導赤散 舌焦黑不語者六一順氣湯 涼膈散加知母石膏 大承氣湯加桃仁紅花 心下按而痛者為實 不痛者為虛 發汗或大瀉之後元氣虛微而不語大補之可也 雖痛好按者虛也

痙

○如聖飲 傷寒六書輕者五積散加附子 十全大補湯加附子 傷寒六書壽世保元可見合

腹痛

○大便不通腹痛宜通利之劑 大便黑溏或硬瘀血也桃仁承氣湯 大承氣湯加桃仁紅花 有虛痛大便瀉下之後或

大汗之後腹按之覺快者溫而和之 舌黑漸去漸潤腹痛常有癟或蟲積者七氣湯 三和散 或柴平湯內消散 不換金正氣散加香附子乾薑 指迷七氣湯 净府湯去胡黃連 加青皮薑炒黃連合平胃散

不食

○熱不退舌黑而不食者熱解則食氣出也 热過半退舌柔而潤黑色漸去不食者有痰有蟲積或常有癟或虛冷有之虛寒則溫補之有痰則用消痰之劑有蟲積癟氣積聚以其藥劑治之香砂養胃湯消疳湯之類

盜汗

○傷寒盜汗見之有兩症熱甚舌焦熱薰蒸而自汗盜汗有之

此汗者。熱去而汗自止。熱漸去。或汗下之後。表裏微和スル時。有盜汗。此汗ハ不可止也。因盜汗。邪氣散スル也。得補劑盜汗出彌可也。邪氣得補而散スルナリ。

頭汗

○熱不解。舌焦黑。無性ニノ撮空循衣摸床。譖言胸中ヨリ出。腑中ヨリ聲音不出。無根。頭汗脉虛數。欲溫補則實熱内ニ有之。欲用清熱通利之劑。則脉虛微而遲。腹弱者不治也。

○此症既見。則心下按而痛。脉有潤者大承氣湯加石膏。或六一順氣湯。桃仁承氣湯。其外通利劑。撰用之有妙。

○頭汗脉虛微。腹動氣弱。足冷。十全大補湯加附子。或益氣湯加附子肉桂。或參附湯。八味丸煎。

止氣散
日寒熱
下半之

○頭汗甚。脉數小便赤煩熱。滋陰降火湯。清離滋坎湯。六味丸加知母黃柏為湯用之。數得効。

○頭汗甚。頭痛如裂。足冷脉緩。脣邊動氣靜弱。八味丸為湯。用之得効。

咳嗽

○傷寒咳嗽。多有痰。宜消痰清熱之劑也。咬甚。解熱下痰湯。或加減瀉白散。瀉陰降火湯。清離滋坎湯。瓜蔞枳實湯。○熱退之後咳嗽スルニ。有蟲積之症可考。

呴蛇蟲

或不食而
逆蛇蟲

○傷寒吐蛇蟲。不換金正氣散。加香附子乾薑。三味淋藥。不食嘔吐治同之。或不換金正氣散。合三味淋藥用之可也。

○傷寒寒熱頭痛五七日或口渴耳聾舌漸黑而服藥則吐之不食通利ノ吐彌甚或用解毒則猶吐之用小柴胡湯則又吐此症蛻蟲動而胸中ニ上リ不受藥也雖有熱寒涼劑不可用也安用前劑用前劑而吐止食氣漸出來テ後清熱劑用之則能受之也次而寒藥通利ハ不應者也吐定食漸進テ熟人格見令用寒涼則受之也

○女子年十二患熱病寒熱頭痛口渴用清熱或小柴胡湯令黃連解毒湯數方熱不解而吐甚知其蛻蟲動故不換金正氣散加香附子乾薑用之則吐止七八貼用之熱彌甚雖然食進出吐止見其舌中黑不換金正氣散加柴胡黃芩葛根黃連山梔子用之熱去テ愈ニ

真
氣
湯
大
便
蟲
譜
櫛
足

○蛻蟲十二次雖吐先吐蛻ニ不拘清熱或補劑ヲ用ル塲ナラハ其時ノノ藥ヲ二度モ加減ノ用ル内ニ是非恶心嘔吐吐蛻アルハ其時ニ蛻蟲加減ノ治法可心付也

○壯男患熱病用通利劑而耳聾少安舌黑少去彌用六一順氣湯五六貼之後盜汗出熱過半輕而吐逆一日ニ兩度不食知蛻動故不換金正氣散加香附子櫛榔子用之食進而安○如此之症予初心ナル時分清熱通利ノ劑多用之而彌不食漸ノ熱増テ不治ヲ數人見テ考ルニ蛻蟲ノ症寒涼劑ヲ用ルノ戒ル道理分明ニ決シタリ故ニ熱強ク凡輕キ藥ニテアシライテ蟲ヲトクトシズメテノ上ニ又清熱苦寒ノ劑ヲ用ルノ也蟲ニズマルト食氣出ル也米食ヲ受ルト藥是子炎

モ亦能受ル也。其時ハ何ノ主方ニテモ用ヒ易キ也。何時ニ
テモ蟲動スル時ハ輕クアシライ。蟲ヲレズメ食ヲ能程ニ
進メテ置テ熱ヲサースト。合点スベシ。大黃ノ勻ヒ。蟲ヲ動
カス物也。通利ノ劑用ル内ニ嘔吐ナト有之。不食スルハ。蛻
蟲動スルト合点メ。芒硝大黃ニ心ヲ付ヘ。惣メ熱病ス。蛻
食セタルガヨキ也。醋キ味ニテ蟲シズマル者也。此格能
考へ覺ユベシ。予此理ヲ知テ數人ヲ治スル妙ヲ得ダリ。

診舌知虛熱實熱之格

○傷寒舌焦黑而指ニテヒ子リ見ルニ堅硬ナルハ實熱也。
宜通利。香港ク乾ケモ。指ニテ捻リ見ルニ軟ナルハ虛熱也。

不宜通利

狂言妄語實熱虛煩熱之格

○傷寒五七日。或十四五日。或經三十日。狂言妄語。欲走之症。
舌黑硬而心下按而病人皺面ハ有痛。是實熱也。宜木一順氣
湯。或大承氣湯。桃仁承氣湯。或涼膈散。加知母石膏防風通聖
散之類也。

解表宣透之熱

○狂言妄語欲走。舌雖黑。柔ニ潤有テ。心下不痛ハ虛煩ノ熱
也。虛煩ノ熱卜云ハ。熱通利或ハ清熱ノ劑ニテ醒メレ氏。久
ク不眠。熱ノ輕ム時分ニ少寐入ラントスレ氏。胸中木力ホ
カト熱蒸スル故。狂言謬語。ノ欲走也。是ハ平人ノクタヒレ
タル時。寐トボケタル意也。故ニ子イランニトスル心ニテ熟

睡スレハ妄語發狂氏ニトクト止ム也。竹茹溫膽湯 清離滋坎湯 六味丸加知母黃柏為湯。煩渴甚則竹葉石膏湯。予此格ヲトクト考覈ヘテ施治ス必的中スル也。數人必死ノ症ヲ本復サセタリ。

極熱之格

○傷寒熱極リ眼不見舌焦黑揚手擲足不能言耳聾心下按而皺面ハ可通利也夫ニテ藥ヲ用ル者通利スル也。用六味丸加知母黃柏交用ルトハ決ノ用イヌ也。亡陽ノ症ト云ハ寒熱汗ニモレテ真陽ノ氣共ニ浮散メモル、故ニ命門ノ火衰ヘ俄ニ虛寒スル也。發汗ノ後通利ノ後ニトヽ有之也。○右同症有宜獨參湯參附湯十全大補湯加附子也。此格ハ

舌黒ト云ヘ比軟也。妄語譫言胸ヨリ聲音出テ何事モ胸ニセテツテ聲音臍下ヨリ不出也。必自汗シ風ヲ恐レドコヤラニ至極弱キ處見ユル也。此症實熱ハ漸去テ亡陽ノ症トナル急ニ溫補スレハ可治也。

不治之熱

○實熱内ニ滯リ通利ノ節モ違テ實熱ニ蒸レテ頭汗甚出脉虛數ニ成テ手足冷ルハ不治也。實熱少モ不退而元氣虛脱スレハ元氣ヲ補ントスレハ實熱内ニアリ。實熱ヲ退ントスレハ脉虛數ニ成テ元氣乏シ故ニ通利ノ劑二三貼用ル間無之也。故ニ不治也。如此症脉ニトコヤラ潤有テソコチカナアリ緩ナル様ナル症ト有之是ハ通利ノ劑前ニ

云如ク極熱ノ治ニテ得利ト一ト有之決メ不可温補也。
○惣メ補劑或獨參湯用之症食氣ソロノト出来ルニ從
テ人參ヲ減メ一貼ノ内ニ一分或一分五厘入テヨキ也必
竟獨參或ハ大補ノ劑ハカリニテ食ノ氣脾胃ニ無テハ生
命不續也食ヲ絶メ人參許用テ命ハ有マシキ也初心太ル
間ハ病後ノ調理ニ食次第二進出テモヤハリ補劑ヲ用テ
人參ヲ減セヌモノナリ。

清熱之格

予數人療治メ為格得妙也先傷寒ノ熱ヲ見ルハ脉ト腹脛
邊ノ動氣ノ進ト不進トヲ能見定テ知母石膏大黃芒硝ノ
類ヲ用土腹ノ動氣ウレ静ニ覺ル時ハ早和スル劑ヲ用テ

熱ノ過不及ヲ見ルト也譬ヘハ十人ノ熱ナラハ六分許靜
ニミユレハ寒涼通利ヲ止テ和スル劑ヲ用テ置ク其中ニ
又動氣モ進ミ熱モニダクツロギカヌルト見ユル時ハ又
前ノ應シタル清熱通利ノ劑一二貼モ用ヒ動氣靜ニナル
時又和スル劑ヘカリテ熱ノサメヨリタルカ未ダ醒ヌ
カト云ヲトクト見テ治ルト也一攻せメテハ退キ和シテ
置テ又一攻セメテハ又退テ和ス如是心得テ可治也是三
テハ必ス不誤也是清熱ノ格極秘也夫故前ニ和スル劑ヲ
出シテ置タリ實熱ヲ攻ル間ニ退テ和スル劑ニハ小柴胡
湯加知母芍藥茯苓角カルカヨキ也或ハ逍遙散ノ加減小柴
胡湯ノ加減常ニハ人參ヲ去テ用ニ惣メ去人參用之可也

弱キ症ニハ人參ヲ加ルト有ヘシ通利セント思テ六一順氣桃仁承氣大承氣ノ類或煩渴人症白虎湯或白虎解毒ナト二三貼モ用テ病人少シ草卧テ見ヘ或又熱少シ輕ク見ユル時右小柴胡湯ノ加減ニ歸テ和メミテ攻ルト不足スルト見ヘハ又攻テ動氣靜ナルヲミルト又退テ和スル劑タ用ニ此格ヲ不知レテハ病人メキノト草卧ル也。

斑疹漸退時之格附熟病兼斑疹初中後之格

○一男五月患熱十日前灸之而微感風步行而涉水以後頭痛甚如裂二三人而抱頭防風通聖散八九貼用之後斑疹一身二出雖然腰下不發斑疹出而二三日頭痛安三日之後斑不見以後狂言妄語欲走欲入水好冷水脉五動清熱之劑不

効心下按而覺痛故以涼膈散加知母石膏三貼無効大便不通以六一順氣湯或壽丘保元桃仁承氣湯用之六七貼未通心下痛同然又以承氣湯加桃仁二貼大便快利而氣正食進以後小承氣二三貼竹茹溫膽湯數貼用之異功散又用平復瘳三日之後不見八到圍或薄衣而感風也惄而熱病斑疹出三四五日之後足ニ到テ快發スルハ漸々ニ熱解スル也腰下快不發メ三四五日ノ中ニ收ルハ毒氣未盡メ熱ツヨク成テ或口甚渴スル者也是病人モ餘毒内ヲ攻テ大便結熱甚無性ニナル也心下ヲ按ニ無性ナル中ニモ按スヲイヤカル也或皺面ス是心下ニ熱毒アツナル也心下按テ痛アル間ハ通利ノ劑數貼トイヘ庄不苦大便利スルト心下ノ

痛モ知シ氣正ク成ル者也。大承氣湯加桃仁紅花能通スル
劑也。通利ノモ先大柴胡湯ナトニ代テ。ニ三貼モアシライ
テ用ル也。様子彌ヨキ時道遙散合溫膽湯加黃連或竹茹温
膽湯用ル熱彌去小便モ快清利シテ無力ハ異功散益氣湯
七味白朮散加陳皮彌進日日ニ食増ハ人參地黃モ不入之
食ニテ肥立モノ也蟲積ナト持病ニ有ル症ハ不換金正氣
散加香附子茯苓或其外淨府湯青皮乾薑黃連ノ類ニテ食
ヲ進メ肥立ル也。

○壯婦去秋產レ氣血未全内ニ患熱病夏ノ間也。六七日ノ
間寒熱輕キ瘧ノ如レ一醫用藥症同然予柴苓湯加黃連ニ
貼用之明日食少多熱少輕午後俄ニ如咬逆左邊ヨリ冲上

リ左ヘ搖頭ヒタモノギクノト云テ不止脉數脅ノ左邊
動氣強クギクノト云ト脅ヨリ出予考之熱毒冲上也。咬
逆ニ小柴胡湯ヲ用ルモ熱ノ左ヨリ冲上ルヲ押ル心得也。
是モ夫ニ同ニ然レバヒタモノギチノト云テ息ヲ引ツ
メル様ナル故ニ病家殊ノ外驚キ予ニ死生ノ决ヲ問予謂
ニ嘔曰時疫ノ熱ヲ見ルニ斑疹ヲ薰ルノ症多シ是モ其類
也斑疹ノ熱毒冲上ノ發せントスレバ表氣閉塞ソ不散故
ニ咽喉ヘ熱氣冲上ル也此咬逆胸中左邊ヨリ出虛極人咳
逆ハ脣下ヨリ出虛症ニテ無之熱少退疹發ル時可止ト云
テ小柴胡湯加青皮山梔子黃連或不換金正氣散ニ三味淋
藥ヲ合メ用之或三和散加柴胡黃芩山梔子予カ意ハ肝經

ト云カ如シ。予此以後十二三ノ子疹後如此症。二三人治之。熱病ノ後度々有之。壽世保元疹門ニ云。疹出テ後小便閉。譴言導赤散其方。生地黃木通甘草竹葉七片水煎用之。此方妙也。用之其間ニ六味丸料加木通山梔子。淋出用之。小水快利而彌熱去。血熱之時ニ四物湯ニ加黃芩紅花用ルハ間ノ和劑也。清離滋坎湯。黃連解毒湯ナト。二三貼モ用之。又四物湯加減。又用之熱ノ格ヲ見合テ退クル也。予熱病小水澁痛甚キヲ考ルニ。熱毒ノ氣。小便ヨリ通ル也。小便殊ノ外アツキト云也。此症ヲ見ルニ。清熱通利ノ劑ヲ用テ。熱少シサメヨリタル時ニ。小便澁痛スル也。故ニ疹門療治ヲ考出シテヨリ以後。決メ利ヲ得タル也。熱後自汗。或勞役傷寒後。脉弱虛

人熱ヲ流通シ。胸膈ニ集ル物ハ輕キ。振藥ニテ順スル意也。如此アシライ。二三時ノ中ニギチ止。又一時許静カニ又發ス。次第ニ輕タ成。表熱次第ニ強ク成テ。咳逆ギチ止ム時ニ斑疹腰上甚出テ。足ニハ處ニ出テ。使ク不發。斑疹熱強。咬逆止。脉數。血熱ナルヲ知テ。四物湯合^{桂附}黃連解毒湯用。或四物湯加黃芩紅花。或清離滋坎湯用之。彌安。予病家ニ云ハ。斑疹若シ收ル時ハ。又熱強ク成ヘシ。其以後小便澁ルアル者也。勿驚ト云。五六日後。斑退煩熱口甚渴。壽世保元疹門白虎解毒湯一貼用之。渴止動氣靜也。以後四物湯加黃芩紅花黃連山梔子之類。清離滋坎湯交用之。熱漸輕シ。以後小便澁。晝夜十度。小便所へ行テ。澁痛難堪。俗ニセウカチト

寒メ小便不通ハ格別也。八味丸加車前子或金匱腎氣丸加木通煎服。斑疹後小便澀痛熱彌退食漸進頭汗無力以益氣湯加知母黃柏五六貼不効清離滋坎湯能應之兩足ニ斑疹多出甚痒シ今食進滋補ヲ得テ氣下行メ出残リタル斑疹腰下ニ出タル也。食彌進ム加味逍遙散加陳皮香附子數貼調理メ本復ス。何レノ傷寒四時ノ熱毒モ此格ニノ自由ニナル者也。大槩熱ノ内ニ斑疹出ル症多シ故ニ壽世保元麻疹門ノ治ヲ見合テ可治惣メ疹ハ熱毒ノ氣也。故ニ熱病ヲ治スルニ斑疹兼ルハ疹ノ療治ニ可心付也。傷寒六書ニ耳聾聾嘔嘔スルハ發斑可出ト云タ也。傷寒時疫熱毒ヲ治スルニ咶メ咽メ痛アリ或微腹痛或耳根腫ナトスルアリ是ハ

斑疹ノ類可出カト可心付也。咽痛ニ牛房子玄參ナト入ル方ノ心ハ毒ヲ消スル也。毒氣ト云ハ惡血熱ニツレテ咽胸ヲ攻ル也。發ハ斑疹トナル故ニ血分ニ熱ヲ蓄ル時ハ惡血不順メ皮膚ニ發シ或瘀血トモナル也。傷寒溫疫ヲ治スルニハ必毒氣ヲ消スル心得有リ也。痘疹ノ類惡血ナリ。毒氣ヲ消スル心得痘疹門ノ療治ニヨキト見ユ。本ノワザラナス惡血ハ何レモ同レ也。風疹出ルニ必惡心腹痛ヲ兼。或咽痛ニ風ボロシ外ニ出ル時ハ惡心腹痛ナク。收ル時ハ惡心腹痛アル者也。血風トモ云也是ハ輕キ症也。消風散消毒飲ノ類ニ加減メ用ユ。予是ニテ傷寒溫疫ノ熱毒心下ヲ攻ルヲ能令点シタリ。故ニ黃連解毒湯ト云ヲ出セリ。解毒

トナセ云トナレバ惡血ノ熱ヲ涼フスル也。常ニ傷寒六書。壽世保元萬病回春ノ傷寒門麻疹門發熱門参考メ可覺也。○庸醫云傷寒痢疾時疫ノ類年ニヨリ或ハ運氣ノ過不及ニ因山者也ト格ノ無キモノ、様ニ覺ル也愚ナル者ノ云ノ也。傷寒六書殺車槌三十七方ニ格少モ末代違フノハキ也。予傷寒六書ニ云ホドカヌ所ニ心ヲ付テ考ヘ置タリ。予數人ヲ治シテ不違也。

四時之熱

○寒毒藏于中春發溫病夏發熱病也。ヒブルイノ瘡ノ様也。瘡ハ手足冷時疫熱ハ手足熱而有惡寒如瘡間ハ熱一身一ハイニテサレ也此間ハ紫胡雙解散合升麻葛根湯或合

黃連解毒湯其外此格ニテアシロウ中ニ舌黒ミソロ出来耳聾大便結スル時通利スル也。不抱日數舌ト熱トノヤウスニテ可通利也心下按テ痛ト不痛トヲ可心得也。小柴胡湯ノ後ハ大柴胡湯心熱ハ安神益志湯。

○初心ナル間ハ初ノ内八日振ノ瘡ト思テ療治ウカノトスル故ニホニテ行當ル也。熱病人ハヤル時今或八日ブルイハ瘡ノ様ニテ口不渴手足不冷ハ心ヲ可付也。瘡ハ熱退汗出テ夜ヨキ程ニ寐入者也。熱ノ類ハ夜不眠也。瘡ノ頭痛ハサムケ止テ頭痛スル也。熱ノ類ノ頭痛ハ朝サメ少シスレ氏頭痛ハ晝夜無間也。

畜血之症

○傷寒六書卷二曰小腹滿者臍下滿是也若胸滿心下滿腹滿皆為邪氣而非物今小腹滿皆為有物而非氣小便利者則為畜血之形小便不利者乃是溺瀉之症滲利之劑宜分兩途經曰病人素有痞氣連在臍傍痛引小腹入陰經者名藏結也死

○熟結膀胱其人如狂小腹急結桃仁承氣湯

○六七日有表症脉沈微不結胸發狂小腹硬滿小便自利抵當湯

○便膿血夫衝脈為血之海即血室也男女均有此血均有此衝脈衝之得熱血必妄行在男子則為下血譫語在婦人則為寒熱微癥皆為熱入血室逼血下行則血熱而利也挾血之臨病宜精別焉

○熱結膀胱其人如狂而血自下者愈不愈用桂枝湯明理論抵當湯

○正血譫語胸脇滿如結胸夜則見鬼此為熱入血室小柴胡湯

○下後無表裏症脉數不解散消穀易飢多日不大便此為瘀血桃仁承氣湯抵當湯或小柴胡湯加桃仁大黃下焦畜血其人如狂小腹急結小便必利抵當湯

○壯男夏患熱初發如瘧。晡時寒熱。朝起床步行。時時泄瀉。十六七日之後。寒熱止。瀉未已。故近處步行矣。雖然舌乾以後發

熱頭痛。舌乾中通。少焦。黑牛筋有之。瀉晝夜三四行。脉弱而少。有巾。性靜二見。予壽世保元。紫胡雙解散。加知母。小柴

胡湯。合升麻葛根湯。加黃連不効。耳少聾。白虎湯二三貼。用

龍湯。或大承氣湯。或壽世保元。桃仁承氣湯。三四貼。脉弱

之。則脈頻弱。黃連解毒湯不効。瀉有之心。下按而有微痛。故黃

譴言不止。故更醫治。十二三日熱彌甚。其人如狂。晝夜譴言。舌

焦黑。無本性也。耳聾悶亂眼不見。卧床二十七八日。如此為必

死。又求治。予用清離滋坎湯。少安。其間大便一行色黑。予按心

下痛。舉未來。卜云。入氏瘀血也。脉五動餘。手足厥冷。無肌熱。無

人皆為必死。瘀血之症也。

○一男年五十。發熱不食。瀉十六七日。腹痛。一醫用藥無効。脉

五動有閼。問苦處。病人云。章門之邊。痛而到圊而不快。通如痢。

大便黑色。或如茶色。心下按而痛。是瘀血也。以桃仁承氣湯。頓

安食氣出。十貼餘而安。

自利

○自利發熱脉數按而無根咽二痰聲有元多不受補而心下柔ナルハ不治也。

○自利心下按而痛者大承氣湯六一順氣湯黃龍湯
○自利虛寒附子理中湯十全大補湯加附子或益氣湯加附子肉桂乾薑

○自利口渴蒼朮白虎湯或中暑門白虎湯

○五六七月ノ間因中暑自利發熱朝起午後倒床以後不能起床手心熱如勞非瘧似熱病非中熱之症是不可通利中暑門白虎湯或五苓散去肉桂加柴胡桔梗或香薷白扁豆黃連

喘急快痰傷寒

○傷寒喘急之治清火化痰湯回春解熱下痰湯六書加味導痰湯瓜蒌枳實湯加黃連黃柏或玄治方十二味陳皮半夏茯苓甘草桔梗前胡紫蘿子杏仁桑白皮黃芩枳實石膏生薑

○虛痰者滋陰降火湯或清離滋坎湯或清上補下丸為湯去玄胡索

○脉弱有巾而緩喘急腹弱臍中動氣靜其腹好溫煖好按者八味丸金匱腎氣丸或益氣湯加附子肉桂乾薑但是溫補喘急ハ不多雖然不甚咽ニ有痰聲諸症弱々見ル也有實熱則却加喘痰

嘔吐吐蛇論可參考

○傷寒嘔噦舌焦黑六一順氣湯大承氣湯桃仁承氣湯通利之劑前二見之可考此嘔ハ咽ニ潤ナクテ乾嘔スルナリ

○舌白黃嘔吐寒熱小柴胡湯加知母芍藥茯苓其外清熱ノ劑可也是熱逆上スル故ノ嘔也六一順氣湯又通利スル嘔ハ乾嘔大便結心下按而痛症ナリ是ハ熱逆上メ心下ニ攻上ル故嘔スル也咬逆ノ治同レ

○汗下之後津液枯竭舌乾而嘔スルハ竹葉石膏湯也黃連黃芩或山梔子

○熱嘔甚乾而不止四物湯合黃連解毒湯或滋陰降火湯加

乾嘔六味丸加知母黃柏淋出煎湯之間交用之

○嘔吐不食吐衄之症清熱之劑不受之吐藥之症吐衄之論二委シ可参考

發狂

○實熱舌焦黑大便結發狂通利之劑則防風通聖散可也○發狂不止大便黑溏ハ瘀血也瘀血ノ論可考

○發狂通利之後不止者虛煩也一寢イリ能ク子ルト止ム者也通利ノ劑ヲ用ヒ舌潤出ル様子少シヨク成テ發狂スルトアリ是ニ迷ヌ者也是前二云虛煩ノ療治ノ場也可考渴

○寒熱譫言口渴柴胡雙解散加知母石膏

○發熱譫言口渴白虎湯ノ場也中暑門白虎湯亦可也渴止

ニ從テ去石膏代滑石或黃連ナトニ代テ用ル也。白虎湯ヲ用ヒ。十分ノ熱五六分モ退ク時ニ石膏ヲ引テソロノトトサエス也。一度ニ石膏ニテ醒シキラシト思フハ惡シ。石膏ヲ去リ輕辛劑ヲアセライ用テ白虎湯ノ場殘ラハ。又一貼モ二貼モ用之。又退テ和スル劑用之。熱ノ過不及見合セテサニスヘシ。

○疹後煩渴壽世保元麻疹門白虎解毒湯有妙。

○汗下ノ後渴而脉弱七味白朮散加減其餘滋補ノ劑可也。

衄血

○半表半裏ノ時多シ壽世保元柴胡雙解散加知母。

○風邪衄血久不止六七日出茯苓補心湯用之頓止。

○衄血熱入血室涼血之劑可也。

○衄血アルノ症以後瘀血ノ症アル也犀角地黃湯小柴胡

湯合四物湯加黃連山梔子。

咳逆

○咳逆半表半裏ノ時多シ柴胡雙解散。

○夾熱咳逆ノ治癒熱ノ治前ニ見之可考。

○經汗下大便濁足跗浮腫脉虛微結不治也附子理中湯八

味丸加乾薑淋出兼用テ不應ハ不可治也溫補ノ場也汗下以後胃氣下陷虛極也益氣湯肉桂附子之類或十全大補湯。

加附子用之脉不知者不治也。

○脉數身熱而咳逆ハ熱胸中ハ冲上ル也。熱退則咳逆止也。不可驚也。

○吐逆或吐蟲而咳逆スル症有之是ハ吐虫蟲ノ論考テ可治之三淋或不換金正氣散加乾薑或陳皮香附子茯苓黑炒乾薑之類淋出或為煎湯小貼ニメ可也。

下膿血

○此症血熱瘀血ノ治療或通利ノ劑可也。熱去テ調理ノ時節アラハ痢疾ノ治可見合也。

勞復

○勞復ハ又風ヲ引ソエテ再ヒ煩ノ也。勞復也トテ書ニ有

ル様ニハナキ者也。

○勞復自汗ハ加味益氣湯可也。

○勞復無汗者初發ノ熱病ノ治療也。勞復也トテ恐レテ風熱ヲ補住スレハ又急ニ裏症ニ成テ死スル也。舌黒熱裏へ入便結スルハ可下前ノ治ノ格ニテスル也。虛ハ補ヒ熱ハ清シ裏熱ハ下ス也。不食諸症トモニ前ノシカケ可考。

○爭按スルニ惣而熱病ハ必ス一二度モ勞復スル者也。勞復せズ直ニ本復スルハ稀ナル者也。何如シトナレハ何方ニヤテ前ノ殘熱アル處ヘ風ヲ引ク也。殘熱スキト無之テ

ハ風ヲ引テモ常ノ感冒也。勞復トテモ不驚療治ナル者也

○勞復肌熱頭痛脉數或惡寒紫胡雙解散妙也。勞復ノ熱表

ヲ散シ内熱ヲ去ル心得第一也。發表ノ劑バカリハ不宜。兩感ノ療治ノ心得也。

○裏熱ニカヘワズノ發汗スレバ。汗出テ解せザル也。何程汗出テモ。不解者也。却テ元氣ツカレテ死スル也。一味配劑ノ心ニテ。意ラ述レハ勞復ノ熱ハ紫胡葛根羌活防風ノ類ニテ表ヲ解シ。黃芩黃連或ハ知母ノ類ニテ。脾腎ノ殘熱ヲ清アスル心得也。是即兩感ノ心得也。防風通聖散。六神通解散。牛房參連湯。ナド皆兩感ノ實熱ニ用ニ。是心得ヲ輕クレタモノ也。

○惣而今ノ熱類皆兩感也。此意不可忘也。表ヨリ次第くニ裏へ。非ス。予思フニ内ニモ熱有之外ニモ風熱有之

故ニ今時ノ熱病。汗シテモ熱不退ハ兩感ニヘ也。故ニ最初ヨリ内外ノ熱兼治ノ汗出レハ内外汎ニ熱退也。夫故小柴胡湯ニ知母芍藥茯苓ナト入ル方。或ハ防風通聖散ナト専一二用ルヲ也。

戰慄

○傷寒戰慄。自汗ノ寒戰ハ亡陽也。汎ニ連レテ元氣虛脱スル也。十全大補湯加附子妙也。或益氣湯加附子肉桂黑炒乾薑。

○初發寒熱戰慄是表邪也。

○熱微和メ後脉少弱。欲為小便戰慄。四君子湯加當歸附子。或參附湯。小便閉加車前子。或補中益氣湯加附子肉桂。或乾

○風毒腫ソユウミ有ル症寒熱如瘡汗出一日ニ二三四次

戰慄スルノ有リ。丁心付也。

夾痰傷寒

○傷寒六書夾痰傷寒可見合又喘痰之論可参考。

○痰喘時時譴言舌乾或少黑ハ亥治十二味方有妙ニ陳湯加桔梗前胡黃芩紫蘿子杏仁桑白皮石膏枳實生薑

熱入血室

○熱入血室男子衄血婦人經水來何レモ涼血熱之意肝要也男子熱入血室而不退則為瘀血症多畜血之部可参考。

承氣

○傷寒ノ蟲ヲ薰タル症ト思ヘシ以蚊蟲之意可治腹ニ蟲有ニハ萬病回春牙齒之部定痛散ナト有妙傷寒ニ不限下部ニ有蟲工有妙小兒疳蟲ノ心得也虛者附子理中湯可ナリ

○十六歳ノ男吐衄ノ後脉虛微腹虛脹脣凸手足面甚腫予人參三分附子肉桂乾薑各六分甘草少許煎用四十貼許ニシテ愈。

不治傷寒

○臂常ニ可曉者ハ不治ノ傷寒也予見テ考之。

○傷寒譴言無性ニテ多笑常ノ物語ノ様ニ覺ヘテ不知所苦者有之痘疹ノ初發ニモ有之其外傷寒ニ如是大便溏脈

弱補之則實熱虛中ニ見ヘ瀉スルニハ心下弱脉無力進者

不治也心ニ熱ヲ甚夕受シ也

○下瘀血ノ後脉數煩燥無性ナルハ不治也何如トナレハ火氣有テ不能補陽故也補陰ノ症ナレハ脉弱故火氣盛ニメ元氣既ニ虛シタル故也是邪火有テ陽藥用ヒ難シ元陽衰故陰藥モ亦用ヒ難シ下血ノ後補テ靜ナルハ可也可治

○一男十日寒熱如瘡熱往来則心下ニ冲上ソ為嘔或乳邊為痛脉數淨府湯合平胃散數貼而愈三三貼ニメ冲上使ク胡黃連ヲ薑炒黃連ニ代テ用ニ是ハ予力工夫ニテ常如是

脾胃ニサワラヌト覺ヘタリ

汗下過多内亡津液或病後水虧火炎口燥滋陰養榮湯當

歸入參熟地黃麥門冬芍藥知母黃柏五味子甘草

○勞復而感風寒暑溼也心氣ヲ勞シタル者ニ多シ心脾ノ二藏虛メ患傷寒也予考ルニ肝腎虛スルニ因ル者不多也心ト脾トヲ勞スル者多シ氣虛甚而元陽虛散メ裏熱甚也二三日肌熱強汗甚或無汗症モ有リ二三日ノ後早舌白胎甚乾無肌熱也早々裏ヘ入ト見ヘタリ内外既ニ感シタル也兩感ノ症ニテ多ハ鴻アル也

○數日ノ後諸症既ニ減シ脉八巾有テドコヤラニ緩和ナル意有テ脉ノ去來ニムツクリトシタル所アルハ非死症也病人ノ頭枕ニヒツタリト押付タル様ニ付テ頸モ既ニ床ニ付ヤウナル者ハ元陽ノ大虛也

○初發脉先弱而進イカニメモ脉按テ無力何トヤラ無心元脉見ルハ虚也。○脉緩ヲ帶ブカ又ハ有巾或脉按而ツヤ有ル脉ハ不可謂不治也。

○心脾ノ元陽虛シタル故ニ脉虛ニメ進如勞咳ノ脉也欲補陽則裏熱甚逆上而譫言如狂フツト起キ如有所見多クハ痰ヲ兼ル者也補陰或寒涼ヲ用ニトスレハ瀉有之脉弱イカニメモ寒涼モ難用テ束手タル様也時ニ又咳逆或ハ喘咳アリ

○三四日ノ内ニ早腰立カヌル也俄ニカヌケタル様ニ外ノ傷寒ヨリハ早ク草卧ル也此元氣ノ傷ル下地也。

○三四日ノ中ニ早兩手フルイ無性ニ成テ循衣摸床ナリ後ニハ撮空也手ヲ振テ手ヲアツカウ病人ハ撮空ノ下地ト知ヘシ。

○初發ニ眼睛ヲミルガ第一ノ秘也先補藥ノ眼睛獨參湯ノ眼色見ユル者也小便ニ行テノ歸リカ或身ヲ動シタル以後ノ眼中瞳子如不轉ウツカリトメイカニメモキロリト弱ク眼ノ色ミユル也是ハ直視ノ下地十可知也此顏色眼中ハ人參大劑不應ハ不治也然ルニ人參ヲ用レハ熱ニサワリテ逆上ス逆上甚シケレハ彌譫言甚而兩手ヒタモノアツカイテ不靜故ニ人參モ不應也眼中ノ色瞳子不轉貌ヲ譬テ云ハ魚鳥ノ死タル目ノ中ヲミル如クナル色

時時見ル也。

○譫言ノ様子。子トボケタル語ノ様也。先ニ云「ハ實ニテ。アトニ云「ハ、堵モ無キ」也。呼吸ドゴヤラセワシ、是鄭聲ノ下地ナリ。

○初發ヨリ聲音不出モアリ。聲音ヒキ、モアリ。音聲カレタルニテモ無ク。ウワ聲ニテ。真ノ根ノ有ル聲出ヌ也。

○舌白胎ニテ。サノミ不乾ニ。早舌ヘワリカ子。舌モツレスルハ。舌本スクム故也。是舌拳囊縮ノ下地也。

○譫言甚タ無性ナルニ因テ。小便ヲ忘ル、ハ是遺尿ノ前ナリ。

○

○初發度ニ大汗出テ後無性ニ成。譫言撮空。脉虛微數ニメ

疾有之人參ヲ用ル時ハ。譫言増テアラクナルハ。猶以テ不治ナリ。

○初發ヨリ瀉メ。六七日ノ後瀉止。大便閉結スルアリ。脉虛數按而無根者瀉スルモ。結スルモ同ニ。虛症ナリ。

○初中後。大便閉結スルモアリ。是亦脉弱キ故。元陽不下行。腹無力シテ不通也。是以大虛也。大黃芒硝ノ類ニテ。何程セメテモ不通者也。數貼用テ通ル時ハ。彌元氣虛スル也。

○食ハ病體ヨリ能ク食スル者多シ。大便瀉ノ時ニ食消化スルモアル也。

○是格。哮喘ナト有ハ。必不受補者也。初發三四日ノ中ニ。

中ニ實邪ヲ含タルカ多ハ不治也。虛中ノ虛邪ハ。補陽スレ

ハ汗ニツレテ散スル也。此症ヲ正ツ補スレハ邪自除ノト
云々也。虛中ノ實邪ハ似タル様ナツナレ。大虛ノ腹ノ中
ニ炭火ノ有ル様ナ者也。人參附子。或ハ肉桂ナトヲ用レハ
却テ熱逆上メ病人アラクナル也。故ニ人參モ不應也。虛中
ノ虛邪ハ肌熱甚シト云ヘ。實ハ裏ニ虛冷アル故ニ温補
スレハ熱自去也。此兩症ヲトクト不知メハ不能決死生也。
予多見之不治ノ症ヲ指ズニ。十ガ八九ハ如言以此格知之
也。故為極秘也。如此症ハ皆心脾虛極而後受邪氣故ニ死症
也。仲景ノ所謂藏結ハ不治ト云ハ此類カト思フ也。何程虛
極メモ温補ヲ受ル症ハ决メ可治也。受補症ト不受症トヲ
辨ジテ可治也。

○傷寒難治ノ後遺尿。譫言。眼睛弱。脉進無力帶細。動氣脣ノ
左邊ニ擊シ脉ヨリ動氣カサ有テ。手ヲ彈ク様ナルハ。其日
其夜ニ死ス。是虛中ニ實邪殘テ攻ル也。動氣手ヲ彈ク者獨
參湯。參附湯ヲ不受者也。脉ト動氣トツリ合タル者ハ參附
ヲ得テ元氣復スルヲ有之。是ヲ為格。喘咳甚シキモ亦不受
補也。

拟前症可治之症

○一男年六十三。十一月患勞役傷寒。四五日之後招予往而診。
脉洪數。大按而如無力。或如實大數。前醫兩醫對談。一醫始
用九味羌活湯同然。昨朝ヨリ一醫用小柴胡湯。以舌有白胎
也。以後大便溏自利。不時譫言。予以為勞役傷寒也。初發以溫

利可取汗ノ症也。然ルヲ熱甚ヲ以早用黃芩熟地黃之類故
=寒氣中ニアルニ依テ瀉スル也。如何ナレハ脉實大ト云
二、大ハ虛脉也。按而如無力。自利スルハ中寒也。浮實大ノ如
キ脉ハ表邪不除也。故ニ先用白朮附子乾薑桂苓甘草之五
味七貼而瀉止。此時人參ト思ヘバ平素人參不應症也。故代
沙參也。瀉止テ後。熱彌增。口渴脉有力。用紫胡黃芩葛根羌活
防風紫蘇陳皮茯苓甘艸之類。和解而取汗。汗出漸々退後
八解散異功散。以沙參代人參。以後持病頭眩怔忡胸支正氣
天香湯。合二陳湯平胃散用之。間々用安神散而全安。

○風毒類傷寒撮空循衣譖言ニ似タルアリ。身ノ中痛アル
ヲ必可知。舌色常也。外科治法可考。

舌帶黑色

○主靜齋勞役熱病瀉五六行。人參一錢獨煎異功散。麥門冬
五味子人參三分用之。氣力漸良。其中ニ舌黑色不堅硬。古ノ
劑用テ黑色加之。其中獨參湯ヲ得テ。氣力ハタシカニ成テ。
ドコヤラ胸滿テ藥ニ飽タル色アリ。予以為此舌ノ黑色。客
熱殘ル故カ。不食胸中鬱滯ノ熱蒸ス故カ。不分明故先胸中
胃口ヲ和メ。黑色去不可不知。不換金正氣散去半夏加檳榔
子香附子茯苓。淋出用之。翌日黑色去。胸中和メ食進此舌ノ
黑色實熱ノ黑色ナハ違タル慶アリ。可心付也。實熱トメハ
大ニ誤ル也。實熱ハ舌黑乾燥唇乾齒モ又黑色有テ。乾燥ス。
今此黑色ハ舌ノ出ヤウモ能出元柔ナル舌ニテ。中サケ

フスブリタル様ナル黒色也。痰火アル者、或虚冷ノ舌ニモ
黒キアリ。小兒黒舌理中湯ニテヨキアリ。實熱ハ乾
燥甚ノ、口モ臭ク、舌強リ卷如クニ曲ル也。

○熱病吐而不納藥譫言甚

○熱病熱甚吐而譫言或汙多三靈紫胡葛根山梔子茯苓右

用之數人得効。茯苓一作黃芩

○女人年十五吐而譫言甚。如有所見。予柴胡葛根山梔子茯
苓犀角檳榔子紅花右用之熱去後去犀角數貼熱退後三靈
紫芩湯調和メ全愈

○風熱脉緩帶濕或汙或面耳腫宜此劑以脉緩用乾薑肉桂
芍藥甘草芩苓唐蒼水

○熱病舌焦譫言撮空循衣摸床無性胸膈有熱湯水不入脉
虛膈間有火元氣虛者起死回生之劑也。四物湯加黃芩人參
白朮陳皮麥門冬知母附子為大劑萬病回春發熱門ニアリ。
元ト明醫雜著ノ方也。

○熱病無汗十神湯清解湯頭痛甚口舌乾譫言者防風通

聖散微和譫語安神益志湯溫膽湯加黃連熱去異功散

○十神湯清解湯ト用テ大便結耳聾者或大便濁スルニ心
下按而痛不好按者大柴胡湯後安神益志湯傷寒附錄

○傷寒ハ仲景全書傷寒六書壽世保元萬病回春等傷寒

門ヲ能見合セテ可施治也先ツ手近ク有功治方ハ是再燃

○表邪寒熱無汗ハ升麻發表湯十神湯ヲ以テ表邪ヲ散シ
汗ヲ出シテ好シ九味羌活湯ヲ用ルモノアリ傷寒初ヨリ
有汗ハ加減冲和湯或小柴胡湯加黃芪肉桂芍藥產後傷寒
ニハ麻黃石膏达硝用ヒ難シ

○汗出テ不解者舌白胎耳少シ鳴時ニ譫言アリ或ハ譫言
ナキモアリ是ヲ半表半裏ト云テ半ハ表ニアリ半ハ裏ニア
山也壽世保元ノ清解湯ヨシ或小柴胡湯加知母芍藥茯
苓或小柴胡湯合六味丸料用ルモノアリ知母黃柏ヲ加ル
モアリ熱入心ニハ安神益志湯舌焦譫語スルニヨキ神方
也如經用ル中ニソロノト耳聾舌焦心下拒按皺面スル
ハ大柴胡湯ノ場也甚シキハ三日承氣湯ヨシ然レヒ大柴

胡湯ヲ用テヨシ大便泄瀉スルモノ心下拒按モ用ル也ニ三
貼五七貼モ十貼モ用ルモノアリ氣力トユヤラ能クナリ食
モ少シ増シ様子能ク見ヘハ連々小貼ニメ用テヨシ大柴
胡湯ヲ用テ實熱アラマシ退キ心ニ成テノ上ハ餘熱ト云
也メコハ安神益志湯竹茹溫膽湯ヨキ也小柴胡湯合六味
丸料煎服スルモノアリ或安神益志湯合六味丸料用ルモノ
アリ熱輕ニ從ヒ知母黃連ヲ減シ或ハ去リ後ニハ生地黃
ヲ熟地黃ニ代ル也熟悉ク去テ後ハ八物湯五味異功散ニ
加減シ或ハ益氣湯ナトニ加減メ調理スルモノ食サヘ進出
ハヨキ也食ノ進ニ從テ人參ヲ減スルモノ
○汗下ノ後熱不解有痰火ニ六味丸加知母黃柏煎服スト

回春ノ傷寒門ニアリ此意ヨシ或滋陰降火湯清離滋坎湯有神効

汗下ノ後咽渴ズルト甚シ回春暑門人參白虎湯ヨシ竹葉石膏湯ヲ用ルトモアリ渴十ガ六止ム時石膏ヲ去テヨシ石膏ヲ去テ用ル申ニ又渴多ナル時ハ又加テ少シ用ユ渴止時ハ石膏ヲ去ル用石膏意ハ予カ醫談ニ云不可失金中之温ト云意ニテ用ル也近ク云時ハ湯ハ釜ノ湯沸クハ熱也シツカリト温力ナル加減ハ人ノ常ノ胃陽也其ワク時水ヲ一柄杓二柄杓サシテウメル時ハ沸ク熱止ム也ソユテ猶水ヲサセハ常ノ温ニ當テ湯氣減メ疲ル也夫ニモカニワズ水ヲサセハ湯が變メ水ニナレハ死スル也故

ニ此意テ得心シテ沸ク處ノ湯ヲ水ニテウメ過又様ニ心得テヨキ加減ニスル意也是カ石膏ヲ用ル傳也

○瘀血アル者惣而衄血ノ症ハ先血熱アルト可知後大便ノ色ヲ改ムルニ地黃丸ヲキタル様ナル黑色交ルハ後必瘀血來ル也少シヅ、黒キ大便ミヘ熱強キハ大柴胡湯加桃仁肉桂用ルトアリ枳殼ヲ加ルトモアリ瘀血多來リ熟強キハ逍遙散加黃芩黃連山梔子人參二三分入レ用ルトアリ熱輕ク元氣疲ルニハ八物湯加山梔子人參二三分入レテヨシ瘀血大ニ來リ一二三升モ下リ口噤絶入時脉緩弱或虛ニメ進ミ或如有如無ニハ獨參湯四君子湯ニ當歸川芎黑炒乾薑加テヨシ八物湯モヨシ氣正ク成テ

熱アラハ黄連竹茹ヲ入レテ用ル也。血崩下シ後脉進ミ如狂人ハ不治ノ者アリ。黃連解毒湯ノ加減也。

○傷寒初發如狂人欲走二三人抱ハ留ル様ナルトアリ。是ハ防風通聖散必スヨシ。

○如疹子モノ出ルトアリ。發斑ハハツカシ、傷寒六書ノ論可参考。如疹モノ出ルハ生地四物湯・合升麻葛根湯・或ハ合山柴胡湯此治法ハ壽世保元・麻疹ノ治方ヲヨク可参考也。疹子ノ如キ物出テ大熱ニ白虎解毒湯ヲ用タルトモアリ。是モ前ニ云釜中ノ湯ニ水ヲササシテヨキ加減ニスル意也。必ス水ニテサマシ過スベカラズ。

不善ノ傷寒アリ。名焦黑硬心下拒按不語ニハ三日承氣

○舌焦レ舌廻リカヌルニハ安神益志湯ヨキトアリ。

○有熱茫然トソ不語スルニ瀉心導赤飲ヨキトアリ。

○傷寒漸去舌ノ出入モヨク不黒硬左へ差込テ病人多

ノリ返リノリ出時ニ聲ヲ立テ不語シ欲言不能言コト間ニアリ。是ハ小兒ノ時驚風ナト煩ヒ或瘡症ナト持病ニ有ル症如此トアリ。熱病ノ熱ハ去テ心經ヲ痰ガ塞ク故トミヘタリ。予沈香天麻湯ニ石菖蒲根ヲ加テ十二日用ヒ能ク言出タルトアリ。脉靜ニソ熱ハ不見故是ヲ用タ也。熱有ル

ハ清心導痰湯或回春痰飲門ノ加減溫膽湯ヨシ是亦不

可不知

心下虛實ヲ知ル。傷寒論ノ大柴胡湯ノ論ニ、心下痞硬、二ノ者、一ハ大柴胡湯、一ハ桂枝人参湯ヲ用テアリ。一ハ補一ハ瀉。天地懸隔也。ト張兼善ノ語アリ。子以為心下拒按者實也。大柴胡湯、心下空虚好按者虛也。桂枝人参湯也。以此定心下之虛實也。有病無瀉一ハ不瀉也。

○傷寒汗下ノ後、熱速くニ去り、虛寒スルアリ。是ハ此溫補ノ場也。十全大補湯或附子理中湯、四君子湯加附子肉桂黑砂乾薑八味丸煎湯、參附湯、參附酒、生薑多入レ參薑湯トメ用セ也。補中益氣湯加附子肉桂モヨシ。或ハ瘀血崩下ノ、虛寒スルアリ。寒極云、血崩細火亦俱ニ七十有テ。血崩

虚人傷寒初發、五味湯有汗者、金建中湯。

○傷寒舌焦乾硬、不能出于唇外、ニハ、以七味柴葛此處ニ至テ脉ニツヤ有テ緩ナル狀有ニハ、三乙承氣湯、其間ニ六味丸煎、今知母來附、冬交用之有神、以心乍拒按為實也。有汗脉虛數提空循衣摸床遺尿ス。ハ必死也。是獨參湯ノ症ナレ。此場ニ至テ獨參湯ト、キタルハ、十ノ一也。

○傷寒汗下後、日ニ疲、舌乾焦、心下弱、脉虛弱、不能出舌、獨參ニハ、味丸煎、交用テ用テ有神、八味丸煎加入參二三分用之、ラ得タルモノアリ。

下ノ後、恶心嘔吐、或吐食スル、蛇蟲ノ動也。三靈與之

有妙或安蛇理中湯或八陳皮香附子茯苓黑炒乾薑甘草ノヨキノモアリ。熱餘程アルニ。理中湯加柴胡葛根山梔子用テヨキノモアリ。

○此治法先傷寒之大格也。百發百中ノ劑也。外症アルハ。前二云傷寒論。傷寒六書。壽世保元。醫學入門。萬病回春等ノ傷寒門。發熱門。斑疹門。麻疹門。可參考。

色脉

○頭髮赤黃。血氣俱熱也。本草綱目。睛珍語。

提耳談卷之一

