

提耳談

二

提耳談卷之二

中寒

中寒輕者五積散甚而虛者附子理中湯

虛寒無陽胃弱嘔吐

沈附湯

赤水玄珠

附子

乾薑

炮各半兩

沈香

白朮

各一錢半

甘艸

生薑

五片

薑附湯

乾薑

五錢

熟附子

三錢

大陽病發汗漏出不止其人惡風小便難四支微急難屈伸者桂枝加附子湯下焦寒八味丸

赤水玄珠東垣曰夫脾胃之症始則熱中終傳寒中經曰陰

盛生内寒厥氣上逆寒氣積於胸中是腎水反來侮土此所謂
所勝者妄行或作中滿腹脹或作涎涕或足下痛不能任身履
地骨乏無力喜睡兩丸多冷時作陰陰而痛或妄見鬼形夜夢
亡人腰脊背脾俱痛而不渴不瀉是溫氣去而寒獨存血絡凝
泣故其脉盛大以瀉名曰寒中以此方治之

白朮附子湯

白朮 附子 炮陳皮 蒼朮 炒厚朴 半夏

茯苓

澤瀉 各一兩 猪苓 半兩 桂心 四錢 生薑

○中寒ノ症ハ冬月内外凡二寒ニアテラレテ内外凡二寒
ス也輕キハ五積散重キハ附子理中湯甚則參附湯

○夏モ内外寒ルハ中寒也食傷ニテ内外寒タルモ中寒也

附子理中湯主藥ナリ

○乾薑肉桂宿砂主藥也甚則附子胃中冷加丁子冷蟲ニ加
テ良脾胃弱キハ乾薑肉桂宿砂ヲ大ニメヨキ也手足冷ニ
ハ加附子

○大溫ヲ用テ手足不溫心下按而痛不好按ハ實也枳實厚
朴檳榔子大黃甘草ヲ以テ下スト内開ケテ手足温ルモ有
リ惡心ムカクスルハ食滯此劑ヨシ或蛇厥ト云テ蟲ヲ
吐ニ手足冷ルアリ理中湯ヨシ理中湯不受ハ三靈或ハ乾
薑良薑二味煎用

中暑

○五心煩熱如勞朝肌熱退日晡熱來不退腹甚熱似瘧無寒
戰無咳嗽不食或小便少或遠是中暑也春末夏初秋間有之

散
湯
主藥
腹脹
胸膈
胃弱
脚酸

誤之為瘡為熱病為諸虛以四苓散加柴胡桔梗有熱加扁豆香薷黃連而有妙

○惡風不時發熱或汗出用藿香正氣散或二香散不効者宜清暑益氣湯

○暑月不食惡食臭者暑氣也清暑益氣湯加白豆蔻

○發熱往來虛人感暑濕因暑為患者神劑也或熱病補瀉之間和而可也

○春末夏初手心熱或氣脹々小便赤澀有汗惡風ノ類有効

清暑益氣湯香薷散黃連香薷散

○夏秋ノ間熱病ヲ見ルニ暑門見合セテ可療治

○中暑發熱口渴譫言ハ萬病回春中暑門人參白虎湯可也

渴止熱微和則去石膏代黃連或代滑石用

○暑熱モ熱病モ治法同シ暑ノ中ノ熱ハ汗多出ル故ニ人

參ヲ使フ症多シ暑ハ元氣ヲ傷ル故也汗多ハ黃耆建中湯

補中益氣湯ニ黃芩黃連知母黃栢ノ類ノ寒涼ノ藥ヲ撰ミ

加ヘル也

○暑月汗多或寒涼ノ陰處ニ納涼ノ内外虛寒スル有リ或

内涼シテ外熱スルアリ皆虛症暑門治法可考

○暑ノ間ハ濕ト熱ト有ル故ニ濕熱ニ感ス中濕門ノ論可

考滲濕湯ニ加黃栢黃芩一モアリ

○暑ニ中テ水瀉ハ五苓散胃苓湯熱瀉ハ壽世保元泄瀉門

泄瀉方ヨシ或柴苓湯虛冷ノ瀉ハ不換金正氣散加香附子

宿砂乾薑或理中湯手足冷加附子不甚而冷瀉者胃風湯有

汗而瀉スルハ黃耆建中湯加人參香薷

○中喝ハ熱傷膀胱經也其症身熱頭洒然毛聳微寒口開前

板齒舌氏二燥生胎大煩渴者人參白虎湯加香薷白扁豆身

重疼痛ハ宜人參敗毒散加香薷黃連

○人參白虎湯 治夏月中喝即中熱舌燥生胎刺

人參五分 甘草三分 白朮 陳皮 各七 石膏 知母 各一

扁豆 八个 茯苓 芍藥 香薷 山梔子 麥門冬 去心 各

右劉一劑蓮肉十箇烏梅一箇水煎服熱極小便遺尿不止加

炒黃柏煩燥加辰砂酸棗仁若腹痛嘔噦吐瀉飽悶切不可用

中濕

○中濕身痛或腫腰痛痿臂手足麻痺一切因濕者是也因症

加減溲濕湯ヲ主方トスヘシ

○中濕泄瀉腰痛足浮腫五苓散加羌活防風升麻以升提之

最妙方也 赤水玄珠

○潔古曰起卧不能謂之濕身重是也此方主之參朮湯

秘藏治脾胃虛弱元氣不足四肢沉重食後昏悶 黃柏酒浸

當歸 各二 柴胡 升麻 各三 人參 陳皮 青皮 各五 神麴 七

甘草 炙 蒼朮 各一 錢 黃耆 二 錢 右咬咀都作一服水二大盞煎至

一盞食遠服

○女子年十三脉遲無力右手動搖足亦搖皆風或跨倒仆痿

症之類也。右手モヂクニテ左手遊スル様也。幼女無中風之症。是因濕發也。滲濕湯數貼而安。以後五積散去麻黃加羌活而愈。

○男子夏月腹中不調。一日二三行頭痛氣重蒙々スル者。有濕也。蒼朮 乾薑 半夏 茯苓 澤瀉 甘州二貼而頭痛頓止。惣而感風濕者。唐蒼朮可也。

○治冷濕 唐蒼朮 乾薑 當歸 茯苓 肉桂 甘草 生薑 水煎服

○男子面耳浮腫脉緩風熱也。一醫用消毒不効。肉桂 芍

藥 甘草 茯苓 唐蒼朮 乾薑水煎用テ安。昔是也。因

○中濕脉緩多為冷濕。治之必効。濟世金書。滲濕湯 人參

乾薑 芍藥 各一錢 白朮 三錢 茯苓 桂枝 甘草 各五

生薑大棗煎服

○萬病回春。中濕論ヨシ。一身麻木。或痺テ如中風アリ。中風ハ左右ヲ分ツ。中濕ノ麻痺不仁。或スクムハ。左右ヲ不分也。或兩手。或腰下。或一身。凡ニ麻木スル也。回春。滲濕湯ノ末ノ加減可參考。

○冷濕ハ。溫補。或溫藥ヨシ。乾薑肉桂宿砂木香。或ハ良薑。子ノ類也。附子ハ手足冷ルニ用。

○五六月ノ間。冷濕ニ感シ。脉遲緩。五積散去麻黃加羌活唐蒼朮。有嘔ハ和蒼朮可也。

感冒

頭痛
風散
風熱上攻頭
目痛項痛

辨症論

卷二

○敗毒散加紫蘓蒼朮木香防風陳皮葛根八鮮散去人參加沙參紫蘇羌活防風

○主劑陳皮半夏茯苓甘草羌活防風紫蘇桔梗前胡香附子或有咳者加紫蘇子杏仁

○婦人風後手心微熱二陳湯加柴胡葛根香附子桔梗而安

○風邪二陳湯加紫蘓桔梗枳殼前胡為劑因症加減而可也

○風斑疹身痒或手足頑麻或瘀血頭痛或散血中之風濕涼皮膚和拘攣或治疥癬消風散常人參代沙參可也有熱加柴

胡葛根或黃芩或斑疹出沒腹痛加牛房子紅花夫斑疹出沒

在外則痒沒則腹痛惡心是惡血之毒氣為痛也大力子能消

血中之毒氣回春痘門腹痛辨二云大力子能逐胃中之瘀血

以是可知咽痛腫塞者非大力子不能通達也射干次之

○寒熱身解你頭痛十神湯可也發汗二八此劑可也

○風邪二三日不散肌熱少有儿二瘡門人柴胡歸湯可也

是邪入血中也風疹亦可也常二去人參虛人加之常人去人

參白朮加羌活蒼朮

○萬珠湯 諸症二可也即敗毒散二去川芎合平胃散也感

冒加紫蘓倍羌活桔梗陳皮有熱倍柴胡加葛根或黃芩痢疾

倍枳殼加黃芩或黃連瘧疾倍柴胡加半夏黃芩青皮小兒諸

症諸治無効者用之加減有効何レモ初發二可用也諸鬱

諸痛之類數方不効者久服有妙予力醫按劑也一方萬珠

意アリ痛風脚氣風寒暑濕疝氣鬱氣風痰或積聚腹痛諸

症水痘痘疹

○男子年十二季春肌熱瀉二三行其時痘流行久痘序二ハ熱輕ク脉六動有巾無力氣味アリ惡寒アリ予以白朮茯苓陳皮乾薑宿砂羌活甘草而熱去以是可知之瀉有テ脉有巾ハ元陽ノ虚アリ陽氣勞則浮散ス丹田シマラス故也ハツトスル味アリテ脉カサアリ是ニ用寒涼則實ニ虚ニ也

○勞役感風寒調榮養衛湯傷寒六書

○小建中湯傷寒論傷寒陽脉澁陰脉弦法當腹中急痛急痛

者先與小建中湯不瘥者與小柴胡湯主之小建中湯方

桂枝三兩

甘草三兩

大棗十二枚

芍藥六兩

生薑三兩

膠飴一斤

右六味以水七升煮取三升去滓內膠飴更上微火消烱溫服

一升日三服嘔家不可用建中湯以甜故也尺脉尚遲加黃耆末一錢

○虛冷者感風寒無汗升麻唐蒼朮乾薑肉桂羌

活當歸川芎甘草或加麻黃加紫蘊

○敗毒散加陳皮葛根紫蘇有咳加紫蘊子杏仁風熱輕則

不換金正氣散加柴胡桔梗紫蘊子杏仁枳殼無汗十神湯

○傷寒溫熱ニナルハ汗出テモ熱不退口苦ク四五日ヲ經

ル中ニ三四日ヨリ舌白クナル也白胎ト云熱餘程強クナ

ルハ中黃ミ舌ノ尖指ヲ置タル程乾キ強クソレヨリ日日

ニ舌乾燥ノ後ニハ黒ク成ル也

○舌雖黒フスブリタル様ニテ黒ク柔ナルハ痰火ニアリ

和湯之
治時氣
表主之
散病論
多シ升ル氣少キ故也。
○惣而熱アラハ舌ノ味モ問ヘシ。苦キハ外邪也。内傷或他
症ニテ有熱ハ口不苦。内傷ハ口淡シ。是ニテ内傷外感ヲ知
ル目當トスル也。

○汗多キ風ハ傷風也。加減冲和湯回春或逍遙散。加肉桂防
風黃耆葛根。有熱加黃芩。傷寒六書。疎邪實表湯モヨシ。無汗
ハ升麻發表湯六書ヨシ。仲景ノ麻黃湯桂枝湯冬ハ自然ニ
用ル。アリ。然レモ六書ノ方ヨシ。止汗ニハ黃耆建中湯。膠
飴ヲ入ル。モアリ。常ハ不入。モアリ。

瘟疫

○瘟疫ハ世俗一般ニ熱病流行ヲ云。痢疾流行ハ疫痢ト云。
熱病流行ハ其年運氣ヲ考テ金氣太過ノ年ハ何。木氣太過
ノ年ハ何ト書クニアレモ。ソレニハ難拘。必竟熱病也。年々
ニ依テ替ルハ其年々ニヨリ。血熱ノ症多キモアリ。或氣虛
ノ熱甚シキモアリ。或咽腫頭痛甚シキアリ。瘀血下ルモア
リ。傷寒六書ノ中ノ三十七方ノ條下ノ論ヲ可見覺。其方其
方ニ似タル症アリ。格別年々替ルニ非ス。
○瘟疫病傷寒ニ異ナルハ耳根腫咽面腫ル症一般ナル也。
溫熱ノ病流行ハ傷寒春夏ニ發ル也。
○傷寒六書ノ主方ノ意方ハ法也ト云ヲ以可見。論ヲヨク

辨証論

卷二

シテ方ハ六書ニ不可拘諸書可見合也。必竟寒熱虛實ノ四也。外ノ事ハナシ。咽腫ハ消毒ト云ニ心ヲ付テ。牛房苓連湯ノ意ヲ以テ可考。咽腫ル症ニハ。牛房子射干玄參山豆根ナト入ル劑ニ。黃芩黃連知母石膏黃柏ノ寒涼ノ藥味ノ中ヘ入タル劑可也。血熱ニハ。生地黃芍藥犀角主藥ト知ヘシ。○一般ニ面腫咽痛大熱頭痛防風通聖散決而可也。牛房苓連湯苓連消毒飲可也。

○溫熱病流行疹子ノ如キ物出。或下瘀血。或譫言舌白黃黑大便閉。或瀉下耳聾。或大便瀉下身冷。夏ニテモ中寒ノ症有リ。如此症流行スルモノ。六書三十七方ノ中ノ症也。是ヲ疫病トイヘ。氏實ハ冬寒氣藏ニカクレテ。春夏秋發スルナリ。

仲景傷寒論可見大成論ニ傷寒ト瘟疫トシ。一ツニ書タルト云モ必竟此ノ違也。醫ニ因テ冬ノ寒毒滯ニ非ストイヘ。氏予熟慮メ見ルニ。一旦ノ風濕ハ汗ノ愈ル也。汗ノ不愈ハ冬ノ内ニ其氣ヲ感メ有故ニ内熱殘ル也。溫熱ハ内ヨリ外ニ發ストアリ。不用麻黃湯取微汗トアリ。溫熱病手近夕療治スル主方アリ。

傷寒溫熱補遺

○無汗九味羌活湯 升麻發表湯 甚者防風通聖散 清解湯。用此劑得汗熱殘。或汗多而熱不解ハ。小柴胡湯加肉桂芍藥山梔子或知母。六七日不解。舌白黃乾大便結。或瀉心下按而痛塞不好按者。大柴胡湯決而可也。

シテ方ハ六書ニ不可拘諸書可見合也。必竟寒熱虛實ノ四也。外ノ事ハナシ。咽腫ハ消毒ト云ニ心ヲ付テ。牛房苓連湯ノ意ヲ以テ可考。咽腫ル症ニハ。牛房子射干玄參山豆根ナト入ル劑ニ。黃芩黃連知母石膏黃柏ノ寒涼ノ藥味ノ中ヘ入タル劑可也。血熱ニハ。生地黃芍藥犀角主藥ト知ヘシ。

○一般ニ面腫咽痛大熱頭痛防風通聖散決而可也。牛房苓連湯。苓連消毒飲可也。

○溫熱病流行疹子ノ如キ物出。或下瘀血。或譫言舌白黃黑大便閉。或瀉下耳聾。或大便瀉下身冷。夏ニテモ。中寒ノ症有リ。如此症流行スルモノ。六書三十七方ノ中ノ症也。是ヲ疫病トイヘ。氏實ハ冬寒氣藏ニカクレテ。春夏秋發スルナリ。

仲景傷寒論可見大成論ニ傷寒ト瘟疫トシ。一ツニ書タルト云モ必竟此ノ違也。醫ニ因テ冬ノ寒毒滯ニ非ストイヘ。氏予熟慮ノ見ルニ。一旦ノ風濕ハ汗ノ愈ル也。汗ノ不愈ハ冬ノ内ニ其氣ヲ感ノ有故ニ。内熱殘ル也。溫熱ハ内ヨリ外ニ發ストアリ。不用麻黃湯取微汗トアリ。溫熱病手近ク療治スル主方アリ。

傷寒溫熱補遺

○無汗九味羌活湯

升麻發表湯

甚者防風通聖散

清

解湯用此劑得汗熱殘。或汗多而熱不解ハ。小柴胡湯加肉桂芍藥山梔子或知母。六七日不解。舌白黃乾。大便結。或瀉。心下按而痛塞。不好按者。大柴胡湯決而可也。

解散之病
次言五臟
內經云
湯之
傷寒
多熱
不眠
者
神志
湯
六七日
不食
人事
者

辨証論
卷二

○大便黑澹如地黄丸色ハ、瘀血也。後必下血ス。下血ニ連テ熱去也。大柴胡湯加肉桂桃仁。瘀血黑物ヲ可下。瘀血無之ニハ、大柴胡湯本方ニテヨシ。大便一二度通シ。熱少シ。和ノ後小柴胡湯又ハ清解湯。或大柴胡湯去大黃用テヨシ。
○大柴胡湯ヲ用ル前後ニ、安神益志湯ヲ用テヨシ。安神益志湯ハ、心經へ熱入故。謬語シアワ。ト食スレハ、前ニ食シタルヲ忘レ、ウツカリトスル様ニテ不眠ニ能應スルアリ。小柴胡湯加知母芍藥茯苓用ヒ、其以後安神益志湯ナト用ル。心下按而痛塞、不好按ニ、大柴胡湯ヲ用。大便通ノ後又安神益志湯。或小柴胡湯ヲ用ル也。
○下後熱微和舌柔ニ成テ、謬語胸中熱スルヲ虛煩ト云。不

解毒湯
熱不止煩
者

眠也。溫膽湯加黃連。或竹茹溫膽湯可也。安神益志湯モ可也。
○瘀血大ニ來テ後、脉凡ニ靜ナルハ可治。煩燥ノ如狂、脉數緊強ハ多不治。熱甚キ故ニ、瘀血鮮血來テ、猶熱未退故ニ、血下ルヲ不止ノ死スル也。治法ハ黃連解毒湯合逍遙散。或ハ物湯加黃連黃芩山梔子。
○寒熱嘔吐。或吐蟲ハ、王靈二、柴胡葛根山梔子茯苓。或陳皮香附子茯苓山梔子黑炒乾薑竹茹葛根甘草。蟲積ノ部可考。
○嘔吐吐蟲テ、瘀血來ルモアリ。吐蚘ノ治法ヨシ。清熱ノ食ヲ進ル治法可也。
○發熱譫言。如疹子モノ出。如狂ハ防風通聖散可也。血中ヲ清シ消毒スル意也。壽世保元麻疹門可參考。斑疹風熱麻疹

是事論

卷二

之治法可也。

火證

○火證萬病回春ノ火症可見内經ニ五藏生五火ト云治法也皆熱也虛火相火實火アリ。虛火可補參耆之類實火可瀉芩連之屬ト丹溪ノ語アリ。本草人參ノ條下ニ腎火ハ虛火也腎水虛耗ニ熱ヲ生シタル火也腎水肺金ヨリ生ストイヘ氏本脾胃ヨリ生ス食物ノ津液清淨ナルガ精ト成テ腎ニ入也故ニ腎火アル症ハ脾胃虛ノ熱ヲ生シ腎水ノ源絶テ火ト成也。

○虛火可補ト云語ヲ見テ相火亢ル症ニハ人參ヲ多ク用ユルヲ不知至當之理也真陽ノ氣モ虛スル程ニ少ハ可用

人參ニテ此虛ヲ收ント思フハ誤也虛火可補ト云ハ假火ノ一也假熱氏云根元ニ相火無之氣虛ノ生熱ニ可也本虛冷ヨリ生熱寒極而似熱ト云様ナ者也假熱ト云ハ重キ物ヲ負テ草卧テアツクナル様ナ者也勞カスル動ニ因テ生熱也産後用力大過頭痛發熱脉大按而無力者陽氣浮散ニ黑炒乾薑ヲ入テ陽氣浮散ヲ收ルト云トアリ是人參ノ場也參耆ノ類黑炒乾薑ヲ加テ陽氣元ニ復スル也或汗下ノ後汗多ノ熱甚肌表如烙手者參附薑桂ヲ得テ真陽元ニ復シ熱去類皆虛也假火假熱ト云。

○男女脊中ホカノトアツク或腹或一身ホツカリトアツキトアリ自足逆上シ怔忡氣沈陷スルハ不火心虛痰鬱

湯之病
飲之病
天香湯之
西諸元
和脂中結
水不調結
沈湯之病
諸病吐瀉
心腹利
大痲湯病
痲症諸
不調七口
湯病論

ナリ
○火ト云ハ熱也。五藏ノ主熱也。藏ニ生ノ有熱ヲ主熱ト云。
風寒暑濕ノ外ヨリ来ル熱ヲ客熱ト云。主熱アル者外邪ニ
感スレハ客熱主熱一ツニナル故熱強クナル也。

○假熱ト云ハ内ハ冷テ外熱スル也。外熱ノ為ニ用寒涼則
病人彌疲レ草卧ル也。假熱ノ脉ハ按テ無力。按テ弦緊ナル
様ナレ氏脉来ル有テ無去也。指ニヒンクト當テ九ク無
之脉進ムトモアレ氏弱キ也。

内傷

○口苦キハ外邪。口淡キハ内傷。口味不知是格言也。

○男婦不時怔忡氣沈陷如欲絶。或如乘舟車驚安驚則手振

瘧疾不

頭重項強腹無力。或時心下痛。或夜不眠。食ヲ急キ脊中微惡
寒。或ホツト熱来リ。食如常。或不食。憂患ノ後發シ數月或經
年月不効ノ症脉緩或少進按而無力。或如常。或重則塊冲上
テ心下腹ヲ一二人シテ不按則如冲上。此症陽虚而有冷痰
濕痰ノ症也。痲症ノ輕キ也。此中ニモ有輕重。人參黃耆地黃
ヲ用テモ不効。年月ヲ經ル者也。内傷虚損ノ病ニ紛ル也。
故ニ記之。治法ハ順氣ノ散寒痰助陽。二陳湯加附子乾薑有
數効。正氣天香湯合二陳湯平胃散。或烏沈湯。或三靈發スル
下甚脉遲緩ノ者。一沈香天麻湯可也。病元陽虚而挾濕痰
心虚スル者。此症有之ト根元ヲ可知也。人參劑多不効。後六
君子湯加乾薑附子之類輕用之。患此症者ハ素ヨリ生レ付

タル病氣也故ニ時々發スル者也。父母ノ中ニ此症アレハ兄弟必此症アリ。一門ノ中ニ此症アレハ其父母ヨリソレソレニ傳ル也。是醫功ノ秘也。生付タル病故危キ様ニ覺テモ不死者也。故ニ兎角アシライ。藥ヲ用ル中ニ快氣スル也。内傷虚損トミテハ結句不治也。

○老人漸々不食身瘦三四月數治不効今晝夜三四行大便澹口舌為痛食無味腹脊中ニツキ脉虚軟附子理中湯數貼全安

○僧尼ニ多ク數月泄瀉不食以後腹脹或浮腫附子理中湯可也。外ノ劑不効人參白朮附子乾薑肉桂ノ五味可也。腹脹甚者附子乾薑肉桂為主有腹痛者或有積者加沈香宿砂烏

散病論
胃不和
不進主

藥丁子之類惣而脾胃虚腹脹腫氣ノ類不宜順氣ノ劑也。元陽ノ氣虚ヲ不運行故ニ心下痞塞也下行スル氣カイナキ故也。氣不下行故小便モ不通也。故ニ參附薑桂或加木香宿砂也。沈香烏藥ハ宿砂ヨリ脾胃ノ元陽ニアシキ也。虚スル元陽ヲ散スルハ不可也。大病ニ脉緩或虚數按而不鼓者皆真陽ノ大虚也。不可用寒涼也。

○壯男色白去冬微腹脹臘月快正月下旬感風三月始良快以後又不時憎寒少來リ食少心下滿按而凝滯シ足冷脉五動弱先用白朮乾薑或沈香烏藥熱出脉進為蟲積淨府湯合平胃散去胡黃連加黃連脉數去心下痞少快或時不快脉又進弱盜汗腹漸脹皮膚乾六味丸加宿砂後腹彌脹或攣腰微

痛六鬱湯加木香烏藥不効時心下塞熱來或腰少痛臍下
攣用烏苓通氣散不効又淨府湯數貼氣重六君子湯加宿
砂枳實然レ氏小便少異功散加車前子少安盜汗熱輕朝
口渴異功散加黃耆當歸後去黃耆數貼益快本方數貼心下
凝滯不和大便時瀉時結啓脾湯數貼而心下和諸虛悉愈此
症腹凝滯漸脹也元氣脾胃弱而氣不行也氣弱キ故順スル
氣微也故啓脾湯異功散能應シタル也温補ノ附子肉桂ヲ
タツフリト用テヨキヲモアリ又不善ヲモアリ緩和ニ異
功啓脾ニテ自日日隨テ順スル也順氣退蟲退疝皆誤也如
此症ハ温補ノ應スルハ早ク治スル也温藥ヲ急ニ用ルモ
胃氣ニサワルニハ異功散妙也

治胃弱
湯病論
胃虛不能
消化
物主

○脾胃虛而有熱ニハ前方可也或氣虛ニハ雲林潤身丸
○温補不効又有清補者虛中有實火者人參白朮ニ苓連或
黃柏山梔子ノ類交用ル格アリ涼藥一味ツノ加味可也
雲林潤身丸或異功散加黃連或黃柏或六味丸料加知母黃
柏人參或去人參知母用或七味白朮散補中治濕湯亦清補
之劑也

○前ニ云如ク心虛痰鬱數年治療ノ又得之有虛有實虛實
氏ニ有ル者ハ虛實氏ニ兼治スル也六味丸八味丸應スル
アリ十五味安榮湯或六君子湯加減レ或香砂養胃湯理中
湯七味白朮散可也氣逆上心下塞時ハ五氣天香湯合二陳
湯平胃散或三靈退蟲散ノ類兼用テ可也補ノ中ニ逆上或
提事終

補氣功

卷二

七

心下塞ル時ノ藥或還蟲丸ナト兼ル也。二陳湯合烏沈湯平胃散或ハ三靈間ニ用テ可也。

○男子六十餘久ク下血ノ後全不食素嗜酒今不好脉按而弱立則足無力頭眩三四醫治療無効予用之黑炒乾薑宿砂各大陳皮茯苓各中甘草小右適中食漸進而愈。

○内傷之治萬病回春壽世保元之論治法決而善東垣薛己張介賓龔廷賢ノ法論ヨシ内傷ハ勞役ノ中焦ノ元氣ヲ傷リ又飲食ニ因テ脾胃ヲ傷リ肺モ傷ル也。

○内傷主藥東垣補中益氣湯也表虛ノ汗多脉大無力惡風ハ益氣湯ノ症也虛冷ハ加桂附子用テミルニ補氣ニハ四君子湯益氣湯ヨリヨキ也異功散又ヨシ益氣湯ハ多味故

補氣ノ功ヨワシ

○補脾胃有二胃氣ヲ補フト云ハ四君子湯異功散益氣湯獨參湯或參附薑桂木香ナトノ類也必竟命門ノ元陽ヲ補フ意也緩ナレハ參朮急ナレハ薑附肉桂也陽ノ温ニテ胃

ノ氣ヲ強クスル意也又脾胃ヲ調ルト云ハ四君子湯異功散二蓮肉山藥乾薑肉桂宿砂木香ノ類撰テ加ヘル也參苓白朮散理中湯ナトモ調ル也大便秘ニ或時ハ瀉或調是ハ脾胃ヲ調ル治方也或ハ啟脾湯ヨシ。

○胃少シ熱有テ弱キ者七味白朮散可也或補中治濕湯モ吉凡辛者却減氣故補之以甘味。

飲食

卷二

七

○凡食傷吐瀉腹痛八不換金正氣散加乾薑或加山查子。

○不吐不瀉而腹痛甚者枳實大黃湯。

○婦人胸蟲痛以後時時腹痛或又感風寒食餅而吐逆甚吐黑血今唯惡心吐唾全不食脉四動半右心下塞而有積好辛味陳皮香附子茯苓黑炒乾薑甘草右煎服的中而愈此症似死而生タルハ脉緩和ナル故也。

○腹痛食滯不盡者內消散乾生薑甘草ヲ加水煎溫服。

○食滯用攻擊或食毒損脾胃絕入テ不吐瀉者類中風食厥之意味可也虛人ハ香砂六君子湯人參二三分入可也或加神麴山查子。

○男子年十三上氣頭痛面赤口渴寒熱左脉カサ少也右脉

カサアリ吐食惡心為食滯不換金正氣散加柴胡茯苓香附子檳榔子頓安熱去蟲ナトラ兼タル症也脉ト症トヲ見テハ食滯ト難決惡心吐食ヲ問テ食力蟲カト云ヲ知タリ病因能ク可問知。

○大體腹痛ハ枳實大黃湯去大黃用テ吉。

○婦人食傷ノ後腹攣痛不止十一日不能偃卧腹稍脹浮腫予以為是非食傷血道凝滯而瘀血アリ桃仁肉桂大黃當歸紅花甘草右適中。

○男子年五十六熱病愈食日進ム比ニ芥子ノ莖ノ浸物三梔食之吐瀉腹痛甚枳實大黃湯去大黃淋出之用之不快腹雷鳴ス此男平生腰脊中為痛症ナリ予深思而自得ス芥子

ノ葉ノ辛味ヲ使覺テ多食スル故ニ塊積動ノ逆之為吐瀉也。食稍盡テ痛不止者塊動也。逆者順之其脉進口渴陳皮香附子茯苓黑炒乾薑各大炒乾薑中甘草小右六味淋出ノ用テ頓安不換金正氣散加乾薑茯苓交用而愈。右主靜齋熱病ノ後也
○男婦不噎膈而不食米穀數方無効。薏苡仁百合麥門冬香附子當歸柴胡牡丹皮檳榔子阿膠生薑皮右煎服大便結則加桃仁此劑有妙服後胸膈鳴者的中也婦人得此症年二十四五經水二三月不行午後寒熱頭痛口渴平素有風疹而出沒予此劑加柴胡山梔子三十日之後食穀此劑延壽院所傳之家秘也

○頭痛自汗脉不數或弦可問胸腹有痛乎否也滯食者多

○脾胃鬱滯或不和無熱者平胃散加乾薑肉桂

○男子年十五色蒼々脉緩按而弱動氣如有如無兩足タルク足ニケテ行樣ナルト云フアリ故ニ握ル時ハ止予以爲此前ノ心虛痰鬱ノ症如此云タフアリ是ハ癰症ノ兆アル也因テ先不補然レ凡全不食無苦處理中湯人參一分五厘頓愈

○下利脉遲而滑或浮大按之反テ濡惡食ハ皆胃有宿食也但宿食忌巴豆只宜大黃湯

○不食スルニ蟲アリ或積或疝氣或痰或血

○脉按而不弱或弱キ様ニテモ心下按テ痛病人不好按ハ心下ヲ按シクツロゲテ或利大便或和スル治法ヲソレソ

辨耳論

卷二

七

レノ病門ニテ可治療

○不食脉緩或按而無力心下空虛好按温手ニテヲス下ヲ好ミ畏寒不食スルハ皆中焦下焦ノ虚冷也温補スレハ食進ム四君子湯異功散益氣湯理中湯十全大補湯八味丸人參附子乾薑肉桂木香宿砂ノ類ヲ加減ス冷蟲ニハ加丁子良薑

○霍乱ハ即食傷也夏ノ間ハ食傷吐下甚四時凡ニ有吐瀉腹痛ス

鬱症

○解鬱和中湯回春治胸膈痞滿内熱夜不安卧卧則愈悶赤茯苓 香附子童便炒 枳殼麸炒 山梔子各一錢 半夏 前胡各一錢

分神麴炒 厚朴炒 黃連炒 紫蘓子研各七分 生甘草四分 陳皮去白一錢

分青皮去穢醋炒五分 生薑 此劑因痰夾熱不能偃卧胸背痛者得効

○病門ニ鬱症門アリ是ハツカエト云様ナ者ニテ惣名也痰鬱血鬱濕鬱氣鬱ノ類也鬱症門可參考皆塞タルガ鬱症也

○氣鬱痰鬱血鬱濕鬱食鬱或痞氣胸痛或心虛痰鬱皆能治之ニ陳湯合烏沈湯平胃散或烏沈湯合主方此劑入門心痛ノ部ニアリ予選出ニテ諸症ニ用ニ腹痛或癰症絶入ルニ毛吉又三和散ヨク氣ヲ流通ス

痰飲

是事論

卷二

七

散病論
元結五藏
脹急大

生大補湯
論治五藏
肝肺傳急
精白濁
和湯
治胸滿
七五

○痰ハ濕痰ト燥痰トヲ知ベシ。濕痰ハ瓜蒌貝母ノ類不効。燥痰ニ天南星半夏ヲ用レハ彌甚シ。

○肥人ニ濕痰多ク瘦人ニ痰火多シ是大法也。惣ノ諸症凡ニ痰ヲ兼タル症十之七八アリ。

○實症ノ痰不能偃卧呼吸促迫者瓜蒌枳實湯。

○虛症ノ相火アリテ痰喘不能偃卧呼吸促迫者滋陰降火湯加紫蘂子杏仁沈香輕者六味丸加紫蘂子杏仁宿砂。

○虛冷者痰咳脉緩而咳不甚者異功散加乾薑宿砂或六味丸加紫蘂子宿砂杏仁或肉桂。

○脾胃虛者消痰下痰驅痰之劑不可過用。脾胃虛ト云ハ本元陽ノ虛也。氣虛ノ脾胃ヲ溫和スルナラヌ故ニ脾胃ノ

運化弱クナル也。脾胃弱キ時ハ痰彌生ス。

○相火ノ痰ト熱痰ト兩症アリ。虛ト實トノ痰也。相火ノ痰ハ血虛ノ腎火動シタル痰也。喘急ナトハ火氣有モ治シ易キヲアリ。脾胃虛シ咳嗽有痰ハ勞咳也。不可治也。熱痰ノ症

ハ脾胃鬱熱シ或風痰滯テナル熱ハ芩連ノ類實火ヲ退ル劑ニ痰ヲ消スル加味ノ愈ユ有熱ニ虛火實火ノ類アリ。虛

冷ノ痰ハ脉緩或大ニノ無力或虛微溫藥應スル也。熱痰ニハ難用。

○痰如唾薄キモノ燥痰在腎之屬痰粘不薄者非火動也。痰飲為患或喘或咳或眩暈頭痛睛疼遍身拘急骨節痺疼

胸背頭項腋胯腰腿手足結聚腫硬或痛或不痛按之血潮或

辨耳論

卷二

七

微紅アリトイヘ氏又淡薄不熱堅如石破之無膿或有薄血

或清水如乳汁又有如壞肉如破絮或又如瘰癧在皮肉之間如雞卵可移動軟活不堅破之又無膿血針口努肉如突出惟覺咽喉痰實結塞作寒熱追風通氣湯加半夏桔梗

○勞咳ノ痰ハ津液上テ痰トナル咳嗽門喘急門可參考

○反胃噎膈餽雜嘔氣咳逆吞酸十之六七痰也痰火ハ熱痰也咳逆嘔氣吞酸ニハ濕痰多シ反胃噎膈餽雜皆痰火也

○氣虛痰咳其聲大而不甚六君子湯加宿砂

○氣虛咳嗽無力而咳補中益氣湯加貝母前胡砂仁是氣高而喘之屬脉大無力也

咳嗽

○風咳玄治十味有熱加蘇子柴胡羌活

○有痰或左積心下按而微痛小柴胡湯合平胃散加青皮香附子黃連或加檳榔子

○一男咳久不已九味清脾湯去草菓黃芩加蘓子杏仁桔梗陳皮香附子丁子適中

○一男風熱之後咳嗽甚乳邊痛夜々不能偃卧脉五動帶緩不換金正氣散加莪朮青皮丁子黃連茯苓桔梗前胡適中

○咳嗽嘔甚脉緩不換金正氣散加香附子丁子茯苓或乾薑或宿砂用之而安

○冬月或秋末或春間風咳ノ症ハ解散加阿膠宿砂乾薑桔梗或五積散去麻黃白芷加杏仁或加蘓子羌活可也聲啞二

是事

卷二

七

肺經
肺經

卷二

七

无必有效

○婦人產後咳少有之或感風寒脉進無力按而無根午時前後惡寒肌熱盜汗平素體瘦上氣煩赤似勞咳而痰不出如燥其間感微風則咳無間時咳嘔不用道達散加香附子瓜蒌仁貝母咳嘔益強予以為脉按而無根中診而進者脾肺之寒邪也以不換金正氣散合香薷散加乾薑宿砂蘇子杏仁茯苓五七貼而咳止

○一男勞役患傷寒初汗多今咳喘呼吸起卧苦悶右ヲ下二ノ卧ス不然ハ咳甚食少小便赤脉肌熱ヨリハ静ニ按セハ弱用加減瀉白散少安加當歸杏仁以六味丸料加酒炒黃柏淋出兼用之二十日之後全愈

○一男常過酒咳久不止脉緩或雖進按而無力不換金正氣散加乾薑宿砂蘇子杏仁香附子茯苓前胡桔梗而安

○肺實咳嗽甚而喘咳上氣或眼赤三味瀉白散小兒加甘草○咳嗽不止中條流小兒肺疳方治小兒肺疳咳面白或浮腫腹右ノ方鳩尾ニ一塊アリ小便晝夜數不通半夏檳榔子桔梗木香丁香猪苓澤瀉防已右九味一方加大腹皮五加皮名丁香湯有腫氣加陳皮予此劑ヲ以テ諸症ノ蟲ヨリ起リタルト云ニ心ヲ付テ治ス有熟者淨府湯去胡黃連加青皮黃連或有冷氣者用肺疳方

○婦人久咳不止時帶血數方無効身漸瘦脉不細數予為蟲肺疳方加前胡蘇子杏仁而咳止

○婦人產後咳嗽久不止。一身微腫。用肺疳方頓止。

○女子年十三風熱後咳不止。肺疳方加蘇子杏仁前胡頓安。此劑奇妙。

○男子風邪ヲ忍ヒ出勤シ以後頭痛。咳痰熱往來。右脉弱。舌尖乾。用逍遙散加防風陳皮杏仁茯苓桔梗枳殼酒炒黃柏。熱少輕。食少舌乾微黑。口甘胸痰。咳嗽肌熱。脉五動如無力。汗多。逍遙散去柴胡加陳皮貝母山梔子括蕒根黑炒乾薑。是ハ人參ニ移ラントノ意ニテ。黑炒乾薑ヲ入タ也。翌日少安。舌潤熱不解。逍遙散去柴胡加防風陳皮杏仁茯苓桔梗前胡黃柏。右五六貼用。昨夜睡後謬語熱輕。是ハ熟睡ノ草卧タル也。逍遙散去柴胡加貝母前胡酒炒黃柏人參。氣力ヨク咳殘ル去。

人參前方去柴胡加陳皮貝母數貼而安。是ハ勞役傷寒ノ類也。有痰之症。無實熱。舌柔ニシテ。少シ黑キヲモアル也。如此症ハ弱キトテ急ニ人參ヲ用ル。ト痰咳強ク成ル者也。中和ノ劑補瀉ノ間ニテ可治療也。

○聲啞咳嗽。壽世保元喉痺門。甘草烏梅桔梗烏藥。右寒ニハ加乾薑肉桂。熱ニハ加黃芩貝母。痰ニハ二陳湯。右有効。

○治因痰火咳嗽嘔吐。或腹痛者。或脾胃鬱滯而有熱者。可也。順氣和中湯。治脾胃弱而虛中有實者。氣虛加人參黃耆。

○男子咳痰久不止。脉少進。有痒瘡。用桔梗前胡防風蘇子杏仁丁子當歸芍藥山梔子蟬脫柴胡宿砂甘草適中。

○小兒咳嗽嘔吐。痰キレカ子。ヒ少。ト云咳有ル。ト十ヶ

癰疽論
癰疽論
癰疽論

年ノ中ニ二度程也間流行ノ小兒ハヤリ咳ト云此症間々アリ後ニ咳嘔ノ吐血スルモアリ是惡血ノ毒氣ト風痰ト交ル故ニ如此症ト見ヘタリ

○童子六七日咳嘔ス不換金正氣散加丁子黃連前胡蘘子杏仁ノ類咳止以後頭瘡發シ或肘ノ間瘡出痰血咳ト云有リ清咳湯ノ心ヲ以テ可考不換金正氣散加丁子黃連ヨシ消痰ノ心得ハ予カ考出ス加減也然レモ又其中ニ可有的中ノ劑可付心也肉桂紅花ナトヲ入ル劑モアリ

○婦人咳嘔久不已ニ柴平湯的中

○久咳不已不換金正氣散加丁子黃連茯苓桔梗前胡香附子痰咳不潤ニ陳湯加貝母瓜蒌仁

○婦人癰後咳甚去秋久瘡灸四花而已今手甲冷手心熱痰多脉五動少進似勞午後無寒熱不換金正氣散ニ痰ノ加減或消瘡湯淨府湯瀉白散六味丸加乾薑宿砂蘘子杏仁無効以後一二行瀉ノ腹微痛ム予用一方瀉止咳嗽モ止テ安シ此方小兒科大便不調症ニ用白朮茯苓陳皮宿砂木香甘草生薑也

○一男年四十餘久咳不止午後熱來似熱病加減瀉白散適中咳而口渴胸滿不利加減瀉白散加枳實蘘子杏仁茯苓

○平素有蟲積或癰症有鬱痰者風邪之後咳嗽數劑無効則咳益甚ニ陳湯合平胃散加青皮蘇子杏仁能止咳有熱加柴胡山梔子

小兒瘧疾

卷二

小兒

○小兒瘧後疳大人瘧後左積不退白朮茯苓陳皮乾薑肉桂
丁子用之吉

○久咳不已少有熱小柴胡湯合平胃散加青皮檳榔子香附
子黃連

○咳嘔甚者丁子黃連二味七分煎用好味苦辛者有妙

喘急

○喘急呼吸有痰聲不能偃卧感風寒則必發杏仁飲加蘇子
而先去風寒其以後燥痰濕痰ヲ見分テ可施治

○喘急年々發テ步行息クルシク大便瀉之浮腫或腹脹者
不治萬カ一溫補ノ劑應スル者ハ治スルアリ

○喘急實症ハ瓜蒌枳實湯加蘇子虛症火ノキサニアルニ

八滋陰降火湯加蘇子杏仁沈香或六味丸加蘇子杏仁宿砂

○理中湯痰喘脉緩或五動肌熱不甚或因痰身痛者可也此
劑虛冷有痰者ニ惣ノ心ヲ附テ可用也

瘧疾

○初發寒熱柴胡弓歸湯或去人參加黃芩虛人加人參

○虛人ハ人參養胃湯脾胃虛者去草菓加白豆蔻寒熱加柴
胡熱甚加黃芩

○婦人瘧間自發四五發後日日發不食不換金正氣散加當
歸柴胡青皮白豆蔻檳榔子猪苓澤瀉草菓七貼ニ瘧去後

○婦人有胎瘧不退或欲墮胎異功散人參一分當歸阿膠宿

瘧疾

卷二

瘧

辨別
王
言

砂柴胡加ヘテ頓安。

○瘡三四發邪稍退之時用此劑自退不換金正氣散加柴胡青皮檳榔子白豆蔻草菓或加丁子生薑。

○虛人瘡不退當歸白朮ノ二味可也或加白豆蔻亦可也。

○予以為瘡四五發ノ後九味清脾湯去草菓加白豆蔻葛根或小柴胡湯加青皮白豆蔻葛根茯苓羌活之類熱ヲ去リ瘡後無餘熱ヤウニ可施治也惣ノ初瘡ハ必長不退一二ヶ月或三四ヶ月患之熱去テ後脉無數多汗者附子理中湯加青皮柴胡可也瘡ノ内汗少キ者必瘡後餘熱アリ久瘡ノ後浮腫者冷ハ温之テ小水ヲ利ス有熱ハ利水而清熱ス温ハ人參附子乾薑肉桂宿砂ノ類清涼ハ薑炒黃連山梔子青皮ノ

不
退
當
九
二
味
可

類或黃芩

○四五發ノ時分ハ加草菓丁子必用ユ常山ハ不可用九味清脾湯七味清脾湯或不換金正氣散加草菓檳榔子熱瘡ニハ九味清脾湯去草菓加黃芩黃連山梔子葛根截瘡ノ藥ハ不可用虛人ハ人參養胃湯。

○葛根檳榔子各一錢為一貼能解ス瘡ノ發ル早朝一番煎二貼用テ可也截瘡ニテハナシ常山ハ殊ノ外脾胃ヲ損ス。

○瘡痢兼作ルアリ九味清脾湯去草菓加枳殼或黃連或檳榔子或通利スルニハ檳榔子不宜枳殼ヨロシ或不換金正氣散加柴胡黃芩枳殼或黃連。

○虛人ハ八解散加烏梅草菓或養胃湯回春ニハ加當歸川

散
感
冒
日
久
熱
毒
深
重
の
病
多
瘡
毒

是
事
炎

卷
三

廿
五

辨別
論

卷二

小

可解。○瘧ノ灸ハ九椎十一椎十四椎章門噫嘻六椎兩髀關各三寸兩傍五十壯ツ、シテ吉病家不好ハ灸ハ遅キ吉。

○瘧ハ用強藥急ニ解ントスルハ後ノ為ニ不宜瘧急ニ攻撃スルト脾胃疲レテ瘧後アシキト云フヲ病家ニ云聞セ置ク者也。

痢疾

○婦人年四十五六寒熱及暮招予診脉數肌熱如瘧又似時疫先以藿香正氣散加柴胡葛根二貼翌日診脉數而如弱昨夜不時讞言從夜半十五六行至圍腹痛後重白膿來不時嘔

正氣散
痢池瀉
所致也

噦ス予熟慮ノ診其腹水分ヨリ中脘動氣甚至圍而努力スル時冲上ノ嘔スト云是胃口熱甚也唇乾好冷水予考ルニ噤口痢ノ初發也脉按而弱從圍歸ル時ノ眼睛腫子不轉様ニテ眼ギロリトスル處有之考其治法ニ脉按而數如無力眼睛弱キ者人參ノ症也嘔吐ノ中脘動氣甚故ニ不受人參又清熱和解ノハ弱キ所アリテ難用以是考ルニ六七日ノ間為必死即謂病家云此病人噤口痢ノ初發也如此ノ症予療治ノ見ルニ多ハ不治也願クハ招他ノ老醫任之ヨト即召一老醫診之水分中脘ノ動氣決ノ胃熱噤口ト云月知ラス輕キト思テ一兩日用藥午時ヨリ脉右ノ方力廿減シ及暮手足微冷兩頰ヤ、冷嘔吐有之老醫異功散人參二提耳炎

分入用之病人藥ノ味殊ノ外風味ヨキト云テ一兩度用ル
後食粥有味テ美シ雖然手足冷脉益弱予謂病家云補劑自
然應スルモ有ヘシ然シ明日不受補タメノ後語ニ今一
醫ニ見スヘシト病家又他ノ醫ヲ呼ビニヤル翌日マテ殊
ノ外能食氣出心下按テ弱ク空虚ニメ食進ムトイヘ氏兩
手冷冷汗出脉彌弱シ予考ルニ此食ニテ脉不出人參劑ニ
貼應スル様ニテ脉ノ力見ヘヌハ何様暮方外ノ事出来ル
ト見ヘタリ申刺ニ上氣甚又嘔吐アリ上氣雖甚兩手不温
予以為補陽ノ直ニ上リ四肢工陽氣ワタラサル者彌無胃
氣也時ニ一醫來リ診メ益氣劑一貼用ニ夜明ノ比脉絶ス
按スルニ予初發ノ時中脘水分ノ動氣上嘔吐ト圓ヨリ歸

ル時ノ眼睛キロリトスルト脉ノ數ナルト考テ六七日ノ
間必死ト思タル考ヘ初中後不違仍記之為噤口痢之格也
數人同之急霍乱ノ吐利スルニモ有之霍乱ハ間ニ參附獨
參附子理中湯ニテ治スルアリ噤口痢ハ素ヨリ胃熱有
ル也故ニ不受温補ノ死ス

○痢疾初メ十四五行脉五動餘不換金正氣散加羌活防風
枳殼茯苓度數漸減而後加香附子宿砂有効

○痢疾嘔吐因蟲因痰有之又ハ有咳逆平素有蟲有痰疝氣
アルノ類ハ不可驚也夫ニハ痢疾ノ體少シエル者ハ脉
ニ能キ處有之又ハ腹ニヨキ處有之不治ノ噤口痢ト見ク
ラブレハ自ラ胸ニ決定スル者也

辨理論

卷二

七

泄瀉
左湯
泄瀉不和腹
泄瀉水穀不
泄瀉不食

風湯
不化泄瀉腸
於痛濕毒
汗或之

○痢ハ柴苓湯加枳殼羌活可也。或黃連或黃芩為藥湯加枳殼妙也。澁滯甚者二吉。

○肌熱少之。和ノ後胃苓湯加枳殼木香防風有效。

○澁滯二ハ不換金正氣散加枳殼黃連可也。

○大坂ノ醫治療得効之二方。三和散香砂養胃湯也。右二方。

二加減ス。三和散加黃芩柴胡可也。香砂養胃湯ハ熱去テ用。

ユ。予按時氣ノ熱去テ後ノ澁滯不食ニ可用。初發ハ敗毒散。

加蒼朮防風黃連或黃芩。或合平胃散去川芎。又柴苓湯去白。

朮肉桂加蒼朮防風黃連枳殼九味清脾湯去草藥。又胃風湯。

去川芎加黃芩柴胡或羌活枳殼黃連胃風湯ヲ主劑トノ能。

キナアリ。

○必用ノ主藥蒼朮防風羌活柴胡黃芩枳殼黃連小便澁者。

柴苓湯加減黃芩為藥湯ヨク和スルナリ。柴苓平胃散去白朮肉桂。右ノ主藥ニ加減ノ可也。

○敗毒散合平胃散而為主劑加黃芩黃連防風之類。因症加減數有効。

○調理ハ七味白朮散異功散加黃連。或啟脾湯消疳湯可也。

○痢三十日晝夜十七八行消疳湯加人參適中。

○風濕ノ劑羌活獨活防風柴胡桔梗枳殼蒼朮陳皮茯苓甘草有熱ハ黃芩黃連無熱ハ玄治九味或胃風湯去人參加枳殼或柴胡黃芩羌活可也。痢似胃風湯之症而不効者此方可也。

辨別論

卷二

七

○東垣蘭室秘藏卷之下瀉痢因傷冷飯水泄一夜走十行變作白痢次日其痢赤白腹中疴痛減食熱躁四肢沈困無力黃芩三分當歸身四分肉桂五分甘草炙各五分猪苓各二錢茯苓各二錢澤瀉一錢五分蒼朮一錢五分生薑一錢升麻一錢柴胡一錢右咬咀如麻豆大分作二服每服水二盞煎至一盞去渣稍熱食前服之

○金匱要畧外臺黃芩湯治乾嘔下痢黃芩三兩人參三兩桂枝一兩大棗十二枚半夏半斤此劑八傷寒下利二可也痢疾二無効

痢疾治法改正

○初發敗毒散倍枳殼加黃連或黃芩瀉滯甚者桃仁大黃少

二三日モ用ル中ニ瀉滯甚數ニ腹痛後重ハ桃仁肉桂大黃甘草或黃芩不甚ハ大黃シ不可用不換金正氣散加黃連枳殼而能通利スル也大黃ノ白ヲ嫌フ者アリ

○初發不換金正氣散加柴胡黃芩枳殼桃仁ヒタモノ用テ可也瀉滯アルニツレテ倍桃仁枳殼或熱強クハ加苓連如此數日用テ有効甚瀉滯スル時一二貼桃仁肉桂大黃甘草ヲ用テ又不換金正氣散ノ加減ニノ用テ可也敗毒散ニ大黃ヲ入ルモ疫痢ノ甚者ニ用テヨキ也

○沙參胃風湯加柴胡黃芩枳殼而初中後用ルモアリ或苓連二味入テ用之其間ニ不換金正氣散加黃連枳殼或ハ桃仁肉桂大黃甘草ナト二三貼用テスカスモアリ

和飲
稍少者
湯
治赤白痢
或腸之痛

○黃芩芍藥枳殼桃仁甘草血痢ニ用ヒヨキナリ。
○後重腹痛不止ニ三和散加桃仁柴胡黃芩或加枳殼去柴胡用ヒ澁滯ヨク止ルナリ。

○熱サノミ無ク冷濕痢或虛人ニハ胃風湯加桃仁枳殼或玄治丸味右二方有妙。

○不換金正氣散加枳殼黃連澁滯漸和ノ後回春ノ調和飲用ルモアリ又回春虛勞門ニアル勞咳ノ中ニ痢ニナル主方ノ和中湯虛人ノ痢ニヨキナリ多シ。

○痢ノ熱ヲ去ハ柴胡黃芩黃連也澁滯ヲ去ハ枳殼ヲ大ニ可也桃仁大黃能通利ノ和ス或小柴胡湯加黃連枳殼良瘦痢ハ小柴胡湯加黃連枳殼澁滯不止ニ大柴胡湯加桃

仁漸和而後不換金正氣散加黃連枳殼此治法亦如神。

○痢病ニ人參早ク用レハ邪氣ヲ補住メ澁滯ヲマス者也痢漸和メ常ノ大便一日ニ一二行來ル時加テヨシ然レ氏病人甚草卧ニハ主方ノ内ヘ人參五厘カ一分加之痢病ニ人參ハ澁滯ニサワル故ニ使ヒニクシト心得テ可施治。
○不食嘔吐脉虛數眼睛キロリトスルハ噤口痢也四五日ノ内ニヒタノト數増テ聲鼻ヘ入鼻ニテ物言フ様ニ聞ユルハ死症也手足冷兩手ニ有汗ハ其目ニ死スルナリ。手足頗冷テ嘔吐スルハ不治人參ヲ用ル中ニ嘔吐不止ハ人參不應也。

○痢百餘行晝夜二百行ニ及トハ氏病人腰ノヌケヌハ

可治三四日ノ中ニ腰不立メ嘔吐不食スルハ六七日ノ中ニ死スル也

○痢臭穢甚キハ熱毒也脉弱キハ惡候

○痢嘔吐スルニ蛇蟲或持積動ノ嘔吐スルハ可治不換金正氣散加檳榔子香附子或枳殼木香三靈兼用テ他醫噤口痢カト云ニ治シタルアリ

○小兒ノ痢モ治法同シ孕婦ハ不可用大黃枳殼ヲ大ニノ用之孕婦ノ痢熱不甚ニハサノミ小産モセヌ者也食ヲ能食シ粥ヲ一二椀モ食スルハ男婦凡ニヨロシ

○調理ハ黃糞來テ十ガ六痢和メ後七味白朮散或ハ異功散ヲ用テ好シ

○痢漸愈ニトスル時腹痛強ク成ルヲアリ是ハ常ノ大便來ル故大便ノ道痛テ腹痛スルヲアリ腹痛ノ後常ノ大便來ルハ欲愈也不可驚也且稍愈ノ間臍下小塊長ク堅硬ナル者手ニサワルハ結糞也腹攣痛ハ三和散加桃仁枳殼能食者加桃仁肉桂大黃當歸甘草虛ニハ七味白朮散加桃仁枳殼人參五厘

○痢嘔吐不受藥服藥則吐難奈何予三靈ヲフリ出メ其前ニ醋ヲアタメテ病人ニカバセ後用之吐頓ニ已ム是蛇蟲ノ動也痢ノ嘔ニモ石ヲ燒キ醋ヲ洒キカセル治法毒世保元ニ見ヘタリ
追加

白子
熱化瘧湯
熱有熱瘧
湯有熱瘧
泄瀉
四苓散
痛瀉下
赤痢瀉小

痢疾論

卷二

七

○和スルニ黄芩為藥湯ヨシ加黄連枳殼一アリ。

○痢病吃逆スルハ胃氣虛スル也難治熱故ニ吃逆スルアリ是ハ小柴胡湯加黄連枳殼人參一二分其内ニ竹茹温膽湯ヲ用テヨキ一アリ四肢冷元氣疲脉虛微ハ死速也痰火吃逆ハ回春ノ吃逆門黄連竹茹湯用ユ前醫獨參湯ヲ兼ルアトナラハ獨參湯少ツ、與之交用テ吉實熱有テ吃逆スルハ清熱化痰湯ニテ得効一多シ虛ニ理中湯ヲ用ル一アリ理中湯ノ應スル症ハ十ノ一也

○痢病初發如水瀉卒ニ有熱百行二百行度數頻ニ腹痛有テ無後重此症ヲ大黄枳殼ノ類用レハ猶々度數増シ五六日ノ中ニ四肢冷死スル一アリ是此下焦濕熱甚メ水瀉膿血交リタル也以前不知此症通利ノ劑ヲ用ヒヒタノト數増テ死タ也壽世保元泄瀉ノ部加味四苓散ヨシ去濕熱小水ヲ利メヨシ如此ノ後澀滯腹痛後重出ルハ前ノ治法ヨシ調理啓脾湯也

泄瀉

○時瀉時止腹中不調或腹痛二陳湯加蒼朮防風木香脉虛加人參兼風濕加羌活

○久瀉食減時瀉時止脉按而無力者決ノ附子理中湯ノ症也口舌時作痛也或色黄脉如弦擊ノ如有力是皆脾胃ノ虛冷真陽ノ虛也人參附子白朮乾薑年中用之自調八味丸加人參白朮亦可也雖然八味丸ハ補真陽ノ効緩也故ニ宜人

參附子白朮乾薑也。

○醫學正傳丹溪白胃風為病初飲食訖乘風涼而致之其症飲食不下形瘦腹大惡風頭痛多汗胸塞不通脉右關弦而緩常瀉胃風湯主之。

○男子年二十腹中不調足微腫漸腹少脹數治無効脉按而不鼓或弱附子理中湯數百貼而全愈。

○啟脾湯治泄瀉久不已及脾胃虛弱者必用之神劑也為丸用亦佳脉弱口甘者用之効口甘者脾胃虛而有熱也。

○泄瀉口渴者胃苓湯加葛根木香虛者七味白朮散。

○大便不調或不時腹微痛心下支時時頭眩怔忡如乘舟車或氣沈陷似欲絕此格ハ平素心虛痰鬱也不拘瀉而心虛痰

鬱治法佳也正氣天香湯合二陳湯加羌活虛者香砂養胃湯

○肥婦色蒼白暴瀉甚胃苓湯不効五苓散胃風湯無寸効故胃苓湯加訶子一貼而頓安。

○一男年七十餘三月初瀉痢四五日晝夜二十四五行不食脉數時結寒熱胃苓湯加柴胡葛根山查子羌活四五貼而熱去血多交腹微痛不食脉緩用當歸芍藥川芎蒼朮茯苓肉桂陳皮厚朴枳殼木香甘草適中。

補遺

○泄瀉ハ水瀉ニ下ル也胃苓湯加水香或五苓散大法也食滯ノ瀉スルハ不換金正氣散加乾薑如滯瀉ノ不快利者少

世宗

○轉筋トテコムラカヘリスルアリ。吐スル時、腹筋ヨリ足ヘツリ附ケテコムラカヘリシテ痛ク、或ハ團子ノ大サノ物、足ヲ上下ノ痛甚シキモアリ。暑濕痰鬱滯ノ不散熱ノ動ニツレテ上下スルト見ヘタリ。股ニ上リ踝ノ邊ニ下テ、上下ノ痛ミ或咳逆スルニ熱アル症多シ。手足厥冷ノ脉弱症ニ間々實アリ、此虛實ヲ如何ノ知ルトナレハ、惡心嘔吐ヲ實トスル也。

○手足厥冷吐瀉脉全無、或虛微決而獨參湯、或附子理中湯ノ症トミルニ實アリ。惡心嘔吐有テ、ムカクトスルハ、食滯未盡也。食滯ヲ吐盡セハ、升降ノ氣メグリテ、手足溫和、脉自出來ル者多シ。故ニ不換金正氣散、加乾薑、或ニ陳湯、平胃

散吐逆ヲ和メ利ヲ得ルヲ多シ。

○咳逆不止發熱ハ、溫膽湯、加柴胡黃芩。

○吐瀉之後氣力弱、脉虛微、獨參湯、附子理中湯、適中。

○無脉者、獨參湯、參附ヲ用ル時、吐メ手足彌冷、冷汗多出、言語靜カニ、聲有根者ハ非虛、不換金正氣散、加香附子茯苓乾薑、或三靈ヲ用テ、吐汗止テ、手足暖ニナル者多シ。

○霍亂腹痛甚者、枳實大黃湯、決而可也。食止ニ有レハ、押ス藥故ニ即チ逆テ吐ス、押レテ降レハ、大便ニ下ル、此劑ヲ可用。惡心腹痛食滯ニ妙アリ。夏ノ間ハ、感冒食滯スル故ニ、氣草卧有テ、虛ニマキル、也。然レモ惡心腹痛スルカ内ノ有餘也。實也。心下按而痛ハ、決メ實也。

○心下スキテ臍下痛ハ虚痛ノ類或冷疝也飲食ノ部治法可參考。

嘔吐

○嘔吐有標本蟲積惡心嘔吐者吐本也吐止則安腹痛或吐血嘔吐者吐者標也。

○一男五六日嘔吐不止三醫用藥無効嘔吐彌甚而冲上于咽喉絶入不能言不動手予診脉緩非死症癰症或痰積之類三靈用之能受之而氣正後又烏沉湯加乾薑三靈兼用頓安○一男三日卧床頭痛嘔吐不納食晝夜不能眠時々謔言二醫以脉數謔言為傷寒而用藥不納藥則吐汗潤吐逆三日不受食予問其因三日ノ前臍邊腹痛有之氣力不快二振舞二

行其前一兩日勞役ス予以為謔言ハ勞役故也不受藥ハ蟲疝氣ノ類也感微風勞役而食又滯吐甚而虵蟲動シタル也三靈不受之不换金正氣散加香附子檳榔子茯苓柴胡煎服能受之食氣出テ吐止去柴胡四五貼而起床如起死回生之効。

○嘔吐不止者不换金正氣散加香附子乾薑淋出ノ有數効○壯婦陰瘡ノ内ニ嘔吐不食為蟲積為痰不已予問婦平素好甘否婦曰此前六味丸煉藥能應スト予以為是好甘性也ト思テ異功散倍甘草人參一分入レ用之嘔吐頓止六君子湯ニテ陰瘡退ク。

○老婦頭痛甚而嘔吐ス嘔吐スル時脊中ヨリ木力メキ逆

血
湯
人血書夜

揚耳言

卷二

三

上ノ嘔ス。數方無効。平生好ム味ヲ問ニ。好甘故ニ沙參異功散ニ。甘草ヲ少シ多ク入。生薑乾薑ヲ少加テ。吐止頭痛安シ。○如前吐スル症。必脉弱進。或緩或微弱。溫藥辛キヲ用テ。不受異功散中。和スル劑ニテ止ム。一マ、有之。

○一婦人去年産ス。五月ヨリ經不行。帶下氣重。初冬患時疫。口舌乾。不時嘔吐ス。殊ニ未申時嘔ス。予以為虛火泛上ノ時。逆上ノ嘔スル也。八物湯適中。

○赤水玄珠。仲景陳皮湯。乾嘔手足厥冷者。治宜辛散。陳皮四兩。生薑八兩。水七升。煎三升。溫服一升。下咽即愈。

○一男晝夜十七八行。似痢。嘔吐惡心。不食吐虵脉五動。二陳湯合平胃散。加檳榔子。瀉止食進。

○嘔吐惡心。口舌乾燥ノ吐スル者。脉虛スル者。人參大劑ヲ得テ止ム者アリ。人參麥門冬為主而可用之。

○嘔吐惡心。因燥痰者。六味丸加貝母麥門冬。或加酒炒黃柏。酒製知母。頓止者アリ。燥痰者。服半夏天南星則却テ嘔吐ス。

○吐不止。藥氣ヲ惡ムニハ。決メ三靈ヨシ。

○婦人痢五六十行。吐而不納藥。三靈用之則吐ス。予平素好ム味ヲ問ニ。酸ヲ好ム。因テ醋ヲ煎シ。其氣ヲカバセテ。用三靈則受之。而不吐。醋ヲカバセザレハ。又吐ス。故ニ醋ヲカバ

セテ二三貼用之。以後醋ヲカバセザレ氏能受テ食進而安。

○壯婦吐而不受藥。湯モ又吐之。予常ニ好ム味ヲ問ニ。好鹹。因テ塩湯ヲ鹹シ。一二口與ヘテ。三靈ヲ與レハ受之。始ノ間

是耳談

卷二

三

八、塩湯ヲ間々與ヘテ三靈ヲ用。後塩湯ヲ止テ能受藥テ安。
○有蟲而吐之。或腹痛スルハ平素好ム味ニテ可知。好酸ニ
ハ梅干或ハ醋。蜜柑或柚。或九年母柘榴ノ類也。好鹹ニハ燒
塩塩湯ノ類。其上三靈或陳皮半夏茯苓生薑或不換金正氣
散加香附子茯苓乾薑ノ類。好苦辛者乾薑黃連二味可也。好
甘者芍藥甘草或不換金正氣散加芍藥甘草或異功散理中
湯或飴砂糖ノ類。好苦者退蟲丸淨府湯消痞湯椒梅湯ノ類。
是予力工夫也。仲景理中湯安蛔ノ意ヨリ思ヒ付タリ。
○吐逆腹痛因熱者散火湯。或小柴胡湯加芍藥炒。
○乾嘔吐逆吐涎沫半夏乾薑散主之。半夏乾薑等分。右二味
許商散方寸匕。漿水一升半。煎取七合。頓服。

○病人胸中似喘不喘。似嘔不嘔。似噦不噦。心中憤々然無奈
何者。生薑半夏湯主之。半夏半斤。生薑汁一升。右二味以水三
升煮半夏取二升。內生薑汁煮取一升半。小冷分四服。日三服
夜一服。止停後服。

○乾嘔噦若手足厥者橘皮湯主之。橘皮四兩。生薑半斤。右二
味以水七升煮取三升溫服一升下咽即愈。
翻胃 附膈噎

○翻胃噎膈脉滑數者間々愈。予以為滑ハ真陽不虛脾胃ノ
氣不虛也。數ハ熱也。痰或胃熱ニ因テ為之故ニ順氣和中
湯或不換金正氣散加香附子茯苓黃連或竹茹可也。三
靈煎用テ可開胸。

○靈樞上膈篇二蟲為下膈ト云フアリ。蟲症ニテ翻胃嘔吐
噎膈ヲナスハ。脉必帶緩。脉靜カナル處有テ。必竟實也。不食
スレ氏。心下塞。按而痛。或脉ニツヤアリ。是ヲ實トス。不換金
正氣散。加香附子。茯苓。乾薑。或三靈。惣ノ蟲ヲ治スル心得。其
好ム處ノ味ヲ聞テ。好ム味ノ藥ヲ用レハ。蟲シヅマル也。蟲
ニサカラヘハ。吐不止也。勻ヲイヤガル蟲ニハ。不換金正氣
散。三靈ノ類。傷寒吐蛔ノ治法。或嘔吐蟲積ノアリシライ。考テ
可治療。

○平人食餌。胸ニツマリ。或胸中痛。或食下ル。屈曲シ。氣力
ヨク。脉緩ナルハ。真ノ噎膈反胃也。不治。連々ニ衰テ。一年モ
過テ床ニツキ。後ニハ足跗浮腫ノ死ル也。脉病テ人不病ハ

死ス。必竟脉緩ハ。真陽ノ虛也。溫補スル脉也。反胃噎膈痰ア
リテ。參附熟地ノ類ヲ不受。故ニ不治也。此脉ヲ得ル者ハ。必
死スル也。脹滿ニ此脉アリ。人病テ脉不病。脹滿ハ。間々參附
薑桂。白朮。丁子ノ類ヲ受ル。有ル故ニ。十ノ一二治スル。一
モアリ。受補ト不受補トノ違也。何モ真陽ノ虛也。
○反胃噎膈ノ屬ノ不食ハ。不好米穀モノ也。老人ノ不好米
穀ハ。此幾ヲ見テ。燥痰ヲ潤ス。

○今見不食者ニ。因痰者多シ。十五六ノ男。七十日程。不食米
ノ餅。團子ナト少シツ。食シ。或ハ鮓ヲ煮テ能食ス。此男非
蟲也。全ク痰也。

○婦人患癰而後不食米。食麥小麥。或酒バカリニテ。經一年

後豆腐ハカリヲ食シタルアリ。痰症也。蟲症ニモ如此アリ。

○凡吞酸噯氣、咳逆、饅雜皆痰也。其內濕痰、燥痰ノ異アリ。燥痰胸膈ニ滯テ、脾胃ニ熱ヲ生ル故ニ、反胃噎膈トナル也。真陽自減メ、下焦ニ火アリ。故ニ大便燥結メ、下塞リ、腸胃ノ傳送違テ為之也。胸膈ニ集ルハ燥痰或痰血也。痰血ハ十ノ一二治スル理アリ。

○心胸ニ滯ル痰血ノ目當ハ、傷寒痰血ノ論、其外痰血ノ治方ノ論ナド可參考。是ハ上焦ニ鬱滯シタル痰血ニ、痰ミトイ、食ツマル也。

○反胃膈噎不食ニ、三靈陳皮茯苓煎湯ニ用。

○痰血胸中ニアリ、食ツマリ時々大便黑澹ハ、桃仁枳殼大黃甘草。

○蟲有テ噯氣吞酸、咳逆饅雜、反胃噎膈ヲナス間々アリ。是ハ脾胃ノ虛ヨリ不發故ニ、顔色ノ様子ドコヤラ能處アリ。連々ニ見クラベテ、蟲ヨリナスカ、痰ヨリナスカト云フヲ可知。蟲ハ蟲積蛔蟲ノ論ニテ可知。

○反胃噎膈ハ、滋補ノ劑ハ泥テ難用。人參ハ燥痰ニサワリテ難用。然レ氏真ノ保養ト云ニ至テハ、不治トスレ氏治療ノ助ハ、異効散、六君子湯、加貝母黃柏當歸、或六味丸、或滋陰至寶湯、異効散、加竹瀝薑汁、兼用、食甚支則、不換金正氣散、加宿砂檳榔子、或三靈ナトアレ、ライト、可保養、非蟲非痰、非痰

血一補陽一補陰ノ心得ニテ治療スル也。都テ大病ハ病人ニハイワズ親族ノ者ニ、ムツカシキト云フヲ聞セテ療治スベシ。

○順氣和中湯。痰火腹痛、餓雜嘔吐、噯氣吞酸、反胃噎膈、其微發者可治也。

呃逆

○内傷門ニ述之。不時怔忡、氣沈陷、如乘舟車、無腹力、肩項強、頭額重、眼上如蒙物、易驚、不時頭眩、頻飢、人ト語テ疑惑ニ物事氣ニ掛ルヲ多シ。如此症、陽虛濕痰也。人參劑ニカト不應者多シ。五厘一分ノ人參、快ハ可也。如此症、不時咳逆アルヲ多シ。胸ヨリ出ル也。或左積ヨリ、腹ヲ押シ上ル様ニテ、咳逆

スル者也。腹ヲ引シメル様ニテ、搐スル様ナル意ニテ、咳逆出ル也。正氣天香湯合二陳湯平胃散間々三靈用之。或烏沈湯合二陳湯平胃散、蟲ヲ煎ルニハ、加丁子。

○吐蛇蟲ノ症、咳逆多シ不苦、不換金正氣散、加乾薑香附子、或黑炒乾薑モ可也。三靈用之間々有効。

○一男吐瀉霍亂、轉筋、咳逆不止、自利、脉進無力、上氣溫補不効。小柴胡湯合溫膽湯用之頓止。

○霍亂吐瀉、手足厥冷、自利、脉虛微、咳逆者、附子理中湯、參附湯可也。得補手足溫者、可治。得補煩燥悶乱者、不治也。虛中有實者、不受補可參考。

○咳逆不止ニ、烏梅肉用テ止タルアリ。

○咳逆ノ症、脾腎ノ氣雖衰、根本有元氣者ハ治ス。元氣虚憊ノ者ノ咳逆ハ不治。故惣テ治病ハ此症必竟死症カ。不治ノ症カト云處ニキツト意ヲ付テ、虚實ノ本ヲ考ヘ知ルヲ上エトス。

○虚實ヲ知ルト云ハ、脉有力カ、無力カ、心下按テ拒按カ、不拒按カ、以是可知。心下不好按者實也。

○虚人ノ相、面頸筋ニ見ル、也。耳ノ根肉スキ、兩頬肉脱落テ、老タル面色有テ、色蒼、眼睛弱シ、是日日ノ切磋ニテ、自ラ手ニハル、也。此症ハ死症、此症ハ可治症ト云程ニナクテハ、功者トハ云レヌ也。工夫ヲ費シ見覺ル時ハ、二十年ノ内ニハ可如ト、大丈夫ノ意ニテ、志弛ミナキ時ハ、自テ生死

トクト可分

噎氣

○噎氣ハ、俗ニ云ヲクビ也。必竟胸膈塞テ、上ル氣ツカユル故也。痰也、蟲積モアリ。

○一男、俄ニヲクビ多出テ不止、食頃ニ止。如此晝夜ニ四五次モ發ス。心虚痰鬱ノ症也。痰積冲上スル故也。咳逆スルモアリ。治法、心虚痰鬱ノ格可也。

○痰火ニ因テ、噎氣スルアリ。諸書痰火ノ治法多シ。何レノ道ニモ、胸ニ塞ル物有テ、下ヨリ冲上スル也。熱上冲故ニ噎氣スルモアリ。或脾胃虚冷ノ胸滿スル故ニ、折ニ噎氣出ルモアリ。虚冷ノ者ハ、雖有噎氣不甚。

○不換金正氣散加乾薑茯苓或加宿砂或三靈ヲ用先和ノ
置テ見ル中ニ何レヨリ發スルト云ヲ見テ可加減不可攻
擊

吞酸吐酸

○男子平素有痰有胃熱有持疝無故而吐黃水是持病也枳
宿二陳湯此方常相應也今不應予不換金正氣散加吳茱萸
薑炒黃連香附子茯苓用之能應去吳茱萸加茴香能安

○吞酸俗ニ云スヲクビ也ヲクビニ酸キ物出テ或ヲクビ
ニツレテ清水ヲ吐アリ第一痰症又ハ蟲積ニモ多シ不換
金正氣散加香附子茯苓乾薑或三靈

○水逆受氣吞酸饒雜ノ類病門ハ分テアレ氏必竟枝葉也

根元虛實ヲ分チ痰力血虛力蟲積カト云處ヲ見定メテ可
施治也

饒雜

○俗ニ胸コゲルイレルト云フ也必竟痰症也蟲積ニモ有
リ血虛ノ痰アリ相火兼痰モアリ

○文蛤貝年久物焼テ為末用可也名降火散婦人瘀血能消
ス經水滯則煎湯藥用之能利小便秘方也

○家秘散辛螺ノカラ能焼テ醋ヲ少シカケテ打碎為末饒
雜又ハ痰痛胸痛ニ妙アリ常ノ腹痛諸藥不効ニ用テ妙アリ
蟲症ニ饒雜アリ蟲症蛇蟲ノ論可參考

○饒雜ノ主方ハ何レ氏痰ヲ退テ有熱ハ二陳湯加竹茹黃
芩

連痰飲門可考。

○前ニ云反胃膈噎咳逆噯氣吞酸皆痰也。濕痰燥痰見合セテ可治療治法皆同。

諸氣

○氣不順流而鬱スル故ニ氣鬱ノ症アリ。ズラノト煩テ胸ツカエテ不食シ寸脉有力テ溢スルニ順氣降氣可也。

○世間ニテ氣鬱ト云者ハ心虛痰鬱ノ症ヲ云故ニ皆分心氣飲二十四味流氣飲或ハ三和散ノ類不効故ニ予心虛痰鬱ヲ別ニ門ヲ立テ置ク也。俗ニ氣鬱ノ症ト云ハ先心虛痰鬱ノ症ヲ考テ其格ニ合ヘハ心虛痰鬱ノ治療スヘシ。

○氣鬱ト云テ降氣順氣ヲ第一トスル症ハ寡婦室女或實

症ノ男子事心ニ不叶鬱ノ氣塞ルニ可用也。生質心虛痰鬱ノ症アル者ハ勞動ニツレテ其症發スル也。根元心ノ虛ヨリ發テ氣不行故ニ分心氣飲三和散二十四味流氣飲ナト不効也。

○實ノ氣鬱ト云ハ心本ヨク生付タル者ノ心ニ懸ル有テ心モ氣モ鬱スルヲ真ノ氣鬱ト云也。

○天性ノ心ニハ虛實無之氣質ノ性ニ弱ク生レ付タル者アリ此症痰ヲ兼タルカ癰症ノ類カ或ハ癰ト不見メ根元其風アル也氣質ノ性弱キ故ニ氣ヲ自由ニスルナラズシテ因事易驚怔忡氣沈陷如乘舟車物事心ニ懸リ獨居ヲ好ミブラノト煩フ是カ心虛痰鬱也心虛ト云名ヲ立サ

レハ氣ヲ分テ解スル一ガナラ又故ニ心虚ト云名ヲ出シ
タリ志ハ氣ノ帥也志虚ト名付テモ可也志ハ心ノサニ向
フ處ナレハ意ノ發ル頭也志虚氣虚又可也

○夾虚者十六味流氣飲氣鬱者三和散烏沈湯正氣天香湯
九味清脾湯去草藥加陳皮香附子或二陳湯合三和散如此
症必有神効莫他求能順氣者沈香木香烏藥降氣ハ枳殼香
附子

青筋

○青筋ノ症俗ニ云ホリ草也ト云半井家ノ傳也國ニヨリ
テ名可違頭痛眩暈心アリテ胸ツカエワク／＼トスル時
肩脊中ノ内ヲ見レハ黑赤ク細カナルモノアリ其處ヲ

針ヲ以テホレハ黑血出ル也黑血出ル時ハ氣清クナル也
或腹痛手足冷ルニ如此ノ黑血ヲ出セハ腹痛止ム

○必竟瘀血有テ攻心也是ヲホル故ニホリ草ト云予未タ
決シタル論ハ考サレ半井家ノ傳ナル故茲ニ記ス

○惣ノ腹痛諸藥不効者惡血ヲ散シ消毒スル意ヲ以スヘ
シ諸瘡ナトニ成ニト欲シ惡血心腹ヲ攻ルト可心得痘疹

ナト毒氣内ヲ攻レハ腹痛惡心スル也風ボロセナト外ニ
出テ痒ハ惡心腹痛止ム也是モ惡血ノ浮キタル力風濕ニ

ツレテ發シ或内ニ入出沒スル也如此理ヲ以可察輕重
○半井家青筋腹痛ニ四物湯加紅花

○手捻散回春痘門

是事炎痘當屬時腹痛不屬其痛着在中腕乃熱

毒凝滯瘀血作痛也。牛房子。

白芍藥。

桃仁。

大黃。

各一錢。

紅花八分 桂枝五分 右剉一劑。水煎。溫服。一服立愈。

○惡血腹痛。輕者。消毒飲。甚者。合四物湯。加紅花肉桂。

○霍亂ノ部ニ委中ヲ刺テ出血ト云フアリ。或喉痺ニ刺少。

商穴出血ノ屬。ホリ草ノクラベニナルヘシ。少商ノ穴ハ手。

ノ大指ノ爪際也。

抄正

卷二

四