

提耳談

三

提耳談卷之三

鼓脹

○婦人腹脹呼吸促迫足漸腫夜不能偃卧咳嗽虛里之動如春脉數按而無根中腕ノ上袋ノ物ヲ入レクハリタル様也。是非積聚也呼吸促迫ノ中腕ヲイキツム故ニ氣ニテ脹リ。凝テ不行也肉桂附子白朮乾薑甘草與二貼少安用之中又泄瀉ノ呼吸益促迫食少虛里之動彈手脉進無力補中益氣湯加乾薑附子車前子四貼瀉止少快食未進異功散加附子乾薑車前子數貼而思食四五十日用之腹脹減足腫退全愈。

○予診腹脹十之七八因脾腎元陽之虛也不宜柴平七氣流氣七清淨府分心氣退積實脾分消之類也脉按而無力者或緩遲皆元陽之虛也人參附子乾薑肉桂白朮之類君藥也桔梗紫蘓為臣沈香丁子宿砂白豆蔻為佐可也

○腹脹脉遲緩而不苦食凡如常者元陽之大虛也脉遲緩者元陽之虛脉也腹脹而無苦者可知元陽之大虛也予腹脹者通利ノ見ルニ又跡カラ如故予若キ時萬億丸モ度々用テ見ルニ不効是不知其病因故ニ通利シタル也退積分消流氣共ニ無効者也脉緩按而無力者皆元陽ノ大虛也陽氣不足ナルニ順氣スレハ彌氣消スル也小便不通ハ陽虛而氣不下行故ニ不通ト可知

○脉浮沈共ニ有力而數面色不憔悴而不食者間々實アリ是ハ因疝因濕因食因積因血之類也此症ハ不多也多ハ虛症也故ニ誤之也

○鼓脹ハ先腹脹ルヲ久而後手足ニ腫氣出テ後一身腫脹ス水腫ハ手足面部ヨリ腫テ後ニ腹脹也水腫ハ輕ク鼓脹ハ重ク鼓脹多ク因積聚因蟲因痰因疝者難治虛症ハ必脉緩也溫劑ヨロシ或溫補ス

○積聚ハ脉緩溫劑ヲ以積ヲト口カス意也脉滑數者ハ易治ト覺ユ清熱ノ可ナリ

○蟲症有熱者淨府湯去胡黃連合平胃散或柴平湯消疳平胃湯無熱者肺疳方平胃散

○疝氣ハ易治。蟲ノ治法モ可也。暑月有熱者。加減香苓散。脉無數下焦虛冷者。烏藥沈香宿砂白朮附子乾薑肉桂之類。加通藥。

○鼓脹因痰發。咳嗽脉虛數無力者。火動也。不治。實症ノ痰ハ瓜蒌枳實湯。加水通車前子燈心之類。

○鼓脹水腫ノ類。因濕者。滲濕湯。加燈心或肉桂。

○撞關飲子。入門鼓脹門。治脹滿。用此衝開關格。使氣通而滿自消也。烏藥一錢香附子一錢砂仁八分三稜白豆蔻

甘草各五分丁香各二分沈香各二分水煎。或為末服。是氣積蟲積鼓脹ノ劑也。予以為虛脹滿ハ。人參附子烏藥白豆蔻沈香丁子肉桂ヲ用テ愈。香附子三稜ノ二味有蟲積者可用之。虛者難用。

予見脹滿ニ多脾胃元陽ノ虛也。人參附子沈香丁子肉桂烏藥宿砂白豆蔻乾薑ノ類可也。得溫而氣行。氣不利則小便不利也。通藥ノ類此劑ニ加テ可也。氣弱者溫藥ニツレテ不通ハ氣不行。

○腫脹ノ症不食。施治ノ後食少シツ、進出ルハ可治。初發ヨリ能食スル者アリ。從腫氣減而食漸々減スルハ胃氣弱。不可治。萬一人參劑應スレハ可治也。

○鼓脹自腹腫而及足腫甚症アリ。虛冷危症ヲ。大溫劑ニテ間々治タリ。人參白朮附子肉桂乾薑丁子車前子甘草生薑

右人參ハ三分或五分一匁。附子肉桂乾薑ヲ多ク入レ。丁子ハ五粒。一貼四五錢ニ調合ス。或先人參三分外ノ藥三匁五

分程ニ調合シ。一番煎ハカリニテ晝夜一貼用ルモヨシ。一婦此劑一年用全愈。強ク腹脹リツメテ不能偃臥ニ。此劑能應ズルヲアリ。此劑ニテ他醫ノ治療盡テ必死ト思フニ。十一一二本復スルヲアリ。人中鼻下ノ腫臍凹ニ。足心三ヶ所腫ルハ大虚也。不治。一ヶ所二ヶ所腫タルハ。右ノ大温劑應スレハヨキ事アリ。三ヶ所共ニ腫タルハ。不治。

○有蟲積而腫タルニハ淨府湯加車前子有熟ニヨシ無熟ニハ肺疳方合平胃散其妙不可言疝氣ニモ妙也

⑬中濕ニテ腫ルニハ溫劑ニ加唐蒼朮或中濕ノ部可考。

○利水ニハ木通車前子燈心三味ノ内大ニメ一二味可用。

○腹脹咳嗽甚盜汗能食者有痰火脾胃弱脉數此症八不治

蟲積故二咳毛出儿八可治虛冷毛亦可治

○脹滿鼓脹同シ。腹ヨリ腫テ後手足ニ至ル。水腫ハ手足一
身腫後腹脹ス。男子下ヨリ腫ルハ虛也。婦人ハ上ヨリ腫ル
ハ不可治トアリ。此理好シ。

水腫

○老男年七十餘。自三月末足微腫。平素夏間兩足麻痺。今至夏腹脹。兩足腫麻痺。一醫為疝氣。用三和散加減。又一醫三和散加利水。藥兼用十全大補湯。數貼腫益增。予診脉實大也。無咳喘時。微咳。左心下按而痛。有塊。用分消湯。實脾飲。淨府湯。三和散。加水通車前子。葶藶子。或用葶藶木香散。腫彌增。陰囊陰莖共二腫大。呼吸促迫。病家為必死。六月土用之前也。小

鼓脹 消渴 鼓脹悶 水腫 水腫宜健 去濕利水

赤白氣
減水白苓散
起憎寒壯熱

水終日不通夜少通暑中少毛不通也予考之臍左邊一塊持疝也暑氣入膀胱故疝積動スル也疝氣夏月發スルハ暑入膀胱也加減香苓散思フニ通利ノ藥多而退疝ノ藥毛多是ハ理決然タリ必的中セント思テ用之三貼而心下少和シ六七貼而小便快利食氣出七月中旬腫悉退至九月壯健如素奇妙也至冬感風後咳不已加減香苓散ノ通藥ヲ去テ用ニ咳止全愈

○痢後腫氣數方不効問之腰下風疹出甚痒因之考之血熱而小水短少水腫也赤小豆湯用テ頓愈

○疹後血熱小便閉導赤散有妙

○一男小水淋閉以後不通龍膽瀉肝湯用之快通

諸氣
氣神心湯
氣鬱結四肢
水腫喘急
水腫
中治濕湯
水腫補中
濕利小便

○婦人小瘡良愈而後一身腫大小便澀少喘痰脉緩按而如無兩醫治療無寸効予診脉緩按而不鼓八真陽ノ大虛也附子肉桂乾薑木通車前子數貼而全愈

○男子七月發熱微腫漸々増腫面目四肢甚腫後腹脹脉關尺有力一醫治療無効予為疝為暑濕不効時ニ思フ有勞力以藥方之意治之而腫日々退テ愈今氣補心湯加黃連

○痘後水腫補中治濕湯數有効

○一婦去秋痢疾之中產今五月一身微腫脉進按而無力ハ解散加羌活防風肉桂澤瀉木通腫漸退又因食滯不食腫日増益氣湯加附子乾薑車前子木通少安四君子湯或異功散加附子乾薑車前子數貼而腫減十之四味噌汁進出食漸

多而腫減之。兼夕。時初ノ八解散之。加減ニ去人參。加沙參。腫日日退テ全愈。

○一男去秋腫脹。心下塞。腹時々微痛。瀉則腹脹少弛。瀉止則甚。如此翌年五月下旬。往而診。脉虛數而無力。自利。一身大腫。腹處々皮破而出水。蘸紙飲湯藥。死在旦夕。自去年衆醫治療。無寸効。予用一方。全愈。得起死回生之妙。初四君子湯。加附子。肉桂各一錢。丁子五分。沈香。烏藥。宿砂。人參各一錢。車前子。木通。他藥減半。自五月下旬。至六月下旬。瀉止而腹脹甚。而腹皮裂破出水。愈而後裂タル跡有七處。此様ナル大腫脹。至極大。切ノ時。此劑ヲ用タルニ。瀉止テ小便閉ソレニモ不拘。前ノ大劑調合ノ一貼ノ重サ。五匁ニシ。七月小便快利。八月上旬。

腫漸退去。秋步行セシ後始テ劑斷ス。後四君子湯。人參五分。加附子。肉桂。丁子。宿砂。至冬。稍步行。至春全愈。其妙難言。後又腫ル。時八味丸。加車前子。木通。倍附子。肉桂。能應ス。

○水腫ニ加減胃苓湯間々大効アリ。

○小兒ハ蟲多シ。蟲ニハ。洋府湯。肺疳方。虛冷ハ。白朮。茯苓。陳皮。乾薑。肉桂。丁子。車前子。或四君子湯。加附子。肉桂。乾薑。丁子。木香。車前子。燈心。

積聚

○紅圓子 治蟲積食積。或瘀血痛。予名建中丸。常用之。

陳皮 青皮

莪朮

三稜

各二錢

胡椒 八錢

乾薑 十錢

右糊丸

○安蟲丸

楊梅皮 十兩

胡黃連 二錢

胡椒 一錢

白朮

莪朮

各一兩 丁子 二錢 右糊丸
加味

○蟲積ノ症有熱者淨府湯去胡黃連加薑製黃連或合平胃散或柴平湯無熱者肺癰方平胃散可也

○惣ノ蟲アリライ可也無理ニ押付ル様子ル攻撃劑ソコ
ノニ不可用甚シキニハ隨テ和スル治療可也

○久年ノ積聚疝氣ノ類不換金正氣散加香附子茯苓乾薑或三靈或陳皮茯苓黑炒乾薑或香附子或萬珠湯加檳榔子和ノ可也即敗毒散去川芎合平胃散

○積或蟲大七氣湯モヨシ惣ノ積聚ハ和ノ食進ミ出レハ常ニ成ル故持病ノ積本ノ座ヘ歸テ安シ積ノ居處カワル故ニ變痛腹痛嘔吐スル也多ハ因食因寒因暑其感シタル

處ヲ去レハ自和スル也蟲積動スレハアシライテ和スル

治法ヨシ逆スル者ハ從之ト云意ヨシ蟲積共ニ治法同シ一處ニ考テ可治療三靈平胃散烏沈湯不換金正氣散加檳

榔子香附子或好辛苦ニハ乾薑黃連或丁子兎角病人ノイヤカル味ハ不應也五味ノ中常ニ好ム味ヲ問テ好ム味ノ

藥ヲ以テ和スレハ淡味ヲ好ニハ三靈ニ陳皮茯苓或不換金正氣散加檳榔子香附子茯苓或二陳湯合平胃散加檳榔

子ノ類ヨシ

○蟲積アル症虛症ニミキルハ也腹ヲ見テ可知心下塞左右ニ積或凝滯有テ拒按ハ實也或攻メ或和ス

○心下空虛積アレ氏臍邊ニ有テ石瓦ヲ袋ノ中ヘ入タル

様ナルハ大虚也。温補メ陽氣復スレハ積亦和ス。心下空虚ナルヲ弱キト云ハ陽氣如常ナレハ心下ニ物ヲ能置テ必竟元陽シツカリトスル人ハ下陷セヌ也。弱クナレハ物垂ル也。草木ノ枝老木ニ成レハ垂ル、也是自ラ元陽弱キ故也。其如ク心下スキテ無力好按或熱手心ニテ暖ムルヲ好ムハ皆虚冷ノ陽氣シツカリト張ラヌ故也。温補ノヨシ人參熟地黄ノツカエルハ温藥ニテヨシ。

○凡積聚疝氣無熱症ハ温和メ自ラ行ル也。温和スレハシコリタル物ハ氷ノ春日ニ逢テ解ル意也。腹脹ニ大温ヲ用ルモ其意也。温和ノ藥ハ白朮茯苓陳皮乾薑丁子肉桂或ハ白朮茯苓陳皮木香宿砂甘州或烏沈湯合平胃散或乾薑肉

桂宿砂ノ属不可欠。木香丁子良薑ノ類モヨシ。

○好苦者ハ實多シ。木香丸淨府湯不去胡黃連。

○蟲積ヲ知ルハ腹ノ虚實ヲ知ラ子ハナラヌ也。心ヲ付テ可治療惣メ腹ト脉トヲ定テ可見補藥應メ能成タル腹ト不受補腹トノ味或不治ノ腹或寒涼ノ應タル腹寒涼ノ中リタル腹脉ト腹ト能考テ可知其道ニ能心ヲ付テ見レハ病人一人ナラセハ夫ダケヲ上手ニナリ死症一人トクト見レハ死症ヲ知リ一日ノニ治療上達スル也。心ヲ不付時ハ次第ニ下落スル學者可用心。

五疸

○濕黃或因時氣胸腹發黃或暑濕發黃柴苓湯合平胃散去

損正言

損正言

三

肉桂加茵陳或有熱加黃連

○妊婦六ヶ月患久瘧愈後四肢面目發黃初秋也胃苓湯加香附子檳榔子又不換金正氣散加香附子茯苓檳榔子木通澤瀉有左積或加柴胡七八日ノ後黃少退テ瘧又發ス發日ノ朝入門胎前門醒脾飲子治子瘧子痢口淡及曾傷風冷兼治老人氣虛便閉少津液引飲厚朴草豆蔻各五錢乾薑四分甘草一分薑棗煎服用之寒熱出テ後或間日ニハ胃苓湯加柴胡黃芩枳殼數貼ノ後黃退テ瘧愈

○黃疸ノ脉ヲ見ルニ緩ニテ脉ニハ熱無之ト思フ様ナル者也小便必黃也紙ニ付テ見ルニ紙ソマル也

○黃汗ハ汗出テ衣黃ニソマル也濕熱ヲ分利ノ可也滲濕湯加黃連茵陳可也

○春末夏秋孟冬寒熱頭痛似熱病而不甚心下或左或右有積塊小便甚濁ルト云ナラハ後ニ黃疸ニ可成ト心得テ可也脉ハ熱ヨリハ靜ナル物也緩長也長ハ三部ニ餘リ長キヲ云熱脉也眼中黃ニ成テ夫ヨリ胸面黃ニ成リ不食スル者也必竟物ノ力上テ黃ニ成ル意也濕熱ニ蒸レテ麴ノ黄ニ成ル様ナ者也是皆濕瘟ト傷寒六書ニアル症也不知之人黃疸ノ部ニ治法ヲ求ム六書ノ茵陳將軍湯必用テ有効大便結スル也又自然ト瀉スルモ有リ是モ心下ニ凝滯有テ不好按ハ茵陳將軍湯ヨリ漸愈テ胃苓湯加枳殼茵陳又ハ淨府湯加茵陳ヨリ予度ニ得大功

○黃疸ノムツカシキト云ハ久病ノ後黃ニナリ不食スルハ惡症也黃疸ノ部見合テ可治療也茵陳將軍湯傷寒六書四卷目ニ出テ大黃茵陳山梔子甘草厚朴黃芩枳實生薑棗法加燈心也

斑疹

○血風斑疹血熱感冒也消風散敗毒散加蟬脫防風葛根ノ類

○血風斑疹不時腹痛脉緩宜溫散也八解散以沙參牛房子肉桂防風ノ類又一人以不換金正氣散加乾薑宿砂肉桂防風羌活用之頓安

○消風解毒湯同春鹿門陰虛ノ治方也血中ノ邪ヲ陽分ニ

引出ス意也故ニ血熱風邪ノ類時疫或疫痢ノ類邪氣客血分之時可用之予以醫案是ヲ見出ノ數得効

○斑疹ノ症壽世保元麻疹ト斑疹ト及萬病回春ノ治法可見合熱病裏症ノ時出ルヲ斑ト云ムツカシキ也頭粒有テ出ルハ疹也此類癰疹トモ云斑ヨリ輕シ表邪血熱ニテ出

ル血風斑疹ハ痒シ表邪血熱也猶輕シ工夫スルニムツカシキハ熱毒裡ニ入テ胸膈鬱身ニ村雲ノ如ク見ユルカ斑也必竟血中ニ熱アル故也裏熱ヲ退ル劑血熱ノ心得可也

黃連解毒湯ナト主劑也犀角牛房子ナト消毒ノ主ナリ

○消風化毒湯世醫心法防風黃耆芍藥荊芥桂枝

牛房子升麻各等甘草減半右剉細加薄荷葉七片水一盞

煎七分去渣溫服無時。予以為風疹麻疹表虛自汗腹痛而甚痒者可得効。

○斑疹ハ熱毒ニツレテ發スル也。熱病ノ中ニ出ル也。六書ノ論可見。壽世保元。麻疹ノ治法ヨシ。輕キ者ハ表邪ナル故ニ。輕シ血中ノ熱ヲ和シ發散スル也。

○表邪血中ノ邪氣ニハ敗毒散加紫蘇葛根蟬脫咽痛加射干牛房子。或柴胡弓歸湯加黃芩射干牛房子。熱不解ニハ清解湯。熱無之風ホ口セニハ消毒飲。倍牛房子。或柴胡弓歸湯。或消風化毒湯。或前胡湯加蟬脫防風牛房子。茯苓補心湯。去地黃加蟬脫柴胡。

○熱甚譫言發狂ハ防風通聖散。熱病麻疹治法見合テ可治。

必竟清血熱血中ノ邪ヲ去ル治法ヨシ。

○熱毒入ル一深ク一身如錦紋村雲ノ様ニ赤ミ有テ譫言アルハ發斑也。赤斑ハ十死一生トアリ。血中ノ熱ヲ清スベシ。黃連解毒湯合逍遙散。或犀角地黃湯。生地苓連湯ナト。六書。或麻疹部可見。合斑色紫。或黑色。胃爛也。熱毒甚而胃爛タル也。故ニ不治。紫黑ニナルハ其日中翌日中ニ心ヲ攻メテ死スル也。

發熱

○人參養榮湯回春發熱門。此劑眩暈心虛怔忡。或汗多勞役ニヨシ。

○發熱ノ諸症回春發熱ノ治法ヨシ。傷寒ヲ治スルニ發熱

神心湯
症因結
心經結

ノ治法可見合

○回春發熱門ハ諸症ノ發熱ノ條ヲ云テ方ヲ上タ也能見
テ發熱スル諸症ヲ可知子細ヲ付テ云時ハ虛火實火假火
ト云ノ類也或外邪客熱ノ次第ソレノ有ル也風寒暑
濕ノ發熱ハ客熱也虛ヨリ發スルニ腎火假火ノ異アリ主
熱ハ火症門ニアリ格致餘論ニ五藏生五火ト云ノ熱アリ
火ト云ハ別物ノヤウ也是ハ學者ノ熱ト云ヲ火ト子細ニ
云也譬へハ陽虛發熱ト云ヲ陽虛陰火ト云陰虛發熱ヲ陰
虛火動ト云實熱ハ實火ト云也陽虛發熱ニ假火アリ元陽
虛冷メ發熱スルハ必有微汗皆假火也肌表大熱アレ氏十
全大補湯益氣湯八味丸或附子肉桂乾薑ニテ熱去ル也

○夫補虛者可知虛實寒熱脉按而有力無力也知之則應手
而愈也虛而實者實而虛者以是惑有千里之誤也予三十六
七歲四十ニテハ多用瀉劑而連々ニ能合点ノ見ルニ元陽
ノ氣ヲ以人ノ生育ハ有ルヲ知ル故ニ寒涼ヲ過用セヌ
様ニ補メ不治者和メ治スルト云ヲ知ル和メ治スルト
云ヲ知ルカ功者ト云者也瀉劑ノ時節モ間々アレ氏過
用セヌヲ知ル也是本ヲ知ルハ元陽ノ過不及ヲ知ル故
也

○草木ノ花ヲイケテ置クニ根ヲ火ニテ燒ク時ハ花イキ
テ生意アル也是水中ノ陰氣バカリニテハ生育無之也又
草木ノ花ヲ石臺或鉢ニ置テ土ヲ能ク裁ルニ土乾キ

水ニテ浸シテ陰ニ置テミルニ必ス其葉シホレ痛ヲアリ
予此時ニ類經大寶論真陰真陽ノ論ヲ思出シテ右ノシホ
レタル草花ヲ日ニ當テ能程ニ温ムル時花葉氏ニ生意出
來テイツキリト成タ也是ヲ以真陰真陽ノ保養ヲ可悟
○鞠初メ新ラシキ時ハ氣能クハヅミテアルニ古ク成ル
ニ從テ軟ニ成テ中ノ氣小キ穴ヨリ漏テ沓入シテ次第ニ
シボム是内ニ氣ナキ故也俗ノ譬ニモ弱キ者ヲ沓入ノシ
タ鞠ノ様ナト云也

○世俗草醫此意ヲ不知ノ腎ヲ人ノ本ト云フヲ聞ハツリ
テ腎水サヘ滿レハヨキト思テ六味丸ヲ常ニ用ル是寒涼
ノ藥也熱有テ陽勝チ水乾ク時ハ潤燥ノ心得ニメ可也熱

無テ元陽弱キ者ハ却テ陽氣自衰ル也張介賓云春夏ノ水
土得之草木生意盛也秋冬ノ水土得之草木ヲ殺ス水モ共
ニ氷テ水ノ性モ亦死ス是土中ニ陽アルト陽ナキトノ譬
也是ニテ腎中ノ真陽ヲ可知腎間ノ動氣ハ真陽ノ根也
○元陽トハ腎中ノ温也腎中一身ニ是元陽ノ氣無之時ハ
生育ノ氣無之是腎中滿ルトイヘ氏此氣無之時ハ陰氣バ
カリニテ人ノ生ハ無之也

○人四十二及フ時ハ歩行モ遲キ氣味出來手足ノ働キ言
語氏ニ少キ時ト違フハ元陽ノ氣衰フ故也面色手足ノ甲
漸クシボミ皺ムハ元陽ノ氣自ラ衰ル故也漸ク陰痿ノ氣
味有テ少キ時ヨリハ房事モ怠ル心アルハ皆元氣ノ衰弱

故也。

○世醫類經ノ真陰真陽ノ論ニ泥テ偏ニ補陽スレハ生ハ有ルト一概ニ思フ者多シ是亦不知其虛實也如何トナレハ人ノ氣質常ニ畜熱ノ症アリ寒冷ノ症アリ有實症有虛症爰ニ泥ム時ハ偏ニ溫補ヲ好ム者也偏ニ溫補ヲ好ムニハ非ス元陽ノ氣ヲ亡サヌ様ニ可保養也故ニ其熱ヲ見テ寒涼ヲ用ルモ元陽ノ氣ヲ亡サヌ様ニ用ヘキ也。

○脉進ト云凡按而無力者元陽ノ虛ト可知遲緩弱虛ハ猶以ノ一也人ノ腹中溫熱ナル者也此溫ニテ食消化スル也此譬ヲ云時ハ湯釜ノ中ニ能加減ナル湯ノ沸テアツクニ且返ルハ熱也水ヲヨキ程ニサシテシツカリト能飲加減

ニ成タル力常也此意ヲ以テ可知。

○腎間ノ動氣真陽ノ本也十二經ノ根本ト難經ニ云タ也臍邊ノ動氣ハ常ノ人ヲ能見覺テ病ハ常ニ反スルヲ可知脉ト此腎間ノ動氣ト交ヘ知ヘシ脉虛微ニシテ既ニ必死ト見ヘ藥モ紙ニシメテ用ルモ腎間ノ動氣臍ニ收テ有ル中ハ可治ノ理アル也此時ニ虛實ノ違有ルト也。

虚勞

○上氣耳少鳴テ兩足兩肩サシコミタルク痛歩行スルニモ肩タルク兩頰赤ク脉少シ進ト云ヘ凡少緩ナル氣味アリ臍ノ上下弱ク動氣力サアリ二十二三ノ男或為火動則誤之也脾胃不和中焦不調也香砂養胃湯去人參或加之。

香砂養胃湯
回春飲食門

香砂養胃湯 回春飲食門 治脾胃不和不思飲食口不知味痞悶不舒 人參 白朮 茯苓 木香 甘草 香附子 宿砂 蒼朮 厚朴 陳皮 白豆蔻 薑棗水煎脾胃寒加乾薑肉桂

○吐血ハ滋陰至寶湯加阿膠論方回春婦人虛勞門ニ委シ夏月注夏病陰血虛者用之可也

○婦人經水不調連ニ身瘦ルハ血ノ源涸ル也血枯ト云勞症ノ漸也咳嗽出ヌ中ニ血虛調レハ可治トモアリ咳嗽出テハ不治也咳嗽アル時ハ心下スキテヒワノトメ食ヲ好シ食スレハ腹力モ出來又ハ好食時嘔吐出テ食スレハ嘔吐止ハ皆虛極也脾弱ク成リタル故也腹ニ重リ掛

レハ逆上ノ氣當分シヅメル也尤血涸メ時ニ瀉スルハ脾胃共ニ疲タル也咳嗽無之症脉モ緩ナルハ根元虛冷ヨリ發ル故溫補スレハ本復スル也腎中ニ燥火生メ下焦乾燥シ面色頸筋ノ肉衰ヘ其上ニ脾胃虛メ大便不調ハ相火在止真陽ノ氣虛スル也故ニ退火トテ知母黃柏ノ類ヲ用レハ脾胃ノ氣弱キ故ニ瀉彌多ク又脾胃ヲ調ント思テ補陽スレハ瀉止ニ隨テ脉彌進咳嗽増テ燥火盛ニ成ル故ニ難奈何故ニ不可治後ニハ足跗浮腫ス足跗浮腫ニヘテ十四五日廿日三十日ノ中ニ呼吸セワシク成テ肩息ニ仰キ卧テ居ルニ胸腹ノ衣ノ上ニ息ツカネ見ルハ死ニ近キ也○男子ハ色蒼白手足ノ色青白或額ニ黑氣見ヘ面色黑ニ

瘦テ耳根スキ頸細クナリ鼻ノフクラ少ク成テ兩頰ノ下ノ垂タル肉消スル故ニ頤ノ上スキタル様也是色脉ノ考也是毛血ノ涸タル故ニ無血色也

○男子年五十餘小便甚有沫為大虛數治不効漸瘦脉進目皆血筋アリ龍膽瀉肝湯四五貼ニノ沫退數貼ニノ愈不可不知

○男子年六十患渴今漸止後小便有沫而黃也經月不已脉沈數無力然有指下二滿ノ狀時々惡寒手足微痺為冷濕治之三貼而沫已 蒼朮 乾薑 當歸 茯苓 肉桂 甘草 生薑

○益陰腎氣丸 蘭室秘藏 此壯水之主以鎮陽光

澤瀉 人參各二錢五分 生地黄酒洗 牡丹皮 山茱萸 當歸酒洗

五味子 薯蕷 柴胡各五錢 熟地黄二兩 右為細末煉蜜為丸

如梧桐子大朱砂為衣每服五十丸淡塩湯下空心服

○固真湯同書一名正元湯 治兩丸冷前陰痿弱陰汗如水小便後有餘滴尻臀并前陰冷惡寒而喜熱膝下亦冷 升麻 羌活

柴胡各一錢 甘草炙 龍膽 澤瀉各一錢五分 黃柏 知母各二錢

右剉如麻豆大分作二服水二盞煎至一盞去渣空心稍熱服以早飯壓之

○予按火極如水不可不知前二云小便有沫者一冷濕一肝火一命門火衰也

○勞咳ノ症傳屍ト云テ父子兄弟ニ傳ルアリ予力醫談ノ

勞
火
湯
吐
痰
汗
動
湯
更
動
湯
益
汗

辨耳論

卷三

七

問已發ノ火ニテ可知父子傳ルハ其弱キ氣ヲ受テ生ルハ故ニ同症ヲ煩テ死スルト見ヘタリ勞蟲有テ傳ルト云說アリ古方專ラ勞蟲ヲ殺ス治方ヲ舉タリタニ力ニ勞蟲ト云一モ不見丹溪ハ勞蟲ノ說ナシ然レモ勞蟲ト云一モ有ルト見ヘタリ父ノ氣ヲ受テ生ルハ故ニ同病ト云一モ有勞蟲有カトモ見ユル也兄弟一家病ハ類症也

○主方滋陰至寶湯或異功散加當歸貝母酒黃柏或七味白朮散加當歸至寶湯兼用ル時ハ異効散ニ當歸貝母前胡ニテ黃柏ハ不入也至寶湯ニ有知母一補陰一補陽ノ意也

○滋陰降火湯清離滋坎湯虛勞門ニ有レモ不宜也其理醫談未發已發之火ニアリ此兩劑ハ喘急痰喘或熱病客熱入

腎テ為火動者ニ可也腎一藏熱アルニ用テヨシ脾腎二藏熱有テ弱キニハ難用生地黄知母黃柏皆寒涼ノ劑ニテ胃氣ヲ又傷ル也

○蟲積ノ痰映勞症ニミギルハ脉ツヤ有テ不甚細カナレモトコヤラ緩ナル意アリ顔色モ勞症ノ顔色トハ違フ淨府湯肺疳方ヨシ蟲積ノ部可考婦人ハ經水絶ルハ決而勞症也

○常ノ婦人經水絶ルハ胎孕力或瘀血不行故ニ腹脹也是ハ水ノ流ルハ末ヲ塞キタル故ニ經水滯テ腹脹也破血順血ノ劑ニテ經行夕時ハ愈也勞症ノ經水絶ルハ本血涸レ少キ故ニ絶ル也故ニ何ヶ月經水不行ノモ腹ニ脹不見也

提耳論

卷三

七

○微咳有テ微寒熱ス前醫補劑ヲ用為勞咳或俗ニ勞症ニ成ニ云症脉力ナ有テ緩ナル味有テ脉ドコヤラ来去ニ潤アリテ心下按而為痛不好按心下ニ付テ鬱積アルハ蟲積也寒熱モナシ咳モナク食ツカエルト云或惡心腹痛アルハ蟲症也此症得大効タルアリ心下ノ虛實ヲ以テ可_レ知熱有_レハ淨府湯常ニ去胡黃連薑製ノ黃連ニ代ヘ用_二サノミ熱ナク虛冷ノ様ニ見_二ルハ肺疳方合平胃散加蘇子杏仁或白朮茯苓陳皮木香宿砂甘草或白朮茯苓陳皮乾薑肉桂丁子蘇子杏仁蟲ノ部可參考或淨府湯人參一分或五厘入_レテ吉

吐血 吐衄 咳咯 嘔瀉 便

○并陽除濕湯

一名調經升麻除濕湯

東垣十書蘭室秘藏卷中曰治女

子漏下惡血月事不調或暴崩不止多下水漿之物皆由飲食不節或勞傷形體或素有心氣不足因飲食勞倦致令心火乘脾其人必怠惰嗜卧四肢不收困倦乏力無氣以動氣短上氣逆急上衝其脉緩而弦急按之洪大皆中之下得之脾土受邪也脾主滋榮周身者也心主血血主脉二者受邪病皆在脉脉血之府也脉者人之神也心不主令包絡代之故曰心之脉主屬心系心系者包絡命門之脉也主月事因脾胃虛而心包乘之故漏下月水不調也况脾胃為血氣陰陽之根蒂也當除濕去熱益風氣上伸以勝其濕又云火鬱則發之

活各五 蔓荊子 七分

防風

炙甘草

升麻

藁本

各一 柴胡 錢

當歸 酒洗 獨

血小便赤
血虛也
不通

羌活 蒼朮 黃耆 各一錢五分 右剉如麻豆大 勿令作末 都作一服 以潔淨新汲水 五大盞 煎至一大盞 去渣 空心熱服 待少時 以早飯壓之 可一服而已 如灸足太陰脾經中血海穴 二七壯 亦已 予按治血崩下血帶下泄瀉久不止 此方升提下陷之劑 也 小便不通或淋痛者 加車前子 木通

○衄血不止 韭葉ヲ曲テ入鼻中頓止 韭氣中二通スト見ヘ夕リ惣ノ吐血二モ可也 古方ニ常用韭汁止血

○痰血咳血 滋陰至寶湯加阿膠

○茯苓補心湯 衄血二有效 方論 陰火逆上者 滋陰降火湯 滋陰至寶湯之類

○傷寒衄血八 小柴胡湯加黃連為藥 或黃連解毒湯或涼血

熱之劑選用之

○吐血陰虛火動者難治 加味道遙散至寶湯加阿膠之類

○俄ニ吐血者過酒或力業ナトスル者痰血滯テ吐スルハ可治

○心虛痰鬱ノ症吐血咳血脉帶緩者アリ惣ノ火氣不動者可治也 心虛痰鬱ノ症ノ咳血ハ皆治ス

○柴胡弓歸湯下血少熱アルニ可也 無熱者胃風湯加防風 便血ハ萬珠湯加防風 因風者可也 因濕者滲濕湯加減而可也

○止血ノ藥黑炒乾薑阿膠升提ニハ防風升麻川芎

○脫血後ハ物湯可也 或四君子湯加當歸川芎或安榮湯モ

目之脫血後ノ治方ハ產後脫血ノ治法可ナリ。

①止血ニ壯婦ノ亂髮ヲヨク油氣ヲ去黑燒ニノ用ニ衄血ニハ鼻ニ毛ヲ入藥ノ中ヘ加テ用ニ妙也。

吐血之工夫

吐血咳血ノ症心虛痰鬱ノ症アル者ハ不苦瘀血アル故也。必竟火不動故也。癰症持病ニアル兄弟父子血脉相續者吐血ノ治スル者多シ。癰病ノ兆アル者モ不苦是亦惡血アル故也。

○咳血清咳湯ヨシ潮熱加柴胡赤茯苓方回春失血門

○咳而吐鮮血胸痛其前胸凸腫以後胸痛而吐血予以為胸裏腫處破而為咳血也。今吐血五七合許甚危然脉帶緩一味

配劑而久服復常當歸生地黃阿膠黃連貝母黑炒乾薑甘草
○丹溪曰口鼻出血皆是陽盛陰虛有升無降血隨氣上越出上竅法當補陰抑陽氣降則血歸經。

○衄血涼血行血為主犀角地黃湯加鬱金丹臺王案 治怒氣諸血門

傷肝積熱不散鬱於經絡隨氣湧泄為吐血衄血便血等症并各經宜加減錄後生地黃犀角牡丹皮赤芍藥各二錢加童便半盞空心服心經血加麥門冬黃連肝經血加青皮黃芩脾經血加白芍藥百合肺經血加百部根天門冬山梔子腎經血加知母黃柏玄參青蒿膽經血加柴胡竹葉胃經血加葛根大黃心胞絡血加茅根牡丹皮大腸經血加地榆槐花小腸經血加山梔子側柏葉木通膀胱經血加茅根牛膝三焦經血加地骨

皮連翹吐血不止陳棕灰炒黑荆芥穗蓄血不消加大黃桃仁或灸大椎及啞門穴二三壯

○人參飲子治衄血人參黃耆各一各半麥門冬當歸芍

藥甘草各一各半五味子九粒水煎

○古今醫統諸血門麥門冬飲子治脾胃虛氣促氣弱精神短

少衄血吐血麥門冬當歸芍藥紫苑各一錢人參黃

耆各八分五味子九粒甘草五分右水二盞煎至一盞食後溫服

○黃芩芍藥湯治鼻衄黃芩芍藥甘草等分水煎不

能飲食衄血加黃耆

○吐血四物湯合參蘓飲

○理中湯治飲酒傷胃遂成衄血人參白朮乾薑

兩各一葛根炙甘草各半

○一方氣上奔吐血心膈痛枳殼三枚青皮二枚桔梗生

地黃木通牡丹皮各一各半川芎黃芩黃連各一各半桃仁十二

个甘草少許生乾薑分四劑水煎服

○兒年五歲小便澁少甚赤其母云燕脂ヲ解テ用之故二小

便色赤之予以為是俗也服赤汁而小便赤ノ理ナシ夫赤者

濁而重是渣滓者大腸二至リ清者至膀胱也為尿血可治之

脉也白朮茯苓猪苓澤瀉芍藥山梔子燈心用之

○三四年以來吐血三四度而今胸痛身瘦脉虛而進左有力

右弱胸苦有咳決而勞症也然三年不死者若瘡毒ノ餘毒力

瘀血力卜可思也用一方內二痒牛物處々二發又連進而安

當歸茯苓為藥甘草桃仁貝母牡丹皮射干桔梗酸棗仁也即清呖湯之變方也。

○小兒下血大人亦用之小兒撮要黃連製吳茱萸後見血者四君子湯加吳茱萸製黃連是八黃連吳茱萸等分拌浸湯蒸之吳茱萸黃連氣交之時去吳茱萸更用黃連或去黃連用吳茱萸。

○下血先便後血者此遠血也黃土湯主之。金匱要畧又主吐血衄血。甘草 白朮 乾地黄 附子 阿膠 黃芩。各三兩

竈中黃土半斤右七味以水八升煮三升分溫三服。

○下血先血後便者此近血也赤小豆當歸散主之。方見金匱要畧狐惑

○病者脉數無熱微煩默默但欲臥汗出初得之三四日目赤如鳩眼七八日目四眦黑若能食者膿已成也赤小豆當歸散主之。赤小豆三升浸令芽出曝乾當歸右二味杵為散漿水服方寸匕日三服。

○蝕於下部則咽乾苦參湯洗之蝕於肛者雄黃薰之雄黃一味為末筒瓦二枚合之燒向肛薰之。

○婦人年五十三四年時胸悶亂數方不効桃仁肉桂大黃三味用之頓止發則投之而止三四年之後五月胸痛甚而吐血一升餘脉虛微如死手足厥冷冷汗惡心嘔吐人參白朮累炒黃連當歸川芎阿膠甘草用之翌日去人參快而手足溫以後三四次吐血半碗許宛氣絕前劑且安神散用之四五日

之後吐血思上圍頻而下血一升又絕口渴白朮茯苓黑炒乾
薑葛根沙參甘草用之或沙參安榮湯六味丸沙參異功散加
當歸川芎如此保養一年而病除全愈吐血甚而絕則人參五
厘用之止則代沙參此婦貧窮也若富家而多投入參則却不
可治吐血盡而思食經日而食益進而形肥
○吐血後有惡心或有嘔者瘀血不盡也アワテ、用人參大
劑補住スレハ瘀血殘リ後腫脹不食而死有嘔者ニハ不換
金正氣散加香附子茯苓黑炒乾薑或沙參白朮茯苓黑炒乾
薑甘草ヲ用血症ニハ去生薑辛者走血ト云フアリ
○吐血盡後心下弱脉絕者獨參湯有嘔則不可用之
○吐血數升則頓死吐血鮮血則死如死而脉虛微者十之一二

有生之理滑緊數必死

○吐血一二碗而後咳嗽出日日寒熱盜汗有ハ勞咳也不治
○咯唾血回春可考此症不多唾血ハ腎ヨリ出ス鮮血隨唾
出咯血モ自腎出ス咯出血屑此二症ハ不多予未見之

○吐瘀血而有嘔ハ不盡也不盡ハ後腹脹スルアリ或不
食腹痛經日而死故ニ有嘔ハ瘀血ノ殘リヲ可順人參少シ
アミライテヨシ五厘或一分或人參不入劑ト可兼用去瘀
血ノ劑桃仁肉桂大黃弱者去大黃加枳殼人參劑ハ四君子
湯異功散或理中湯ニ黑炒乾薑人參ハ一二分或三分有嘔
者ハ不換金正氣散加香附子茯苓黑炒乾薑

○惣而血分ヘカ、ル藥ニハ生薑ヲ不入破血心ナラハ可

入生薑

○吐血吐血ナト少シツ、有ル症脉緩ニテ肥人或婦人ナ
ラハ心虚痰鬱ノ症ヲ可考心虚痰鬱ノ症ハ痰血ヲ吐ハ不
苦火動カヌ故也吐血咳血諸血ノ症下焦ニ火動ハ難治也
兎角熱有テ血ヲ見ル症ムツカシ、熱アレ、實ナレハ間
間可治也

○婦人俄ニ吐血スルアリ、經水行ル時ニ氣逆スル有
リ或因怒氣逆上吐血スルハ錯經妄行ト云テ不苦然レ
久不已時々如此ハ為虚怯當歸芍藥川芎生地黃黃芩山梔
子牡丹皮犀角阿膠茯苓陳皮麥門冬右水煎用
○婦人吐血スル多シ脉緩ハ不苦順氣行血スヘシ

○過酒ノ男ハ有瘀血故吐血ノモ不苦多シ吐血鮮血ハ自
熱發スムツカシキ也吐血ノモ脉緩不數氣力能ハ不苦
○衄血甚者鼠糞ヲ鼻中ヘ入ル、妙也

汗症

○汗不止者陽脫也宜大補十全大補湯異功散益氣湯四君
子湯獨參湯必用之劑也加附子肉桂或桂枝江府ノ醫汗不
止ニ用入參大劑而一身ニ溫粉ヲヌル者アリ醫書大全ニ
溫粉ハ汗多不止ニ白朮川芎藁朮白芷等分為末每末一兩
入米粉一兩半和勻用粉周身撲之

○黃耆建中湯脉弦氣弱自汗四肢發熱或大便溏泄或皮毛
枯槁髮脫落等之症並治之

黃耆 肉桂 芍藥 各三 甘草

二兩薑棗錫少許

○大汗不止脉進弱温補不効者六味丸加知母黃柏黃耆人參益氣湯加知母黃柏

○夫虛冷已陽者温補也又腎火有テ表虛ノ者ハ表氣調ル劑ニテ不効下焦ノ火鬱ヲ清フスル時ハ上ノ蒸ス氣減スル也湯ノニハ上ルヲ水一ツニツサシテ退テ表氣ヲ收ル意可也傷寒汗多諸論ニ此治法不見

○暑ニ中ラル者汗多シ甚者ハ人參黃耆ヲ主トス

○逍遙散ニ加防風黃耆而風熱之後汗出易キ者ニ可也此劑ハ和劑也暑病ニハ酒炒黃柏澤瀉ナト加ヘテ清暑益氣湯ノ變方ノ心得ニテ用ルモ佳也

○盜汗三四年不已醫用黃耆建中湯加龍骨牡蠣三貼用之汗不止ト云氏小便多通醫曰小便多者汗必止之兆也四五貼之後汗頓止

○盜汗風寒暑濕ノ外邪ニ感シ熱漸去ル時食漸進テ盜汗出ルハ餘邪胸中へ睡中ニ集ルニ因テ出ル也此ハ吉也食進ムニ從ヒ盜汗ニ因テ餘邪悉ク去ル也虛症ノ盜汗トハ違フ也

眩暈

○氣虛或產後ハ四君子湯加當歸川芎或陳皮

○氣虛而兼痰者六君子湯加天麻砂仁沈香或烏藥生薑

○眩暈ノ症ハフツト立時家ノ中グラクト力ヘル様ニ

テ足ノフミ處ナキ様ナルカ眩暈也氣虛濕痰或血虛燥火
アリ
○心虛痰鬱ノ者多シ是ハ眩暈ノ外ニ怔忡氣沈陷如乘舟
車心細ク驚安シ是ハ痰有テ心氣ヲ塞ク故也怔忡スルハ
胸ノ上ニ手ヲ置テ寢入レハ夢ニヲソワル、意ニテ心ヲ
覆フ故也眩暈門ノ治法トハ違フ大同小異ノ意也
○氣血虛弱而眩暈者何モ補劑ノ中分寒熱而可撰用
○婦人非心虛痰鬱而眩暈者十五味安榮湯佳也
○愬而惡心嘔吐ノ眩暈スルハ心胸塞ル故也不虛心下按
而不好按ハ不可用補食傷ナレハ吐テ愈惡心アルハ惡心
止則眩暈モ止也

麻木

○麻木ハナヘスクム也中風麻痺同類ニテ可治療

○因寒濕者ハ五積散

○手足麻木脉緩虛冷者加味大補湯可也

○痰ニテ氣不順ノ者ハ二陳湯加當歸川芎烏藥沈香宿砂

木香薏苡仁牛膝或肉桂此方中風半身ノ者ニモ佳也

○一身ナヘスクム者中風ニ同シ手足モ不動十指子ジレ

タル様ニテ不動アリ予數人ヲ治メ神功ヲ得タリ或手ハ

叶テ足不叶アリ痿躄スルアリ此症冷濕ニ感シ或濕熱ニ
感入二三年腰ヌケテ如此回春ノ滲濕湯ノ加減妙アリ如
此症溫劑應スルハ他醫モ可治他醫ハ必溫劑ヲ用ル也中

濕ト云ニ眼ヲ不附皆虛冷ト思ヒ中風ト思フ故不治也唐
蒼朮ヲ主トスル也濕症身體重痛手足麻木酸軟腫痛或
枯細痿弱筋脉拘攣ニ陳皮宿砂甘草白朮唐蒼朮茯苓當歸
芍藥生地黃木香肉桂牛膝黃芩防風羌活也蓋風能勝濕也
此劑有妙人不知之一身ナシビレテ久臥床不起者前醫
參附ノ類用之不治脉ニドコヤラ進ム心有テ下焦微熱ア
ルニ此劑妙也地黃黃芩ノ二味下焦ノ濕熱ヲ清フシ蒼朮
濕ヲ去リ無熱虛冷ニハ去地黃黃芩加人參附子熟地黃不
泥者ハ加熟地黃回春中濕ノ部可參考

癰癤

○輕者未發之症名心虛痰鬱見前畧可見合內傷

○男子驚則有物而冲上心下絕入或噁氣咳逆數聲怔忡如
乘舟車氣沈陷手足微搐發甚則搐亦甚此劑應而治 正氣
末香湯合三陳湯平胃散加檳榔子或烏沈湯合三靈振出藥
右交用之

○清心導痰湯 治痰火諸癰又能治狂氣而有妙予悟之夫
患狂氣者平素心虛夾痰者多是癰症也氣質之稟虛而有痰
者患之治法同之或熱病後濕痰恰似竹筴溫膽湯之症而不
治者間々得効予常加減之癰發絕入沈香檳榔子二味淋藥
脉滑數帶熱者可也無熱者去黃芩黃連山梔子加烏藥沈香
宿砂痰燥者去南星半夏加瓜蒌仁貝母或去茯苓加茯神或
去黃芩黃連山梔子加白豆蔻可也熱輕者可加黃連一味

○眩暈怔忡如乘舟車氣沈陷無腹力項強如欲絕是癰之輕微而未顯也予名心虛痰鬱治法別記之大概正氣天香湯合二陳湯平胃散或二陳湯加紫蘇桔梗枳殼前胡天麻烏藥三靈清心導痰湯熱痰者本方可也燥痰者去南星半夏加瓜蒌仁貝母去黃連黃芩山梔子或去黃芩一味十五味安榮湯○調理ハ香砂養胃湯可也或用人參或不用○癰症發スル中ニ手足搐搦止ム時面色唇黑既ニ死スルト思フ顔色也見テ居ル内ニ氣味アシキ者也然レ氏脉力サ有テ手ニサワリ動氣腹ニ有故ニ不死脉力サアリテ腹ニ動氣アルハ死症ニアラス○過酒或虛人癰症度々發スル中ニ心氣忙然トノ不正問

ヘハ言不問ハ不言ウツカリトスルハ心脫ノ類也如此ニ成テ度々發スル中ニ次第ニ發リ様輕クナリ其間ハ困睡シ發スル後ニ汗多出テ諸虛アラワルハ死症也脉數無力動氣在胸中ハ不治也

○癰症絶入不語ニ沈香人參一各或五分用之淋藥ニノ後煎服有痰加竹瀝薑汁

○心虛痰鬱無腹力食ニ急ヤ咽喉塞ル様ニ覺ル婦人七味白朮散有妙

○癰症死スル様ニテ不死ハ有實故也陽氣常ナル故ニ不死也故ニ面色脉動氣引合テ可考面色ハアシキ物也○夾虛者清心抑膽湯癰症屬氣血虛兼痰火者用之

○中風不語去香附子用心虛者以歸脾湯不効者可也

○癰疾甚喜笑言語錯亂妄見妄言登高罵詈黃連解毒湯加

半夏竹瀝薑汁

○癰症無熱動氣靜者沈香天麻湯

○按心虛痰鬱ト名付タル症其症易驚因事疑惑氣沈陷而

心如絮如死而危ク物事心ニ懸リ手足戰慄怔忡フツト起

テアナタコナタへ歩行メ心氣如醉心ニ氣力メケ大息シ

如乘舟車頭重眼胞如覆物肩ツマリ無腹力食ヲ急キ腹少

シ痛ハ痰也胸脇為痛不眠多夢咽喉下有如梅核或指ノ大

サノ物吐不出嚥而不下咳逆數聲或噫氣頭痛或右或左眉

稜骨頭痛ノ後頭腫ルモアリ咳血或交唾出見血則怔忡頭

眩手足スクミ或十指屈伸不自由惡心動ノ熱シ或ゾツト

寒久耳鳴動氣逆上眩暈人多集ル中へ出ルト必發ル也此

症ヲ病人ニ一ツ二ツ云時ニ脉ヲ見テ外ノ事ヲ此方ヨリ

問ヘハサテモ吾心ノ如ク也ト云也病人ノ方ヨリ此症ヲ

二ツ三ツ云ニ依テ知ル也肥人ニ多シ顔色アホウノ様ナ

ル男婦ニ多シ惣ノ物事氣ニ懸ルト云病人ニ此症多シ尤

眩暈心アルト云ニ此症ヲ問ヘハ能合モノ也此症三四五

七備ルモアリ悉備ルモアリ此内二三症ヨク成テ外ノ二

三症出ルモアリ兎ヤ角ト保養スル中ニ病氣ヲ忘ルト能

カナル也此症ハ死セザル症必能可成ト云テ治療シ藥ハ

ソロノメクル物也ト云テ可治

婦人門心虛痰鬱初中後安榮湯人參三五厘入煎服主方
中因症見合テアシライテ投之回春梅核氣ノ部加味四
七湯ヲ用ルモアリ正氣天香湯合二陳湯平胃散三靈或
二陳湯合三靈或二陳湯合烏沈湯平胃散有熱動氣強キ二
八清心導痰湯或三靈加陳皮茯苓黃連或七味溫膽湯加黃
連或茯苓補心湯去熟地黃加天麻南星或二陳湯加紫蘇桔
梗枳殼前胡天麻南星モヨキ也十五味安榮湯人參五厘入
テ煎湯ト交用振出ニスルモアリ三度振出ニ後煎服ニ
緩リト保養ノ後六味丸加砂仁正氣天香湯合二陳湯平胃
散兼用ス振出ノ用モアリ或半夏白朮天麻湯モ用ユ
健忘

○健忘ト云ハ今云タルヲ忘ル也久シキ事ハ覺テイ
ルモノ惣ノ連々物忘レスルニハ歸脾湯或加味歸脾湯可
也

○中風健忘或不語因痰者溫膽湯回春痰飲門神不守舍ト有テ

○歸脾湯加味歸脾湯回春健忘門本方ハ心虛勞役ニヨリ心虛
痰鬱ニハツカユル者也

怔忡驚悸

○怔忡ハムナサワキ也驚悸ハ驚テサツトスル類也皆心
虛ノ有痰故也溫膽湯或歸脾湯ノ類可也人參養榮湯モ吉
○傷寒熱過半退キ寢入ラントノ不熟睡怔忡驚悸シ易キ
是

1多シ加味温膽湯可也酸棗仁ヲ用テ十分ニ寢入レハ氣
草卧止テ心穩カニナル故ヨロシ

○心虛痰鬱ノ症可參考

虛煩

○虛煩ハ胸イキレ胸中ニ熱アリ有痰火故ニ胸中アツク
苦悶スル也熱病後有痰火者虛煩多シ或血虛ノ人病後ニ
血液乾燥ノ胸中熱シ口舌乾眠ルル少キ類虛煩也津液乾
テ虛ノ有熱ヲ虛煩ト云也熱病後或痢病後ニアルヲ見テ
可知病氣ノ末ニ發スル也自初發非有虛煩ノ症血氣虛而
ノ上ニ有熱ヲ虛煩ト云也產後血虛老人ニ此症多シ温膽
湯加黃連或加當歸主劑也八物湯六味丸煎或滋陰降火湯

清離滋坎湯滋陰至寶湯ナトノ心得可有也氣虛或虛冷ヨ
リ發テ濁症上熱胸煩口舌痛ノ類アリ是ハ假火ニテ相火
實火ノ類ニ非ス脉必浮虛緩弱遲或虛數按而無力或細其
腹好温暖是ヲ以假熱ヲ知皆温補ノ熱自退也假火相火實
火ノ辨ヲ見テ可知也

濁症

○濁症有寒熱虛實下焦濕熱ノ者多シ夫ハ脉少進齒痛或
斷爛齒齒或小便ニ蟲ナト交リテ出ルモアリ小サキ蟲也
齒痛下焦ノ濕熱ヨリ發ル故也

○小便ヲ溜テ見ルニ如膏糊アリ虛冷陽虛ノ者ニ多シ是
ハ水中ニ無氣レハ水不清也氣不下行故ニ小便久シク溜
是

リテアル故ニ濁ル也可補氣補腎也

○腎中有火モアリ有濕熱モアリ六味丸加知母或清心蓮子飲

○婦人有帶下者ニ多シ下焦有濕熱故也先濁症ハ濕熱ノ者ニ多シト可知帶下亦同

○男子年二十五白濁自幼不愈遺精或白濁中ニ小蟲多ク下リ陽事不起下累之

遺精

○遺精甚者或夢遺以韭子一物為丸如梧桐子大卧ニ臨テ一粒用之為妙人不知之隨症方用之有効

○治夢遺清心蓮子飲 治婦人帶下夢遺或男子濁症夢遺

白濁或心虛煩熱手心熱小便赤者上熱者加知母黃柏

○遺精ハ覺ナク精漏ル也漏精氏精漏氏云也

○夢遺ハ夢ニ婦人ト交合ノ精漏也一夜ニ二三度モ夢精スル者アリ心熱多者ニ多シ腎中ニ火有テ如此モ有リ濕熱アルモアリ虛冷陽虛ノ者ニモマアリ皆下焦虛冷陽虛ノ治方多シ温補ノ却テ多キハ下焦ノ濕熱力心經熱アル力腎中火アルカト可知

○男子如心虛癆鬱三年前正氣天香湯合二陳湯ノ類用之漸ク收ク以後大便一二行ツハ不調ハ味煎用之夫ヨリ味噌汁不進ハ味丸ヲ服スレハ夢遺多シ一醫人參少シ入劑ヲ與テ腹中調フ然レモ不時痔痛斷爛或齒浮キ痛ミ味噌

汁三年不好大便時々不調或心下支へ色蒼々八味丸ヲ服
スレハ夢精必アリ脉五動弱予以爲八味丸ヲ初メテ服メ
惡心氣味有テ味噌汁ヲ不好者蟲症也齒浮痛斷爛者濕
熱也下焦ノ濕熱ヨリ蟲モ生シ今八味丸ヲ服スレハ夢精
必有ル者濕藥故也濕劑ヲ服スル時ハ腎中濕熱ヲ動スル
故夢精アリ也下焦ノ濕熱ヲ去リ蟲ニヨキ劑ヲ用テ人參
加ヘタラハ其根元アラワルヘシト思ヒテ消疳湯ニ人
參五厘入テ用之テ夢精止ミ味噌汁二年目ニ食メ食彌進
テ本復ス其根本ヲ知ル時ハ藥必適中スル也故ニ初テ知
ル夢精ハ下焦濕熱アル者ニ間々有リ補氣補腎ノ劑ニテ
不動ハ可重シ也故ニ記之

○虛冷ハ十全大補湯並氣湯加附子肉桂四君子湯加附子
肉桂八味丸煎人參養榮湯久溫補而不止者六味丸加知母
黃柏或滋陰降火湯滋陰至寶湯溫補而不愈脉緩長ハ下焦
濕熱アリ清心蓮子飲或清心湯

○男子年四十衰中惡寒右脇大振ノ邊時ニ變ス故右ヲ數
テ不能卧毎ニ左ヘ卧シ氣塞々不時漏精或夢遺數腎溫補
與人參而不効服人參則上氣耳鳴故不能服服則腹少脹臍
右邊至脇腹長而如掌之小予以八味丸料爲湯與之兼用家
傳連年丸六十日漸安如常氣力稍好病減十之七而今有遺
精白濁隨氣力之健而漏精多予去肉桂附子宿砂而與之經
白而安此男交而後在七日無漏精然交則頭重倦陽事舉

而後暫而漏精多。是命門之水火俱虛。而命門之真火衰。相火稍動而生也。予之所謂火與元氣不兩立也。今得八味丸料。而氣力稍健也。然以桂附之熱。增所生之火。故似有氣力。而實者有火勢。依火勢而陽事舉。氣動其水。故漏下。隼不堅固。而小便頻數之屬。不能久持。臍下也。以六味丸消所生之火源。而不能動其水。水靜則堅固而不漏也。氣。八風也。如水中。有波。因波而精漏也。且以六味丸久服。則少火之氣衰。衰則加宿砂肉桂附子之屬。或後以六味丸。或異功散。加當歸。加人參少許。一補陰。一補陽。而可使陰陽如權衡也。

淋症

○諸淋。脈弱。少。凡。淋。痛。有。之。小便赤澀。五龍膽。瀉肝湯。予以散。

方試。凡。二。不。効。瀉肝湯。八。淋。妙方也。人不知之。

○虛症。八。淋。六味丸。加車前子。或八味丸。加車前子。

○淋病。多濕熱也。有肝熱。故。二。成淋多。故。二。實症常。八。淋。二。

八。瀉肝湯可也。或。小柴胡湯。加生地黃。龍膽澤瀉。通用亦可也。是半井家之秘方也。

○虛症連綿。凡。淋病。二。八。六味丸。虛冷。二。八。八味丸佳也。

○疝氣。下焦有濕熱者。間。有。之。三。和散。加山梔子。木通。

○淋痛。小便閉。瀉肝湯妙也。數治不効者。得大効。

○淋症。八。此劑皆有神功。婦人經行。時。淋痛。スルアリ。桃仁肉桂。大黃。ヨ。痰血行。テ。痛止也。セウ。力。チ。ト。云。モ。淋病。ノ。俗稱也。虛婦。セウ。力。チ。ト。云。二。利水。ノ。劑。ヲ。用。テ。欲死。タルアリ。

益氣湯ニテ治シタリ。是下焦虛冷ニテ無力。小水不快利ノ痛故也。溫補ノヨロシ。人參ニテ下焦ノ氣カラ得テ。行ル故ニ宜也。

遺尿

○小兒遺尿ニ

人參八分

白朮

黃耆

山藥

芍藥

酒各一錢

山茱萸

酸棗仁

各七分

甘草

四分

水煎服

○同症灸穴

天樞

氣海

五樞

腰眼

腎俞

大小腸

俞各三十壯。

○遺尿ハ下元虛憊也。諸病氏ニ連々小便遠ナリ。或閉或澀。リ後一度遺尿ヲ見セハ。不治ノ兆ト知ル也。惡候也ト可知。下焦ヲ守ル氣無也。獨參湯主藥也。

○熱病發狂ノ中。自然取ハズレテ遺尿スルハ。一次遺尿ノモ。又重テハ覺ヘ有ル也。非獨參之症。

○婦人熱病。不知小便出。七日。十全大補湯。益氣湯。或ハ人物湯。八味丸。用之。不効。咽喉痰塞。煎湯不通。脉力サアリ。三靈ヲ用テ咽喉開ケ。食進出テ後愈タリ。予是ヲ見ル。

○熱病疲テ。循衣撮空。摸床。全無性ノ時。脉虛數。或細數者。先可問遺尿。遺尿アル者。必死ト可知。萬之一。獨參湯。十全大補湯ノ類。應セハ治ス。

○何病氣ニテモ。連々ニ疲テ。後ニ遺尿スル者。不治也。○中人以下。或獨居而。他人ニタスケラレテ卧者。小便兩夜不通。三日而小便通ス。色黑赤。是動作ニ懶ク。他人ノ助ケヲ

憚リ忍小便也。色黑赤。不因熱ニ通スル。失期而色濁赤也。
貧賤ノ男婦或奴婢ナトニアリ。能閉能慮而可施治。

小便閉

○其母小便澀少。或時為痛。二醫治療二十日許。不効而彌閉。
夜半胸中動氣甚。小便不通。苦悶。心下二冲上。胸塞臍下凸。
腰下甚腫。脉六動。按而無力。或帶緩。是真陽ノ不足而氣不行
也。八味丸加車前子。為煎湯。又以附子肉桂乾薑木通四味。振
出シテ用之。小便快利。數貼之後。腫氣退而愈。水腫小便閉。真
陽虛者同治。倍加人參而可也。

○小便閉者。疝氣中暑。或是實邪ニテ不通者。按脉而有力ハ。
順氣通利ノ劑用之而安。

○汗下之後。或病後閉者。因元陽之氣衰也。是ハ臍下ハ張ル
勢ナクテ不通也。氣不下行也。故獨參湯。參附湯可也。輕者人
參附子肉桂乾薑甘草之類用之。又四君子湯加附子車前子
○老人感冒。咳痰愈而後臍下シコリ。小便澀少不通。食事氣
力能ク脉緩。予以為以人參升提ノ可治乎。以後人參ヲモ不
用。順氣升提ノ意ヲ以テ。自然ニ愈。升提ノ意ハ。桔梗防風黃
耆川芎木香ナトノ類也。然レ黃耆川芎白朮ノ三味ハ不効。
○一方升提ノ妙アリ。桔梗防風大ニシ。蒼朮茯苓陳皮羌活。
獨活枳殼白芷甘草。右小便閉。數治不効。八九日不通者。大効
ヲ得タリ。或積氣下墜シ。惣而諸症下陷スル者ニ可也。防風
桔梗羌活獨活ノ四味。能升提ス。世間ニ升麻柴胡ヲ以テ。升

提ノ主藥トスレ氏不効此劑得大効

○一醫小便不通或水腫數劑不効ニ羌活獨活桔梗防風前胡黃耆白芷甘草ヲ用升麻柴胡古來用レ氏無効升麻ハ却テ瀉ニ澀滯ス升提ノ神藥ハ桔梗防風黃耆也羌活能開テ順行ス獨活ハ羌活ヨリ弱ニ前胡能利胸膈下氣藥也白芷利水道ノ効アリ予是ニ問フ產前用白芷臨產ノ藥トス水道ニ行ノ理乎一醫云白芷利水ノ効有ルヲ知レリ產前ニ用ルノ理水道ニ引故也ト云故ニ升提スルニ桔梗防風黃耆羌活也

○婦人七八日小便閉悶亂數方不効得此劑而靜ニナリ翌日小便便利ス奇妙不可言

○三十七八ノ男小便閉痛難忍瀉肝湯二貼用頓通

○元氣虛ニ氣不下行者小便一日一度或不通然不思小便者多ニ大虛也獨參湯益氣湯四君子湯加肉桂乾薑八味丸之類佳也

○一男年五十臍凸小便則沫滿尿壺尾張之醫用人參熟地黃而無寸効自春至六月不治壯健而少疲一醫治之頓愈脉弱左眼眵一點血色赤是肝火也用龍膽瀉肝湯三十貼而愈此醫能知瀉肝湯之意婦人頭痛有妙婦人諸疾有熱治而不効者瀉肝湯佳也

○予按スルニ小便スル時沫立チ沫多者大虛也ト有リ十全大補湯六味丸八味丸參附ナト用ヒ來ル也然ルニ肝經

ノ熱ニテ沫立ツコアリ、不可不知、眼ニ血色アリ、惣ノ怒氣
アル者、決シ是也、

○小便閉、女ハ男ノ臍ノ緒、男ハ女ノ臍ノ緒ヲ割、煎用、忽通、
○小便閉、炒塩ニテ臍下ヲ温メテヨシ、葱ヲ割、ミホウロク、
又ハ鍋ニテ炒テ、臍ヲ温ルコモアリ、

大便閉

○脾約丸 方論畧之、

○大便閉結實者、枳實厚朴、大黃、桃仁、紅花、甘草、生薑、

○大便閉結虛者、七味白朮散、加當歸、枳殼、虛甚者、枳殼ヲモ
不可用、潤ノ可也、

○常ニ大便秘者、用桃仁潤大腸、用枳殼通之ノ意也、七味白

朮散加減佳也、

○食不進而大便不通者、進食ノ劑可也、食進出テ腹中潤ヒ、
ソレヨリ、大腸潤ヒ自通也、

○大便直腸ニ至リ、肛門ニツマリ難出ヲ、ツモノ先ニテ堀
リ出スヘシ、世俗ヨク知之、

○大便久不通、臍下ニ堅キ物有ルハ結糞也、心下スキテ弱
ハ、必不可下、陽虛也、胃氣弱而無力ノ不通也、食進出レハ自

潤テ通ス、食進出フ待ヘシ、七味白朮散、加當歸、枳殼、或脉弱、
ハ、葶氣湯、加肉桂、杏仁、或異功散、加桃仁、當歸、心下塞不好、按

者、桃仁肉桂、大黃有妙、痢後ノ者ハ、必腹痛ス、
大小便閉

○大小便閉者實症ハ可下大便大腸和ノ小便自通空桃仁承氣湯或枳實大黃湯急症ニハ可與神仙萬億丸小粒五七丸

○大小便閉屬痼者三和散加大黃木通山梔子胃苓湯加滑石大黃亦佳也

○大便結欲通不通後へ氣ヲ取ラレテ小便不通者尺リ用桃仁肉桂大黃枳殼紅花之類大便通則小便自通

○老人暑月腹痛大小便閉腹脹汗出脉虛數者多不治

痔漏

○痔大體ハ肛門中ニ物出来テ潰テ後愈也或潰テ下血スルアリ或不下血ノ愈ルモアリ羌活獨活防風桔梗枳殼蒼

朮茯苓柴胡甘草ノ類有熱者加黃芩或加黃柏大便結スレハ倍枳殼或加葛根當歸可潤

○蒸洗藥生地骨皮生黃柏如常煎洗之

○蟲痔ト云アリ入門ニ見ヘタリ取漏蟲法用黃活鱔魚一條擲在地上就其盤曲處以竹釘五七枚針穿以香油塗之覆瘡上遍布繫定良久覺瘡痛不可忍取鱔入水中覺蠕動有如線之蟲朱盡再覆如此者五六易復用乾艾煎湯入白礬三錢洗淨以黃連檳榔等分為末敷之月餘方愈膿瘡亦空

肝平胃散愈

○出痔痛甚石灰胡麻油ヲ以煉塗二時ニメ納テ步行ス

○蟲痔ノ治方失血ノ部狐惑ノ部ニモ有可參考

脱肛

○脱肛洗藥 地骨皮^生黃柏^生等分煎洗或溫蒸而洗之痔痛亦宜

○脱肛ハ肛門ノ氣緩故也升提スルノ意可也羌活防風蒼朮黃耆桔梗此類ヲ主トスヘシ虛ニハ可溫補因症ニ有熱モアリ

○產婦努力ノ脱肛出ルモアリ常ノ法可也產門洗藥モヨシ石灰十匁黃芩三匁為末布袋ニ入レ溫湯ニ浸シ痛處ヲ溫メ蒸ス心ニテ洗也產門ノ痛或破レ痛ニ妙也加阿膠大二痛ヲ和ク以昆布煮和以之按脱肛而送入之

諸痛

○病人藥ノ氣ヲ聞ク時ハ吐或惡心或全不食心下如盤胸膈塞ニ妙其功不能盡述 三靈右小兒蟲氣振リ藥ト云テ草醫傳之紅花ノ意味予亦不知之雖然用之有起死回生之功可信之

○治蟲ノ心得安虻理中湯ノ意ヲ可知治虻不可用甘草甜物蓋虻得甘則動於上得酸則靜見苦則安得辛辣則頭伏於下予常以是諸蟲積ヲシツムル意トス

○不可用甘物トアレヒ病人平生好甘者ノ腹痛或ツカニルニハ異功散或白芍藥甘草二味ナトニテ能止ム者アリ甘ヲ得テシツマルヲアリ

○某室痢晝夜五十行五日熱甚嘔吐ノ藥食ヲ絶シ白湯ヲモ不入衆工束手此婦平生風ヲ引テモ嘔吐如此ト云是故也噤口嘔吐ハ平日嘔吐ノ持病無者ノ痢ニ因テ胃口ノ熱甚故ニ嘔吐スル也。是ハ惡症不治也。常ニ嘔吐アル者痢ニ因テ嘔吐スルハ蟲積也。此婦藥キライ也。藥ヲ嫌フト云モ蟲也。是ハ物ノ香ヲキラウ蟲也。有香藥吐テ不受者也。予三靈ヲ用二三度用テ不受束手時予以為久藥方ノ治スヘキニ非ス。病家ニ云テ醋石ヲ度々カベセヨト云其間ニ振出し藥ヲ用テ見ラレヨト云則醋ノ氣ヲカヘセテ振出し用ルニ即能受之。二貼ニシテ食少進數貼ニシテ嘔吐止ム。是無香苦藥ヲ用ニ柴胡黃連陳皮枳殼車前子茯苓甘草右煎

痛時止
湯

服受之。三靈交用痢止食進得起死回生之功也。

○椒梅湯蟲症可也。

○吐不止婦アリ蟲ト思テ三靈ヲ用不効予問平素服地黃

丸テ應スルヲ有ヤト病人云六味丸應スト然レハ蟲ニ非

ス好甘症ノ必竟虛アリト思テ異功散人多一分入レ用レ

ハ止ム

○蟲症面色蒼白有瘦平生多惡心或度々吐唾或少腹痛面

見青筋食サリキライ多シ多ハ味噌汁ヲ不好如此症ニ痰

積ノ症モ間々アリ

○諸病不食惡心ノ者蟲症多シ大體好苦者淨府湯消疳湯

退蟲丸或為散

○虛症有蟲積ヲ補モ應スル症補中ニ好苦者アリ或虛冷ニノ苦藥難用者ニハ加木香可也

○虛症ノ蟲ニハ白朮茯苓陳皮香附子黑炒乾薑甘草ヲ用白朮ヲ去テモ可也

○辛ヲ好ム者ニハ乾薑ヲ主トスル也

○酸ヲ好ム者ニハ上醋ヲ與テ可也大根ナマス或醋味噌或煮梅或梅干モ可也

○甘ヲ好ム者虛スルニ異功散常ニ補脾散ナトヲ與ヘシ芍藥甘草湯モ亦妙

○虛症或虛冷ノ症ニ苦味ヲ用ルニ木香ナトハ香ヒ惡キト云者黑炒ノ乾薑可也

○仲景虢ヲ安ニ乾薑一味ニテ二色ノ味ヲ取タリ聖醫也ト覺ル也予此理ヲ悟テ三年腹痛不已脉弱者ニ陳湯加茯苓黑炒乾薑煎シ用テ愈

○好苦味カト問テサノミ苦ハ不好ト云アリ然レ氏不好甘者ハ好苦者多シ故ニ平素好葷薤ヤ不好ヤト問テ可知蟲症好苦者多ハトコロヲ好ム者也

○好鹹者ニハ鹽湯ヲ辛クノ陳皮茯苓二味或陳皮茯苓黑炒乾薑ナトノ散藥ヲ用ヘシ塩ノカラミニテ蟲退也塩湯バカリモ難用故陳皮茯苓二味何ノサワリナキモノ故ニ用之

○保童圓

蝦蟇一錢

青黛白朮

三棱各三木香七分

陳皮六分 檳榔子 黃連 莖朮 半夏 牛黃 甘草各三分

青皮 黃柏各五分 右十四味糊丸諸蟲諸疳有妙古河三歸方

○好辛苦者乾薑黃連或黃連下子右煎用之

○好甘者六味丸應スル者アリ

○紅圓子モヨシ即チ予力建中丸也積聚門可見合

頭痛

○婦人頭痛諸藥不効發時額上見青筋脉緩而弱者予二陳

湯加香附子頭痛頓已食進自愈

○頭痛或氣鬱滯者空家傳順氣散 香附子 陳皮 鬱金

各一分 川芎八分 木香五分 右為散或加細辛三四分亦可也

細辛能順流寒痰然凡兼熱者有香而反テシカユル也

○頭額甚冷而痛者痰也濕痰ニ多シ間々貝母瓜蒌仁ヲ用

ル燥痰ニモアリ正氣天香湯合二陳湯加天麻或ハ一方ニ

羌活獨活防風陳皮半夏茯苓甘草枳實天麻南星生薑此劑

ハ清心導痰湯去黃芩黃連山梔子タル也

○風邪頭痛者散風濕則汗出而愈

○頭痛多ハ痰也其内分濕痰燥痰而可治濕痰多ハ陽虛溫

藥或補劑或和劑燥痰多ハ相火可用潤劑

○頭痛疝氣ノ者多シ是亦痰疝ノ類也

○心虛痰鬱ノ者頭重カハリ物シタル如ク或不時頭痛ス

心虛痰鬱ノ治方可也

○頭痛八九日不已三四人頭ヲ押ヘ頭汗アリ眼赤足冷脉

清或
往來
不寐

緩上熱ス。八味丸煎用之頓止得妙。予二十六歲ノ時治或人。
○凡頭痛ハ上ル氣也。頭痛持病ノ者三十八九ヨリ自愈ル
者也。上ル氣衰ル故也。春夏ノ令ハ上リ。秋冬ノ令ハ下ル。是
天理自然也。四五十以後頭痛アル者多ハ痰火ニ属スル也。
或ハ實症ノ者ニアリ。四五十ヲ越テモ上ル氣不衰故也。俗
ニ云耳鳴心者ハ長命ノ兆ト云モ此理也。
○濕痰頭痛有熱者二陳湯加天麻南星細辛桔梗防風黃芩
山梔子妙也。

○產後頭痛脉微有力四物湯加人參半夏黃芩山梔子天麻
南星甘草。

○男子五十上熱頭痛如裂脉弦有力諸治不効用荊芥薄荷

牛蒡子川芎石膏甘草。

○頭痛不已六味丸加知母黃柏或加柴胡宿砂山梔子藟

二痛二八猶有効。

○疝氣頭痛二八三和散。

○熱病頭痛如裂謬語防風通聖散。

○產後頭痛不已惡風有汗者氣血俱二虛スルニ當歸白朮

茯苓熟地黃陳皮烏藥香附子黑炒乾薑人參黃耆甘草生薑

一片此劑回春調血飲去川芎益母草加人參黃耆也。

○頭痛時止時發難堪脉數人參天麻南星半夏黃芩山梔子

甘草或加柴胡是濕痰頭痛也。
心胸痛

○心胸為痛難忍烏沈湯入門心痛門

○輕心心痛奇効ノ方江戶下里玄格所傳二陳湯加山梔子蒼朮川芎

丹溪之方也

○木香調氣飲回春醫症門

○心胃痛屬蟲者使君子檳榔子二味煎用大効

○息ナヘド云類ニテ心痛スル者アリ是ハ必竟腹中ノ筋

子ガレタル様ナル類也伸欠ナトノ時脇攣急スルヨリ發

スルアリ二陳湯合烏沈湯加當歸川芎和スレハ愈

○有燥痰而引心下痛者六味丸加貝母蘊子宿砂

○心胃痛咳痰者或心胸常ニ痛者ニ若キ時瘡毒ヲ病者必

吐血スル兆也

○瘦人胸イキレ痛有ルモノ後膈噎ニナルモアリ四十

以後ノ者ハ必可有其心得其膈噎ニナル症ノ脉ハ緩ナル

者也

○胸蟲ト云アリ痰火痛ハ赤辛螺ノ燒末シタル佳也二陳

湯ニ加山梔子香附子用常ノ辛螺モヨシ

○蟲痛ハ三靈不換金正氣散加茯苓香附子檳榔子振出テ

用必不可逆是ニ從テ佳也芍藥炒甘草或陳皮香附子茯苓

黑炒乾薑炒乾薑甘草或小麥稈ノ黑燒ヲフリ出シ用ニ蟲

積門腹痛門可見合

○某男自左支胸痛發前思食然携食來一遲ニ故ニ俄ニ痛

甚頭汗脉緩手冷此前モ痛アリ予恐吐血先以九氣湯用之

三次痛同之烏沈湯加山梔子用之一次痛頓止

○胸痛上云二痰アリ蟲アリ痰血アリ蟲ハ蟲積門可參考

胸蟲痛難堪二芍藥甘草湯有效乾薑黃連二味煎服モ佳也

○心胃痛燥痰者多二陳湯加瓜蒌仁貝母枳殼宿砂有熱

則加黃芩山梔子

○因痰血者桃仁肉桂大黃可也

腹痛

○寒熱腹痛汗多痛難堪小柴胡湯加芍藥酒炒肉桂頓安甘

草少之多ク可入

○胸痛蟲ノ者回春云小麥稈去頭節為黑霜振出之用之時

有妙効持病ノ胸痛ノ者脊中或胸腹痛ヲナス者二用テ

亦妙也

○食傷腹痛枳實大黃湯加木香

○老人大便結脉五動按而弱平素有下血今止而腹痛晝安

夜強是下焦有火脾胃乾燥痰血結澁不和而為痛異功散

加當歸芍藥桃仁紅花間二用潤和散痛止

○虛人腹痛異功散加水香

○虛婦有痰積持病二風水口之時不出頭痛胸支腹

痛二陳湯合平胃散加紫蘇香附子當歸紅花用テ安之

○一女年九歲胸腹痛甚或發或少安十四五日漸瘦全不食

到危前醫消食退蟲或以人參補脾不効予診脉五動帶緩面

神未憔悴是可治ノ症也如浮腫為蟲症肺疳方用之未適

中少安或發夜ニ至テハ有微熱予心胸ノ間ヲ摩テ見ルニ
如白疹キ者出ル予以為胎毒ノ氣為痛歟胎毒ノ氣ハ痘ノ
毒氣ニテ惡血類也可考知故ニ平胃散加牛房子紅花丁子
少許振出し兼用ス痛漸止後肩胸ノ邊ニザラノトイボ
ノ如キ物生ス水膿ヲ以テ發出ス夫ヨリ痛全愈食如常主
方平胃散加牛房子紅花前胡羌活丁子少許與之胎毒ハ痰
血ニテモ無レ氏惡キ血有テ外ニ出テハ風ホロシナトニ
成リ或ハ小瘡ナト出内ニ在テハ惡心腹痛ヲナス也風ホ
ロシナト出テ痒キ時ハ内快ク外ノ痒去レハ惡心腹痛吐
逆ス痘毒ナト内ニアル時ハ腹痛惡心吐逆咽痛也是シ毒
氣トス毒氣ニ牛房子紅花ノ類能消毒ス痘ノ部可參考

○僧時時腹痛左支食後痛吐而止如此時發時止不換金正
氣散加香附子茯苓丁子頓止

○某室三四日以来風斑出痒シ自昨日風斑退吐逆腹痛不
止時又瀉數行如澁滯瀉之間遠則惡心甚一醫治療不受藥
予平胃散加牛房子紅花羌活肉桂蟬脫一貼為湯一貼振出
之用之吐逆腹痛頓止

○婦人腹痛用桃仁肉桂大黃紅花蒼朮厚朴陳皮甘草而大
半止而不全愈汗多脉弱香砂養胃湯人參五厘或一分加テ
全愈又一婦年四十三四經行以前甚腹痛右兩劑治法同ノ
久年ノ痼疾全愈

○某寺僧久年腹痛不止數貼用之全愈其方陳皮香附子茯

苓黑炒乾姜炒乾薑甘草予數人用之得効春中腹心胸脇痛者皆可也因症和スル意ニハ去炒乾薑而用黑炒乾薑也

○熱痛ノ者アリ散火湯可也回春腹痛門乍痛乍止脉數者火痛

即熱痛也用散火湯

○腹痛數劑不効辛螺殼ノ霜妙也

○一官人年六十肥滿六七年来少シ腹痛アリ燒飯ヲ食ス

レハ痛漸止故ニ官府ヘ行ニモ燒飯ヲ持也脉五動少進數

方不効予萬珠湯加山梔子痛漸安七八ヶ月用之全愈鬱痰

痛或血鬱痛ノ類火鬱者發之ノ意ヲ以テ得妙

○手捻散治瘀血腹痛回春痘門牛房子 白芍藥 桃仁 大黃

錢各一紅花八分桂枝五分右剉一劑水煎諸瘡餘毒或痘後毒

內攻腹痛者主之

○瘀血腹痛桃仁肉桂大黃當歸紅花甘草水煎急則振出ス

○腹痛予常用之食滯甚ハ加大黃有効枳實厚朴檳榔子木

香甘草生薑

○寸白蟲胸蟲腹痛生蛇一具殼實共二醋浸為霜用ル時醋

ヲ温テ右ノ黑燒ヲ入カキ立アワ盡ル時用之

○男子五十六熱病食進ニ出ル比食滯吐瀉ノ後蟲積動腹

痛難忍似欲絶脉數無力陳皮香附子茯苓黑炒乾薑炒乾薑

甘草右振出ニ用之頓止

○予始而知之仲景云以苦以辛之藥乾薑一味ヲ以テス炒

乾薑ハ辛ク黑炒乾薑苦シ能定蟲積夫虛弱有蟲積者難用

攻擊炒乾薑黑炒乾薑補陽ノ功アリ又退蟲積妙難言

○好鹹者之醫案予未徹予五十二歲始得此意好鹹者陳皮茯苓ノ丸散燒塩湯ニテ可用甚妙常ニ胸イキル者燒塩湯ヲ用テ愈ル理ト同事也

○婦人平生唇舌夜々乾持病胸蟲ノ如キヲアリ今上腕ニコリ時々攣痛ノ痛欲甚陳皮香附子茯苓黑炒乾薑中山梔子太用之痛止食進脉緩也ト云ハ氏長也動氣脊中ニ附キ有力熱アル症也惣ノ腹痛有寒有熱今テ可療治

○食傷腹痛吐瀉手足冷時絶脉虚微數方不効附子理中湯與之吐甚而吐青汁衆工束手一醫為熱薑製黃連枳殼平胃散黃芩ノ類大黃ナト用之手足温和而脉復ス是胃熱也灸

天樞氣海無寸効是熱痛熱吐故也熱極而似寒也可知

○婦人年四十腹痛時止時發難堪腹中雷鳴或腰痛後吐血一升而止

腰痛

○腰痛能察病因而可施治虚痛ニ有冷熱感風寒濕而痛アリ有痰有疝有瘀血有蟲積

○風熱ハ發散ノ得汗時ハ止ム表邪也疝氣或寒濕瘀血五積散加木香檳榔子烏藥羌活獨活因症去白芷

○因濕或疝氣者加減胃苓湯水腫或滲濕湯濕門

○疝氣或氣痛大便結或腹攣痛者三和散加青皮

○決ノ瘀血ト見ハ桃仁肉桂當歸大黃紅花甘草

○虛痛者十全大補湯或加味大補湯

○腰痛溫補不效者回春脚氣門三妙丸為湯用之而愈蒼朮

牛膝黃柏酒炒加防風羌活

○夫筋攣牽引者熱也急者熱緩者寒也見入門痺門

○男子年三十五六一身麻痺腰脚攣痛唇緩數方無効以三

和散兼六味丸加知母黃柏振出用之痛和全愈今年五十六

無恙

○拘攣急痛ハ寒筋緩ルハ熱ト書ニアリ然レ氏以一難論

熱ハ急也寒ハ緩ニ惣ノ何症ニモ有寒有熱有虛有實

○治失力腰閃或跌蹠瘀血凝滯及大便不通而腰痛者調榮

活絡湯回春腰

此主方其理明也按跌蹠而血凝則經絡塞塞

則氣不流行冲集處塞之血故熱生而為痛也疎通經絡順氣

涼血則可也今此劑順之涼之疎利之

○腰痛久不愈追風通氣散加附子回春癰疽門當歸木通去皮

赤芍藥白芷小茴香烏藥枳殼何首烏忌銅甘州

○腰痛烏沈湯合平胃散加川芎疝痛或クニキ筋違夕ルニ

○不甚而痛者腎中陽虛ハ味丸煎

脇痛

○脇痛多ハ痰也瘀血モアリ蟲積亦多ニ俗ニ息ナヘノ痛

ト云者脇腹ノ筋攣スル也

○風熱ノ中咳而腹筋攣脇痛難堪家祕散用之

○咳而脇痛者吐血咳血アル者アリ。脉必數而無力。力ナ有テ進ム者アレトコヤラニ無潤也。

○痰症不能偃卧。脇痛脉有潤者。瓜蒌枳實湯。

○治心胸脇痛者。二陳湯合烏沈湯平胃散。

○平肝流氣飲回春脇痛門治脇痛及小腹至達臍併疝氣内外疼者。

○咳嗽脇痛不換金正氣散加藟子杏仁青皮宿砂枳殼臂痛。

○舒筋湯 臂痛不能舉有人常左臂痛或以為飲或以為風為濕諸藥悉試繼以針艾俱不効得此方服之而愈蓋是氣血凝滯經絡不行所致非風非飲非濕腰以下痛食前服之腰以

上痛食後服之又名通氣飲子。片子薑黃四兩如無以嫩莪

朮代之。炙甘草各一兩海桐皮去外白朮各二兩當歸各二兩

每服五錢薑三片水煎臨服入麝沈香少許方見濟世全書又

出醫學入門痛風門名舒經湯藥方同分量少異。

○臂ヨリ肩井ノ邊キヤノ痛テ後ヘ手ノ廻ラサルノ有

リ皆痰ト氣トノ不順也和痰順氣ノ治法大法也疝氣二三

和散蟲二淨府湯ニテ得効タルノ間アリ。

○風毒腫ノ痛寒熱ノ痛甚也又疝氣或氣血鬱滯ニテ痛

ハ發作アリ腫モアリ外科モ膏藥ヲ貼シ鍼ヲセント云ニ

五積散去白芷麻黃加木香檳榔子烏藥羌活獨活或三和散

ニテ痛止腫退テ大効ヲ得タルノ四五人モ見タリ其症腫

タル中ヲ探リ見ルニドコヤラソコニ筋ノシコリタル様ナル物アリ夫ハ膿タル物ニ非ス必竟筋ノシコリタル也○右手不痛但軟弱無力不能自舉必用左手托之乃能舉也此肝經血虛痛也蓋肝主筋資血以養寒則更縮熱則弛長更甚為拘弛長為痿惟補其氣養其血則病自痊乃製一方用人參黃耆當歸川芎白芍藥續斷甘草節白朮桔梗木香防風薏苡仁為末山藥作糊為丸服至半月而安○婦人肘痛二陳湯加當歸芍藥川芎烏藥右的中○男子年五十六七左半身微痺肘痛不舉經半年二陳湯合烏沈湯去香附子加桔梗防風薏苡仁肉桂木香的中

背痛

○婦人脊中或心胸時時攣痛或足攣心下塞如凸如有結核身疲不食脉五動午後胸支上氣微熱便結八九十日二三醫用藥無効二陳湯合烏沈湯平胃散加柴胡百貼餘而平復此主方疝氣痰鬱或不食或腹痛或病後持病疝氣痰之類用之而有効不能盡述以之則三和散七氣湯之劫劑不用三和散七氣湯無効○背心一點痛參合湯腎鑑云三合散烏藥順氣散二陳湯香薷散合之加羌活蒼朮○背心痛者痰也或如置手冷或麻痺ノ類痰ト氣トノ不順也心虛痰鬱ノ症此類也

○男子膏肓人下一陣痛難堪悶亂五積散加木香檳榔烏藥而頓愈疝氣之類也

○背痛久不已脊骨屈曲如龜是龜背也保元小兒門龜背龜胸者痰也ト云婦人脊骨痛兩脇至腹攣痛二三年催メ歩行不能自由ニ成脊屈曲ノ痿躄スル者多シ此適中ノ劑未見之此症以為濕痰痛也回春中濕門滲濕湯ノ末ノ加減久服ノ治スル一可有世俗多ク為痰血婦人ヲ見ルニ經水順也然レハ非痰血龜背ノ一也回春小兒龜背ノ治方一條畧之

