

提耳談

四

提耳談卷之四

痺

○手足左右或一身痺ルアリ必竟虚也。氣虚血虚痰火アリ中風ノ類也。後必中風發ス。老人手足痺テ中風不發モアリ是ハ痰也。二陳湯合烏沈湯去香附子加當歸川芎薏苡仁木香生薑。予用此劑麻痺或中風左右麻痺之類効アリ。氣虚加人參或加肉桂此劑ハ十全大補湯加味大補湯或六君子湯天麻附子烏藥宿砂ナト不應ニ可也。

○虚者益氣湯加附子肉桂十全大補湯加味大補湯八味丸。

六君子湯加天麻烏藥宿砂附子當歸ナトノ類可也

○痰火或ハ有相火者瓜蒌仁貝母當歸黃柏ノ類主藥也尤

熟地黄應スル者可也間々六味丸加酒炒黃柏振出ニ兼用

○左手足麻痺不能行步臥床自夏至秋中風勻氣散ト六味

丸加知母黃柏振出ニノ兼用テ愈

○肥滿ノ色黒赤キ男婦年二十三十四十前後痺ルト云

ニ心ヲ付ヘキアリ癰疾ノ兆ニ一身或手足ノ中處々痺

不仁或灸テ不熱トアリ是肉壞也肉ノ死肉ニ成タル處氣

不行ノ不知痛痺也故ニ手足ノ中處々如此是ハ非麻痺之

類故ニ麻痺不仁ト云ニ顔色可心得事也

○濕地ニ坐卧シ一身痺ルハ滲濕湯ニ加減ノ可也

○壯男兩手痺或胸痛腹痛三年之後兩手和キ腰下不仁後

不知小便腰下ノ肉爛テ不痛如此ニテ不能動身半年ニノ

死タル者アリ全思フニ是モ癰風肉壞ノ類ト見ヘタリ

○因濕者唐蒼朮可也有惡臭故有蟲積者多惡之故ニ此劑

其香不好乎好味服後可試ト病人ニ知ラセテ可也不然レ

ハ病ニサワルアリ唐蒼朮乾薑當歸茯苓肉桂甘草生

薑

○癰風ノ痺ハ處々痺不痺ノ處アリ死肉ノ處痺生肉ノ處

不痺也或頭面水ノダラト流ルト覺ルト云是惡血

ト見ユ骨ハ強ク肉潰壞ル也中風ノ痺ハ左右ヲ分チ中

濕ノ痺ハ一遍ニ痺ル也顔色眼中ノ狀モ異ナリ

○中濕ノ痺ハ中濕門可參考。

痛風

○一身走注而痛寒熱頭痛不能起卧脉緩足冷初發ハ五積散或五積交加散。

○痛風寒熱手足痛或謔語防風通聖散有妙加蒼朮酒炒黃柏股肉如虎咬者又可用之。

○凡痛風羌活湯可也。回春痛風門或通聖散用之痛少和而後用之或為痰痛清濕化痰湯。

○如痛風而痛風ノ治療不効則為蟲為疝氣脚氣門可交考。

○手足痛脉弱者加味大補湯。回春中風門大防風湯可也又十六味流氣飲有効半井家秘方。

○羌活湯治痛風身痛又頭痛ヲ可治。

○有似風毒痛風ノ痛ハ手足關節腫也風毒ハ手足脇腹背脊ノ中肉ムツクリト腫也二三ヶ所四ヶ所膿アリ。

○身盡ク腫レ無性ニナリ死タルモアリ。

○疝氣ト痰症ニ風毒ニギルモアリ疝氣痰症ハ腫タル處ドコヤラシコリタル様子堅キ様ニシツコリトスル也風毒ソハスサシク赤キアリ又常ノ肌ニテ下ヨリムツクリト腫ルアリ底柔ナル格多シ外科風毒門可參考。

○如痛風風毒腫テ疝ニモ非ス痰ニモ非ス後疹子出テ散スルモアリ是ハ血中ニ熱有テ風疹ノ毒氣集ル故ニ腫

也可膿カト思フニ散スル症アリ風疹身痒ニ可付意腫退

キ風疹發スル故此痛ハ敗毒散合驅風解毒或苓連消毒飲
ナト用ルアリ。

○痛風因濕者。溼湯加防己牛膝薏仁羌活防風有熱加
黃芩或黃柏之類無熱者加羌活防己肉桂牛膝或去牛膝。
○男子年五十手足痛十指腫難忍兩醫用藥無寸効晝夜四
五次絶入直視咬牙病家以為必死診脉五動半有幅予以為
是痛風也度々絶入ハ平素心虚痰鬱ノ症也痛甚故ニ塊積
冲上而絶人也聞ク此男平素怔忡氣沈陷心細ク成リ眩暈
無腹力是痛風ニ交テ心虚痰鬱ノ發リタル也惣ノ心虚痰
鬱ノ症ハ諸病ニ交テ發ル夫ヲ不知醫者痛風ノ惡症或食
傷熱病痢病ノ惡症出タルト思テ驚也其症症ノ惡症ト云

者ハ古人極メテ置タル通り也夫ヲ能知ハ心虚痰鬱ノ
交リタルハ自ラ撰出セル也又心虚痰鬱ノ症ヲ能知ル
時ハ自ラ痛風ハ痛風心虚痰鬱ハ是也ト分ル也予ニ陳
湯加紫蘇枳椇枳殼前胡天麻烏藥羌活獨活防風右煎湯正
氣天香湯合ニ陳湯平胃散振出之間用之絶入時ノ氣付
ニ三靈加陳皮茯苓用之眩暈止テ痛風漸愈或清心導痰湯
去黃芩山梔子用ユ有熱ニハ可也心虚痰鬱ノ交リタル痛
風ハ多冷痰濕痰熱痰加風濕テ發ルト知ヘシ。

○男子年四十自去冬十月咬嘔為勞症或為濕痰二三醫用
藥不効正月診脉五動有幅非勞症可治症也不換金正氣散
加蘇子杏仁桔梗前胡之類或六味丸加陳皮貝母前胡牡丹

和散
不香陳
不腰皮
蘇瓜沉
便和

皮ノ勻ヲ不好故ニ去之咳稍止四月初手足痛腫痛風ニ變
ス風冷ニ感ニ痰滯タル症也一日俄然トノ吐血二升呼吸
促迫舉家以為死予診脉五動有幅脉ツヤアリ非死症ト云
テ施藥吐血止痛愈如此時勞症或虛極之呼吸促迫吐痰喘
聲アルハ聲音無根脉細數也是ハ不治也外症ハ同ニ者也
以脉知之則生死分ル逍遙散加陳皮貝母蘊子前胡枳殼
○痛風因濕虛冷者加味大補湯回春中 大防風湯此方論一
條畧之

○痢後痛風鶴膝有熱者防風通聖散或滲濕湯加減虛者加
味大補湯大防風湯

○攣痛者三和散有腫者二八三和散不空

脚氣

○脚氣先宜當歸粘痛湯回春脚氣門

○虛寒濕五積散加羌活獨活木香檳榔子烏藥有妙

○手足痛處出コリ有之或為核屈伸不自由或攣痛為蟲為

疳可治之淨府湯去胡黃連加薑製黃連青皮或三和散加青
皮有熱加柴胡黃芩或山梔子或加蒼朮酒炒黃柏合二妙丸
之意也

○脚氣腫痛蟲疳氣ノ腫痛ハ少シ意アリ濕ニテ腫ハ常ノ

腫氣ノ心ニ痛處腫也疳氣ハ腫處筋ノコル心ニ少シ堅

三有之先是大法也同類ニ見ユルモ間々有之

○足腫痛濕痰痛ハ清濕化痰湯回春脚氣門 加牛膝酒炒黃柏防

已龍膽木瓜

○脚氣因濕者。溼湯可也。回春中痛風加減可見合。

○脚氣ハ足痛也。膝脚氣ナト、俗ニ云也。脚氣ハ有腫筋骨

弱而痛者ハ無腫可補之。

○大防風湯ヲ用テ治冷濕或下焦虛冷ノ脚氣。大防風湯ハ

四物湯加人參黃耆白朮附子牛膝杜仲防風羌活甘草生薑

○痢病後ニ濕熱殘テ一身手足痛膝腫如鶴膝是謂痢後鶴

膝風痛風邦ニ記之

疝氣

○疝氣腹痛或陰囊變痛或肩或足痛或不食或肛門為痛或

腰痛或頭痛大便結或裏急後重如痢或寒熱如瘧之類。疝氣

之症多シ三和散加青皮或五積散加羌活獨活木香檳榔子

烏藥得數効。

○疝氣シコリ痛甚者カニ木ト云木ヲ剉ミ煎シ為熱湯以

布浸シ痛處ニ蒸洗フ。アツキト輕キ灸ノ如クナリ時ハ可

也。腰或股ノ内或肩ノ邊ニシコリ如風毒腫者有妙。

○婦人不能歩行腰下如炙又如冰或腰痛七八年前痢後發

ノ今ニ不愈數方不効予九味清脾湯去草菓加陳皮香附子

桔梗前胡檳榔子或時加烏藥久服而歩行ス其後手足為痛

之類間々用之而得効久咳脉有力者又可也。入門有痰疝痰

積為疝之類多シ。

○補節湯見空方治疝氣如神有効或腹痛。楊梅皮生焙三分

○疝氣。二陳湯。合烏沈湯。平胃散。有妙。

○肺癆方合平胃散疝氣二功アリ。淨府湯平胃散柴平湯ノ類モ可也。

回春協
痛門

○疝氣ニ寒疝アリ。濕疝アリ。痰疝アリ。熱疝アリ。先是大法也。血疝ト名付ルニ。股ノツケ子。俗ニヨコ子。處腫痛スルト

云ヲ血疔ト云。是下疳ノ類多シ。江戸ナドテ。下疳ノ名ヲ忌
テ。贅モ血疔ト云ヘリ。

○蟲積疝氣ナト大格同アシライニメヨシ。其中臍下及陰囊寧痛ノ者決メ疝トス。

○疝氣處々為核・攣痛者アリ・結核或痰核ニ近シ・其中下焦
ニ有フ疝氣ト云・然レ氏痰核モアリ・入門ニ痰疝トモアレ
ハ・同類トモ見ヘタリ・

○手足凝滯ノ痛甚者風毒腫力。疝氣力ト凝フト多シ。風毒ハ後必膿ム也。疝氣ハ不膿ノ散ル先是大法也。

△也。朝サメスル意有テ、其外ハ無間、按メ難忍甚痛也。ソコ

膿タル時一日二三度如瘧寒戰ス汗多出テ脉數無力也凡テ膿タル脉ハ虚數也

○腸癰難知而按之而脉滑數ト滑伯仁カ云タリ是以考ル二肌熱モ不見熱病ナトノ様子ト違テ脉ハ病體ヨリ進外症色脉考合スレハ膿可有ト思フ心移ル也數ニメ無力者也風毒ソコニ膿アレハ如瘧戰慄ス

○疝氣シコリ痛ハイカサメ膿ム物トトコヤラ違タル處自ラ見ル也痛處甚不熱或腫中結核ノ如ク見ユル也或痛様子時ニ發シ時ニ和クモアリタル痛ニ痛ム也兎角能心ヲ付テ可見覺

○虚疝十六味流氣飲回春乳岩門

○疝氣溫和ノ不効者平肝流氣飲右井關玄說家為散間々用之為家秘

○蟠葱散入門心痛門疝氣腹痛虚冷者用之或依本方加吳茱萸木香茴香

○追風通氣散回春癰疽門痰塊加南星半夏

○醫學入門ニ痰疝トアリ痰痛疝痛似タル者也痰症ニ陰囊大ニナリ變痛スル者多シ夫故痰疝ト云モノヲ出スト見ヘタリ

○疝氣腹痛烏沈湯加木香或乾薑肉桂丁子之屬茴香モ吉

○回春ノ烏沈通氣散モヨキアリ疝門可參考
○惣而蟲積疝氣可參考

痿躄

○痿躄虛冷而無他症者加味大補湯

○痿躄一身為痛者有妙天野善左衛門家傳數得効加減胃

冬湯

回春水腫門

痛甚加牛膝檳榔子

陳皮

去白

猪苓

去皮

赤茯苓

冬

牡丹皮

各六分

山查子

去核

宿砂

各七分

蒼朮

米泔製

甘草

一錢半

三分

右剉一劑水二升

生薑三片燈心一團煎至一升服

○婦人腰脊屈曲而脊骨出見痿躄者不治予數人治療スレ

氏未見的中劑加減胃本湯ニテ婦人痿躄一人治之夕リ又

肺疳方合平胃散テ稍步行ス翌年再發メ不治

○筋節攣痛或腰痛而不能步行者為疝為濕為虛冷或為蟲

積瘀血而愈者也

○治產後腰脫手足屈伸不自由或疼痛或爪甲枯其効如神

加減胃本湯

○痿躄因濕者滲濕湯疝氣者三和散虛症者十六味流氣飲

○男子年三十脊中脇痛以後腰下不仁不知痛痒灸之而半

年後贅肉敗壞而死似癰不癰似中風不中風病症不知何病

難治而死予今以為濕症也滲濕湯或加減胃本湯ヲ以テ可

加減然則有可治之理中濕則筋脉緩一身痿

○痿躄之男三人滲濕湯ニテ的中立愈奇妙滲濕湯加減

陳皮

宿砂

甘草

白朮

唐蒼朮

茯苓

生地黄

當歸

芍藥

木香

乳香

肉桂

牛膝

黃芩酒製

羌活

防風

右十六味

生薑入

一人者有咳痰加蘇子杏

是耳

卷四

九

仁此劑妙不可言

消渴

○男年五十肥滿酒徒渴後發疽而死一條畧之

○治西崎氏年五十八能食而浮腫脉緩理中湯加麥門冬五味子又六味丸加肉桂麥門冬五味子而愈

○凡消渴症食三倍常口渴飲水或好溫湯小便赤或白濁或赤濁或臭或口舌乾燥粘唾如飴此本屬脾胃虛也後或腫滿或脊中發瘡而死

○凡此症飲食入胃直下小便二交下故小便如膏

○鹿茸丸入門消渴鹿茸一兩 兔絲子 山藥各二兩為末蜜丸梧

子大每三十九米飲或人參煎湯塩酒任下治飲酒積熱薰蒸

五藏津血枯燥小便併多肌肉消燂專嗜冷物寒漿

○心脾有熱口舌乾燥為渴者清心蓮子飲回春濁症門

○心經伏暑小便赤濁 人參去芦減半 白朮 赤茯苓 猪苓

澤瀉 香薷 蓮肉 麥門冬去心各等分 右剉一劑水煎空心溫

服

○男子消渴小便反多飲一斗小便一斗腎氣丸主之

○小便不利者有水氣其人苦渴瓜萐瞿麥丸主之 括萐根

二兩 茯苓 山藥各三兩 附子一枚炮 瞿麥一兩 右五味末之煉蜜

丸梧子大飲服三十九日三服不知增至七八丸以小便利腹

中溫為知金匱要畧

○渴欲飲水水入則吐名曰水逆五苓散主之

○渴欲飲水口乾舌燥者白虎加人參湯主之按回春中暑門人參白虎湯有神舌白胎燥者脉緩也ト云ヘ氏可用之

○脉浮發熱渴欲飲水小便不利者猪苓湯主之金匱要畧

○予消渴ヲ見ルニ七味白朮散加麥門冬五味子六味丸加

肉桂麥門冬五味子為湯好水者人參白虎湯回春中暑門清心蓮

子飲回春濁症門有神仲景八味丸ヲ用タリ

○人參白虎湯ヲ用ルハ渴漸則止服不足則又用之去石膏

加黃連其間七味白朮散加麥門冬五味子

○因症十全大補湯加麥門冬五味子トモアリ

○大便溏足跗浮腫者決而死胃氣絶スレハナリ

瘧病

○瘧病ハ一身スクム也感寒而瘧アリ產後或腫物金瘡ヨ

リ風入テ瘧搖擗スルアリ瘧症發ノ搖擗身瘧ムアリ瘧症

ハ痰積退則自痊

○熱病ヲ患ル者兩人振舞ニ行大食ノ翌日一身瘧不能起

大便モ仰テ臥ナカラ通ス冬ノ一也予二十四五歳ノ時

用五積散兩人氏ニ三四貼ニシテ瘧

○一身瘧シ攣痛ノ不能動者疝氣蟲積痰瘀血食滯アルヘ

シ諸書ニ主方不見

○諸書剛瘧柔瘧可見合予見瘧症度々發痰火搖擗者回春

瘧病ノ部用瓜蒌枳實湯得効瓜蒌仁枳實貝母桔

梗黃芩陳皮山梔子茯苓麥門冬人參當歸

癰子各等甘草三分右剉一劑生薑一片入竹瀝薑汁少許同服治痰火發癰。

○柔癰有汗虛極十全大補湯加附子或加味大補湯參附湯。
○癰病ノ論可考知皆病ノ末ニ發スル也痰喘者治痰火發癰瓜蒌枳實湯回春癰病門此劑中風痰涎ニ可用痰火ニヨル諸症元氣虛痰甚者此劑可也。

○破傷風モ同ニ自切癰腫物風ヲ引ヲ曰破傷風產後自產門風ヲ引モ破傷風ト云皆戰慄角弓反張スル也。

○傷寒六書如聖飲治剛柔二癰頭搖口噤身反張手足攣搐頭面赤項強急與癰癰同治法羌活 防風 川芎 白芷 柴胡 芍藥 甘草 當歸 烏藥 半夏 黃芩 有汗是

柔癰加白朮桂枝無汗是剛癰加麻黃蒼朮口噤咬牙如大便秘者用大黃利之水二升薑三片煎之臨服入薑汁竹瀝溫服。

眼目

○風眼赤痛頭疼甚敗毒散加黃芩黃連犀角此劑奇妙。
○洗藥 赤芍藥 當歸 荊芥 防風 滑石 黃柏各二錢黃連三錢古文錢十文右水煎溫メ絹ニ浸シ蒸洗フ如常調合ノ古文錢一文入テ可也。

○風眼治法如此調理セント欲レハ柴胡芎歸湯凡テ血中ノ風熱ヲ散シ血熱ヲ涼スルト云本意也。

○虛眼ハ補劑ノ中ヲ可用虛火相火ヲ令テ可治虛火相火ノ意味ハ火症門可見合。

○虛眼ニ六味丸ヲ用フ多知之不知假火相火也腎中有燥火者可也腎氣弱者反テ失明ノ理アリ腎氣ト云ハ腎中ノ陽也水中無陽則氣無キ也無氣則失明六味丸寒涼也腎氣虛者久服則腎氣彌消ス

○雀目ハ申ノ下刺酉ヨリ不明日日如此是ハ小兒ニ多シ大人ニモ間々アリ肝積アルニ因也以此意寒熱ヲ分テ可施治有熱ハ消疳湯或淨府湯去猪苓澤瀉胡黃連加薑制黃連冷ニハ二陳湯合平胃散加柴胡青皮丁子之類或蟲積溫和ノ劑ヲ用ヘシ

○眼胞乾燥スル氣味ニテマタ、キスルニ燥ク意アルハ八物湯或六味丸ヲ以燥ヲ潤シテ可也熟地黄泥ム症ニハ

逍遙散ニ加減ノ可也左積アル者ニハ消疳湯モ可也或三和散ノ小貼ヲ用テ順氣ノ能キ一モアリ

○雀目ニ蒼朮丸ヲ用テ有大功ト云者アリ蒼朮一味細末ノ糊ニテ為丸保嬰撮要ニ因濕為雀目ト見ヘタリ唐蒼朮ヲ用ヘシ

○小兒疳眼赤而羞明ニ柴胡生地黃唐胡黃連白朮青皮右主藥加減有大効

○遠視不能近視有火六味丸近視不能遠視者命門火衰也八味丸下焦ノ真陽虛スル故ニ不能遠視是虛症ノ目的也

○蠅ノ頭一味瘰ノ眼中へ入或ツキ目ニ水ニテトキ付ル妙也小兒ノヨダレヲタル、ニ足ノ裏心ニソクイニテ貼

ス妙也可秘

○眼赤痛ニ荆芥防風當歸黃連芍藥桔梗甘草可也

面病

○面生小瘡清上防風湯回春ノ主劑也。是ハ少ツハ面一ハ
イニ草氣出テ疥癬目ニ入ト云テ眼閉テ膿モハヤ眼ツブ
レタルト云様ナル體也。予清上防風湯十貼與テ無効加味
五香湯七貼ニテ過半愈遂至二十餘貼全瘥。

○凡稱面病者面ニ有疾者ヲ論スル也。中風ナトニテ口眼
喎斜ニ半面或額或頰麻痺スルアリ。於中風門可參考。

○惣ノ面色ヲ見テ先虛實ヲ察ヘシ故ニ古人モ色脉ト云
テ色ヲ望ムヲ脉ノ次トス色蒼白ハ氣虛虛冷也。相火實火

ノ者ハ十ノ一二也。相火アル者ハ頰赤而耳ノタブ乾ク也。
耳輪乾クトアル也。實火ハ面部衰ヘタル處ハ不見ノ上熱
スル也。其中ニハ假火モアリ。勞症ノ面ハ秋冷ノ如ク物サ
ビシキハ常ノ人ノ如ニナキ故也。處々枯テ手足氏ニ白ク
洗タル如クキレイニテ面乾キ無血色也。必竟勞症ハ連々
ニ血少クナル也。婦人ハ半年或三四ヶ月或一年經水絶ル
也是ヲ血涸ト云。實ノ經水絶ルハ内ニアル血不行故ニ腹
脹ル也。血涸ハ中ニ無血故腹モ不張乾也。氣虛ノ人參ヲ症
ハ眼睛ウツトリト目タキモ遲クアホウノ如クナル
者也。勞症ハ鼻ヲクラ次第ニ少クナル也。皮モ薄クナル也。
實症ノ顔色ハ下手ノ畫ヲ書タル如クフツクラト成也。眼

耳唇舌兩頰、兎角巾廣ク、ユツタリトスル也。

耳病

○耳痛、因風熱者、或聾、小兒頭瘡愈後、耳鳴遠クナルニ、芩連消毒飲ヲ與ヘシ、或熱ノ輕重ニ因テ、去黃、芩黃連。

○耳鳴ノ症、脉緩ニシテ、形不虛者、心虛痰鬱ノ者多シ、是ハ有痰肥婦、或産後ナト、眩暈後ナト、或眼ウロリトスル生質上、氣有テ、鳴ルニ可也、有火氣則不効、正氣天香湯、合二陳湯、平胃散可也、或二陳湯加紫蘗、桔梗、枳殼、前胡、天麻、烏藥ノ類。

○耳ノ前後、或面腫ル者、風熱ノ毒氣也、驅風解毒湯、芩連消毒飲、大熱甚者、防風通聖散。

○相火有テ、耳鳴者不多、何トナレハ、勞症ナトニ、耳ノ鳴者

無之者也、風熱ナト有レハ、鳴也、痰火耳鳴甚者、六味丸加知母、或滋陰降火湯モ可也、然レハ五十以上、漸々耳鳴スルハ、上ル氣也、非虛火、人ノ常也、耳漸々ニ遠ナルハ、長命ノ相ト俗ニ云也、然レハ實症ノ有痰者、多ハ鳴モノ也、丹溪ハ決ノ虛火トシ、腎中ノ燥火也ト云フナレハ、是決定ノ論トモ不見也、形不衰、トコヤラユツタリトシタル者ノ鳴ハ、上ル氣ノアル勢力ハ、大虛ニ非ス、痰ニ胃熱、或腸胃ニ熱有ル故也、真陽ノ氣、ユツタリト生レ得タル者ニアル也。

○若年ノ中ハ、頭痛シ、頭痛ノ持病アル者、中年ヨリ漸々ニウスク成ル者也、是真陽ノ氣減スル故、上ル勢衰也、五十以後、頭痛スル者ニ實症多ト可知、其中心虛痰鬱ノ症ハ、頭痛

スル是ハ常人ニ異ナリ。

○耳鳴モ頭痛モ必竟上ル氣也。以是可知虚實也。

○熱病ハ決ノ半表半裏ヨリ耳聾ル也。不耳聾熱病アリ多

ハ氣虚也。或痰血ノ者ニモアリ。氣虚ハ不聾一多シ。

○大體虚ト不見ヘ男婦ノ保養ヲ賴ム時ニ世間ノ醫書ニ
力セニ思フ醫者ハ腎中燥火ト思フ者也。夫故ニ藥多ハ滋
補或ハ參朮ヲ用ル也。然レモ最初ヨリ如此治法ハ手重ク
テ却テ飲ニクキ藥ヲ與ル故ニ蟲積疝氣痰ナト動テ反テ
不宣也。故ニ風熱ナト滯テ鳴リ或氣不順ノ者ニハ萬珠湯
ナト加減シ心虚痰鬱ノ者ニハ正氣天香湯合ニ陳湯平胃
散或ハニ陳湯加紫蘇桔梗枳殼前胡天麻烏藥之類用テ可

也能ク考テ虚實ヲ辨スヘシ。

○兩耳痛水出者黃柏酒炒甘草減半右水一盞煎至半盞冷
而一滴ツ、耳ニ入テ可也。温ナルヲ入モ亦可也。

○耳タレ痛甚ニ蟬脫為末胡麻油ニテトキ入ル、妙也。

○耳鳴ニ咳嗽ノ後ガウ、ト云テ耳聾鳴一アリ痰塞ル
也順氣和痰而耳氣自通ス。

鼻病

○延壽院治平素肺氣壅塞鼻氣不通温肺通氣湯。薄荷大

荊芥小陳皮小羌活中防風小肺中火熱アラハ加黃芩山梔

子因肺熱鼻中痛有瘡者加升麻丁子肺中真陰虚燥鼻中燥

キ息タワシクハ加麥門冬肺ノ正陽虚ニ鼻中ノ氣冷テツ

グ息カイナクハ加人參小肉桂小

○膽府ニ有熱テ其熱腦ニ上テ額辛ク濁涕多ク流出テ後

ニ或血交出是ヲ鼻淵ト云黃芩麥門冬各中防風川芎各小

甘草少黃連山梔子各小陳皮少右水煎服

○聲鼻ニ入鼻ヒ口カリタル様ノ聲ニナル者アリ痰咽喉

ノ間ニ有テ瘡毒ヤミノ言語ニ似タリ數方無効脉緩氣力

如常瓜蒌枳實湯の中

○瘡毒アル者鼻中生瘡或咽喉痛者ニハ消毒ノ心得ノ可也

此劑ヲ與テ間々有効 荆芥 防風 射干 牛房子 連

翹 羌活 桔梗 當歸 川芎 陳皮 紅花 茯苓 甘

草 生薑不入瘡毒者加沈香木香各少許土茯苓餘藥ノ一

倍ヲ加ヘ常ノ二貼ガテニ調合ス

○貼藥ニ潤和散可也葛柏散モ亦可也

○鼻塞不通ニ主靜齋試數方不効ニ陳湯加瓜蒌仁貝母頓

瘡

○鼻中常覺惡臭ニ陳湯加桔梗細辛白芍藥甚効

○鼻中覺惡臭勞則甚益氣湯加黃芩

○痰血ノ症鼻中ノ上ヨリ出テ咽ニ入痰血トナル者アリ

濟世全書ニ辨之此肺腎火動ノ痰血ニ非ス消風散ヲ可與

凡テ無故而痰血出ニハ消風散ヲ用ルアリ

○鼻中覺臭或自腦鼻中へ惡臭ノ物二三滴ツヘ時ニヨリ

來ルト云頭痛アル者痰清涕如膿クサキト云多ク腦中ニ

久鬱シタル痰或血腐テ来ル也。消風散ノ屬或和痰茯苓補心湯ノ類去地黄モヨシ急ニハサツハリトセヌ物也。漸ニ愈ル也。

○頭痛甚久不已。鼻中出膿血。是ハ腦中ノ腫物也。老人ニ多シ。不治也。自眼膿ミヌケテ膿多出テ死タルモアリ。或顴骨結核有テ痛ミ鼻中膿多出。後ニハ血多出テ死ス老人アリ。

口舌

○六十ノ僧。夏末口舌為痛。不食。九月末。一身憔悴。腰冷。四五日大便五行。澹シ。食日減少。脉四動餘。時時結アリ。腹脊中ニヒツ、イテ弱シ。附子理中湯加弦人參四五貼而食進數貼而愈。時時左ヨリ支微痛。

○岡田某年五十餘。勞役傷寒。口甘シ。數方不効。予與啓脾湯愈。食進也。口中甘屬脾熱トアレ氏。多ハ非實熱。脾胃虛而有濕熱也。脉必弱。以澤瀉滲濕ノ意也。

○口舌為痛者。益元散之末。含之有効。口中醫ノ祕方也。

○延壽院家方。丹溪曰。肝膽有實熱レハ。口中酸苦ト。柴胡中

白芍藥中茯苓中青皮中甘草小龍膽中半夏小蘆根中

ナラハ人參小遠志小茯神中柴胡中龍膽小地黄大心熱口

苦口舌生瘡。黃連大為藥中酒黃柏中甘草小脾熱口甘ハ黃

連大黃芩中大黃小陳皮中甘草小肺熱口辛ハ桔梗中甘草

小桑白皮大麥門冬中山梔子中黃芩小腎熱口鹹ハ酒黃柏

中地黄大地骨皮大知母小

○口中常二酸而醋水ノ出ルハ中焦虛而宿食難消故也。
○口舌為痛者、蒲黃ノ末ヲ付テ可也。潤和散モ亦佳也。
○口舌為痛、大便不實者、人參理中湯決ノ宜也。予數人得大
効。婦人產後ニ多キ者也。去年產ノヨリ、口舌痛連々諸虛多
見ト云者多シ、八味丸又可也。或六味丸加肉桂五味子。
○口舌ノ治法、回春口舌門ノ條可能見。
○婦人口中、齒根サクノトノ痛甚ニ、六味丸加知母黃柏
大ニ効アリ。
○舌本腫赤久不愈者アリ、歸脾湯去龍眼肉加烏藥沈香宿
砂而愈。久服而効アリ。此男左ツカヘ或腹筋攣アリ、疝氣
兼痰症也。

○舌本痛テ重舌ヲ生ルアリ、治法可順氣也。或血中有熱者、
當歸芍藥川芎ヲ加フ。胃熱強者、去胃火劑ニ宜シ。口舌門火
症門ヲ可參考。胃熱ハ黃芩黃連芍藥ヲ主トス。知母黃柏ヲ
用ルモアリ。石膏ハ口渴口臭ニ少々ツハ加テ用ユ。熱ノ
過不及動氣ノ靜躁脉ノ力ノ有無ヲ考用ヘシ。
○舌痛症實熱ノ者ハ少シ。多クハ屬假熱者也。補劑ニ心ヲ
附ヘシ。

○口舌為痛者、清心蓮子飲

○重舌ハ舌根腫生モノ也。木舌ハ堅故也。

○瘡ノ餘毒アル者、癸連消毒飲ヲ用テ本復ス。後ニ舌ノ中
甚硬舌迴リカタシ、其比疹流行ス。予云此人疹ヲ病ハ木舌

可治後病疹與疹連消毒飲或四物湯合消毒飲ナドノ加減ヲ用ル内ニ瘡疹瘡テ後舌モ和イテ常ニ復ス是疹本血ヲ動スル故也

○小兒有熱而後舌白胎手ヲ以テ折ク舌ヲカキ唇外ニ出ス心脾ノ熱也澤瀉葛根前胡芍藥黃連山梔子甘草或瀉黃散ナト用ルアリ石膏ノ入劑ハ熱不甚則難用若ニ用ハ七分煎ニノ小貼トナシ可試用前胡湯加石膏黃連柴胡亦可也

○舌爛痛ニ千口散ヲ用甚効アリ

○治脾胃壅熱口舌生瘡煩悶多渴煩痛唇燥口臭咽乾壅滯不食瀉黃散入門積藿香七錢山梔子一兩石膏五錢甘草三

兩防風四兩剉碎用蜜酒拌炒香焙乾每三錢水煎溫服一方有砂仁能治口内瘡瘻生

牙齒

○牙齒ユルギ痛ニ細辛小川芎小當歸小香附子中炒右為末齒根ニ塗ルヘシ

○牙齒痛者為蟲牙諸藥不効者六味丸加知母黃柏為湯

○牙齒動搖者牙床者腸胃之所主下焦濕熱ノ者多蟲牙或小兒齒痛痒或斷ニ物生口臭ノ類俗ニ有蟲故ト云下焦有濕熱者ハ生蟲ノ理アリ消疳湯加減ノ可去腸胃之熱

○蟲齒痛甚者絲瓜ヲ黑燒ニノ為散貼穴

○口臭口粘者有實熱黃芩黃連黃柏為主甚者石膏

○齒者腎之所主故世俗齒痛拜必以為腎火予以為濕熱或腸胃鬱熱ノ者多之腸胃鬱熱アル者腎中亦熱故知母黃柏可也

○蟲牙以蛇脫皮包絹浸沸湯嚙之痛立止

○斷腫痛頰腫二苓連消毒飲壽世保元荊芥 防風 牛房

子 連翹 羌活 甘草 桔梗 射干 川芎 白芷 柴

胡 枳殼 竹茹 黃芩 黃連 生薑水煎

○齒腎之所主ト世人所云也以一難論五十ヨリ齒脫七八十ノ齡ヲ經モアリ然レハ腸胃ニ主熱アル者如此

○咬牙スルハ牙床浮故ニ痒之故ニ齒ギリスル也痘瘡大便瀉ニ咬牙スルハ惡症也不瀉者ハ間々可治小兒驚風ノ

症ニモアリ

咽喉

○某姪壯婦咽喉腫痛湯藥不入口近日欲發駕越前願速療之予云速難治先診其脉數帶緩驅風解毒湯加柴胡黃芩桔梗射干二貼而漸愈後午後發熱夜咳與苓連消毒飲三四貼熱去咽喉益和二陳湯合平胃散加柴胡桔梗牛房子射干右數貼而全瘥七八日而食如常

○咽喉腫痛甚時驅風解毒湯加桔梗射干或黃芩熱頭痛陶氏苓連消毒飲可也射干牛房子主藥也此二味能去血中熱

○熱甚而謔言便閉防風通聖散加射干牛房子或牛房苓連湯有効脉按而有力者實熱者可也脉大而按而弱者非實熱

驅風解毒湯可也。脉虛者治法可見合。

○婦人產後腹痛乾薑肉桂宿砂烏藥ノ類用之。產後感風邪咽喉腫痛湯藥不入口脉帶緩以驅風解毒湯無寸効予以為脉緩ナルニ連翹不宜也故以消毒飲加肉桂桔梗牛房子射干用之一貼咽喉快利三四貼而如常脉按而無力者虛人又下焦ノ虚冷也按而有力無力ヲ以可知之。

○延壽院治法風熱喉痺甚腫痛ノ津モ難吞者。焰硝中礬砂中龍腦少白蠟蠶炒小右細末管ニテ喉中ニ吹入或鼻中

ニモ入

○凡喉痺ヲ治スルニハ刺テ血ヲ出ヲ上策トス鍼口強ク痛ハ生薑汁ヲ熱湯ニ調ヘ少々ツ、時々嚥ヘシ多ク秘灸

アレ氏輕者ニハ可用甚者無効犀角末ヲ少シカキ立テ用ルモ妙也生薑二片ヲ加テ可也

○七情鬱結氣上焦ニ滯テ咽喉中有物而吞下不下吐ケレ不出心ムツカシ是氣鬱ノ痰結也香附子檳榔子各中陳皮大半夏小桔梗甘草少

○結喉ノ中ハ俗ニカラフヘト云氣ノ通スル呼吸出入ノ道也此カラフヘ痛ム症アリ急ニ和セヌ物也痛モ亦不甚予シカト的中ノ劑ヲ不覺連々ニ的中ノ劑モ有ヘキ也鬱氣ノ者ハ順シ弱者ハ益氣湯或ハ珍湯加桔梗防風ノ類也大體ハ茯苓補心湯ノ類モ可也熟地黄泥ム者ハ香附子ニ代フ然ニ香附子ハ無テモ可也

○瘡ノ餘毒ニテ咽喉為痛者。芩連消毒飲ニ宜シ。熱ノ多少ニ從テ。或去黃芩。或去黃連。身乾者。加當歸。川芎。紅花。或加土茯苓。大大便結ハ加大黃。

○風熱。或肩強痛。咽喉腫閉者。驅風解毒湯有妙。倍加牛房子。

○虛火ニテ咽痛ノ類ハ。不甚。外症ニモ諸虛備ル。

○男子虛人。如痛風。一身處々シコリ痛。起卧不自由。驅風ノ劑。用之稍安。以後咽痛。以升麻。牛房子ノ屬。彌甚。湯藥不通。ハ珍湯。加肉桂。防風。而頓愈。脉沈遲。故ニ用之。ト一醫語之。不可不知。

○咽喉中腫塞者。以針破。黑血出テ愈。

○咽喉腫痛塞者。少商穴血ヲ出ス甚妙。或脊中ニ墨ノ様ナ

ル物出ルヲ穿テ血ヲ出ノモ宜也。藥ハ驅風解毒湯。加射干。熱甚ハ牛房。芩連湯。輕者。芩連消毒飲。牛房。芩連湯。方ハ見回春瘟疫門。

結核

○結核ハグリノト梅核ノ様ナル物。身ノ中ニアル也。或痛。或不痛。皆痰也。痰滯經絡。而為核也。散スルアリ。又潰ユアリ。ソコツニ不可破。色變リ潰ント思ハ。外治スヘシ。頸筋ニ多ク生也。細カニイクトモ。グリノト生ハ瘰癧也。

○結核一概ニ痰トモ難言。疝氣ノ症ニ間々アリ。是ハ筋縮リシコル類也。痰疝ト云フアレハ。疝痛痰痛ニギル也。先疝一通リノ核ハ。三和散。烏沈湯。合平胃散ナト可也。此劑ニ

テ治スルヲ見レハ筋ト氣トノ集ル也

○一身處々核有テ如痛風痛者ニ淨府湯去胡黃連加薑製黃連的中シタルアリ蟲症ニモアリ

○頭痛スル者項頸ニ生核或有頭瘡者生核俗ニ是ヲ根ト云以是見之ニ血ト氣ト滯テ生スルモアリ是ハ非潰ル者○治法ハ先順氣化痰湯也ソレニテ不治ハ疝力蟲力或ハ瘡癰ノ根カト心ヲ付テ可治也

○肛門生核稱痔者ニ蟲ノ症アリ肺疳方及消疳湯ニテ効ヲ得タリ

○耳ノ根ニ生核夫ヨリ下へ下ルハ後ニ至テ膿タル有○結核痰ヲ消シ氣ヲ順スル治法ヲ主トスヘシ

梅核氣

○梅核氣ハ咽喉中ニ如梅核者アリテ嚥下不下吐下不出常ニ氣蒙ミトノ不樂是痰ト氣ニヨル也順氣化痰ヲ主トスヘシ空加味四七湯四味烏沈湯加桔梗檳榔子陳皮半夏茯苓甘草亦可也

○吐蛇ノ症ニモアリ是ハ蟲也與三靈妙也或不換金正氣散加香附子乾薑或陳皮香附子茯苓黑炒乾薑炒乾薑甘草○有頭瘡者ニ如此症アレハ空頭瘡治方萬珠湯加丁子或牛房子

○咽喉急ニ腫塞ハ喉痺也

○加味四七湯方見萬病回春梅核氣門

癭瘤

○俗ニコグト云也。自潰ニトスレハ可貼膏藥。妄ニ求メテ不可破。

○多氣血或痰凝滯ノ生也。治之少ハ順ル。トモ有ヘシ。多ハ不消也。大抵柔ナルハ保養ノ時。小ニ時。大ニ成テイツトモナク消ル也。

○先宜順氣消痰ノ劑。諸書癭瘤門或結核門可參考。

○強テ不可療。飲ニクキ藥ナドヒタト用ルト。蟲積ニテ不食。及テ他病ヲ生スルアリ。

○治法ハ色々アレ。難治者也。上工ニ問尋ヌヘシ。

肺癰

○肺癰ハ寒熱風邪ノ如ニメ或胸痛或咳。其痰ノ腐リ臭キニ心ヲ付ヘシ。多ハ膿也。或ハ咳血而胸痛。痰臭者モアリ。足跗浮腫。時々増減アリ。治療ノ連々ニ臭痰止テ治ルモアリ。膿痰日日ニ多ナリテ。肺腐レハ必死也。大體如勞咳也。不可誤。是ハ寒熱咳痰臭氣ニ心ヲ付ヘシ。夫故ニ顔色ハ空キ也。治法ハ醫學綱目肺癰門ノ論中可考。初中後宜桔梗湯。方見回春肺癰門。

○有咳痰症甚勞倦。或胸痛。對其病人。息臭クチタル様ナルハ肺癰ノ潰タル也。予先ニ咳痰數月ノ者ヲ見ルニ。息クサリ臭ク。予其痰色ヲ改ルニ。臭氣甚ク。即膿水也。予云必死也。後五六日ニメ死ス。死後脊中膏肓ノ邊。色カワリタル也。

○肺癰多ハ不治然凡前醫ノ心ノ付ヌ處ヲ見付ルガ醫者ノ功也其脉必數ニシテ無力初發ハ滑數也先用桔梗湯或脉無力則兼益氣湯用テ愈者アリ

肺痿

○肺痿ハ至極ノ肺虚ト見ヘタリ咳嗽久不已如勞症ニノ肺虚極タルト見ヘタリ初發ヨリ肺痿ノ症ト云ハ無キ也予モシカト未見至極ノ肺虚ト云ガ肺痿ノ論ニ合フ肺痿ト可知心漏モ未見論ヲ見合テ可知鳩尾胸ノ中ニ穴アリテ久ク不愈ト云痔漏ナドモ肛門ニ物生メ久不愈ヲ漏ト云也

○咳嗽久不已胸痛無膿血也渴者自愈欲飲者欲愈也蓋痰

仁散方見回春肺痿門

外科

下疳瘡

○內藥龍膽瀉肝湯

回春便毒門

膿來則加連翹晝夜三貼或二日

七貼洗藥地骨皮

生黃柏生

等分右常藥五貼程ニ合せ為一

包濃煎洗之也

膿來則度々洗膿多キ時ハ腐也勢不退時ハ

寒コ子ノヌカ味噌

成程久年ノヲ用テ湯ニテトキ洗也止

腐生肉物也

附藥常ニ附テ置ク也名消毒散即葛柏散也肉

上リ愈ル時ニ

阿膠藥ヲ早ク加フ靈天蓋ノ黑燒ノカワリ

也消毒散フリカケ

其上ニ膏藥ヲ付ル也王子膏可也膿多

不愈則無憂膏

輕者二ヶ月ニテ愈ル也膿出白甚者惡症也

葛根散胡麻油ニテモ解也。

○無憂膏 椰子油三兩 南蠻蠟一分 川芎 當歸二味為末

分丹三 胡麻油二合 一番ニ胡麻油ヲ能ク煎其後餘藥ヲ

一度ニ入火ヲユルクノ煉ル也。

○瘰癧トテ指ノ先痛土中ニ住スシクジノ蟲生ニテ塗り付ル妙也。

○玉子膏 一名失瘋膏 切瘋血留萬ニ良シ 痛頓ニ止 會津

蠟一錢 雞卵二箇 松脂十三錢 右蠟ヲ鍋ヘ入煮解テヨリ其上

ヘ松脂ヲ入煮能解ル時鉢ニ水ヲ入布ニテコシ水中ヘ入

レ何通モ如右ニノ取出シ胡麻油能程煎シ其中ヘ右ノ蠟

松脂ヲ入能ク煮サシ其中ヘ玉子ヲ入能煉合セ又煮テ

鉢ニ水ヲ入レ其中ヘ布ニテコシ入レ玉トナルヲ取上ケ

燒物ニ收メ入置ク也。

○長崎外科道巴所傳之楊梅瘡下疳瘡內藥頭面多者荊防

敗毒散加升麻葛根黃芩黃連大黃腰下多者升麻葛根湯也

何レモ土茯苓大ニノ為大貼。

○下疳瘡ハ龍膽瀉肝湯土茯苓大ニ加フ何レモ茶ト醋ヲ

癰疽

○延壽院家書云飲食失節膏粱ノ美味ヲ事トシ肥甘ノ濃

味ヲ專ラトスル人漸々濕熱腸胃之間ニ生シ氣道ハ濕鬱

ニ塞レ津液ハ痰ト化ノ脉中ニ滯リ榮路ハ積熱ニマカレ

テ經血瘀濁トナリテ脉ニ顯レ出ル故ニワル肥ニフトル
猶此上ニ房事過度次第ニ真陰ヲ盡ス故ニ渴ノ引飲中焦
ニ邪氣有故ニ水穀速ニ消ス食餌常ヨリモ盛也此理ヲ不
知腎衰ヘ下焦虚シタリトテ辛温ノ劑芳香ノ藥石美味ヲ
服食ノ水源ヲ絶シ命根ヲ絶スル也猶抱石入淵積薪救火
哀哉故ニ陰氣衰ル時分四十歳ノ後大概腫物ハ生ル者也
兼テ數年先ヨリ不時ニ數脉アラワレ渴ノ好水也此類ノ
人有ハ膏粱ノ美味ヲ戒メ芳香ノ熱藥ヲ禁メ黄芩黄連黄
柏ニテ濕熱ヲ退ケ生地黃ニテ涼血生血麥門冬ニテ補水
源止煩渴石膏ニテ時々空除中焦ノ滯熱如此治療シ慎淫
事食飲漸々渴止脉平ヨリタラハ癰疽ノ患ヲ免レテ自

然ニ長壽ナルベシ予按スルニ此主劑濕熱ノ者ニ可也道
理ハ至極ナレ氏藥味ハ攻撃アルハ常保養ニ急ニ熱ヲ退
ントスル時ハ真陽ノ氣ヲ打也緩々ト熱自退心得ニテ治
療スヘシ

○脉數ニノ發熱疼痛クル者陽ノ腫物也其腫勢其痛處堅
ク一身子マリスクミ小便黃大便結セハ宣毒湯 芍藥中
丁子中忍冬大羌活 黃芩 各中 黃連 甘草 各小 連翹 中

○脉不數不發熱而疼ハ陰ノ腫物也大便秘時ニ瀉尿清キリ
ト甚痛ハ 白朮 小 白芷 防風 茯苓 香附子 各中
甘草 忍冬 各小 合歡皮 中 右以兩劑因症可加減

○治一切腫物惡瘡忍冬ノツル葉家上也忍冬蔓葉ヲ多取

テ水多ク入レ煎ノ其汁ニテ内藥ヲモ煎シ療治ノ中湯茶
ニ代テ用之押藥ニモ止痛散熱惡血ニモ忍冬ノ若葉ヲ搗
採日ニ乾シ末ノ用之

○小瘡久不愈予力主方 羌活 防風 蒼朮 防己 芍
藥 甘草 痒者加蟬蛻

風毒腫

○風毒腫甚者如癰晝夜寒戰發熱二次或三次汗出多寒戰
ノ手足如瘧甚不冷口不渴無伸欠或傷寒裏症ニ似タル者
舌常ノ如キヲ為異故ニ心ヲ付テ有痛力或手足胸腹ノ中
凸ニ腫ルカト問テ脊中手足ヲ見ルヘシ

○一男三十日治療其前寒戰如瘧一身為痛揚手擲足厥冷

苦悶摸床循衣譫言腰以下不搖似中風又似傷寒裏症而舌
不黑虛極如亡陽而有身痛不痛風不中風不傷寒予診脉虛
微汗多故四君子湯當歸附子肉桂乾薑人參三分用之手足
溫氣少正シ又以八解散合逍遙散加肉桂人參三分用之稍
氣正而兩股内甚痛熱強小便澀全不食柴苓湯平胃散熱少
去少食ス後股内シコリ出来ムツクリト肉起高欬成膿八
解散合逍遙散加肉桂黃柏而左膝下一處股内一處潰針ノ
濃多クハ物湯合六味丸氣力彌快又右股内潰而膿出食彌
進步行六味丸加肉桂全瘥

久年楊梅瘡

○土茯苓大 當歸二 蒼朮二 沈香一 丁子一 大黃二 連翹二 木

提耳散

卷四

三

香二牛膝二藿香二川芎二薰陸二右水煎

○身ニタムシ有テ甚痒者生苦參ヲ煎シ入湯ニメ可也

能煎シタル湯ヲ水風呂桶ニ入沐浴スヘシ内藥ニハ萬珠

湯ニ蒼朮大黃或通聖散ニ去麻黃石膏芒硝用之癩病ニハ

通聖散本方ニ加苦參荆芥雷丸右為末用之秘方也

○大田蟲加減四物湯有妙 人參一各 枳殼一各 荆芥一各

我朮 甘草 各少 右五味為細末與之或煎服按ルニ癩瘡ノ

田蟲ニ與テ可也此藥用ル中ニ癩ニハ早ク通利ノ劑ヲ用

ヘシ

○打撲老婦倒卧而腰股脇變痛五積散去白芷麻黃加羌活

獨活木香檳榔子烏藥炒

○耳根ニ如梅有大核ニ三年出沒而後大二腫外治ノ膿出

難愈カル可シト思タルニ脊中ニ腫物出来テ如癰ニテ外

治ノ愈其以後頸筋ノ核モ散テ愈タリ不治ニ似テ是ハ不

治ニ非ス心ヲ付テ可治療也

○秘方山本恕哲所傳下里玄加之方治癰疽瘡瘍痔漏便毒

瘰癧乳癰贅癰石疽懸癰婦人陰瘡下疳濕瘡等貼患處止痛

搗臘炙肉生肌 當歸 熟地黄 芍藥 肉桂 大黃 桂

心 白芷 各五錢 黃連 黃柏 各十錢 丹 真香油 百二 右藥末

真香油ニ浸ス一宿以武火煉口傳

○楊梅瘡下疳瘡愈後頭面如甲瘡膿多出則少安乾則頭痛

如裂悶亂敷治不効予芩連消毒飲一錢五分土茯苓一錢為

大貼用之的中痛甚則心下二冲上而欲絕其間退毒散用之此劑得數効瘡毒攻咽喉或手足處之膿或腫硬不能立者數貼ニノ愈此劑ハ子力醫按ニテ用ヒ始メタリ消毒飲ニ加射干牛房子有妙

○無名惡瘡赤小豆ノ粉ヲ紫萸ノ汁ニテ煉付ル妙也能愈スト見ヘタリ小瘡久而後可治也赤小豆ノ能ニ無名ノ惡瘡ヲ治ストアリ

○腫物出来痛ニシテ藥ニハ酒製大黃末ノ醋ニテ煉付テ頓ニ腫退ク者也ヲシ藥ニハ大黃妙アルト見ユ

○鼠喰ニハ鼠尾艸ニ分程一貼トシ煎服ス日々服ノ妙也○加味養血湯治疥瘡有血無膿搔痒不止者黃耆五錢連

翹二錢當歸防風錢各一木煎有血無膿是表氣不足也諸疥

痒屬虛虛者可補故用黃耆當歸乃防風者引當歸黃耆直ニ至表連翹解諸經客熱而已

○諸惡瘡或疥防風通聖散表有疥瘡裏有實熱者此方主之○癰疽未潰有熱ハ内藥初發敗毒散加荊芥防風金銀花或芩連消毒飲潰而膿出則内托散是大法也潰而膿出ルニ從テ四君子湯益氣湯異功散ハ物湯十全大補湯獨參湯撰之用ユ膿出テ弱ハ人參五三分入テ用癰疽門可參考

腸癰

○腸癰之症四五人治ノ知タリ初發寒熱如瘧輕而甚腹痛如食傷嘔吐而吐蚘蟲モアリ雖時止時甚脉初發緩緊此間

ハ不膿脉滑數ハ有膿也。甚腹痛按而有熱此症ニ逢時ハ臍
邊臍下ヲシロクト按テ可見臍下左右ニシコリタル物
アリ按ハ其痛△△甚シ手ヲ置タル程ノ大サモ有リ左右
章門ノ邊ニテシコルモアリ常ノ積聚ヲ按シ又ハ瘀血ナ
トヲ按ス時ニ痛也腸癰ハシコリタル處ヲ按スニ其痛子
ブトノ上ヲ按ス様ナル痛ノ心也病人ニ何ト此按心ハ子
向テ發スル也腸癰内癰ハ裏ニ向テ發ルト壽世保元ニア
リ然レハ腫物ノ頭腹ノ中へ向テ出来ル也腹ノ腸ニ出来
ルニ非ス腫物腹ノ裏ニ出来ル意也中脘上脘邊ニ出来ル
ハ胃癰腸ノ方ニ出ルモアリ皆内癰也壽世保元ニ意茲仁

大牡丹皮中瓜蒌仁中桃仁中川芎小有凝滯而腹痛甚ハ桃
仁肉桂大黃右三味水煎用之此三味ニテハ膿血ヲ破リ下
也シコリ不減ハ右ノ劑ト交用之或桃仁肉桂大黃ヲ用ヒ
續ク又一方ヲ用ル也予桃仁肉桂大黃ヲ用テ見ルニ腹痛
ノシコリノ處へ答ヘルト云也病人ニモ凝滯ヲ減シ膿ヲ
退ル藥也ト云テ用ヘシ用ル中ニ膿血五合一升下ルモア
リ下レハ少ツ減シ痛止食進ニ出テ本復スル也四五人
如此治療ソ治シタ也

○甚則腹脹一身腫脹腸鳴小便淋瀝スルアリ是ハ十之八
九死スル也何レモ治法同ニ膿血多下而胃氣強食味出尿
ルハ何ノ道ニモ吉也腹脹腫大ニ成タル腸癰十四五ノ童

ニ在テ後腹破レテ膿二三合程出嘔吐ノ必可死ト思タル
ニ何ソ好ム物ヲ食セヨト云タルニ燒鳥ヲ好ム故ニ小鳥
ヲ燒セテ進メタルハ其上ニテ食氣出來ヲ本復シタル者
アリ其外腫脹甚キハ不治也婦人ニ多シ産後ニモアリ
○腸癰内癰ヲ見付ルヲ腎ノ手柄トスル也内癰ノムツカ
シキト云フハ諸人モ知レリ膏藥ヲ蠟ニテ丸シ吞下ス治
法モ見ヘタリ諸書ノ論可考

癰疽疔之次第 附風毒

○癰ハ脊中腹脇腎ニ出來ルヲ云腫物ノ初テ出來ルハ少
キ者也坐ヲ取リシコリアルハ癰也治法不潰中ハ可清熱
消毒追風通氣湯モ佳也潰テ膿多來ル時ヨリ四君子湯異

功散益氣湯人參多入レテ可用又ハ獨參湯一匁或二匁兼
用ユ口苦有熱ハ八物湯十全大補湯人參養榮湯可也

○疽此一條疽ノ形狀潰後ノ次第畧之

○疔ハ手足面ニ出來ルヲ云小ナル者ニテ甚痛腫或手足
ニ出來テ夫ヨリ赤筋ヲ腹ノ方ヘ傳ル其道ニ灸ヲシ或ハ
刺テ血ヲ出スヲモアリ皆外科ノ功者ナル者ヲ招テ可治
療内癰ハ敗毒散合消毒飲或苓連消毒飲可也癰疽疔ノ治
法可見合

○風毒腫ハ皮肉ノ間ウム也痛ム處ムツクリト腫テ上皮
ニ赤ミ無之癰疔トハ色モ違ヒ肉ノ間ウム也疔氣腫ハ風
毒腫カト疑フ也疔氣ハ腫タル處ニコリテ底堅キ物有ハ

痰又ハ疝氣ノ属、ウハ様ニテ、ウマヌ者多シ、ウミタルカ不
膿カト云フ正メ可針、不膿者ニ針スレハ惡シ、按テ穴ヲナ
ス中ハ不膿、按セハハ子反スハ膿アリ、度々此類、此考ニテ
見レハ自ラ得心スル也、風濕ノ氣血中ニ滯テ、腫テ穴ヲナ
シ、可膿カト思フニ、思ノ外、不膿ノ散シ、風疹ナト出テ、或一
身ニ細ナル物出テ、甚痒ク、散ルモアリ、風毒カト云、症ニ、此
三段ノ工夫アリ、數人見クラヘテ、夫々ニ合ルヘシ。

○風毒甚者、如傷寒、謔言煩悶スル也、脉進テ弱、擲手足苦悶
セハ、手足ノ中ニ腫ル處カ、痛ム處カ有テ、改テ可知、手足ニ
腫タル處カ、シコリタル處ナキガ、熱病也、傷寒後ニ腫物出
來ルモ、風毒也。

○男子年四十、肘ノ前、腫痛、難堪、カコブノ出來ル處也、難堪
痛後ニ、其腫按則穴ヲナス、外科膏藥ヲ貼シ、明日針ヲセニ
ト云タルニ、予熱慮ノ腫處ヲ見、痛因ヲ問ニ、病人云、何ヤラ
グリノトノ凝リタル物アル様ニテ、痛ト云、サテハ疝氣
カ、氣血ノ凝滯也、按而穴ヲナス中ハ、不膿トアレハ、針スル
病人ニ非スト思テ、膏藥ヲ取リ、三和散、加柴胡、山梔子、或ハ
黃芩ヲ入テ與ヘ、痛和シ、後ニ一身ニ痒キ物出テ、腫退ク、奇
妙ト人評シタリ。

○風毒案一條畧之

○臙瘡赤腫痛、用黃連、黃柏之類、皆涼藥也、久而不愈、其瘡冷、
反當用溫藥、煎油為膏、貼之、加鹿角、灰、頭髮、灰、乳香之類、當愈。

此陰陽寒暑往來之理也。口訣有外邪者，荆防敗毒散，入重屬陰寒者，大防風湯，加五爪龍和名薺艸，外以三香膏。乳香、松香、大黃、蠟小、輕粉少，右油煎，先入蠟、乳香、松香、輕粉，各次第二入，稍久紫黑者，以解毒治之時，用葱湯洗之。右一條長崎之醫許斐元綱傳。

婦人科

調經

○調經ト云ハ、經水ヲ調ルヲ云。經水期ヨリ先、或後ル、アリ、經水ノ色淡ト黒トアリ、回春調經ノ主方ノ條下、委クアリ、格言也、可覺之也。

○經水久不調、腹痛アルハ、氣血凝滯スル也。桃仁肉桂大黃

當歸紅花甘草之類ヲ用テ、血ヲ破テ下ス時ハ、堤ヲ切テ、水ヲ通スル意ニテ、スリト行テ止ル也。久ク不止ハ、一度ニ餘程ツ、來テ、三四日ノ中ニ止ルガ、經水ノ順也。少ツ、來テ、久ク不止ノ腹痛スルハ、キレリタル意也。腹痛ハ、血ノ行ル道ニ瘀血塞テ、行ル氣サレ支ル故ニ痛也。氣ガ瘀血ヲ衝テ、ソコニ氣モ滯テ不行也、皆實症也。

○經水久不止ニ、虛症アリ、腹痛アルニ、按ハ、使ク覺ヘ、或温暖ヲ好ム者アリ、是温補ニ、或升提スル治法可也。

○血虛燥火アリテ、久不止者アリ、脉虛ニテ、數下焦熱有テ、崩下スル也。尺脉有力、是ハ六味丸ニ加減シ、或四物湯、加黃芩、黃連、黃柏ノ類、或ハ物湯、加黃芩、山梔子テ可也。回春保元

涼血清火ノ心得可見合也。

○血症腹痛ノ虛實ヲ知ハ前ニ云如ク實症ハ腹ヲ按テ
不好心下滿ル也。按テ痛ハ實也。虛ハ腹ヲ按スニ柔ニ成テ
按スニ好也。惣ノ腹軟ニ心下スキテ無力也。是虛實ヲ
知ルハ至極也。回春腹痛門ニ在リ

○經水先期而來者血虛有熱也。治當補血清熱經自順也。

○經水過期而不來作痛者血虛有寒也。治當溫經養血痛自
止也。

○經水將來作痛者血實氣滯也。腹中陳々作痛乍作乍止氣
血俱實治當行經順氣痛自止也。

○經行著氣作心腹痛腰脇疼者乃瘀血也。治當順氣消瘀血

痛自止也。

○經水過期而來紫黑成塊者氣鬱血滯也。治當調經順氣經
自準也。

○經水過期而來色淡者痰多也。治當活血化痰經自調也。

○經水過期而作痛者血虛有熱也。治當生血清熱痛自止也。

○經水過多久不止者成血崩也。治當涼血補血經自止也。

○經水行後作痛氣血虛也。治當調養氣血痛自止也。

○經水去多久不止發腫滿者是脾經血虛也。治當補血健脾
利小便水腫自消也。

○經水月久不行發腫滿者是瘀血滲入脾經也。治當活血健
脾行氣腫自消也。

掠耳膏言

公得者見下

三

○經水日久不行。腹脇有塊作疼者。是血結癥瘕也。治當調經止痛。塊漸消也。

○錯經妄行於口鼻者。是火載血上氣之亂也。治當滋陰降火。順氣調經。經自準也。脉必芤濇久而不治。乃成虛怯。

○經行身痛麻痺寒熱頭疼者。乃觸經感冒也。已上婦人調經之文。出回春。

○升陽舉經湯 畧之

○當歸附子湯 蘭室秘藏 婦人門 治臍下冷痛赤白帶下。當歸二分

炒鹽三分 蠟稍升麻 各五分 甘草 六分 柴胡 七分 黃柏 少許為引

附子一錢 乾薑良薑 各一錢 右為麋末。每服五錢。水五盞煎至

一盞。去渣稍熱服。或為細末酒麪糊為丸亦可。

烏藥一兩 香附子 二兩 右咬咀。每服五錢。水二大盞。去渣溫服

食前

○調經ノ數論ヲ能知テ。胸ニ可有治法ニ。惑フ事ハナキ也。

症ヲ明メ子ハ藥適中セヌ也。血中有熱ハ加味逍遙散加黃

芩黃連之類。常女血崩下スルト云テ。不時ニ如經水大ニ崩

下スルハ有虛又ハ熱多ニ解毒湯ヲ以加減メヨシ。虛冷ハ

溫テヨシ。溫テヨキ治療ハ心安クハ物湯十全大補湯。或理

中湯四君子湯ニ。當歸川芎乾薑肉桂ナトノ類。瘀血ノ滯リ

タルニハ桃仁肉桂大黃ノ三味。如常煎服ノ使メヨシ。能去

瘀血也。○惣ノ血ト云者ハ氣ニテ順行スル也。水ハ不動ノ波ヲ立

テヤルハ風也。風ハ氣也。夫故ニ血滯ル症、輕キハ烏沈湯、川芎、肉桂、木香ノ類、氣ヲ順メ、血モ自ラ行ル也。四物湯ヲ主トスルト思ハ、惡シ、俗ニ血ノ上ルト云フアリ。是ハ血ハ不上、氣ニ連テ逆上スル也。熱アレハ氣逆上ス、熱ヲサマセハ、血ノ上ルト云フナク、氣下ル故ニ、血ヲ下サント思ハ、末也。熱ヲ清フスレハ、氣下テ血不上也。虛冷ノ症ハ、血升ル者ニ非ス。上ル氣ナキ故也。陽氣虛スレハ、下陷スル也。虛冷スレハ、血反テ下ヘ脱ス。溫メテ升提スヘシ。

○瘀血腹痛ニ、建中丸ヨロシ。桃仁、肉桂、大黃、三味トメ置モヨシ。肉桂ヨク上皮ヲ去リ、辛處ヲ用。大黃ハ剉ミ酒ニ浸シ、日ニ干シ焙リ用ユ。

○血崩久不止ヲ、俗ニ長血ト云。白帶下ヲ、白血ト云也。

○經水十二三ヶ月モ、十三四ヶ月モ不行、胎ノ様ナルアリ。然レ氏按テ見ルニ、ソコニ活物無之、シコリ有レ氏、ソコ軟ニメ、子トハ違フ也。シヤクル様ニスルアリ。胎カト疑フ有リ。然レ氏、シヤクル形、搐スル意ニテ、ビクノトスル様子、活物ノ働トハ違フ也。得ト知ヘシ。

○乳頭黒キハ、多ハ胎也。五六七ヶ月ヨリ、乳張テ乳頭黒ク成ハ胎也。然レ氏、瘀血モアリ、瘀血滯テ張ルハ、十ヶ月ニ及比ハ、顔色トコヤラ不潤也。胎ハ九月ハ多ハ顔色ヨシ、格致餘論ニモ、血塊ノ症ニ、乳頭已黒トアリ。

○調經ハ、虛ハ補ヒ、鬱滯ハ氣ヲ順メ、調ヘ、或血ヲ順ス、回春

調血ノ意味吉。

○婦人ノ經水ハ十三四五ヨテ行也。女ハ男ヨリ血多キ故ニ。一身ヲ行リ餘リタル血子宮ニ滿テ。三十日ニ一次行ル也。二日半三日半四日行テ止ムカ。婦人ノ常也。弱キ症ハ七日八日十日モ十二三日モ不止也。七日ノ中ハ不苦。七日ヲ過ルヲ期ヲ過ト云也。胎ヲ結ヘハ經止テ。産後ニ瘀血來ル也。産後乳汁出テ兒ニ乳ヲ飲スレハ。三四年モ乳ノタツフリト來ル中ハ。經水不來也。是ハ脾胃ノ飲食ノ消化ニタル力潤血ト成リ。乳汁へ行ル故ニ。血ニ餘ル程ナギ也。産後四五八月。或一年ニテ。經水行レハ。乳汁少ク成也。産後經水止テ後懷胎スルハ。俗ニサカイト云テ。經水一ヶ月行ル也。

夫カ胎ヲ結ブ證也。一ヶ月行テ。夫ヨリ數ヘテ。十ヶ月産月也。經水月々ニ行ルハ。胎ヲ不結。其中ニ經止テ。三ヶ月ニ惡阻有テ。吐逆食物好ミ。或酸ヲ好ミ。又不好モアリ。四五月モ不行ノ。朝空腹ニ臍下凸ニ成テ。後ニモヤノト動キヒクノト動キ。活物ノ狀知ル、也。婦人經行ノ間。三十三年也。内經ニモアル意也。

經閉

○經閉。或瘀血為痛之類。煎劑之間。紅圓子。兼用之。而有効。予此醫案。夢中得之。用之數得効。故記之。

○經閉。脉中有方。沈而不鼓。或無力アリ。予治數人。附子肉桂。乾薑。右為主。烏藥。沈香。為臣。或桃仁。紅花。血鬱虛冷者。非附子。

肉桂無効也。行血ノ劑順氣次之。何トナレハ元陽ノ氣虛而凝タルハ非溫劑不達也。人參モ亦可也。

○婦人經水十二三月不來。十ヶ月ハ胎ト疑フ。雖然腹ケノミ大ナラズ。臍邊塊處々按而攣痛。十六七之婦始而經行ル後如此事間々有之。平素蟲積ニテ香アル藥或苦藥惡心ノ不受。予三靈ヲ煎湯ニノ用ヒ數貼ニノ安ク經行也。

○經閉實症者。桃仁肉桂紅花大黃當歸甘草煎服。

○經閉大格此治法ヲ以不治ハ破血ノ主方。處々見合セテ可施治也。

○虛冷元氣不下行經閉者。人參附子肉桂乾薑丁子當歸可也。必竟虛冷ハ大溫劑ニテ溫レハ血行ル也。瘦人ハ熱ヲ和

メ積ヲホトク意也。實ハ破血ノ劑ヲ用ル也。

○虛勞血涸ハ血ノ源絶テ不行故ニ腹張りタル氣味アル也。桑韓腎談未發之火ニ辨アリ。

血崩

○血崩脉虛微或大而按之無力。真陽虛者產後脫血諸症脫血ト同症也。十全大補湯益氣湯加附子肉桂。附子理中湯。四君子湯加當歸川芎或獨參湯。間ニ安神散。脉得方則去附子或黑炒乾薑八物湯。

○虛瘦之婦脉五動。血崩諸補不効。四物湯合黃連解毒湯而止。

○血脫之後脉弱尺有力。虛中有熱者異功散。四物湯加黃連

○血崩久不止。正氣天香湯。加炒乾薑。茯苓。防風。頓安。久服全愈。不用炮乾薑。炒乾薑。宜黑炒乾薑。

○婦人年四十四五。崩血久不止。數方不効。用人參劑無効。八物湯。十全大補湯。安榮湯。不應。腹痛時。久。少。脉弱。當歸。川芎。黃耆。防風。白朮。黑炒乾薑。阿膠。甘草。右適中而止。予以當歸。川芎。和血。升提之劑。黃耆。防風也。白朮。八補。脾胃。黑炒乾薑。阿膠。止血。實理。乃配劑也。

○血崩不止。炒蒲黃。生地黃。黃芩。右三味。用。頓止。

○東垣升陽除濕。防風湯。黃耆。蒼朮。柴胡。羌活。升

麻。藁本。防風。蔓荊子。當歸。獨活。甘草。右水煎。

○升提神劑。黃耆。防風。桔梗。獨活。羌活。蒼朮。

陳皮。甘草。右水煎。

○血崩腹痛難忍者。按而痛。不可近手者。實也。瘀血凝滯。而不得流行。血道澁而不止也。逐瘀血。則其提坊流下。而血則止。桃仁。肉桂。大黃。當歸。甘草。紅花。

○壯婦血崩之時。腹痛甚。為食傷。服藥而痛微和。而後甚。攣痛不能偃卧。十一日。倚床。脉五動。有幅。如益氣湯之脉。醫以補劑。反苦悶痛甚。予劑。以頓止。數貼之後。偃卧而安。

○婦年四十。經水經月不已。腹痛難堪。此劑數貼而安。

○婦經水過多。腹痛難忍。以此劑。似痛和。經日不已。香砂養胃湯。去人參的中。此婦平素。心虛。痰鬱之症也。

○血崩久不止。腰少痛。或腹少痛。黑色小塊來。二。山田振藥

或煎服

帶下

○婦人去春ヨリ帶下醫治療秋末瀉不止卧床小便濁如膏糊兩手指ノハラヨリ汗多流レ不能舉枕諸虛悉發諸藥不効四五醫用藥無効子翌年二月見之苦キ藥ト香氣甚キ藥ヲ用レハ腹雷鳴ノ心下ニ支以逍遙散加人參陳皮山梔子或異功散百貼即至夏舉枕初秋漸步行而愈

○婦人帶下多有者也其色白クヲシロイヲ解タル様ニ來ルハ白崩也或白淫ノ類モ有之濕熱心腎不交類也清心蓮子飲異功散逍遙散或蒼朮黃柏羌活防風陳皮半夏茯苓甘草ノ類ニ加減ノ佳也

○帶下粘ル者ハ久夢ノ為虚甚ハ物湯因症十全大補湯益氣湯六君子湯異功散ノ類六味丸八味丸ノ類ニテ治其本○予多治帶下帶下ヲ止ル治療ハ必惡シ帶下ハアレハ氣分サヘ能ク成レハ自ラ止ム者也帶下ヲ止ント思フ心ニテ治療スルハ初心ナルヲ也是自得ノ治法ニテ無テハ誤ルヲ多シ不可用止瀝之劑也

○婦人帶下午後日日惡寒或熱少來怔忡不時氣沈陷如乘舟車或持積冲上食頃而安或頭重二陳湯合烏沈湯平胃散或正氣天香湯合二陳湯平胃散加柴胡防風數貼而愈

○延壽院家方赤白帶下脉洪數ナラハ赤芍藥香附子大黃柏中甘艸小右細末用之或加棕櫚毛灰良也脉虛細ニノ無

是等證

卷四

四

數者白芍藥香附子研生薑細末ノ飲スヘシ加髮灰毛良
○予按スルニ棕毛灰止下血髮灰血崩用之止赤帶下イ力
ニノモ不已時少用毛佳也血止而不快者久服不可也自ラ
止ルカヨシ

○白帶下久不止或尿白濁陰中常有白汁而腰痛面色青少
脉弦數ナルニハ柴胡香附子羌活芍藥中青皮知母右煎
用時ク黃柏中知母酒製芍藥中細末為丸可送下此劑意味
アリ下焦濕熱腎中熱アルニ良シ此症多シ

○治赤白帶下腰痛或小腹痛有熱者 檮皮二兩或椿根皮延胡索

側柏葉 茴香 當歸 黃連各半香附子八錢肉桂 烏藥

各三神麴炒麥芽各一錢右用二

○帶下ニ養生藥ニ用テ吉予常ニ用之羌活獨活防風桔梗
枳殼茯苓陳皮蒼朮甘草下焦有熱ニハ加酒炒黃柏虛者加
人參右下血或痢疾脫肛痔何レニモ可也加減モ同シ

○心虛有痰者清心蓮子飲

○帶下虛冷ハ大補湯或入門正氣補虛湯八味丸益氣湯加

附子肉桂或入參白朮為君附子肉桂乾薑宿砂木香類也

○帶下多ハ自濕熱發ス下焦ノ熱ニテ帶下多シ清熱化痰

和脾胃而自止也人參白朮脾ヲ補ヒ二陳化痰或南星或瓜

薑仁貝母清熱ハ黃芩黃連或知母黃柏此中ヲ撰ニ用ユ

○陰虛火動ノ有咳嗽者不受滋補或八物湯之類者虛而不

是等症

受補死症也。似勞症者アリ。以脉可知。トコヤラニ脉力サ有テ。緩ナル味アリ。是ハ實ノ勞症ニ非ス。勞症ハ脉力サ無之。乾テ虛數也。半年或一年。寒熱盜汗。咳嗽而後。必大便溏スル。十四五日二十日許ノ後。足跗浮腫ス。是胃氣下陷也。如此而死。

○近勞症者。消瘴湯肺疳方。間々有効。蟲積似勞者ハ蟲積ノ治法ヲ以ス。喘息ブラトト煩テ。似勞者アリ。呼吸ノ體喘急ノ格アリ。脉虛微濡弱。或力サ有之。勞脉トハ異也。夫々ノ症ヲ能取リ。覺ル時ニ可知也。

○延壽院家方奇方アリ。婦人不食ノ。似勞症。數劑無効。後二ハ不食米穀菓類。大小豆ナトヲ食ノ。胸塞テ難治ノ症ト云。

二。此一方有妙。服ノ後。胸膈鳴者。的中也。百合大薏苡仁大當

歸 柴胡 黃柏 牡丹皮 檳榔子 阿膠各小 香附子

麥門冬各中 吐甚者。加生薑皮。便結加桃仁。

○滋陰至寶湯。治血虛陰燥。發熱咳嗽。或病陰燥生火。或燥痰。或熱病補瀉之間。見進退之時。用之可也。夏月用清暑益氣湯。不効。宜是得大功。

○龍膽瀉肝湯。婦人頭痛上氣。或怒氣脉數。補陰補氣不効者。宜此劑。

○男婦共ニ治法同シ。勞症ノ部可參考。桑韓醫談已發未發之火之辨。考見可知。

