

提耳談



提耳談卷之五

胎前

○延壽院家方。惡阻甚而嘔吐痰水。不食過十日者。香附子
茯苓 陳皮 麥門冬 各大厚朴 前胡 各中白朮 小甘草少
右水煎入研生薑。

○治胎動腹痛不寧。芍藥炒中當歸 黃耆 各小甘草少
右入葱白煎服。又鯉魚ヲ煮少ツ、食セシム可依脉症。
○胎漏下血。可辨寒熱脉之遲數。熱則 生地黃 大芍藥 竹
茹 各中荆芥 黃芩 各小冷症ナラハ。乾薑 中當歸 阿膠

遠志各小

○胎前胸甚痛。香附子 黃芩 芍藥 各中枳殼 陳皮 各

小若妊娠者蟲發テ胸痛ハ。香附子 前胡 檳榔子 青皮

懷妊腹痛甚者。芍藥 大 香附子 中陳皮 當歸 各小腹脇

筋攣痛ハ。加青皮紫胡

○妊娠腰背痛。熟地黃 大羌活 中當歸 甘草 各小

○妊娠傷寒。大便數日不通。紫胡 中芍藥 中大黃 枳實

黃芩 各小甘草少

○妊娠平素脾胃弱。懷妊メ猶中焦ノ氣鬱ノ。紫衛ノ氣肉中

ノ順行シ難ク。四肢滯リ。津液不行メ。生浮腫。白朮 大茯苓

陳皮 各中芍藥 羌活 防己 各小生薑

○治惡阻秘方。其妙不可言。無定吐令食。前胡 麥門冬
陳皮 各中阿膠 宿穀 茯苓 各小甘草少 生薑皮 予用之
知其妙神方也。因血不食則又能食ス。

○胎前腹痛之辨。墮胎而小產者。痛中ニ努力スレハ。痛臍下
ト脇卜痛也。先問テ可知。產門潤有テ如漿水者來リ。或瘀血
來ル者十之九。小產スヘシト可知。常ノ胎動。或食滯蟲痛者
中腕ヨリ上胸ク邊痛者也。產門ニ何ノ子細モナレ。是ヲ以
テ可知。

○婦人八月夜半腹痛有ト云テ招予。問之ニ痛胸下上腕ノ
邊也有恶心。產門無別儀。予以為食滯蟲痛ノ類也。不換金正
氣散加香附子宿砂茯苓一貼振出シ用テ頓止。二三貼煎服

而安。

○妊娠四ヶ月。瘧日發時。く臍下攣。胎ノレヨリ。常ヨリ殊ノ外下リテ。今一二發振ヒ。ダラハ胎可墮ト思フ様也。有盜汗。脉按而弱。兩度經止テ。四五ヶ月ニメ墮胎ス。今瘧ノ中ナレハ。猶以可墮。以異功散加當歸宿砂阿膠紫胡人參一分ニメ。晝夜二貼ツハ用ヒ。翌日瘧發ル。輕ク。連くニ瘧輕ク。胎和メ愈。

○治妊娠時々腹痛或胎動能安胎。當歸 川芎 阿膠
宿砂 右水煎服。

○婦人三十餘妊娠九月。鼻邊口渴。乾燥帶黑色。滋補而渴止。到產月同臨產脉數。腹痛時止。時來漿水來而不產。兩日連く

努力ノ氣弱也。漸臍ヨリ上ニテ呼吸レ。後嘔吐メ死。安胎之神劑異功散。加阿膠宿砂當歸。予常用之。免難產及血暈。虛婦結胎。則自三四ヶ月常可服之。試數人而得効。

○小腸艾湯治頓仆挫跌胎動不安。或搶上逼心。或腹痛下血。阿膠一兩。艾葉二兩。指迷方。加秦艽一兩。右水煎服。

○膠艾湯不問月數安胎極妙。熟地黃 艾葉 當歸 炙甘草 川芎 阿膠各一兩 黃耆二分 右水煎。大全有芳藥一丸。入生薑大棗。

○治胎漏下血。白朮一兩 黃芩五分宿砂 阿膠炒各一兩。右煎。

○醫學正傳云。胎動者因火逼。動胎逆上。作喘急。用黃芩香附

子之類。

○子癇。羚羊角散。治妊娠中風。頭項強直。筋脉攣急。言語蹇澁。或時發搐。不省人事。謂之子癇。本 羚羊角 獨活 酸棗仁 炒
五加皮 各五分 林 蓼茲仁 炒 當歸 防風 川芎 茯神 杏
仁 各四兩 林 木香 甘草 各二分半 右每服四錢。生薑五片。水
煎。

○獨活防風湯。治妊娠角弓反張。口噤謂之風痙。又曰子癇。
獨活 防風 麻黃 各一分 肉桂 羚羊角 升麻 甘草 炙
酸棗仁 炒 秦艽 各八分 當歸 川芎 杏仁 各六分 右每服七錢。薑
四片。竹瀝一合。水煎。防風 葛根

○防風葛根湯。治妊娠中風。腰脊強直。反張。防風 葛根

川芎 生地黃 各二分 杏仁 麻黃 各一分 肉桂 獨活 防己
甘草 炙各半 水煎 入四分。人參。當歸。川芎。升麻。甘草。炙
葛根湯。治妊娠臨月。忽發風痙。不省人事。吐逆眩倒。少時醒
後復發。謂之子癇。葛根 防己 防風 當歸 川芎 牡
丹皮 肉桂 茯苓 澤瀉 各一分 人參 石膏 獨活
各一 甘草 炙半 加貝母。令人易產。未臨月者。以升麻代之。
羌活 一分 炙。為末。黑豆一合。炒黑。投酒中。沸定去豆。調藥末。幹開
口灌之。稍醒再灌。有効。
○受胎三月。經水不行。俗ニツワリト云嘔吐。食之。食好。メ
メ。常ニ不好物ヲ好ム者也。是胎ト易知。又惡阻。ナキ者モ

アリ。經閉カ胎カト疑テ醫ヲ招ク。多シ胎ノ脉ハ進テ顏色ツヤ常也。經閉ハ脉緩ニメ。病ル顔色アリ。是先大法也。夫ニテモ十分難知ハ。兎角胎ノ結フ。次第ヲ先知ヘシ。胎ニ結フハ。三月ノ末ヨリ。臍下トクヽド。水ヲ落ス様ナル心アレ也。五月ノ末ヨリ。時々動形アリ。六ヶ月ノ始中比ニハ。臍下早朝ニハ。凸キ形有テ。凝タル小塊アリ。ムツクリト臍下高モアリ。是胎也。動カ不動カト云ニテ。胎ヲ定ムレハ。ハズレズ。三四月ノ間バ。難決。脉遲ナルハ。十之七八經閉也。

○姪婦年三十。胎九ケ月ニ成テ。墮胎。或十月ニ滿テ。產スレ氏死胎ニテ。產ス四五人不育故ニ。予ニ求治。予結胎三月ヨリ。異功散加宿砂阿膠當歸。人參一分入。一日ニ一貼ツ、用

之下畧之

○壯婦有熱者ハ。黃芩ナト加ル。下モ可有。正傳ニ香附子ト云ハ。不空也。墮胎ハ下焦ノ陽虛也。下氣ノ藥ハ。不可用。虛く也。

○四十二三ノ瘦婦ノ胎ヲ結フ。ハ。臍下ニ凝タル狀。大ナル手鞠ヲ入タル様也。連ニニ大ニナリ。胎力胎ニテハ無クト疑フ。ト多シ。若キ時ノ胎ノ動ク様ニ無シ。意ヲ付テ可施治。予數人ニ。惱ミタリ。兎角活物中ニ在ト無トナリ。接テ臍下ノ動ヲ可知。

○姪娠四五月ノ中ニ。經水ノ如ク多来ルアリ。胎漏ト云。前ノ治方ヨシ。異功散加當歸宿砂阿膠。有熱則加黃芩。

○胎前ニ脉弱キアリ。是モ目當ニハナラヌ也。惣體ノ顔色元氣ノ體ヲ可考。脉滑數ナルニムツカシキモアリ。兎角産前後氏ニ主熱ノ婦ハムツカシキ也。

○萬病回春。胎前安胎ノ治法ハ用テ見テ功少シ。予試テ功アルハ當歸阿膠宿砂ヲ。人參白朮ニ加ヘ或四物湯ニモ加ル也。子懸ト云テ心胸ノ癉痛スルモアリ。回春ノ子懸ノ治法無効。予カ安胎方有神功。子嗽下テ咳不已モアリ。是モ安胎ノ可也。化痰次之。蟲積ナトアル婦ハ黃連乾薑ノ類不換金正氣散ニ加減ソ用ルモアリ。或三靈陳皮茯苓モ用之。常ノ啖嗽ノ療治ノ不治ハ安胎ノ可也。

臨產

○臨產催生入劑數方アリトイヘビ不可用。必竟無虛者天理ニテ自生ス。虛ハ入參ヲ得テ努力ノ精力不盡様ニ。自生スルヲ可得。陽虛ハ催生ノ藥可用理ナシ。何トナレハ陽氣虛スル者降氣下利ノ劑ヲ用ル時其藥氣ヲ下へ連レテ行。陽氣ソカ乏キ故ニ催生ノ藥下行スル。ナラス脾胃ニ停滯メ反テ減真陽。十全大補湯異功散加川芎當歸。或理中湯實症者ハ當歸大川芎陳皮茯苓各中之屬。

○平素血虛好甘者血中有燥熱ハ六味丸煎加肉桂。

○姪婦十一ヶ月ニ至リ。十一日腹痛潤ヒ少シ来リ。稍產せントス。川芎當歸黑炒乾薑ヲ用テ夜半過腹痛止。其以後時止時痛。予如此ノ症死胎ノコアリ。子ノ動ハイカニト問ニ。

子ノ傷ヨシ然レハ漿水來テ腹痛難忍時節アルヘシト云
テ夫ヨリ打卧テ居タリ脉五動或緩ニテ無力當歸川芎入
參一今黑炒乾薑阿膠ヲ用テ産後ノ脫血ヲ防テ置シ也十
九日ノ夜腹痛ノ安産母子共ニ健ニメ無血暈

○姪婦臨月ニ入テ四日ノ晚腹痛餘程努力ス潤ヒ不來予
以為產月延テ十一月位ノハ催ソ居スワルト希也此婦產
月ノ初ナレハ居スワルト有ヘシト云テ當歸黑炒乾薑陳
皮茯苓ノ劑用置ク中ニ痛止リ一兩日少ツ、痛テ後居ス
ワリ無事川芎ヲ去タルハ此婦平生吐アル症ナレハ不用
翌月ハ十一ヶ月也十一ヶ月ノ七八日目ニ又腹痛メ夜ニ
入テ呼ニ來化往テ見ルニ媼婆モ來リ今宵ニテ可有ト云

然レ氏破水モ不來異功散人參五厘加當歸宿砂阿膠用ル
中ニ又痛止十二三日快其間此劑ヲ用ヒ其以後夜中腹痛
強ク成テ破水來リ安産ス

小產後

○小產前後常ノ產ニ變ルトガ其中ニ服藥シ或絕產ノ
藥或牛膝ヲサシテ子ヲ殺メ小產スルアリ夫ハ寒戰シ發
熱メナヤミテ腹痛シ小產スル者也攻擊絕產ノ藥ハ巴豆
輕粉木綿子ノ類水銀ヲ服ソ小產スルアリ毒藥ニ當テ母
モ死スルト多シ其脉進無力寒戰發熱汗出テ死ル者多シ
○蕎麥切卒三大根ニテ食シ或辛キ物ニ中ラレテ小產ス
ルトアリ毒藥ニ中ラレタルヨリハ輕シ

○倒仆メ胎動シ小産スルアリ何レモ川芎當歸阿膠宿砂
黑炒乾薑バ類ヲ用テ胎ヲ和シ脫血ノ難ヲ防ク也。

○小產前後共ニ常ノ產ノ治法ニ違フトナシ常ノ產ヨリ
急ニ死ルレ多シ格致餘論ニモ觸テ墮胎ストアレハ無理
ニ小產サセタル也或毒藥ヲ用ヒ或ハ牛膝ナトラサシテ
胎ヲソコナフ故ニ小產後ハ反テムツカシキ也。

○小產後虛アラワルハ常ノ產後ノ補虛ト違フトナシ
恶心吐逆ハ不換金正氣散加茯苓香附子乾薑或三靈或建
中丸大卜用ル也壽世保元小產ノ治法可参考。

中產後

○婦人初產六月中旬產ノ後呼吸アラク耳甚鳴如不通時
時燈暗シ氣沈陷脉數左弱右沈如有熱予見顏色唇白蒼是
去血過多也四君子湯合芎歸湯加炒乾薑人參二分ニ貼之
後間ニ用安神散呼吸靜也氣正ク右脉力サ出來數如帶熱
雖然同劑用之三貼之後脉和而愈

○產ゾ一日ノ間脉數トイヘ甲根熱多シ初產ノ婦ハ產門
ノ痛ニ依テ數アリ氣虛脱ノ者數アリ肌熱シテ如實熱脉
時時又靜ニ或大按テ弱ク或數ニノ擊ス來ルト有テ去ル
トナシ皆虛脉也

○延壽院家方產後瘀血残リ上氣ニサソワシ惡血上リ滯
リ耳鳴リ聲スルハ速ニ降氣ノ可去惡血香附子桃仁
牡丹皮各中枳殼紅花各小童便

○產後子腸出而如脫肛不收ハ、八物湯加黃耆防風升麻二
三日モ不收トアリ。外ハ淡竹葉ノ煎湯ニテ洗テ。五倍子白
礬ヲ末ノ摺リ掛ケソロト押入レ。又小麥ト葱トヲ煎
シタル汁ニ込硝白礬五倍子三味ヲ末ノカキ立テ。陰門ヲ
浸シ洗テ推シ入ル。

○產門痛三子腸出ルニ妙。平常ニ治療ス。石灰十匁黄芩三
匁右為末。大ナル袋ニ入。湯ニテ振出シ。其湯ヲ以テ布ニ浸
シ。陰門ヲシツカリト温メホコト蒸ス心ニテ洗
テ可也。

○產後血暈虛實脫血スルハ虛也。唇必白ニ。血產門ヨリ崩
下ノ元氣ノ脫急ナル症間々有之。手足急ニ冷痰胸ヲ攻レ

ハ急症也。急ニ死ス。手足少冷或不冷ノ血暈スルニ。四君子
湯加當歸川芎黃耆黑炒乾薑常ハ人參一分或一分五厘甚
者三分。其間獨參湯ヲ薰ル。一六七分或一匁。生薑不入。

○手足冷甚者。附子理中湯加黑炒乾薑獨參湯或十全大補
湯加黑炒乾薑去肉桂又妙也。太體十五味安榮湯モ可也。痞
蟲アル者。八君子湯加當歸黃耆黑炒乾薑或人參理中可
也。和劑局方ニハ人參理中湯ヲ。產後ノ妙トス。

○脉有幅無力者ハ氣虛也。兔角按ノ無力顏色白黃唇白ハ
虛ト知ヘシ。急ニ死ル症アリ得補陽而元氣復スモ多シ。

○安神散兼用。眼暗シト云者也。或燈火遠ク見ル多シ。
急ニ暗ナシト云者。脫血多故也。腹鳴多血下ハ惡症多シ。

○無腹痛而血下八大虛也。腹痛八實也。瘀血行ル故ニ痛ハ常也。必入唇ノ色常也是ハ不苦也。

○血暈ノ補フ中ニ恶心アルハ實也。理中湯可也。吐逆スルニハ不換金正氣散加香附子茯苓乾薑振出シ用之テ可也。

吐止テ氣晴ヤカナルハ實也。夫ヨリ不換金正氣散ノ振出シ交用テ人參劑ラソロくト引ク心得可也。

○上氣脣赤腹痛頭痛脉按ノ有刃或進テ滑ハ實也。瘀血ヲ行シ氣ヲ降メ可也。順氣ニハ香附子烏藥行血ニハ青皮内桂紅花當歸川芎牡丹皮牛膝延胡索ノ類或桃仁肉桂大黃當歸紅花ノ類能瘀血ヲ順下ス。腹痛ニ可也。熱頭痛上氣或腹痛十五味ノ振出藥可也。八物湯加黃芩黃連大黃肉桂桂

心木香丁子川骨沈香或莪朮右山田振藥ト云。

○八物湯ニ黄芩黃連大黃木香肉桂丁子川骨是十五味也。瘀血腹痛ニハ山田振藥モ可也。大體ノ瘀血ニハ此十五味可ナリ。

○回春調血飲ノ加減可也。ノ書半能可見。調血飲ノ本方。瘀血腹痛ニ可也。然レ氏飲ニクキ藥也。牡丹皮益母艸熟地黃川芎皆蟲ツカエ持タル者イヤガル者多シ。故ニ前ノ治法ニテ治療ノ後可見合也。

○烏沈湯合川芎當歸產後腹痛ニ可也。

○婦人年三十七八產ノ唇白ノクビ多出脉大無力眼暗ク血暈有汗安神散。茯神黃耆遠志各一錢人參桔梗各

木香

山藥

辰砂 各三分

甘草 四分

右為散人參理中湯

此二劑用之其中ニ惡心ヲクビアリ是胸中食力氣力痰力持積力鬱滯メ實似虛也不換金正氣散加香附子茯苓檳榔子振出メ用之頓ニ安シ此症多シ似虛テ危キ體也然レバ

惡心有ヲ以テ為實也多ハ產前ノ食滯停テ產ノ努力ニ連テ胸中ニ滯テ惡心嘔吐ヲナス也調血飲ノ條ケ様ノ辨テキ故ニ惡心吐逆ヲ以テ瘀血冲胃ト見テ違フタル治療スル也タトヒ瘀血ニテモ胃中ニ滯リタルニハ不換金正氣散三靈可也

○丹溪曰產後大補氣血為主予以是如得今以為以補氣為主有實者以進食為生產後氣不收則脾胃不能運行用血藥

則反テ滯テ不食又因臨產動蟲積動メ胸中ニ上リ或臨產ノ時食胸ニ泥テ不下產後惡心吐逆入多是虛中有實去實則惡心止胸中開テ能食ス食則安シ去實者不攻擊只微和メ可也不換金正氣散加香附子茯苓乾薑或蟲積者陳皮茯苓香附子檳榔子黑炒乾薑甘草或三靈加陳皮茯苓心虛痰鬱ノ症因動發者正氣天香湯合二陳湯平胃散或三靈或心虛痰鬱ノ治法可也氣收脾胃和メ後可用血藥食進氣正則不及血藥也腹痛者實多甚者桃仁肉桂大黃當歸紅花或去大黃加青皮枳殼脉緩者虛冷痛也可溫和烏沈湯肉桂當歸川芎之類可也

○平素有蟲積婦產後血暈脉弱異功散加黑炒乾薑大炒乾

薑 小右振出し用或煎服。

○無蟲積者異功散加當歸川芎黑炒乾薑有汗者加黃耆。

○氣虛而血少し燥アル者産前後十全大補湯平素好甘者補能應スル者也。

○有熱而交虛血虛燥熱ノ者八物湯加山梔子可也。

○熟地黃用心心得血中燥ト云ヲ目當テ可用也酒ニテ蒸ストイヘビ實ハ冷藥ト可知也故ニ真陽ノ氣虛スル者ニハ不可用當歸ハ溫ナレハ血中ノ陽ヲ補フ味アル也。

○虛婦ハ姪胎ノ中異功散當歸宿砂阿膠ヲ時々可用臨月ニハ異功散ニ當歸阿膠可也産後血脫ヲ防ク也産後血量氣虛可甚ト思フ婦人ハ右ノ劑ヲ可用臨產ノ時無蟲積者。

十全大補湯史メ可也壽世保元臨產交骨不開者虛也十全大補湯產後陰門不閉交骨不正者モ亦虛也十全大補湯トアリ予是ヲ以テ常ニ大効ヲ得タリ。

○產メ脫血腹甚鳴鮮血來ル者速ニ死ル者間ニアリ虛婦ト見ハ臨產ノ時ヨリ此防ヲスル力肝要也此防ハ十全大補湯去肉桂如黑炒乾薑或異功散加當歸黑炒乾薑又參二分入用テ可也。

○產後脫血手足厥冷者獨參湯參附湯四君子湯加當歸黑炒乾薑或熟附子可也先ハ獨參湯ト四君子湯加當歸黑炒乾薑黃耆防風ノ類人參三分入テ可用十全大補湯去肉桂加附子黑炒乾薑又可也補劑無効レハ死ス十全大補湯ト

○脫血甚者唇白面蒼無血色也安神散或十全大補湯可兼用

○附子ハ虛冷ヲ目當ニ可用大體不可捨辛能走血也

○十五味安榮湯モ亦可也

○產後嘔吐止後有瀉テ腹微痛ニ白朮陳皮香附子黑炒乾薑澤瀉茯苓甘草右的中也

○產スル時食後ヨリ腹痛スル者多ハ停食在胸膈而不下產後吐而不受藥食或其間兒枕痛交發欲吐不吐胸中鬱滯時絕時甦脉弱時如欲絕不換金正氣散加乾薑或三靈無寸効以理中湯入參二分入如絕時用之安神散擦牙暫時而大ニ吐食氣正ク脉滑數後不換金正氣散或陳皮香附子人

參茯苓黑炒乾薑甘草ヲ用テ安シ有虛故ニ吐而不受食人參理中湯必用ノ劑也

○產後發熱氣虛發熱ハ陽氣浮散スル故也脉按而無力溫補可也

○血熱ハ上氣而脉數有力或頭痛或腹痛八物湯黃芩黃連大黃木香丁子肉桂川骨可也或八物湯加便製香附子山梔子或生地黃入ノ劑モ可也

○風熱者頭痛惡寒清涕口苦シ以口舌而知外邪

○蒸乳發熱有血熱氣熱風熱ニ下キル也產後四日五日コロ乳脹而凝滯スル也脇下ニグリく見ヘ肩ツマリ寒熱スルハ乳脉行ラントスル故也調血飲ニ蒸乳ノ加減可

也。又逍遙散香附子烏藥木通山梔子陳皮ナトモ可也。能食メ快然。タル婦人。產後四五日ノ間。俄ニ熱アラハ。乳房ヲ探テ可見也。乳ノ道開キカヌルハ。童ニ吸出サセテ可也。或功者ナル。婦人アラハ。其者ニ吸出サセテ可也。溫湯ヲフクサ物ニ浸シ。ホコト蒸ス時ハ。乳脹リタルガ能和ク者也。

乳汁溫湯ヲ得テ解スル也。

○當歸黃耆飲。治產後陰脫。謂陰戶中宮脫下也。當歸 黃耆 人參 考藥各二升 麻半匁 水煎。

○產後子腸不收。八物湯。升麻防風。以酒炙黃耆為君。

○產後三日滯食。吐瀉甚。酸臭瀉汁甚熱。食不消化。脉實數。

一醫疑為虛冷。予以為熱瀉之辨。壽世保元四卷散之條下。考

テ思フニ是熱瀉也。平胃散。茯苓猪苓澤瀉柴胡黃連山梔子。右適中。

○婦人診脉五動。按而不鼓。去秋八月。產而後腹脹如鼓。食少減壯健如常。予以為脉按而不鼓者。命門之火衰。脾土虛冷氣着者為鼓也。產後經亦不行。理中湯。人參五厘。加肉桂附子茯苓。四月經行。久服而安。

○產後經日去血過多。腹痛脉進而無力。黃耆建中湯。

○產後醋炭ノ氣ヲカセテ吉。產ヲ催ス中ニ石ヲ爐中ヘ。クベテ置キ。其石ヲ取出シ。鉢ノ中ヘ入レ。醋ヲ掛テ。其匁ヲ産婦ニカセスレバ。血暈ヲ收メ。嘔ニモヨシ。

○產後感風寒。血中ヘ入ル傷寒ト成ル。多シ。睡後謬語レ。

或ハフツト立テ寢トボケタル様ニスルアリ。食餌ヲ與フ時ハ箸ヲ取テ進テ食シ不與時ハ不思食。脉虛而數大補スレハ謬語多ク何トヤラアラク言語レ熱増ス也。清熱補虛ノ心得ニテ治療スヘシ。逍遙散合小柴胡湯加黃連山梔子ノ類或安神益志湯モ有神人參五厘或一分入テ用ニ。若大便結不通ハ大柴胡湯或小柴胡湯加桃仁肉桂大黃トモアリ。通メ後ハ安神益志湯或竹茹溫膽湯或七味溫膽湯。加紫胡黃連トモアリ。如狂熱甚ハ逍遙散或四物湯合黃連解毒湯用ル。トモアリ。產後傷寒ニハ麻黃石膏芍硝ナト難用。其外ハ傷寒常ノ治可参考虛中ニ有實熱ト云意ニテ可治療也。

○產後食傷不換金正氣散加乾薑腹痛甚則枳實大黃湯大便濁而無力則理中湯惣ノ常ノ食傷ニ不異也。其中虛人不食スルト同シ。

○產後腰下腫ル者多シ。大體腫ル者ハ外ノ處能成テ食進ニ從テ自ラ退ク者也。日日ニ腫増ス者腫脹ノ治法ニテ治スル也有熱ニハ補中治濕湯ヨシ。有血熱ハ赤小豆湯ヨキトアリ。虛冷ハ溫補メ利水ノ藥一二味加減スル也。

○產後腹痛ハ俗ニアトハラノ痛ト云按テ彌痛心下塞ルハ實也。紅花肉桂桃仁大黃ナト決ソヨシ。或破瘀血ノ劑可参考。乎用テ見ニ桃仁肉桂大黃ノ三味能瘀血ヲ逐フ。傷寒惡血ヲ下ス藥也。故ニ瘀血ニハ決ソヨシ。痛強クハ肉桂ヲ

倍加スル也。尤産後瘀血ヲ逐フ藥當歸。延胡索。牛膝。牡丹皮。肉桂。ナトペル劑多シ。夫ヨリハ桃仁。肉桂。大黃。ノ三味。煎用テヨキト思フ也。

○產後腹痛。心下弱。痛處ヲ按セハコラヘヨキト云ハ虛也。鳥沈湯。加木香。肉桂。或十全大補湯。倍肉桂。或當歸川芎乾薑。內桂宿砂ノ類。或異功散ニ。木香ナト加テ。溫和メ可也。虛ハ兔角温メテヨシ。

○產後有熱而腹痛スルハ。八物湯ニ。黃芩。黃連。大黃。木香。内桂。丁子川。骨妙アリ。熱痛ニヨシ。

○產後血熱身痛ニ。加味逍遙散ニ。犀角。延胡索。加テヨシ。師傳也。

○產後虛冷ノ痛ハ。十全大補湯ニ加減スル也。產後無力。腰脚痛不能起者。加味大補湯。或濕熱有テ痛ハ。滲濕湯ノ末ノ加減ヨシ。或ハ大防風湯。

○婦人產後ヨリ腰脊中痛テ不能起。產前ヨリ痛。或常々痛ム者。產後ヨリ取分ケ痛ト云者アリ。是予力桑韓醫談ノ問ニアリ。是ハ必竟濕痰濕熱滯テ骨髓ニ入テ。後ハ脊骨凸ニ屈曲メ。海老ノ様ニ曲テ。五七八九年餘ヲ經テ。腰又ケニ成云也。予濕熱鬱痰也。ト云考ハ。壽世保元ニ。龜背龜胸ハ痰也。トアル。小兒ノ胸背骨凸ニ。扒レタル様ニナルヲ云也。且予痢後ノ痛風。一身痛ヲナシタル症ヲ見タルニ。治法不効ノ

後ニハ兩手屈リ或足直ニ成テ不動骨折曲リタル様ニ成タル者アリ是ヲ以テ考ヘハ回春ノ滲濕湯ノ末ノ加減ヲ久服メ効ヲ可見ト思フ也世醫多ハ温補ス予モ加味大補湯其外温補ノ劑ヲ用テ不効也

○產後ニハ心虛痰鬱ノ者必發スル多シ安榮湯ヨシ其外心虛痰鬱ノ治法ヨシ

○產後胞衣不下ハ六味丸加肉桂十全大補湯或八味丸

乳病

○婦人寒熱頭痛肌熱乳挾出来テ痛強シ拳連消毒飲去黃連加烏藥四貼而熱去乳挾殘ル二陳湯合烏沈湯平胃散加紫胡防風木香三四貼而挾去而如素

○婦人小兒死而後乳甚脹乳頭腫痛難忍予三靈加紫胡羌活獨活防風陳皮茯苓甘草右用頓安此婦平素有蟲三靈能應ス此三靈胸中人氣ヲ降ス紅花行血風藥散氣故胸中升降而和ス

○乳房ニ核アリ痛ムニ正氣天香湯合二陳湯平胃散或八二陳湯合烏沈湯平胃散可也

○夾虛者乳核或潰或不破者十六味流氣飲世間能用之
○斷乳方當歸赤芍藥紅花酒洗牛膝酒洗水煎
○乳汁不通桔梗二枚紅花紫胡瞿麥各一通艸七枚木通連翹青皮白芷甘草各五分水煎食後細々飲之更摩乳房

○乳中ニ常ニ結核有テ連々大ニ成リ四五十年ノ婦人乳痛破レ其口岩ノ中ニ穴ヨル様ニ瘡ノ兩脇上下岩ノ洞ノ如クニ成リ膿出ルアリ乳岩ト云也不治者也

○壯婦乳沫不通或一旦乳シコリ腫ル者アリ是ハ腫物ノ四方岩穴ノ如クナラヌ故ニ愈ルモノ也

小兒科

急驚

○小兒有熱而恐怖シ身ヲ振ヒ或ハ外ニ居ル様ニ覺ヘテ睡後ニ驚クアリ是急驚輕ク見ハル、類也食傷風邪癰痢ノ初發水痘或痘疹ヲ煩出入時ニ必アリ是ハ驚風ノ兆アル子感外邪テ熱アルニ連レテ如此不換金正氣散合前胡

湯加柴胡香附子可也熱強ハ加柴胡山梔子ノ類或陳皮香附子茯苓ノ類可加味蟲積吐逆セハ三靈用之可也有熱ニハ萬珠湯加陳皮半夏チト或不換金正氣散加減サシ引メ用之也

○風邪ノ後俄ニ時々驚搐シ上竄直視唇舌乾泄瀉脉數前胡湯加黃芩黃連用熱去テ愈或如此症急ニ搐搦發メ死スルハ一晝夜ノ中ナル者アリ予以為熱入心經ト

○龍腦安神丸治大人小兒驚風癲癇骨蒸勞熱咳嗽語滙舌強及傷寒大熱未解久無汗者大人服一丸井花水調雄黃四分送下或嚼或研下小兒一歲已下者四之一二三歲三之三四五歲已上者二之一牛黃五分片腦三分烏犀角二錢

朱砂水飛人參地骨皮麥門冬桑白皮甘草各二錢
茯神三分麝香三分馬牙硝二分右為末煉蜜丸每兩為十九
金箔四大張為衣陰乾磁器內放用黃蠟為蓋恐泄腦麝之氣
此方百發百中不能盡述

○人參湯最能利驚或小柴胡湯加防風枳殼

○驚癇アリ驚風ト同シ様ナレ是ハ不死者多シ是ハ癲
癇也絶入ル時キチノトメ痰沫ヲ吐キ搐搦スル様ナレ
氏治スル也

慢驚

刺史半夏不離金五味子

○慢驚ト云ハ虛症也吐瀉ノ後ニ俄ニ直視シ絶入搐搦メ
此シ又發汗連々疲ル也吐瀉ノ後ニ發レ處虛ヨリ出

ルラ慢驚ト云温補ノ可也寒涼ニテ治スルハ急驚或蟲積
ナトノ實症也弱半處ヨリ發スルヲ慢驚ト知ヘシ

○治法温補ノ劑可也人參理中湯或加附子或異功散加乾

薑宿砂或六君子湯ニ加減ス

○吉州醒脾散

人參陳皮白朮茯苓木香全蝎

甘草

各半兩

半夏白附子炮

天南星

陳倉米粒二百

為末薑

素煎服回春無半夏陳皮天南星有天麻殼

黃耆湯治慢驚風之神藥也

黃耆二兩

人參一兩甘草五

今加芍藥炒一枚

○益黃散治胃中風熱

黃耆二兩人參

陳皮各一兩藥七

今甘草一兩半生黃連少許水煎

○慢驚ハ兔角温補ノ不治ノ症也。萬ノ一温補應スル時ハ可治也。是ニモ驚癇アリ。オ人ノ中。一二人モ愈タルト云ハ驚癇ノ類也。

○急慢驚風發ノ夫ヨリ續テ二三日發ノ後。不思儀ニ治シタル者アリ。後ニアホウニナリ。或無智ノ人ニ成ル者多シ。急驚慢驚ハ皆心胸ニ痰有テ。脾胃虛スル故ニ難治。十之一愈ルモ心氣大半脱タル故ニ無智ニ成ル也。驚癇ハ父母心虚痰鬱アル者。或癇症ヲ患ル者ノ子。如驚風時發時止。是ハ多ハ不死也。

痺

○痺者連ニ損脾胃而有蟲也。其中冷痺者溫和補脾而可也。

連ニ熱出テ虛中ニ伏シ。脾胃弱者ハ不治。三十行腹脹眼ニ星出來或白膜。或雀目。脉數有力。或虛數溫和而不効者熟也。

○冷痺者脉必帶緩。症ハ寒熱ニ同然也。入門痺門ノ論委シ

○熱痺瀉ハ消痺湯。

○脾胃弱而瀉スルハ啟脾湯。

○虛冷瀉ハ異功散加乾薑砂仁。或人參理中湯。

○疳一方。治虛疳身瘦如柴。暴瀉無度。口甚渴。水飲二升。有熱。眼中白膜。雀目有瀉者可也。并瘧後疳疾。又可也。妙不可言。

白术 茯苓 陳皮 乾薑 內桂 丁子 各等分

○回春疳門肥兒丸有妙不可不知。

○虛瀉者口渴參苓白朮散或七味白朮散。

○抑肝扶脾散此方朝鮮之醫嘗百軒姓奇名傳之。陳皮
青皮炒油 神麴炒各六分 白朮 土炒龍膽酒洗 白芥子 炒山楂子
茯苓 各八分 人參 五分 黃連 姜炒一錢 柴胡 胡黃連 甘草 各三分 生
薑三片

○小兒疳瀉或冷疳久不已或急思食易飢八味丸有神効
○疳眼ト云テ頭痛甚後眼瞼又ケ或痛テ盲ノリアリ。目旨
而熱去盲人ト成アリ。眼旨ヒテモ熱不去大便瀉シ補劑ヲ
用レハ熱増シ瀉劑ヲ用レハ大便溏瀉ス故ニ死スルアリ。

肝經ノ熱強キ故ニ眼痛盲スル也。生地黃 胡黃連 黃連

○大蘆薈丸 胡黃連 黃連 神麴 蕃荑仁 白雷丸
蘆薈 木香 青皮 各半兩 一去青皮加龍膽

○四味肥兒丸 黃連 神麴 蕃荑仁 麦芽 各等分 右糊丸
○冷疳ハ雀ヲ燒鳥ニシテツツ、食ノ吉。

○癬疾

○塊積也。蟲積ノ治法ニ同シ。有熱者淨府湯去胡黃連合平
胃散。熟甚加胡黃連或紫平湯或九味清脾湯去草葉加減ノ
ヨシ。或消疳湯。

○無熱者肺疳方合平胃散或溫中化痰圓ノ劑ニ加減ノ湯

トナス。

○惣而癬疾積甚而逆スル者ニハ、從之可也。不換金正氣散加香附子、茯苓乾薑、或三靈、或陳皮茯苓黑炒乾薑炒乾薑甘草之類。

○左二僻有テ、右心下弱ク、瀉シ易キハ、不可攻。溫和温補而可也。溫和而積自消ス。理中湯内桂丁子之類、或白朮茯苓陳皮乾薑肉桂丁子、或白朮茯苓陳皮木香宿砂甘草。

○瘧後左積アル。瘧母ト云。癖疾モ瘧母ノ類也。瘧後日ヲ經テ自消スルアリ。溫和ソ可也。乾薑丁子良。薑人參白朮人參、或左積者加青皮。

諸熱

○小兒諸熱初發前胡湯有風熱加紫胡羌活陳皮有咳加陳皮杏仁香附子大便瀉セハ加澤瀉猪苓。

○諸熱病其因ヲ可知風熱力有小瘡力食傷力痘疹力或八鬱熱腸胃ニ有ル力ト可考也。

感冒

○風熱脉進予驗方餘程熱アルニ小紫胡湯加香附子陳皮茯苓生薑。

○敗毒散加紫蘇防風陳皮或葛根。

○大體熱アルニ前胡湯加紫胡陳皮羌活有咳紫蘆杏仁熱不甚者加紫胡葛根羌活茯苓。

○熱甚或嘔者三靈加紫胡葛根山梔子陳皮或竹茹或黃連。

○熱強キハ可發汗十神湯。
○風熱不解內熱甚者清解湯或升麻葛根湯合小柴胡湯。
○小兒風熱ハ熱病ニ八大方ナラヌ者也和解清熱ノ内ニ
退ク也痰咳アルハ咳嗽門可参考。
○時疫家内ニ有テ熱病ヲ煩フモノアリ夫ハ治法大人ト
同シ。

傷食

○傷食ハ大人ト治法同ニ不換金正氣散加茯苓或乾薑。
○腹痛不吐瀉者枳實厚朴檳榔子大黃木香甘草輕者去大
黃。

○吐瀉ノ後無力者人參理中湯或附子或獨參湯參附湯王

用ル症アリ。

○不吐瀉悶亂者神仙萬億丸五六粒用ルモノアリ。

腹脹腫脹

○腹脹ハ先腹脹テ後數月ヲ經テ手足脹ル水腫ハ一身腫
ルハ也。

○腹脹蟲積食積或血或痰以大人意可治之。
○疳積腹脹多シ疳ノ部可参考。

○水腫ハ一身腫ルハ也大體大人ト同シ其中蟲多シ淨府
湯肺痈方或脾胃虛冷者人參白朮乾薑肉桂附子利水ノ藥
ヲ加ヘ用之或丁子血熱テハ赤小豆湯五加皮湯胃苓湯ノ
加減モ佳也。

- 小兒腹脹腫脹八味丸有効。
○虛冷腹脹白朮茯苓陳皮乾薑肉桂丁子車前子。
○腫脹加減胃苓湯赤小豆湯。
○小兒小瘡早々愈テ毒氣內攻為腫脹赤小豆湯熱甚二八加犀角。

嘔吐

- 嘔吐八三靈或不換金正氣散杳附子茯苓乾薑必用之劑。
○嘔吐腹痛蟲多薑炒黃連乾薑ヲ為主加減右二味可也。
○半夏一味生薑三片入煎用可也或加丁子黃連。

- 陳皮香附子茯苓黑炒乾薑炒乾薑是亦可也。

- 脾胃虛嘔吐者後慢驚風ノ兆也人參理中湯或加附子

○脾胃虛嘔吐乳泄之後驚風搐搦是慢驚也不治萬之一得溫補而溫和則愈者アリ其中熱アル者ハ實ノ慢驚ニテ無キ者アリ或蟲大十二テ冲上絶入ル類ハ可治癇症モアリ癇八慢驚ト見迷フ者也癇八實也慢驚八虛極也故有治不治。

泄瀉

- 小兒泄瀉理中湯七味白朮散五味異功散啟脾湯。
○因風寒暑濕者先散時氣而後瀉不止之時右之劑選用。
○夏月腹脹而大瀉止而又腹痛ノ類脾胃虛也口渴七味白朮散加天花粉車前子可也不効者啓脾湯妙也。
○因暑濕者紫苓湯可也壽世保元熱瀉之意可參考輕者胃

苓湯加木香。

○明鑑曰。吐瀉泄黃傷熱乳也。瀉青傷冷乳也。皆當下。白餅子主之。傷熱乳者。玉露散。傷冷乳者。益黃散。溫中丸。並於下後服之。又須不下。但服此藥愈。益黃散治小兒脾胃虛寒。陳皮一錢。青皮。訶子。甘草各五分。丁子三分。加入參白朮各一錢。尤有効。

○醫學入門詳論之。互參參考。若有患瘡瀉青。乃毒去無害。不必服藥之語アリ。

痢

○小兒痢。噤口嘔吐。脉虛數者必死。大人亦同。

○脉緩和ニテ晝夜二三十行ノ者。胃風湯去人参加羌活。有

熱加紫胡黃芩。瀉滯者加桃仁枳殼。無熱者。胃風湯合平胃散。本方去人参加羌活。

○有熱者敗毒散去前胡川芎。加黃芩倍枳殼。或合平胃散。或加黃連。此劑有熱。噤口ニナラントスルニ可也。

○瀉滯裏急。後重ハ不換金正氣散。加黃連枳殼。

○好甘者。紫胡羌活枳殼葛根滑石蒼朮陳皮甘草之類。

○瀉滯有熱者。黃芩芍藥炒枳殼甘草。

○無熱十二三行者。胃苓湯加羌活或木香。有熱者。胃苓湯加

- 紫胡黃連枳殼或黃芩或羌活
- 下痢六七日全不食聲入鼻テ鼻聲ト云様ニテ鼻ツヽリタルヲ息ツミタル聲ノ様ニ聞エル者ハ不治
- 牙床浮キ齒クシケル者不治痢ニハ脉細數ヲ忌ム
- 脉五動ニテ弱ニ有テ脉ハ可補脉ナルニ大便赤白交黑色後重甚者虛中實熱アリサシ食スルト云ヘ凡七八日ノ間ニ脉進ニ無力自利メ不治者多シ
- 凡テ大人小兒共ニ日積リヨリハ早ク自利メ大便甚臭者不治味ニテ薑附ニ三十付ハ香冒風散大便臭氣散
- 重急後重ハ不換金正氣散加枳殼黃連桃仁能下ス甚者桃仁肉桂大黃或大紫胡湯
- 病度數不減中ハ溫熱未退穢毒不盡故人參過用スレハ補住邪氣而反テ滯滯不食嘔吐斯度數ケツ、減スル比氣力疲レハ人參三五厘ツ、入テ食能進テ後ハ一分ニテモヨシ滯滯後重ニ多ク難用黃糞來テハモハヤ滯滯增ヌ物ナリ黃糞來ルハ古キ食ノ色ハ不鮮ハナヤカナルハ黃汁ケツツ、交リ黄色速ニ増スガ順也
- 予近年瘧ノ治法ヲ知ル一二三發ノ間不換金正氣散加瘧

紫胡羌活葛根檳榔子ノ類熱強ハ加黃芩風濕ヲ去リ夜分
發スルハ紫胡芎歸湯可也申ノ刻前後發メ夜分熱多ハ陰
瘡也陽瘡發スル時ヨリ熱アル中ハ不換金正氣散加紫胡
葛根檳榔子香附子茯苓右振出シ用テ可也間日或發日ノ
早朝六ツ時ヨリ午刻前煎湯度ミ用テ可也不換金正氣散
加紫胡青皮白豆蔻檳榔子丁子如此ノ日ヲ經ル中ニ自ラ
瘡退ク也陰瘡ニハ當歸白朮青皮丁子白豆蔻紫胡檳榔子
之類可也

○久瘡ニモ如此緩ミトメ治療スヘシ其上虛有テ不効ハ
發日ノ早朝人參理中湯加青皮丁子白豆蔻人參五厘或ハ
一分或六君子湯ニ加減メモ可也發スル時ト間日ハ不換

金正氣散檳榔子香附子茯苓ノ類或煎シ或振出シ用テモ
可也故ニ九味清脾湯七味清脾湯人參截瘡ノ類不用之九
味清脾湯七味清脾湯ニカ、ワル中ハ初心ノ中也

養胃湯

○消積化痰不効久瘡者溫補可也加丁子或人參理中湯加
青皮丁子或附子

咳

○小兒咬嘔不換金正氣散加香附子茯苓紫蘇子杏仁丁子
薑炒黃連有効丁子黃連消痰平胃之劑ニソヘテ用有効
○小兒咬肺瘡方平胃散可也加紫蘇子杏仁

○風熱アル時ハ杏仁飲或前胡湯加紫胡羌活陳皮杏仁之類用テ風熱去テ後咳不止ニハ痰ノ治法蟲積ノ治法可也或用陳皮香附子茯苓檳榔子黑炒乾薑甘草モ可也。

○小兒風痰咳ニハ玄冶十味去桑白皮代宿砂可也先風熱ノ治法ニテ可也不効時ハ蟲ニ心ヲ付テ可也先食積痰トニ心ヲ可付也。

○咳久不已三靈加陳皮茯苓紫蘿子杏仁有神効。

○咳久不已百朮茯苓陳皮宿砂木香甘草有効。

喘

○喘急風熱呼吸促迫杏仁飲加紫蘇子

○實症ニハ瓜萎枳實湯加紫蘿子

○無熱者回春喘急門理中湯

○大人小兒喘急為痰不効者肺疳方合平胃散加蘿子杏仁

○女子七歲脉五動餘進テ弱クドコヤラ細ノ格有テ弱アリ咽喉喘聲アリ子以為下焦陽氣弱此時杏仁飲或瓜萎仁貝母枳實人類ニテ押一夕ラハ氣彌減シ真陽逆上ノ馬脾風ニ成ルヘキト思テ此劑ヲ用タレハ頓ニ愈紫蘿桔梗陳皮乾薑宿砂蘿子杏仁茯苓甘草生薑喘門理中湯ノ意也

○喘痰呼吸促迫ニ三青湯有効ト云者アリ雜症ニ見ニ

○馬脾風其症肺脹喘滿胸膈氣急兩脇搖動陷下為坑兩鼻竅張悶亂嗽渴聲嗄不鳴痰喘潮塞俗曰馬脾風若不急治死

在旦夕也。喘急者。痰氣盛也。

○一捻金。治小兒風痰。吐沫。氣喘咳嗽。肚腹膨脹。不思飲食。小兒肺脰喘嗽。多人看作風喉。大黃 槟榔子 黑牽牛子 白牽牛子 人參各等。右五味研為細末。蜜水調服。或煎服。

疹子

○疹ハ實熱咽痛。咬腹痛アリ。二三日有熱テ。ハラトアセ。ボノ如ク出ル也。前胡湯ニ。羌活紫胡牛房子紅花ノ類或合平胃散。或萬珠湯ニ。牛房子葛根紅花ノ類可也。熱強キニハ。芩連消毒飲。或消毒飲合升麻葛根湯モ宜シ。荆芥八香アシキ故ニ。嫌フ者ニハ去テ用。血熱ニハ加黃芩紅花。七杏子ト

○疹主血熱。紫胡芍歸湯。多ハ可也。有血熱故。疹出テ後。血液

乾クト見ヘタリ。故四物湯ヲ用テ。不食ニ可也。宿砂紅花ナト加減スルモノアリ。壽世保元。疹門ノ治法。間ニ妙アリ。四物湯ノ心ニ氣ヲ付テ治スヘシ。血熱故ニ。陰火ト同シ。故ニ補陽ノ治不宜也。

○不食ノ症モ。蟲ナト動スルモノハ。アシライテ可也。アシライテモ食不進時ニ。四物湯ノ加減ニ。心ヲ可付。

○人參多不應。然レニ虛症ノ者ハ。ヨキモノアリ。先補陽ハ。應セヌト云トヲ。合点ノ用レハ誤ルトナシ。

○毒氣ニ。人參不効故也。毒ハ瘀血也。氣ト云ハ熱ト知ヘレ。疹内ニコモレハ。胸ヲ攻ル也。疹ニヘテ。二三日有テ。消ル。力常也。一日ノ内ニ。沒スルハ。毒氣内攻スル也。故ニ。血中ヲ涼

スルニ生地黃或犀角或黃芩紅花消毒飲ニ牛房子紅花ヲ以テ血中ヲ涼シ惡血ヲ順和メ羌活防風ノ類ヲ以テ發スレ意也。二人參不發時此言也。

○疹子出山ハ脉緩ニナル者也。此緩ハ虛冷ニテ緩ナルニ非ス。血熱皮膚ニ發ノ。血中虛スル故ニ緩也。血氣不調也。疹出テ後虛數ハ虛中ニ毒氣殘リタル也。痰喘ヲ加レハムツカシキアリ心ヲ付ヘキ也。

○疹人不食ニハ四物湯加神鞠宿砂有熱加黃芩。

○疹後湯ヲカケルト云フアリ

下畧ス

○小兒三歳午後ヨリ發熱有之。兄弟何レモ患痘故ニ痘序

(二)究テ敗毒散ノ加減一醫用之。翌朝發驚。搐搦一時許。敗毒散ニ去川芎加天麻殭蚕。午後又發驚不已。時々自利シ。搐搦直視腹脹。小便不通。臍下シコリ一塊アリ。是ハ小水ノシコリ也。兩醫相談メ。白附子ヲ加テ不効。面冷右脉弱。左脉浮弦ラノ。按之無力巾アリ。右按テ絶ス。一醫診之曰。面冷ハ陽氣不揚氣不上達也。理中湯加人參一分一服ノ後呼吸無力。搐搦モ微也。時已ニ夜半也。既ニ與七八分ノ獨參。尚依然タリコリハ小水也。元氣虛スル故ニ氣不下行也。益補陽氣。陽氣復メ自可通。即獨參湯一枚。七八分ニ至。小便自快利。聲出能乳ス。搐搦止テ眠リ。脉彌弱。面尚冷。氣力彌弱シ。遂ニ獨參湯

ヲ夜明ニテ用面漸温脉數ニメ復陽ス。小便快利。氣力漸復。シ。擣止脉彌弱キ時ハ。痘序ニモ有ニシキカト思フ程ニ。熱サムル也。此時元陽漸復スル故。氣力ヨキ也。未ダ十分ナラ。又故ニ。面不温。明ケ方ニ熱出タル也。擣搦ノ中ニ。冷汗少シツ、出タル也。元陽ノ虛也。此症急ニ參附薑桂ナト用ル心ハ。不空也。元陽ヲ獨參ニテ呼テ置意ガヨキ也。附子薑桂ハ。序病ナル故ニ。先急ニ不用也。元陽サヘ復スレハ序病故自ラ熱ハ出ル理也。溫藥ニテ急ニ温ル症ト。元陽ヲ獨參ニテ。フロノト。養フ症ト。ニツノ意味有ル也。至極弱ク見ユルハ。薑桂モイヤ也。熟附子ハヨキ也。

○女子年十二。痘發熱二日。吐而不入藥食。予平胃散加檳榔

子牛房子。振出メ用之頓止。以後譴言脉數前胡湯加陳皮防風牛房子紅花厚朴用之。以後痘快發ス。

○男子年二十餘。出痘三日ノ夜。瀉三行。以後俄ニ譴言。手足微冷。手表痘色微帶紫色。面痘色淡白。脉六動。按而無力。急用白朮乾薑肉桂木香防風甘草頓安。

○貫膿ノ初日。痘乾如欲收齧。異功散。加當歸木香葛根一貼。翌朝面腫出而潤。脉數去リ。熱減故。恐葛根之冷。後異功散。加乾薑木香當歸。彌快。收齧ノ時。微熱故。去乾薑。漸面收齧ノ手足遲シ。加乾薑肉桂。收齧ス。

○婦人年十七。痘欲收齧而熱來。痘乾口渴便閉。七味白朮散。以人參代蔓人參。加當歸防風陳皮。而熱去能收齧ス。右二人

平素氣逆上而怔忡如乘舟車持病有之不受人參故用蔓人參前ノ男ニハ異功散ノ時用入參能應又後熱去而代蔓入參也。

○女子年十二出痘漿水ノ中吐津囁少シ有恶心平胃散加茯苓牛房子振出テ用ニ一貼而頓安。

○患痘者予治之大便結者出痘常ヨリ多毒氣咽痛或腹痛者ニ不用寒涼用微涼發熱出痘ノ間防風牛房子前胡蒼朮厚朴陳皮甘草熱良強者加芍藥紅花發熱ノ時加羌活色微淡白加當歸。

○貫膿ノ時沙參異功散加木香防風或當歸四肢弱者加肉桂收齧沙參異功散加當歸或芍藥炒收齧ノ時濕潰ノ衣類

ナトニ粘リ附ク者沙參異功散加蒼朮防風或白芷或芍藥收齧ノ時乾而微渴便閉者沙參七味白朮散或異功散加當歸麥門冬。

○漿水ノ時大便溏者沙參理中湯咽痛者理中湯加肉桂牛房子防風大便調而後異功散加木香防風瀉二三行者附子理中湯手足色ウルミタル者加肉桂如此治療メ得効。

○子癥慮スルニ痘ハ寒涼ヲウカくト用テハ誤ルモノ有レシ有熱者拳連ノ類生地黃ナト用ルモノ有ル也然レモ熱少ヒ和メ病者少シ安ク見ヘハ可退寒涼之劑也夫痘ハ真陽ノ氣ニテ出痘貫膿收齧スル也此陽氣不衰様ニ可心得也用寒涼而客熱去ル時ハ真陽ニサワル也真陽衰則大便

ユルミ真陽ノ氣ニ寒涼ノサワラヌ様ニ可用也。悉ク寒涼ヲ忌ムニハ非ス熱強クハ寒涼ヲシ用テ陽氣ノ過不及ヲ考分テ可治也。脉按テ有力無カラ知ヘシ。凡テ大ナル脉ハ虛ノ方ニ心ヲ付ヘシ。中ニ按テ如弦重ク按テ弱者虛寒アルト知ル。ヘシ元陽ノ虛也。

○貫膿ノ初日ニ面乾キカセ心ニ成ル者多シ。スクナキ痘公大方貫膿ノ初日二日ニ面乾キカセ心ニ成テ腫減テ兩手へ腫行リ夫ヨリ兩足ニ腫メクル也。面カセ心ニ成ル時食氣出ルガ順也。面乾キ食氣ナク乾テ帶微黒者毒氣中入タル也。カセ色ハアメ色ニ成テトコヤラ潤アル也。

○收瘡日數ヨリハ少シ遲キハシル痘ノ類也。シル痘ノカ

セギワハ面少シ乾キ痘ヨリ膿出カタマル様ニテ黃色ニ乾ク也。或潰テカセタル下ニ膿有テ汁アル也。手足ハ潰テ汁出テ皮メクレテ後ニ愈ル也。處ニ出来ル者也。一身ニ多出テ潰レ衣類ニ附テ皮メクレ難堪者コヌカラフトンノ上ニキテ身ニマブケテ起卧ラスレハ衣類ニ附ヌ也。回春ニハカラケノ粉ヲヌレト有レバ不空也。

○八九歳ノ女子發熱二日ノ夜一醫以葛根湯瀉甚而欲絕急用獨參湯氣復而後譴言發熱右脉巾アリ。按テ無力予以葛根湯ハ平素脾胃虛冷ノ者ニハ不宜也。故ニ以異功散加羌活防風乾薑瀉止出痘ス。

○庚寅ノ春痘アリ季春不時ニ寒シ發熱出痘ノ間ニ四五

兒死スルヲ考ルニ升麻葛根芍藥ナトノ誤也。溫和ノ散入
ル意可也。ハ解散去半夏加羌活防風ノ類可也。脉有弱弱シ
瀉アル者白朮茯苓乾薑宿砂羌活ノ類ニ加減。

○男兒八歲自出痘八日。貫膿初日也。自昨夜熱出テ痘乾燥
面稍瘦。昨夜大便一行ヅ、ユルク通ス。脉進無力。痰喰アリ
予以為大便ユルキ故ニ陽氣下陷ス。故ニ痘毒胸ニ塞テ不
食。今此劑不効則シキリニ死セニ急ニ一方ヲ用。二貼而面
兩頬脹。食進三五貼而愈。入參一分五厘白朮當歸黃耆

肉桂丁子甘草生薑

○入門痘之部云。初熱儼似太陽病所異頤赤中指冷。初起發
熱惡寒。類傷寒太陽表症。但傷寒男面黃。女面赤。麻痘則頤赤

也。傷寒中指熱驚風男左女右。五指俱冷。麻痘中指與耳鼻尖
及尻足俱冷。又察其耳後有紅筋赤縷為真。無筋者非痘。筋紅
亦易愈。紫者難治。黑者死。

○痘發熱ノ一日ニ紅点見。或二日見者不治也。毒氣有餘メ
表虛也。必竟内ニ三日夕モツツ不能メ漏ル意也。然ハ氣不足也。元氣不足メ熱毒盛者温補スル時ハ實ニ清熱スル時
ハ虛ニ也。故不治。

○灰色ハ膿色白而無潤也。必竟皮薄キ也。膿テ又スリムキ
タル跡乾テ常ノ肌ノ如キハ不治也。スリタル跡一夜ニ皮
張リ。草ケノ爛レタル跡ノ如キハ可也。惣メ每痘膿八陽ノ
充也。陽氣虛者不充故。人參黃耆ガクノナカレ。

○平素小瘡アル兒ハ痘輕シト云ヘニ收齧後餘毒アリト可知或餘毒不盡收齧後腹痛苦悶嘔吐スルモアリ草ケアル兒ナラハ消毒ノ心得不可忘。

○五歳ノ女子平生小瘡多患痘發熱ノ時嘔吐多然レニ面ニ二十粒出テ食モ進ム收齧ノ前日小便澁少午後ヨリ不食心下右ノアバラノ下ニ附テ凝滯ソ塊アリ嘔吐有テ不能服藥收齧ノ二日無理ニ手捻散用テ無嘔然レニ七分煎一服通ルカ不通カト云程也心下痛苦悶アリ收齧ノ三日死入乎以為惡症也病大ニノ藥小也小兒故ニ無理ニ用ル藥故ニ不及也後大便溏メ沒ス必竟臍ノ邊弱心下ニ物浮テ塊アリ熱毒虛中ニ凝滯メ塊チナス者血ト食也熱毒

ニ包マレテ塊ヲナス也收齧ノ時心下塊有テ嘔吐スル者虛アル者手捻散ニテモ不和却テ大便下利メ死ス昨日一椀食ス心下塊塞テ中々食スルノ成ルマジト思フニ食スルモ虛也惣メ脉腹ノ體食スルノ成ルマジト思フニ食シ或ハ可食十思フニ不食スルモ多ハ虛也收齧ノ初日眉毛ノ下ニ膿メ黑色ナル痘一ツニツアリ是毒氣ノ候也心ヲ可附也輕症ト云ヘ正意ヲ付ヘシ。

○婦人出痘ノ間熱多譖言痘亦多以消毒飲加黃芩紅花回水ノ時熱去此婦七八歲內滿胃氣調食モ少ミツ、進ム故ニ熱去夾虛者神効散ノ意ヲ以テ可施治神効散ハ虛中ノ實熱アルヲ治スル意也。

○庚寅ノ歳痘流行不治ノ者間々多シ予考ルニ皆生質虛
スル兒也大人モ同之脉弱ニメ進虛人ニ熱毒甚故不治也
出痘ノ間不發出脉進無力全無性ニテ不知苦處痘紫黑出
痘ノ終回水ノ初日多ハ死ス偶ニガミナリニ出瑜テモカ
セギワニハ毒氣内陷ノ死ル也補瀉溫涼共ニ不効虛ヲ補
スレハ熱毒盛也熱ヲ涼フスレハ脉弱中補中和不効其中
補ヲ得ル者或拳連消毒飲ノ類應スル者間々生ク如此症
出痘甚多キハ不治也痘スクナキ者ハ熱毒輕キ故ニ易治
也痘疔或痘ノ間ニソコニ墨ヲ付タル様ナル色皆惡血有
ル症也不治予又以為其歲ノ時氣ニモヨル也溫補應ス
ル歳ハムツカシキ痘モ治スル者多シ熱毒甚キ症ハムツ

カシキト可知熱毒強キ者モ實症ハ治スル者多シ拳連犀
角ノ類ニテ熱退テ食進ム故也

○世醫心法痘發熱二日而出者表虛有毒卷之三出現症治
歌括熱蒸三日痘現形此為常候不須評論先今虛實因痘
瘡之毒蘊伏在裏非熱蒸則無因而出是以古書云熱蒸三日
而斑生發熱三日痘瘡以漸旋出者不論疎密皆吉得常候也
疎者不須服藥密者以和中解毒之劑審而調之如纔發熱一
二日間痘瘡便一齊湧出者須問其曾數日前有熱否如曾數
日前進退熱以過期論惟原未發熱至今纔熱便斑現此表氣
虛榮熱衛虛腠理不密肌肉不實不能約束於外使毒火冲擊
故出太驟也宜用實表之劑可以無痒塌無潰爛實表解毒湯

主之方 黃者 人參 當歸 生地黃 柴胡 白芍藥
玄參 升麻 地骨皮 酒黃芩 甘草 右剉細加薄荷葉
少許 淡竹葉十片 水煎溫服無時

○感風寒 肌表閉塞 血凝而不行 必身痛 四肢微厥 斑点不長
或變黑色 或變青紫 癢疹此為倒伏也 宜溫肌發散 桂枝葛根
湯 葛根 桂枝 茯苓 菖蒲 升麻 防風 甘草 加麻黃蟬
脫

○女子十二歲出痘三日 感風發熱 手足微冷 壓瓦申ク鼻ヲ
セヘリセ ワリ 多ク痘處々凹也 此劑一貼而起發氣定リ如

常

○小兒多死スル痘ヲ見ルニ 多ハ實熱虛中ニ入テ 毒氣盛

紫黑交出テ死ヌ 輕者神功散 李連消毒飲可也 虛實兼見者
實表解毒湯可也 間々溫和モアリ 溫和應スルハ安也

○痘將養膿時 面上有乾靨者 犯倒陷逆症原無治法 製一方
得効 黃耆 人參 當歸 甘草節 赤芍藥 生地黃

牛房子 黃連 連翹 麻黃 右蜜酒拌炒黑紅花子水煎
調穿山甲末 且告之 曰此藥服若瘡先乾者復起作膿 未乾者
胖紅飽滿痘空地上再出小痘上也 痘不作膿 不補空 或癰腫
次也 否則無所為計矣 連進三貼 已乾者不腫 不乾者飽膿空
中補痘不多 手足發癰後以十全大補湯加金銀花黃連連翹
調理而安

○女子年十五平素虛弱 温補ヨシ 有疳積 費膿ノ初日 面乾

嘔吐喫逆而戰慄ス。大便結用大補湯反テ喫逆アリ。白朮茯苓陳皮青皮莪朢木香肉桂芍藥甘草右用頓安夜半痘能貫膿。佑ノ劑ノ中人參五厘入或去之用能食而癒以一難論。

○收屬ノ間貫膿ノ初日或二日ノ朝面乾燥者倒屬也。バヤガセト俗ニ云也。此時清熱消毒發表兼タル劑ニテ胃氣アル者間々治スルトアリ。前ニ云十五歳ノ女ノ如キ温補潤出来間々治スルトアリ。面乾燥發熱脉進無力症得温補而ノ症ニテ十全ノ補ヲ不受蟲積定溫和スル劑ニテ咳逆戰慄止タリ免角可察至極ハ虛實ノニツ也。虛實ノ見違有ニ依テ誤ル也。心ヲ碎テ痘ノ死症ヲ知リ又可生ノ症アルヲ知ルヘキ也。

○必竟決死生ハ在知脾胃之氣脾胃之氣ハ元陽ニ依テ運化又能食メ死ルト能食ノ生ルトアリ能食スルニ泥テ可生ト思フハ誤リ也。何程食スルト病家ニ云云テモ不時ニ有謬語ハ無性ニ云食スル故生クヘキト難決又病人靜ニメ氣モ正ク食モ大體ニ進ト見ユルニ脉弱メ後瀉ノ死ル者アリ是ハ前醫溫補ノ手ヲヌカレタル故也能々可決斷○入門云少陰病出痘黑陷口舌腐爛四物湯加紫艸紅花虛實則正氣收毒自痘頂而下漸次結痂者順裏虛則氣血不能收毒而痘根先醫者逆。

○血熱咽腫飲食不利啖血或痘甚多謠言者桔梗黃耆

牛房子 犀角 玄參 紅花 甘草 热甚者加黃連 吐血

加牡丹皮

○色淡甚則倒醫便溏而痒者為虛。空保元湯倍加黃耆實表少加芍藥活血。痒甚遍身爪破膿血淋瀝不能坐卧者內托十宣散去內桂倍黃耆加白芷止痒。當歸和血。木香調氣氣行血宣散去內桂倍黃耆加白芷止痒。當歸和血。木香調氣氣行血運其痒自止。有毒氣陷內痒瘍者木香散加丁子攻裏內桂實表以救之。凡手足常搖動者將發痒也。內托十宣散治一切癰疽瘡癰已成者潰未成者散小兒痘疹空用之。人参 黃耆當歸 厚朴 肉桂 桔梗 川芎 防風 白芷 甘草如天熱去桂加栝蔞根赤茯苓不飲酒者木香磨湯調下。○痘已出狂叫多怒喘呼者肝熱甚而無陰以斂之也。犀角地黃耆 連翹 甘草 水煎溫服熱退即止。

○鼠粘湯治稠密以防陷伏治痘出稠密身熱不退空急服此藥以防晴乾黑靨。牛房子 當歸 地骨皮 黃芩 柴胡
黃耆 連翹 甘草 水煎溫服熱退即止。

○透肌散治痘已發不快。紫艸一錢升麻 甘草各五粒水煎服解毒清熱涼血加蟬脫地骨皮酒黃芩。

○解毒防風湯治痘七日後壯熱毒盛氣弱痘出不快及痘出而聲反啞防風 五分地骨皮 黃耆 枳殼 芍藥 荆芥牛房子各二分半水煎。

○初出黑色狀如蚊咬秘燥皆因瘀血畜初出狀如蚊咬色黑者因毒氣暴出瘀熱傳之故血凝不行遂成黑陷太小便閉腹

脹喘急煩燥。宜梔子仁湯。人齒散加味四聖散。單蟬脫湯。加紫草出痘不快者。宣毒膏。猪尾膏。

○山梔子仁湯治痘疹及斑毒狀如蚊咬。毒盛黑色。山梔仁白鮮皮。赤芍藥。升麻各二分。寒水石。甘草各一錢。紫艸。薄荷。

○單蟬退湯治痘疹已出不透腹痛或痘黑癰。或蘊積熱毒。及風毒充於皮膚。癰癧不止。驚悸。癲癇。夜啼寒熱亦宜。蟬退二箇。或加甘草半錢水煎。

○加味四聖散治痘出不快。及變陷倒屬。小便赤澁。餘熱不除。一切惡候。或痘出被風吹復不見入皮膚內。鬱熱不散。紫艸木通。木香。黃耆。川芎。甘草各五分。人參各等分。蟬脫減半加黃耆。

每二錢水煎服。如便閉。加枳殼。便調加糯米。能解毒發痘也。山梔艸。木通各一錢。枳殼。甘草各五分。水煎溫服。如氣弱去枳殼加黃耆。

○出不能使。如炭焦。表分大熱還宜透。表熱如炭焦。黑陷伏見熱症者。透肌散。加紅花。地骨皮。或單犀角磨水服之。或獨聖散。小活血散。腹痛者。單蟬退湯。乾枯倒陷甚者。單麻黃五錢。用蜜水拌炒。水煎去沫。再煎乘熱服之。其痘復起。

○色淡不紅活。血虛也。以四物湯加減服之。但地黃大能滯血。不可輕用。不得已用之。須薑汁炒過。予按。二色淡者。氣虛而血不附也。血得氣而行。諸書可考。

○人乳補血甚捷。加酒少許佐之。且血非氣不行。又四物湯合保元湯為湯。陽生陰長之義。予以為格言也。人乳乃補陰人功。有子涼也。虛冷者不空。夫血虛者。血中熱也。血液乾者。真ノ血虛陰虛。皆血中有熱而血虛也。痘色淡白者無血也。然又虛寒者多得溫補而紅活。以是考之。則赤水ノ論未盡。

○出痘即變黑者。此為惡候。如有起興。急用托裏解毒ノ劑。少用保元。大加紫艸紅花服外用四聖散照之。然早能涼血解毒。必然此患亦多。因脾胃衰弱。血熱所致。凡紅變白。白變黃者生。紅變紫。紫變黑者死。

○涼血地黃湯。室女出痘遇經不止。熱入血室。

當歸 川芎

芍藥 生地黃 白朮 升麻 黃連 甘草 人參 山

梔子 玄參 水煎

因益水人參瘦實東林集卷六十八

○涼血解毒湯。治婦人出痘。非經期於發熱時。而血忽至。當歸 紫艸各一錢半 白朮 升麻 各五分 赤芍藥 一錢 紅花 一分 桔梗 八分 連翹 三分 燈心 二十根 水煎服。

○當歸養心湯。治婦人出痘。口瘡不能言者。人參 當歸 麥門冬 甘草 升麻 生地黃 各等分 加燈心水煎。

○瀉肝散。婦人經水不斷。適逢出痘。發熱昏沈。言語狂妄。羌

活 川芎 防風 各八分 當歸 一錢 山梔子 龍膽 各五分 大黃 酒蒸一錢 一方。加木通紫艸黃芩水煎。

○歸脾湯。婦人經閉不通。血海乾涸。適逢出痘。以是調其心脾。不使益妄行。加柴胡山梔子。名加味歸脾湯。

○逍遙散婦人出痘寒熱不時經水不調服此其血不致妄動

加牡丹皮山梔子名加味逍遙散

○如聖散姪婦出痘安胎白朮當歸黃芩枳殼黑豆

大腹皮宿砂甘草桑寄生等分水煎

○黑神散婦人出痘分娩後瘀血作痛當歸川芎熟地

黃炮薑桂心蒲黃炒香附子童便木香青皮黑豆

酒水各半煎服

○出痘有毒熱血熱寒虛咽痛不起發漸乾出痘ヨリ貫膿ノ

比ニモ可也餘毒ニモ吉予射干鼠粘子湯ニ加減メ得此劑

大効アリ射干牛蒡子升麻犀角當歸防風

黃耆桔梗甘草因症加入參或實表解毒湯ナトノ味

ヲ不好者ニ可也

○倒膿八俗ニハヤカセ也貫膿ノ二日比ニ面シコリ乾ニ
倒膿八手足疋ニ乾キ心ニテ不滿也是ヲハヤカセノアレ
キト云目當トナシテ可也順ナルカセハ少シ早ク面收ル
モ面ノ腫退ケハ夫程手ヲトク腫レ夫ヨリ足マテ能フク
ル也面ニ膿十分ニ満テ收レハ兩手ヘ膿廻リテ能腫レ
夫ヨリ足ニ膿カリテ腫ル也順ナルヲ手本ニゾ可知也
○痘吐血者不治自斷出血者因症可治乎一人自口出血者
得活以此考則自斷出血者也

○痘血熱煩燥或痒痘黑陷犀角地黃湯合消毒飲

○收膿結痂之間血熱者大便結者可乾燥四物湯去熟地黃

加生地黃升麻紅花。

○痘眼久不開則眼中ニ星生ス其時敗毒散加黃芩黃連犀角白礬洗之眼不開間之事也。開テ後ハ無効。

○痘後腫脹赤小豆湯加犀角妙。

○痘起脹膿之時泄瀉則不發而內陷メ死ス故木香散異功散ヲ用ル也。以訶子肉豆蔻瀉之可也。瀉止則不用之。予始多去訶子肉豆蔻用之。今年始テ訶子肉豆蔻ノ効ヲ知ル。不可無之。

○手捻散 牛房子 考藥 桃仁 大黃 肉桂 紅花

右痘疹後毒滯于内為腹痛者有妙。其外風疹瘡癧或惡血毒氣腹痛諸藥不効者可用之。

○痘發熱三日出痘三日回水三日貫膿三日收齿三日三五合テ十五日ニ酒湯ヲカケル也。大ニ出テカセカヌルハ六日目程ニ篋湯トテ酒湯ヲ篋ノ葉ニ付テ振リ掛ルニ子ヲメ。手拭ニテ面々酒湯ニテシメシ。手モ如此ノ。一日ヲ隔テ又如此シ。又一日ヲ隔如此シ。三番湯ノ比ニ食進ミ氣力ヨクハサツト洗フ。モアリ。不食熱有ルハ初中後スグイ酒湯ニテヨキ也。常ノハ十五日目ニハ悉クカセル也。足六デカセルが相圖也。輕キハ早キモアリ。然レモ發熱ヨリ十五日目ヨシ。有熱ハ延テヨシ。十五日目ニ拭酒湯ニスルモノシ。酒湯ト云ハタライヘ湯ヲ常ノ如ク入レ。自水ニテウメ合。盃ニ酒ニツサレテカキニゼ洗フ。是ヲ酒湯ト云也。

輕寺痘八十五日目ニタライへ入浴シ米俵ノロニ當タル
サニダワララ頭ニ當テ頭ヘモスグニ酒湯ヲ掛ルモアリ。
其國マノ風俗ニヨル也。

○發熱三四日初日ヨリ敗毒散加陳皮葛根又ハ前胡湯ニ柴
胡羌活發熱ノ二日紅点モ見ヘヌガヨシ前劑其役用之熟
甚腹痛嘔吐アルハ毒氣アリ多可出也升麻葛根湯加牛房
子黃芩紅花用之發熱ノ一日二日ニ目ヲ見ツメ急驚發ス
ルアリ絶入テ搗搗上竈甚モアリ熱強クハ前胡湯加紫艸
黃連搗搗甚キハ加殭蚕二日半日一夜正氣ノ付ヌモノア
リ獨參湯ヲ兼用ルモノアリ人參五分生薑五分也懶メ序
病甚キハ必無恙痘モ不多也二日ニ紅点ノミユルハ表虛

有毒ト世醫心法ニアル通り也實表解毒湯ヨシ或黃耆建
中湯加人參射干牛房子黃芩紅花モヨシ發熱ノ三日ニ午
後ニ紅点少シ見ユルハヨシベニヲ紙ニヌリ紙燭ニノ見
レハ能見ユル也油ノ病人ニ掛ラヌ様ニ心得ヘシ順ナル
ハ前胡湯ヲ加減用テ置テヨシ二日ニ紅点見ユルハ三日
ニ餘程見ユル也是ハムツカシキ者也出樣薄黑キハ不治
也紅點大ブリニテ赤ク潤フガヨシ赤ミ大キナルハ熱薄
シ白シテ不赤ハ氣虛冷ト可知發熱三日ノ中大便瀉スル
ハ不苦順ナルハ三日ノ満日ニ熱サメテ出痘スル也發熱
ノ中ニ多ク出ルハ出痘ノ中熱サメズメ回水ノ比膿迴テ
熱輕ムモアリ。

○出痘三日四日目ノ朝熱サメテ出痘スルハ順ニテヨレ。色赤過テ熱殘ルハ内托散去肉桂木香加紫艸紅花黃芩人參五厘色ウスク額白キハ氣虛也。内托散加人參七厘發熱ノ二日目ヨリ出テ出痘ノ初日ヨリ熱彌甚キハ多ク出レ也。細ニメ不秀地界ハムツカシキ也。黑点ナト見ユルヲ痘疔ト云一處ニ集リフクレルヲ痘庖ト云。黑点黑色見ヘ譖言撮空ハ死スル也有熱ハ回春人神効散ヲ用ル也。或内托散加黃芩紅花紫艸去木香肉桂或加黃連出痘二日前日ノ格ヲ見テ可治療也。色赤キガヨシ赤ミ過テ乾クハ血熱也。色薄キハ人參ノ症也。四君子湯異功散建中湯ニ加減スル也。益氣湯ニ肉桂ノ加減モアリ。内托散ノ本方モヨシ出痘也。

三日此時漸水膿ニワリ心ナル者也。治法如前。此時ヨリ大便瀉スルハイヤ也。ウミ上ル中痒ミ出スル也。黃耆建中湯異功散。四君子湯加木香。虛冷加乾薑肉桂。熱強ク痘多出ハ實表解毒湯或神功散内托散ノ加減出痘ノ三日ニ悉ク出盡ス也。痘不盡ノ黒キハ不治也。出タル様子キルイニテ皮薄ニ見ユルハ大虛也。後大便瀉シ痒ミ出カキヤブル也。○回水三日發熱ヨリ七日目也。此時水ニワリスルト云テ。薄ク膿力ハル也。水膿ト云痘皮厚ク根赤キハヨシ根白ク皮薄キハ陽虛也。四君子湯異功散保元湯加減内托散益氣湯大便瀉スルハ理中湯參苓白朮散異功散加木香建中湯加木香痘多有熱ハ内托散去肉桂木香加紫艸紅花黃芩或

神効散半虛半實ハ前ノ補劑ニ加減スル也。回水三日發熱ヨリ九日目也。此日漸本膿ニナル也。膿ノ色コクナル也。此時瀉スレハ痘瘡ミ出カキ破リ。寒戰咬牙スル也。回春ノ理中湯加減痘門ニアリ。附子理中湯加木香内桂ノモアリ。瀉無クテモ一日ニ二三行ノ者ハ弱シ。痘ノ色薄キハ四君子湯異功散内托散保元湯益氣湯ニ木香内桂丁子乾薑ノ類ヲ加味スヘシ。弱クハ人參二三分加フヘシ。瀉有テ寒戰咬牙ニハ附子理中湯人參三分獨參湯一丸ニ生薑五分ヲ兼ル也。多ハ難治也。或ハ物湯多く出ル痘熱有ラハ内托散ノ加減ヨシ。

○貫膿三日發熱ヨリ十日メ也。前日ノノ治法此日俗ニハヤ

力セト云テ。面カセテ手足乾クハ不治也。倒齧ト云面少燥キ心チルニ從テ。手ノ痘ヨク膿ニワリ。腫大ニ痛ハ吉也。俗ニ窓ラロスト云テ。眼ヲ閉ル也。回水ノ二日比ヨリ收齧ノ初日テ。窓ラロスガヨシ。目塞クト云ハ唱アシキ故ニ。窓ラロスト云也。十日十一日。面カセ窓ヲ開クハ大虛也。可温補。ソレモ手足ヨク腫テ痛ハ不苦。痘ノ虛實痒ハ虛也。痛ハ實也。瀉アルハ前ノ治法也。惡症ハ諸書考。貫膿二日發熱ヨリ十一日メ也。此中ノ辨。萬病回春。壽世保元ニ委シ。又水膿ヨリ聲啞スルアリ。十一日メ十二日メニ聲スムハ吉兆也。食ハ發熱三日不食メ。出痘回水ノ半ニテハ食シ。貫膿ノ前後收齧ノ初メニテハ多出タルハ口難開故ニ不

食不^レ者也。小兒ハ口吻堅^リテ。乳ヲ呑^ヌ故ニ。モ湯ヲ
コクシテ。砂糖拌^テ與^ヘテヨシ。貫膿ノ二日比ヨリ。食進ミ
出ルハ大吉兆也。大便發熱ノ比通シ。力セギワマテ不通^ガ
セギワニ堅ク通スルハ順也。或ニ三日メニ堅ク通スルモ
ヨ牛方也。十一日メニハ少シカセ心ナルニ依テ。少シ痒キ
ハ不苦。痒ガルヲ。鳥ノ羽ニテ撫^テ。手ニテ輕クタヽキテ。コ
ラユルハ不苦。貫膿三日發熱ヨリ。十二日メ也。此日漸面ハ
カセル也。輕キハ十日メノ夜。面少シカセ心ニ成^テ。食ヨク
手足モ脹ル也。或十一日メノ晝ヨリ。如此モアリ。十二日ニ
面カセヨル也。痘何程多出^テモ。此比ニ聲スミ食進ミ出ル
ハ大吉兆也。十日ノ夜。十一日。十二日痘早ク乾燥シ。熱アレ

ハ八物湯。熱有^テ弱キハ。十全大補湯。益氣湯ノ類也。十日十
一日ニ。困睡ノ草卧タルハ。獨參二三枚。四君子湯。異功散。益
氣湯ノ類ニ。溫藥ヲ加^ヘテ。兼用ル也。口渴スルハ。瀉セニ^ト
ヲ恐ルベシ。四君子湯ニ。當歸麥門冬。或十全大補湯。或七味
白朮散。獨參湯ニ。加麥門冬生薑^テモヨシ。

○收瘻三日發熱ヨリ。十三日メ也。前ノ格ニテ補劑ヨシ。多
ク出タルハ。餘毒有^テ。痴トレカヌル也。諸書可参考。十五日
ノ後ハ。餘毒ノ治法也。是大法也。」

諸症

○小兒生下翌日。欲乳啼哭不止。啼而後身振ヒ色赤。見其腹
甚堅。大便黑而少通。小便赤ノ又少シ。以升麻葛根湯。加大黃

木通紅花一貼而啼哭止大便便利用二貼而安。○小兒一切瘡草氣竒方。船見十云所ノ賣藥也。大人草氣ニモ妙也。薩摩小人參 升麻 茯苓 肉桂 生地黃 土茯苓各二 和白朮茱八十兩余倍甘草各右皆炒香シ細末ニメ白湯二テ下ズ禁物油氣香バシキ物。茶大根其外青葉類。

○大人小兒遺尿。人參八分白朮 黃耆 山藥 考藥酒製

各一 山茱萸 酸棗仁各七分 甘草四分

○小兒胎熱。前胡湯。吐乳加陳皮香附子風邪加紫胡羌活陳皮風咳熱アリニハ加蘿子杏仁陳皮。○小兒七八歲病家田蟲目ニ入タルト云テ来レ。眼ヲ取りニワシ瘡生シ膿出眼中ヨリモ膿出ル故ニ田蟲眼ニ入タ

ルト云。予以前一人ノ兒ヲ見ル時痘ノヨリ眼ノ上下ニ生シ膿血眼中ヨリモ多出テ。眼旨タル如ナリ。其後草氣モ愈テ。眼尚不開故彌目旨タルト驚ク也。予云此兒先ニ痘ノ時ニハ眼中ニハ不出也。只眼胞ノ上下ニ出タル。痘ノ餘毒ニテ閉チ外ヨリ傳ヘ肉ヨリ來ル膿ナレハ眼ニハ別条アル。○ジキト云。後眼科ニツ毛ヲ切タレハ眼開テ明カ也。以是思アニ前ノ兒眼中ヨリ膿出ルハ目ノ玉潰タルニ非ス。肉リタラハ眼ノ赤ミモ可去ト思テ加味五香湯ヲ。八九貼用タレハ甚瘡發シ手足ニモ出ツ。此時病家モ草氣ト云フヲ知レ以後八九貼用テ膿瘡愈眼如常。予加味五香湯ヲ以テ。

久々周身ニ瘡出來テ不愈ニ妙ヲ得タフ也。

○小兒生下翌日不乳眼不開啼哭弱シ。予以為生下ノ時逆產也。半生下而不全生經四半時故氣弱倦怠シタル也。強ク草卧タル故ニ不乳ト思ヒ異功散ニ人参三四厘入レ用之。

一貼而啼聲出テ二貼而能乳ス。

○小兒家秘劑主治小兒七八歳ニテノ中俄ニ熱發リ咽喉

セラツキ痰咽ニ支テラビヘ驚キ後口ヘビクノト反リ。

熱強ク腹脹大小便黃色或結ス熱症ニ吉三青湯當歸
楨榔子鬱金大黃木香等分甘草少大熟加黃拳山危
子腹痛加芍藥桂右振出シトナシ用予以為此劑大人瘀血
ナト有ル者或婦人ニ可也婦人ニ用タル主方也腹痛ニハ

尤ヨロシ。

○小兒肺ヨリ出血益氣湯用之外五倍子ノ末ヲ付ク

○痘起脹貢躁ノ時大便溏者或灰白氣虛者益氣湯加減甚有効。

○小兒生下後不乳不開口兩手微冷白四君子湯加藿香木
香則乳ス是八虛弱而胎毒伏也以藿香木香二味溫散胎毒
以四君子補之也。

○小兒生下後五香湯ヲ用ヒクレヨト望ミ或アマ物ヲ呑
セヨト婦人云トアリ腹痛ニハ甘草芍藥ニ味ヨキ也五香
湯ナ望ム時ハ三靈ニ陳皮茯苓ナト合用テヨシ真ノ五香
湯ハ沈香木香丁香藿香乳香也加味五香湯ハ本方加升麻

葛根連翹木通大黃十味也。是ハ胎毒ヲ發スルト云心也。然レニ生下後早ク用ルハ不空也。三靈ナトヨシ。
○口舌痛細力ナル物吹出ルヲ俗ニ口ワタト云。不乳ハ不治多シ。黃連甘草ソニ味如常小服ニメ。煎服ス如神。
○小兒生下六七十日ハ大便常ニ瀉スル者也。其後自調フ者也。生レテ二三十日ノ中ニ大便結スルハ前胡湯ニ加大黃煎用ヒ大便ヲ下メ吉。

脉法

○食傷或產婦恶心胸膈不和之症。脉大而緩或弱細ヲ帶。其容ハ氣聚心下而脉道氣不行也。恶心嘔逆ヲ以テ為實。吐或恶心止テ脉必滑數也是心下和而脉道行也。虛者心下無力。

無恶心心下スキテ好按也。是虛症也。此處見虛為實。見實為虛也。不可不知。

○丹溪曰。產後大補氣血為主。

○醫ノ至極ト云ハ病門古人ノ格言ヲ能諳シ。病症ヲソレソレニ幾度モ當テ。虛實寒熱ニ心ヲ付テ。其病其病ノ初中後ノ次第。惡症ヲ能知レハ可治症。不治ノ症自ラ手ニ入也。不治ノ症ヲ不可治兔角病人ヲアセタ見テ。心ヲ入テ理ヲ究ル時ハ。連々自由ニナル也。予ニ三四ヨリ。病人多ク々ニ功ヲ積メハ古方モ能ク手ニ入り。此病ハ此理。此病ハ日ヲ經テ後ハ此ノ様ニ成ルトモ可有ト云。前ヨリ見ニ

ル也。末ノノ前ニ見ユル程ニ成テモ油斷モナラヌ物也。レテ初心ノ間心ヲモ不入行當リ。ニ治療メハ一代治療ノ手ニ入ル。ハ有ニジキ也。我が生涯アル中。四十五十ノ間ニ治療手ニ不入メハ無念ナルス也。三十ヨリ四十ノ間ニ工失脩練スヘシ。四十二テ漸ク達者ニ成ル者也。予隨分心ヲ碎テ其塲くヲ覺ント思フテ。心カラ盡レタルニ。三十七八比漸手ニ入ル様也。五十二成テハ餘程落着スル處アル也。是醫ノ至極ノ修練ト知ヘシ。折々此ケ條ヲ見テ。服膺スヘシ。

○病症ヲ見ルニ虛症兼蟲積。傷寒後持病交ルノ病症。一般ナラゲルト多シ。故ニ虛症ノ格ノ是蟲積ノ交リタル分ハ

是傷寒ノ分ハ。是持病ノ分ハ。是ト分テ可知。三症交リタル者モアリ。是心虛痰鬱ノ症。患病或患風熱或痛風或傷食或諸病ヲ得。交ヘ見ハル。ニ依テ不時ニ眩暈スルヲ。是ハ至極草卧タルカト思テ。人參ヲ與ル。心虛痰鬱交リタル故ニ弱ヰ様ニ見ヘテ。人參却テ不應。皆爰ニテ治療ニ迷フ也。或傷寒初中後ノ次第ヲ不知メ。為内傷偏ニ溫補ス。外症内傷ノ定ハ。回春内傷ノ論ニ格言アリ。熟讀メ可明也。内傷ハ口味ヲ不知也。外邪ハ口必苦シ。何ヲ以テ口苦ヲ知ルナレハ。塩ノ味必苦。味噌タマリ。苦シト云ヲ以テ。次メ外邪ノ伏シタルヲ知ル也。内傷陽虛ハ。必口淡シ。淡シト云ハ。陽虛ト知ルヘシ。内傷ハ熱有テモ。塩味不苦也。外邪ハ必ス惡風

スル也。

○療治ヲ手ニ入シト思ハ、外事ニ心ヲ不可觸。外事ニ心ヲ留ルノアレハ病ヲ忘ル、故ニ治療不可。手ニ少々間アラハ病家ヲミ一ヒ。兔角虛實入道理ヲ自得メ。手ニ入ルヘシ。虛實手ニ不入故ニ藥的中セズ。或不治ノ症ヲ可治症ト見ル故ニ死ニ行當テ驚ク也可。死症ヲ前力強ニ見ツケ子ハナラヌ也。惣メ諸藝ニ達シ。名人ノ名ヲ得ルハ晝夜其事ヲ忘レヌ也。詩文ヲ學フトテモ。治療ノ勞役ニタル氣ヤスメニスルハ可也。詩文ニ泥ムハ。治療ノトヲ忘ル也。少間モ不可忘。不忘則久而自得妙。古文視聽言動ノ箴ニ久而誠アサメ同シ心也。志道ハ人ツツメヨヤ。

○醫ノ至極ハ虛實ヲ決スルノニツ也。虛而不受補者死。實症ハ必竟不死故ニ。虛ヲ實ト見。實ヲ虛ト見。死症ノ様ニテ。不死症ヲ必死ト思一。可死様ニテ生クルハ必竟根元ニ生綱アル故也。故ニ顏色ヲ能察シ。其人ノ若年ヨリ大病ヲ煩ヒタルカト問ヒ。其治療ノ法ヲモ問テサテハイツ比ヨリ煩ヒ付。其間ノ治法。病ノ次第。詳ニ問ヒ。極メ。脉ヲ診シ。腹ノ虛實ヲ察スヘシ。連々二年ヲ經テ。功者ニ成ヘシ。此心ヲ不知則。老年ニ及テ。却テ童心ニ可耻。

當莊菴家方口解 全部七冊

文化四年丁卯三月刻成

京二條通

伊兵衛

太城心齋稿筋

森本多助

江戸本石町

西村源六

名古屋本町通

片野東四郎梓

