






捷徑醫案卷之三

遺精

尿遺精便濁當驗於尺結北動

月緊二病之的●急疾虛浮時

者死○論夫精者五藏六府

之精之所又聽命於心焉蓋遺

精乃心虛神交也○曰夢中交而遺

精也○三曰壯年氣盛久蓄色欲

而遺也○四曰情縱於中而願不

夫壯年氣盛乃情不遂欲而泄也若

其情自愈至若夢中交泄則其

精之某不効殊不知此症之

肝胃飲酒厚味痰火濕熱之入
肝胃飲食化生而輸於腎今
肝胃傷於濕厚濕熱內鬱中氣
濁而不清則其所以化生之精亦
得濁氣而主秘厥陰則火氣
所輸之精既有不寧則故造而
於腎中而水不得寧則故造而
致遺精者從心腎治之但遺精
胃者多又當○治法大抵固精
●心虛神交者●心湯定心丸
●腎虛精滑者●腎氣丸加牡蠣
●玉堂丸●百粉丸●保精湯●選丸
●屬脾胃者●固本鎖精丹●白丸
●九二八●童男陽氣暴盛故情
熱於中志有所慕而不得遂成
夜夢而遺精也其心不安惟清心
滋潤不可補清心乃安惟清心
蓮子飲●臨臥服及定志丸主之
●虛夢遺定而遺宜溫膽湯去

竹茹●加人參遠志蓮○方主固精
肉炒●酸棗仁茯神○
湯●治心腎虧損遺精白濁●
當●黃芩●白芍●人參●麥門●巴●
五●味●益●智●酸●棗●仁●巴●
澤●瀉●升●麻●黃●連●黃●芩●
草●梢●水●煎●○●
●心●虛●神●交●者●
●腎●虛●精●滑●者●
●玉●堂●丸●
●百●粉●丸●
●保●精●湯●
●選●丸●
●屬●脾●胃●者●
●固●本●鎖●精●丹●
●白●丸●
●九●二●八●
●童●男●陽●氣●暴●盛●故●情●
●熱●於●中●志●有●所●慕●而●不●得●遂●成●
●夜●夢●而●遺●精●也●其●心●不●安●惟●清●心●
●滋●潤●不●可●補●清●心●乃●安●惟●清●心●
●蓮●子●飲●
●臨●臥●服●及●定●志●丸●主●之●
●虛●夢●遺●定●而●遺●宜●溫●膽●湯●去●

耳草一分半 共為末，神效。○
 九指子，大，每五十粒，空，心，振，湯，如，白，枯。
 下，姜，橘，根，白，皮，加，二，陳，湯，木，枯。
 乾，石，菖，蒲，根，白，皮，知，母，龜，子，研，○
 硬，石，菖，蒲，根，白，皮，知，母，龜，子，研，○
 麻，紫，胡，白，治，濕，熱，傷，脾，遺，精，○
 橘，白，九，白，木，知，實，知，母，各，
 二，分，胡，白，木，知，實，知，母，各，
 每，五，十，九，空，心，煎，湯，下，久，不，止，
 加，橘，根，白，○
 黃，連，清，心，湯，有，所，
 藥，而，作，愛，道，此，君，火，既，動，而，相，
 火，隨，之，治，在，心，○
 參，遠，志，耳，草，
 和，酸，仁，人，參，遠，志，耳，草，
 水，煎，○
 三，黃，丸，治，遺，精，○
 湯，治，陰，虛，火，動，夜，夢，遺，精，或，白，濁，
 當，飯，川，芎，白，芍，

生，非，如，母，黃，連，參，門，乾，萎，
 知，母，黃，連，參，門，乾，萎，
 壯，陽，山，茱，萸，○
 固，精，丸，治，心，
 安，腎，虛，精，自，泄，○
 各，一，錢，壯，陽，山，茱，萸，
 藥，各，一，錢，壯，陽，山，茱，萸，
 各，三，分，共，為，末，煮，山，茱，萸，
 九，指，子，大，朱，砂，為，衣，每，
 五，十，九，空，心，煎，湯，下，○
 百，粉，
 九，指，子，大，朱，砂，為，衣，每，
 各，分，為，末，煎，湯，下，○
 五，十，九，空，心，煎，湯，下，○
 固，本，鎖，精，丹，治，元，陽，虛，遺，精，
 乾，萎，參，門，乾，萎，
 此，大，補，元，氣，滋，陰，不，固，遺，精，
 陽，虛，熱，○
 藥，各，一，錢，壯，陽，山，茱，萸，
 相，粉，五，味，二，錢，半，
 黃，連，二，錢，半，人，參，一，錢，半，
 黃，連，二，錢，半，人，參，一，錢，半，

共為末用白木六錢水二碗煎
至一碗傾出木汁別放再水
碗半煎至半碗去渣與前汁同
煎熱至半碗如膏如前某末
梧子大每五十九加至六七
十九空心溫酒或淡鹽湯下
白龍丸 治虛勞腎損夢中遺精
白濁滑泄盜汗等症
●鹿角霜 壯陽各二錢
骨生用一錢 共為末酒麴糊
九梧子大每三十五十九空心或
鹽湯或酒下不惟治遺精之疾
且能固精
●玉環丹 治遺精
壯陽神效
●蓮子散 治遺
肉 壯陽 黃柏各一錢糊丸
梧子大每五十
九空心鹽湯下
●蓮肉 蓮鬚 芡實 人參
要門 茯神 遠志 甘草
本煎空 ○栢樗丸 治白濁夢泄
心腹

而不收
蛤粉 青黛 麻 乾姜 滑石 各等分
烏來水丸 梧子 大 每百丸 空心
溫酒下
● 庫勞者 四物湯吞
下
○ 玉堂丸 治夢遺精滑 晝夜
長流 神効
● 蓮
歸一兩 六錢 芡實 一兩 二錢
麥門四錢 石蓮肉 八錢 共
烏來水丸 梧子 大 每
五十丸 蓮 湯送下
○ 兼濟湯
治男子失精 女人夢交 自汗盜
汗 不寐 氣動 微緊
● 挂技
白芍 龍骨 牡蠣
其 卑卑 觀空 心 神 服

△痢閉
脈少陰脈細而數為氣熱婦人
則陰中生瘰●盛大而實者
生瘰而○論夫瘰者小便便
痛者死○論淫涼痛飲去
吳或去又來痛亡不顯蓋因
食膏粱之味濕熱之物或燒

不出宜二陳湯加木通香附
吐或炙石會火皆以開上竅也
蓋膀胱雖主水道而肺金為水
之化源也 ● 陰虛兩尺脈弱
服清利藥不効者腎氣九陽
虛精不出而內敗小便頻數
如淋或老人精已竭而復耗之
大小道牽痛愈痛愈欲便愈便
則愈痛八味丸加半前子牛
膝 ○ 主海金沙散 當飲五淋
牛膝 大黃 木香 海金沙
各等分 為末 每下一錢半 臨臥酒
調服 ● 五淋散 治肺氣不足
立効 通淋 不出或尿如豆汁或如
血或冷淋如膏或熱淋尿如
赤茯苓 母草 水煎服
一方加生半只渴
木通滑石車前子 ○ 阿膠散 治

淋 ● 阿膠 猪苓 澤瀉
赤茯苓 滑石 車前子 木通 空
心 治血淋 用乾神燒存性為
末 每二錢 空心米
飲 ● 五苓散 加蒼朮 治小
下 散滯茴香湯 治諸淋并婦人
小指 當飲 烏菜 荊芥
黃連 香附子 木通 菖蒲
赤仁 薏苡仁 竹 ○ 琥珀熨金
丸 治水火不既膀胱虛心火
不熄或遺泄不禁或白濁如清
水或膏淋如膿或如粉糊則似
痛不已候熱症也此藥治
● 滑石 茯苓 各四錢 黑膏
牛頭末 大黃 黃芩 琥珀
各二錢 黃連 薏苡仁 各一錢
共為末 水九指子 大每五十九

聖心白
○治淋濁妙方
牙石

竹葉
○治淋濁妙方
牙石

水煎
○治淋濁妙方
牙石

久淋不止
○治淋濁妙方
牙石

白芍
○治淋濁妙方
牙石

升麻
○治淋濁妙方
牙石

知母
○治淋濁妙方
牙石

車前
○治淋濁妙方
牙石

二苓飲
○治淋濁妙方
牙石

茯苓
○治淋濁妙方
牙石

起不通
○治淋濁妙方
牙石

附子
○治淋濁妙方
牙石

半復
○治淋濁妙方
牙石

生等
○治淋濁妙方
牙石

散
○治淋濁妙方
牙石

青皮
○治淋濁妙方
牙石

陳皮
○治淋濁妙方
牙石

車前
○治淋濁妙方
牙石

大荷
○治淋濁妙方
牙石

各等
○治淋濁妙方
牙石

分
○治淋濁妙方
牙石

肉
○治淋濁妙方
牙石

桂步
○治淋濁妙方
牙石

水煎
○治淋濁妙方
牙石

論
○治淋濁妙方
牙石

夫尿者
○治淋濁妙方
牙石

賴心腎
○治淋濁妙方
牙石

二氣之所
○治淋濁妙方
牙石

傳
○治淋濁妙方
牙石

遺尿
○治淋濁妙方
牙石

脾者五苓散合四物湯●虛弱不
禁五苓水煎空心服●老人
氣短小便不禁四物湯加黃芪
人參煎湯送下通關九●婦
人產後傷胎小兒胎前遺尿
雞肝膽一具并腸洗淨煨灰用
雞心酒每一錢溫酒調服男用
雞女用雄雞●方滋養
法宜灸氣海穴○常遺尿失
衛湯治身瘦夜常遺尿失
白木●山茱萸●益智仁●山茱
●當歸●白芍●黃芪●山茱
●草水煎服○縮泉丸●足小使頻
●數日夜百餘次●益智●山茱打糊
●菜各等分為末酒煮●山茱打糊
●九梧子大臨卧時用○治下元
●酒送下五錢●人參
虛小水頻數黃柏各五錢人參

草一錢共為末煉蜜丸●
大每五六十丸臨卧白湯下用
可○既濟丸●治小便不禁
●知母●熟地●各五錢●黃連
●各二錢●五味子●牡蛎●山茱萸
●未起糊丸梧子大每五錢●治遺
●六十丸空心湯調下○治遺
尿失禁●錢故紙炒為末每二
●治夜多小便●益智仁●水煎服
●又方●夜前草薢一味
●服之●水不夜起

△小便閉

附轉

論夫小便不通●小腸熱結也
●熱飲則小便難●而僅熱甚則
●小便閉●而結●又有因濕熱不
●痛自汗五內結●及諸瘧失血

過多者又有痰涎阻滯，氣道不通。通者又有愈愈，氣結閉過不通。者又有胞氣轉疾，下併急。而痛小便不通者，名曰轉胞。○
治法：散之類，選用宜，兼用外治。○
法：散加朴硝。●熱結者，煮赤散，或五苓散。失血過多者，人參、龜、榮、湯、胃、及氣虛者，四君子湯，加黃芪。升麻、血虛者，四物湯，加黃芪。八物湯。●精竭不通，莖痺不通者，八味丸。●小便不通，兩尺脈俱沉微者，乃除尿也。●曾服過濟之劑，不効者，附子。●小腹痛，二味、灯心、煎食，速服。●轉胞，小便不利，命在反掌。八味丸救之。一服，小便如湧而安。●轉胞，症二石散，如車前子、木通等，分水煎服。外用妙靈、附脂、冷、路、易、之。●陰陽關格，前、后、

不通，尋常難利，大腑小便，中有轉胞一症，諸藥不効，失救。則腰滿悶，亂而死。○以耳達末，水調敷臍下，內服耳草、葶、煎湯，及茶汁至臍，二茶相反，胞即轉。安小便，來如泉湧，此急救之良訣。○**通關丸**：治小便不通。●石各二錢，黃柏、知母、滑石、分三錢，共為末，水丸。一錢，肉桂、百九白。○**導赤散**：治小便赤熱，煩渴及口舌生瘡。●生、八、草木通、甘草、竹葉、煎服。○**正散**：治心經、華熱、胎前、結、血淋、如、赤、波、瀾、開、而、不通、及、熱、淋、使、熱、出、而、痛、既、出、而、得、者、則、小、便、通。○**二石散**：治男婦、分、心、煎服。○**二石散**：治男婦、

九日不得小便者
○治小便不通
研爛投寒水

○又方
燒灰

○又方
治心腎有熱小便

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

△大便秘

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

○又方
用蠶絲一箇焙熟研

流潤則大便如常若飢飽失節
勞役過度損傷胃氣反食辛熱
厚味之物而助火邪伏於血中
耗散其陰津液虧少故大便秘
結然其病不一風秘者風痰結
於大腸而通也氣秘者氣滯而
不通也重煩悶脹滿大便秘結
不通也寒秘者年高腸冷及痰
癖冷氣結滯大腸而不利也難
秘者內脂積熱消耗津液大便
結燥而不通也濕秘者濕熱鬱
結津液不行大便秘結也又有
因宿食結而喘者又有年老之
人新產之婦氣血虛弱腸胃結
而秘結者不可妄用通利之藥
恐傷元氣惟當滋血潤燥而已
○治法或三生湯又宜兼用外
治方其後諸方當對症選用
●秘結有虛實之分胃實而閉
者能飲食小便赤當以利氣九
三黃丸脾約丸之類下之胃虛

而閉者不能飲食小便清利
○補主之蓋實閉物也虛閉
也○宿食停滯胃中大便不
通心腹作痛者備急丹主之若
食傷大腸瀉不通者利氣丸主
之○大便秘結者以四物湯加
枳殼桃仁紅花○氣血乾涸
津液枯竭時常大便燥結八珍
湯加肉蓯蓉久服自通或腎氣
丸潤腸丸○七情氣秘者補中
益氣湯○六磨湯○痰滯不通者
通五積散○痰滯不通者二
陳湯加枳殼煨榔○大便秘不
通并傷寒雜症用藥不行者
粟米水煮至熟入麻仁○主通
再煮二三沸飲湯立通○方通
幽潤腸湯治大便秘難由門不通
不便燥屎不下○桃仁
生半○熟半○桃仁
紅花

以蘇子麻仁粥每早晚服之
二味不拘多少研爛水送服治
意粥食之能加減神效湯木
便閉結不通○當飯熟半
生芋麻仁桃仁杏仁杏仁
枳壳耳朴黃芩大黃各
等分此草水煎空心熱服
大便通即止或為末煉蜜丸梧
子大每五十九空心白湯下忌
辛熱之物●發熱加紫胡
●腹滿加水香●如虛柿燥
●加當歸熟牛桃仁紅花●
風燥閉而閉加人參郁李仁
●氣實而閉加枳椇木香●
●痰火而閉加瓜蒌仁竹瀝●
因汗多或小便去多津液枯竭
而閉加人參麥門●老人氣
血枯燥而閉加人參錢陽麥門
●都李仁●產婦去血多枯燥
而閉加人參紅花倍當飯熟半

此仁○治大便不通及老人

風濕閉結陳倉角燒存性以飯

子諸冷水下立通○蜜蘗法

治自汗大便閉結不通且便於

老人非日久不能展者如無

變以香油灌入○治大便閉結

用前法搗爛收貯上○治大便

閉結至極各不知人○大田螺二

鐵釘生搗碎置醋下三寸○

去燥藥生薑刺如小指長二

大小便秘
顛倒散治臟腑實熱或小便

丹溪曰此症多死寒在上熱在下也寒在胸中過熱不入無入之理故曰格然在下焦則吐逆通無出之由故曰關格則吐逆關則不通○治法陽主之必用吐得小便○治法陽主之必用吐以提其氣之橫格不必在出痰也有痰宜二陳湯加木通探吐之●中虛者補中益氣湯加枳實●升降之中虛者六君子湯去木加枳實仁及神遊丸●甚吐利俱不得看神遊丸●兩枳三陳湯治關格上焦痰也●陳皮半夏白茯苓●前星枳殼枳實耳草●水瀉服用鵝翎探吐之○平胃散●五苓散加藿香姜枣煎服如病虛弱不可用也○神遊丸治關格吐逆小便不通●人

參附子各一錢 麝香五分
共為末 假九梧子大麝香為衣
每下九粒

△脫肛

論夫脫肛者脾門翻出也乃虛寒下脫間有熱者其病或與肺麻痺日久服寒涼藥勞傷而下脫或因久痢氣急迫而脫下又有產婦用力過多及小兒疳積而脫也蓋肺與大腸為表裡者大腸之門肺實熱則閉法肺虛寒則肛出腎主大便○治法肺虛者補中益氣湯加芍藥升氣降濕湯若血虧四物湯加黃芩槐花血虛四物湯加白朮連升麻風邪者敗毒散○升氣

除濕湯

治胃弱不思飲食
便黃四肢困弱及脫肛
胡荽 芥子 防風 神麴 麥
芎藭 蒼朮 陳皮 杏仁 溫水
● 提氣散 ● 治脫肛

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

芎藭

治胃弱不思飲食

河車丸

治傳屍癆瘵二具可愈

●紫河車焙乾一具辰砂一

兩大黃五錢桔梗黃柏胡黃

連貝母敗鼓心人中白

各二錢五分犀角共為末煉

芒硝各一錢五分為衣每二十

九至三十九腸熱食消溫酒下

○去虫積為末蜜水

調下令患者先一日少飲飯

臨晚亦勿食火早五更服之

治蛔虫苦練根二兩以水三

碗煮至一碗半去查用

晚糯米一合煮粥空心先以桑

葉粥一合吃引虫向上然台進

△補益

脾氣虛弱細或緩而無力右手

手脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

虛脈弱或脈大或數而無力右

汗出於肝則換筋搖骨若汗出於肝則換肉飲食飽甚汗出於胃則換骨治宜酸若辛散於肝則不可治矣肉因五勞六傷心則不可治久虛五勞應五臟七傷積虛成損損成傷經年不愈占謂之六虛六府蓋心勞曲六極即六慾也六府蓋心勞曲神虛則盜汗極則心痛咽腫肝勞盡力則盜汗極則心痛咽腫頭目昏眩脾勞則吐瀉肉削四肢急則氣逆有背脊痛肺勞則喘急則氣逆有背脊痛肺勞則喘毛焦津枯咳嗽喉乾熱腎勞則精竭則精竭此五勞應乎五極者也若五臟已衰行步不正名曰精竭人精竭華弱核少故又

勞極之由久相傷血又則傷氣久坐傷肉又立傷骨久行傷筋房勞思慮傷心腎則陰血虛勞役則傷胃脾則陽氣虛此傷症之至要也其為病也食少神昏遺精夢泄背脊痛筋骨痛盜汗潮熱咳嗽痰涎沫或吐血或血便血等俱見

治法 凡補益下三便是聖症

以養胃消痰茶飲之蓋人以穀氣為本也

●氣虛諸病脾胃虛弱飲食少進者四君子湯脾胃虛寒者香砂六君子湯脾經鬱結者破脾湯肝木侮脾者六君子湯加木香芍藥若命門火虛而見脾胃虛弱下食等症八味丸

●血虛諸病四物湯主之若脾氣虛而不能生血者四君子湯若脾氣虛而不能生血者腎氣丸

●氣血二陳湯

傷停飲日眩去參加官桂、茯苓、
●脾困氣短加木香、砂仁、
●腹脹不思食加白豆蔻、枳實、半復、
●胸膈喘急加枳實、五味、
●杏仁、●喉嗽加梨白皮、五、
●枳殼、●心煩口渴加倍參、加黃、
●杏仁、●心煩不定加辰砂、酸、
●仁遠志、●氣痛加玄胡、索、小、
●茵當歸、●氣塊加三稜、莪、木、
●茵香附子、●腹痛加乾姜、赤、
●芍官桂、●遍身疼痛加赤芍、
●官桂、●外感寒熱冬加麻、黃、
●桂枝、三時加防風、羌活、●風、
●燕往來加前胡、川芎、●口、
●邪加荊芥、黃芩、薄荷、●小、
●加木瓜、葛烏梅、●小、
●不通加薄荷、木通、猪苓、●太、
●疾如全、●附子、細辛、●小、
●症已出、●成、加升麻、乾葛、●疹、

●凡病后調理加陳皮、
●病后腹熱加柴胡、當歸、升麻、

異功散 治久咳不已或腹滿少
胃腹脹食少思等症 四

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

此 六君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

●凡病后調理
●君子湯 治脾胃虛弱飲

● 燔加天門 ● 寒加桂心 ●
● 陳虛火動加知母黃柏 ●
有嗽合二陳湯少許 ○ 八

婦人諸病加茶見婦人科 ○ 八
珍湯 治氣血俱虛弱惡寒發熱

或飲食少思小腹痛男婦百
症小兒疹痘通用 ● 四君子

湯合四物湯姜連煎服 ● 有
痰合二陳湯名 ○ 十全大補湯

治男婦諸虛勞傷生氣血壯脾
胃凡元氣虛弱或因起居失

宜或因飲食勞倦或因用心太
過致遺精白濁盜汗自汗或內

熱喘熱渴無熱或口乾作渴
喉乾舌燥或胸乳膨脹脇肋作

痛或頭暈或眼花或心神不
寧或頭暈或小便赤澀華中

促或一切熱症皆是無根之火
本方加參門五味培其根本諸

症自息 ● 八珍湯加黃芪肉
桂姜棗煎服 ● 相火旺加

知板 ● 下焦虛 ● 補中益氣
湯 治中氣不足肢體倦怠口乾

或氣高而喘身熱而煩或脈微
細軟弱自汗心悸少食或中氣

虛弱而不能攝血或飲食勞倦
而患虛癆或虛癆因脾胃虛而

不能愈或元氣虛弱感冒風寒
不勝發表宜用此代之或入房

用此湯急加附子或瀉痢腹痛
急用附子理中湯 ● 少加黃柏
以救腎水瀉陰中之伏火紅花
少許入心養五 ● 若元陽虛
寒加附子肉桂 ● 若陰虛火
動加知板 ● 若口乾作渴加

麥門天花粉 自汗盜汗加

麻黃根 浮小麥 酸棗仁 痰盛加五

心煩熱 加生芩 麥門 嗽盛加五

加半復具母 夜卧不寐 加酸棗

味天門 心下怔忡 恍惚加遠志

麥門 獨參湯 治元氣虛弱 惡

扶神 喘氣促或氣虛 卒中不

煩躁 痰喘或痰涎上湧 手足逆冷

語口噤或痰涎上湧 手足逆冷

或婦人難產 上后不醒 喘急等

症 或加乾姜 佐之 如不應

急加炮 白脾湯 治脾經失血

附子 或思慮傷脾 不能振盪 以致

汗或思慮傷脾 不能振盪 以致

疾行或健忘 怔忡驚悸 不寐或

心脾傷痛 嗜卧少食 或憂思傷

脾 或或婦人經候不準 哺熱內

不調或婦人經候不準 哺熱內

熱或瘰癧 流注不能消散 潰

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

或唇口生瘡等症 黃芪

與脫身背受風氣，或五臟病，或宣
火並會於背，或令人筋脈或宣
氣手足，此中風之原若津諸疾
便宜服八味丸，大能調理臟腑
驅邪氣。●患瘧疾之人，幸
云有熱皆因，因而得之，愈后幸
及先渴而右，痼非。○加減八
八味丸，不能治之。
味丸，治腎水不足，虛火上炎，至
熱作渴，口古生瘡，或牙齦
爛，咽痛，作痛，或形體憔悴，夜
汗發熱，平曠，或小便頻數，或
或兩足熱，或痰氣上湧，而右
患疽，宜預服之。●滋養肝
肉桂五味，各一錢。●滋養肝
腎，補心，利足，臍實，肌膚，悅顏
色，真衛生之良藥也。依本方加
鹿茸，當飲牛膝，各二錢。●凡
人久服，如減八味丸，必肥健，而
子晚，服此，不生瘧疽。●
治心腎不交，清渴引飲，有人病
八味丸，而愈，其病本於腎水，治端
不能，料大，中火，上炎，是以生渴，
此藥降中火，凡人有不耐，等不
大生腎水，能食，或飲，食作
服大便不實，或尿古常，按如痛，
服藥，藥愈，或發汗不止，小便便
頻數，腰膝無力，或虛汗，或呼吸
短，冷，或面白，或黑，或畏寒，或手
足冷，或面黃，或黑，或畏寒，或手
以上諸症，皆為虛，甚八味丸主
過此方，用附子，有功，大附子，一
物，大辛，藥陰，三焦，府於六腑，沉
寒，味助，悍，有，四陽之功，而此
大寒，此不補，但雖有，毒，以，炮
製，如法，或呼，草，防，風，或車
便，人，服，以，去，其，毒，搜，其，地，黃，等
味，同，用，以，劑，其，熱，潤，其，燥，其
急，候，其，免，捷，之功，而，其，其，其
得，之，勢，則，雖，久，服，亦，有，功，○
而，無，害，惟，在，其，用，之，而，已，○
玉膏，大能，填精，補髓，化，濁，胃，
筋，骨，神，其，足，五臟，益，滋

味丸，而愈，其病本於腎水，治端
不能，料大，中火，上炎，是以生渴，
此藥降中火，凡人有不耐，等不
大生腎水，能食，或飲，食作
服大便不實，或尿古常，按如痛，
服藥，藥愈，或發汗不止，小便便
頻數，腰膝無力，或虛汗，或呼吸
短，冷，或面白，或黑，或畏寒，或手
足冷，或面黃，或黑，或畏寒，或手
以上諸症，皆為虛，甚八味丸主
過此方，用附子，有功，大附子，一
物，大辛，藥陰，三焦，府於六腑，沉
寒，味助，悍，有，四陽之功，而此
大寒，此不補，但雖有，毒，以，炮
製，如法，或呼，草，防，風，或車
便，人，服，以，去，其，毒，搜，其，地，黃，等
味，同，用，以，劑，其，熱，潤，其，燥，其
急，候，其，免，捷，之功，而，其，其，其
得，之，勢，則，雖，久，服，亦，有，功，○
而，無，害，惟，在，其，用，之，而，已，○
玉膏，大能，填精，補髓，化，濁，胃，
筋，骨，神，其，足，五臟，益，滋

鹿茸四斤丸

治肝腎虛損之極以致筋骨疼痛

酸弱
肌不能
自持
瘦悴
血氣
不
生
牛
膝肉

熟苧
杜仲
鹿茸
木瓜

牛膝丸 治肝腎
換骨丸 換骨丸

不能起於床宜養精氣不能

白
杜仲
菝葜
補骨脂
菴

各一鐵肉桂五分 共爲

二神交清丹 治心脾

●夜伸
意故
仁各三
神錢
通酸

二錢 拓子仁 失實 生半

白芍 白朮 砂仁 各一錢

鐵煮山藥四錢為丸搗子大每

大加鹿茸野
黃芪

熟艾
 半復

當歸 川芎 黃芪 白朮
白芍 五昧 姜枣 煎服

○黃芪建中湯 治男婦

足少腹急痛脇脹胸滿驚悸而

不復服宜服之

甘草三分 黃芩 肉桂各

少時再煎令清空服

補陰丸

治勞瘵咳嗽吐血
黃柏 知母 熟地 各二錢

錢 黃柏 各二錢

天門 熟地 各二錢

白芍 各二錢

五味 熟地 各二錢

共為末

分五錢 熟地 各二錢

每七、八、十、九、空、心、

遺精 熟地 各二錢

白木 山、柴、更、

陳皮 熟地 各二錢

有赤白濁

加白木 熟地 各二錢

黃連 防已 木瓜

無力 熟地 各二錢

如蒼木 黃連 已木

川芎 熟地 各二錢

青皮 柴胡 黃連 犀角

蔓荊 熟地 各二錢

防風 花、柴、胡、黃、連、犀、角、蔓、荊、

左 熟地 各二錢

尺、風、右、足、微、命、門、火、衰、陽、

虎 熟地 各二錢

事、不、舉、加、附、子、肉、桂、沉、香、

虎 熟地 各二錢

清、丸、治、諸、虛、不、足、腰、膝、痠、痛、行、

虎 熟地 各二錢

氣、血、

虎 熟地 各二錢

白芍 各二錢

虎 熟地 各二錢

虎骨 各二錢

虎 熟地 各二錢

虎骨 各二錢

虎 熟地 各二錢

三味安腎丸

治下虛
熟地 各二錢

元、氣、

熟地 各二錢

補、腎、

熟地 各二錢

小、茴、

熟地 各二錢

或、煎、茶、下、

熟地 各二錢

山、茱、萸、

熟地 各二錢

先、治、腎、

熟地 各二錢

鹿、茸、

熟地 各二錢

鹿、茸、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

四聖不老丹

治下虛
熟地 各二錢

元、氣、

熟地 各二錢

補、腎、

熟地 各二錢

小、茴、

熟地 各二錢

或、煎、茶、下、

熟地 各二錢

山、茱、萸、

熟地 各二錢

先、治、腎、

熟地 各二錢

鹿、茸、

熟地 各二錢

鹿、茸、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

五、味、

熟地 各二錢

好酒煮教沸攪稠結住火以酒
黑盛水傾入木內結塊又煮
煮之如此一日九遍次日又煮
九遍如此者三日通計二十七
遍清瑩然如玉聲之不苦不
乃止為細末淨用一兩二錢
煮服不宜酒飯則易乾焦
煮服不宜酒飯則易乾焦
二方之一就可入米
黃菊花 栢子仁 各
共為末煉蜜九 梧子 大 每七十
五九清漿好酒送下修合
時母婦人鴿犬令見之
脂法 咸內傷失治邪氣不散而
滯於肺中多生粘痰而作喘急
咳嗽或傷房勞飲食吐血咳嗽
寒乍熱耳目昏仁身倦精神
拘急胸滿煩悶飲食少思精神
怯弱等症及一切肚腹冷痛小
腸氣百藥罔效 煨神
骨 虎骨 蛇骨 附子 木
香 雄黃 朱砂 乳香 沒

五夫脂 小茴 革烏頭 有
 盤各等 爲末 一 方 去 草 烏
 知人 參 白 附 子 別 用 白 麝 香
 條 圓 於 脂 上 先 用 真 麝 香 末 五
 分 填 入 脂 膠 內 又 將 前 藥 末 入
 磨 上 麝 圓 內 外 用 地 皮 一 斤 蓋
 於 藥 上 艾 火 灸 之 無 時 換 益 壯
 其 熱 氣 一 身 熱 透 遍 人 心 倦 沉
 如 醉 灸 至 五 六 十 壯 遍 身 大 汗
 上 至 泥 九 下 至 湧 泉 如 此 則 骨
 節 寒 暑 濕 五 勞 七 傷 及 皆 拔
 陳 苟 不 汗 則 病 未 愈 再 於 三 斤
 日 右 又 灸 口 至 汗 出 爲 度 灸 至
 百 二 十 壯 則 疾 必 痊 不 時 要 換
 地 皮 灸 時 要 慎 風 寒 或 油 脂 生
 冷 保 養 一 月 以 后 愈 如 精 神 健
 旺 凡 勞 嗽 之 疾 無 不 愈 不 惟 吾
 疾 凡 一 年 四 季 各 薰 一 次 元 氣
 堅 固 百 病 不 生 及 久 秋 久 喘 咳
 血 寒 勞 遺 精 白 濁 陽 事 不 舉 下
 元 虛 弱 精 神 失 常 衰 弱 等 疾 婦

人赤白帶下久無生育子宮冷
症治凡用此丸則百病頓除
益氣
延年

△艱老

膝喜反肘男年八喜尺旺女
年七七喜寸旺細濡滿多
弦緊洪○論兩腎中間白膜之
筋頭皺舞製化開周身黃
三焦消化木穀外繫六腑內當
萬思晝夜無停年老精血俱耗
平居七竅反常啼號無淚笑如
雨流鼻不嚏而涕耳無聲而
蟬鳴曳食口乾寐則涎溢漉不
割而自遺便不通而或泄甚則
對人臨睡夜則獨卧惺惺此老
人之病也○治法艱少即壯病進宜
進好藥此奇湯●老年房事
遺精病此奇湯●老年房事

古生刺而目俱赤煩燥不
時喉間如烟火上冲意飲涼
少解其洪大而無倫且有方
其身發熱手此腎經虛火游行
於外以十全大補湯加山茱萸
澤瀉牡丹皮山藥麥門五味附
子○服此藥色久味各
印和與八味丸●胃弱
養補中益氣湯有清毒者平胃
散●若人精已竭而復純之
大小便牽痛愈痛愈設便愈
則愈痛漸久味丸●若人
痿痺也弱不出肉敗小便通
痛如淋八味丸加車前子牛膝
●痛如淋八味丸加車前子牛膝
小便頻數者腎氣丸去沃瀉
茯苓神益知五味●大便燥
瘦足膝無力者●陸犀藥骨
如故補腦丸○却病延壽湯

人參 白朮 牛膝 白芍
 陳皮 白朮 山查 姜黃
 當歸 甘草 夏秋加黃芩
 麥門冬 冬加當歸 止渴
 生薑 小水長如舊止渴
 補陰丸 牛膝 杜仲 巴戟
 熟地 山茱萸 各三錢 茯苓
 白朮 枸杞子 遠志 山藥
 鹿茸 龜板各二錢 共為末
 煉蜜丸 桐子大 每八十九空
 下

△勞瘵

瘵者勞之脈或浮大或弦數大
 血氣未衰可飲而正也弦數者難
 治血氣已耗而難補變弦則難
 邪侵脈教而直則難治又曰骨蒸
 其非葉可除

○論

夫勞之
 其非葉可除

勞瘵為難治之疾古方雖分六
 種不同大抵皆由年少之時嗜
 欲無節起母不時或七情六淫
 之所傷或飲食勞倦之有過
 至真陰衰而相火熾旺火旺則
 消燥真陰而發為瘵之燥熱也
 瘵者嗽喘急吐痰吐血肺痿肺
 癰等症其火結於下焦者癰瘻
 之中則瘵瘵結燥遺精盜汗
 自汗驚悸腰膝痛泄瀉等症婦
 人則月水不通之類既而火熾
 既久氣必傷矣傷則不能運化
 水穀水穀停滯而濕熱生蟲生
 蟲之由也虫積日深變異莫測
 能致矣况其親炙之久薰陶日
 久受其惡氣之毒傳染是日
 風丹病日深瘵瘵治日久成

至氣將脫不休形體羸瘦
治法

大氣血乾枯胃氣弱則氣血不調陽虛不可偏用辛香下附
行但陽虛不可偏用苦寒知柏
之類
●開胃法須分陰陽熱
勞陽病口乾舌瘡咽痛涕唾稠
難手足心煩瘕小使黃赤大便
口惡飲食難化小便多遺精白
濁大便澀澀又有瘕瘕脾不
得者陽病開胃清熱利便宜
白散加柴胡秦尤桔梗木通
得常散為柴胡木香以小便多
病去陰病開胃行痰利氣宜
陳湯加便製香附貝母牡丹皮
當飯山查換梗及生牛木香
許以氣清痰化為病瘕
胃法陰陽俱用參苓白朮散三
白湯或二陳湯加白朮神龜

●胸勞瘕之法惟滋陰降

火是滋其源也滋陰降火湯
腎地黃湯之類消痰和血取積
追虫是製其流也紫河車丸及
食育育并四花火無有不效者
●元氣虛弱胃弱脾弱咳嗽吐
痰自汗盜汗無不乾聲嘶有
補中益氣湯加知和天門五味
杏仁黃芥人參麥門●氣熱
少勞瘕者十全大補湯加參
芩黃芩如熱在骨髓更加青蒿
●驚風
●虛勞胃弱瘕瘕不進
●元氣虛弱乾咳六君子湯加
生苧紫苑五味知和厚夏火
再如麥門●虛勞不屬瘕瘕
●脾胃虛弱或泄瀉或喘滿
●虛勞瘕瘕熱瘕瘕瘕瘕瘕
●理氣健脾胃九●虛勞瘕瘕
●肢國德氣血兩虛者以八

知如補母麥門天門五味
姜仁陳皮等分●陽虛者十
全大補湯人參養榮湯補中益
氣湯獨參湯●陰虛者四物
逍遙散●滋陰降火湯●
陽補散●九厘甚者●
勞熱清骨散內熱●勞血略血太
黃芪驚甲湯●勞血略血太
平丸嗽吐血●保和湯血去
多三黃補血湯血不止十灰散
還血●元參●白散●四君子湯
腎氣丸●瓊玉膏●勞嗽乾咳
人參潤肺丸●保和湯●太平丸寧
肺湯●肺痿知母茯苓湯●肺癰
梗湯●單白芨散●勞地地仙
丹腎氣丸●八物湯去白朮加砂
仁等分●勞汗黃芪散●
血氣血●癰瘡與血化●
但平補氣血●烏梅主知母烏梅青
葛根破之類而血自出紫河車
凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

凡

膠庖子加天門冬羊乾薑
丁方去肚母五味
加貝母五味
皮去參厚角阿膠庖子加遠志
杏仁加喘盛加款冬花紫菀五味
杏仁加半復貝母瓜蒌仁白皮
潮熱盛加地骨皮紫胡知母
盜汗多加酸寒仁牡蠣薄小
麥加夢遺精滑加龍骨牡蠣
山茱萸加赤白濁加白茯苓
連血痰血加紫白皮貝母黃
連丸基仁加紫白皮貝母黃
子黃連乾姜蒲黃韭汁姜汁
咯唾血加枯梗側柏葉
久病者○主滋腎地黃湯
去川芎方
動諸症治同前
門生半熟半黃柏
母當飯白芍白木知
山茱萸白芍白木知

山茱萸熟地黃湯
服潮熱不眠加六七麻壯盛
便白我同服
款冬花
仁心荒不寧加遠志酸棗
仁服滋腎地黃湯再用腎氣
丸加紫河車為丸早晚服
服以愈
為度
嗽聲唾其効如神
錢杏仁貝母百部
合各四錢紫菀三錢
花五錢共細切用長流水煎
三次取汁三次去渣不用將汁
入始糖入錢蜜下兩六錢再煎
又入阿膠白茯苓各四錢
鉤芎如稠成膏不執時服
平丸治勞瘵久嗽痰喘吐血
宜喘服次定除根按此方陳
水動痰嗽喘熱吐衄盜汗等症

不得服參芪者宜之
麥門冬 知母 貝母 天門
杏仁 各二錢 當歸 生半
熟地 黃連 阿膠 各一錢半
蒲黃 京墨 桔梗 薄荷 各
一錢 麝香 少許 共為末 煉
蜜九 梧子 大 每二十丸 食後服
吐衄 喘 薄荷湯下 咳 嗽 痰
盛 先服 消化丸 次服 此丸 仰臥
使 藥 流入 肺 竅 則 肺 清 潤 其 嗽
除 角 而 足 半 復 枳 實 各
陳皮 各二錢 枳殼 枳實 各
一錢半 薄荷 一錢 沉香 各
黃芩 各五分 共為末 姜汁浸
神 麝香 九 梧子 大 每百丸 臨臥
飽 嚼 并 吞 次 噴 太平丸 二 蒸 相
攻 痰 嗽 ○ 腎氣丸 加 知 栢 人 參
陳根 治 虛 勞 百 病 滋 陰 降 火
二錢 治 虛 勞 百 病 滋 陰 降 火

消化丸

腎氣丸

十全大補湯

太上

保真湯

治 勞 瘵 百 病 發 熱 增 寒
乾 作 渴 五 心 煩 熱 按 此 方 治 瘵
虛 勞 諸 症 誤 投 寒 涼 攻 剋 之
則 傷 元 氣 以 致 氣 血 兩
虧 用 參 芪 白 朮 赤 茯
● 黃 芪 人 參 白 朮 赤 茯

地仙丹

治 虛 勞 百 病 發 熱 增 寒
水 夫 苦 皮 童 便 浸 一 日 夜 切 片
陳 壁 土 拌 炒 去 土 為 末 水 糊 丸
梧 子 大 每 五 六 十
丸 不 拘 鹽 水 飲 下 ○ 山 茶 粥

地仙丹

治 虛 勞 百 病 發 熱 增 寒
水 夫 苦 皮 童 便 浸 一 日 夜 切 片
陳 壁 土 拌 炒 去 土 為 末 水 糊 丸
梧 子 大 每 五 六 十
丸 不 拘 鹽 水 飲 下 ○ 山 茶 粥

山茶粥

治 虛 勞 百 病 發 熱 增 寒
水 夫 苦 皮 童 便 浸 一 日 夜 切 片
陳 壁 土 拌 炒 去 土 為 末 水 糊 丸
梧 子 大 每 五 六 十
丸 不 拘 鹽 水 飲 下 ○ 山 茶 粥

山茶粥

治 虛 勞 百 病 發 熱 增 寒
水 夫 苦 皮 童 便 浸 一 日 夜 切 片
陳 壁 土 拌 炒 去 土 為 末 水 糊 丸
梧 子 大 每 五 六 十
丸 不 拘 鹽 水 飲 下 ○ 山 茶 粥

勞，益氣，強志，元陽，止泄，精
●山藥一兩六錢，共為粗末，煮粥，空

●心食之，或入韭子末二三錢，无
妙食，用后，用好藥，○神授丸傳

酒飲，一二杯，妙，○神授丸傳
疑，凡，人，得，傳，屍，旁，病，氣，血，未

此，藥，元，氣，未，足，脫，絕，者，能，早
用，此，藥，無，有，不，愈，者，真，濟，世，之

寶，也，●真川椒，去子，先，開，口，以
者，炒，為，末，酒，糊，丸，每，二，錢，空，心，

米，飲，送，下，多，服，奏，効，●或加
苦，練，根，戒，手，九，服，疑，○瀉南補

魚，尽，從，大，便，中，出，●瀉南補
北湯，治，酒，色，過，度，妄，泄，真，陰，上

嗽，咯，血，吐，血，之，疾，●黃連
黃，栢，黃，芩，知，母，貝，母，黃，連

桔，梗，杏，仁，五，味，紫，苑，天，門
當，歸，赤，芍，生，苳，天，門，烏，梅

天花粉，白朮，白茯苓，加，將，根
打，碎，煎，服，入，●無，益，加，將，根

蘇，葉，第，根，側，柏，葉，京，墨，●喘急
盛，加，半，復，前，胡，竹，瀝，●喘急

如，瓜，蒞，仁，石，羔，葶，藶，柴，白，皮，菴
子，沉，香，批，杷，藥，●熱，甚，加，柴

胡，地，骨，皮，連，翹，●風，盛，加，防
風，前，芥，酸，棗，仁，薄，荷，菊，花，●

寒，甚，加，黃，芪，人，參，桂，枝，●驚
情，加，茯，神，遠，志，栢，子，仁，酸，棗，仁，

子，●膽，下，氣，臍，加，枳，殼，青，皮，白，芥
中，前，子，●淋，濁，加，猪，苓，沃，草，薤

清肺滋陰散

治，色，欲，酒，毒
文，成，陰，虛，火，動，咽，喉，生，瘡，失，聲

心，荒，喘，急，●川，芎，白，芍
生，苳，白，朮，陳，皮，白，茯苓

黃，栢，知，母，貝，母，麥，門，紫，苑，地，骨

皮黃連 酸棗仁 甘草
 遠志 姜煎 入竹歷服 神不
 驚不寧 加枳實竹茹 痰嗽
 安心 煩加瓜蒌仁 天花粉
 喉有痰 用通隔散吹之
 咽喉有痰 用通隔散吹之
 小兒金丹 鴉片一錢 硃砂
 香各三分 共為末 外用良姜
 四兩切碎 燒酒泡三日 去酒
 水十碗 煎入乳汁半盞 再煎
 熬成膏 再入乳汁半盞 再煎
 煎茶末為丸 九黃豆大 金箔為衣
 每下九先吃梨一片 又嚼吞下
 頭止 牽熱即退
 小兒金丹 側柏葉 苛藥 茅根
 諸藥 大黃 皂子 牡蛎 皮
 標欄各一錢 俱燒存性 為末 用
 藕汁或蘿蔔汁 磨京墨 調服 其
 血高 獨參湯 止血 后服 此補
 十灰散 大

用諸藥 陰根 似人參 肺熱者
 忌服 而有火者 必以天門冬佐
 之
 保和湯 母 具冊 天門 知

麥門 欬冬花 五味 甘草
 杏仁 杏仁 五合 桔梗
 阿膠 當歸 生芩 紫蘂
 薄荷 一方 無生芩 有百部 姜
 煎入 饴糖一匙 食后月三服
 小兒金丹 加蒲黃 茜根 藕節 大薊
 夏橘紅 茯苓 枳殼 枳實 瓜蒌仁
 加防風 荊芥 金沸草 菊花 細辛
 香附 寒盛 加人參 芍藥 桂
 味五 保真湯 補虛 除熱
 杏仁 黃芪 人參 蓮肉 生芩
 赤茯苓 白茯苓 天門 麥門

陳皮 百芍 赤芍 知母
 黃柏 熟地 五苓 藥胡
 地骨皮 甘草 遠志 子仁 酸
 驚悸 加茯苓 遠志 子仁 酸
 冬 天 渴 加 龍 骨 壯 蛻 蓮 鬚
 爆 熱 加 滑 石 小 麥 青 蒿 驚 甲
 壯 肺 黃 芪 麻 黃 喘 急 日 久 成 癆
 九 知 母 六 錢 官 桂 桔 梗
 各 五 錢 人 參 款 冬 花 共 細
 辛 杏 仁 甘 草 各 四 錢 共
 烏 末 蜜 九 梧 子 大 每 二
 先 食 后 細 嚼 淡 姜 湯 下
 湯 治 寒 熱 俱 重 癆 熱 自 汗 肺 氣
 當 飲 芍 藥 熱 平 白 木
 半 草 五 味 麥 門 白 皮
 黃 芪 散 治 咳 血
 阿 膠 黃 芪 散 治 咳 血

白芍 麥門 水煎服 一升
 加人參 黃芪 驚甲 湯 治 寒 熱 俱 重
 五味子 四 股 煩 熱 心 悸 汗 少
 肉 消 瘦 四 股 煩 熱 心 悸 汗 少
 食 多 嘔 吐 有 益 桂 來 寒 熱 勞 瘵
 骨 皮 知 母 黃 芪 秦 朮
 白 皮 赤 芍 人 參 黃 芪 秦 朮
 天 門 肉 桂 人 參 黃 芪 秦 朮
 紫 地 生 草 人 參 黃 芪 秦 朮
 水 煎 服 一 升
 黃 芪 散 治 咳 血
 知 母 天 門 白 芍 當 歸
 白 木 黃 芪 陳 皮 生 草
 李 草 乾 姜 委 蘭 空 心 服
 湖 蘇 加 桑 白 皮 沙 參 地 骨 皮
 滋 汗 及 久 病 者 夫 川 芎 加 桂
 藥 酸 仁 浮 小 麥 咳 嗽 如
 桑 白 皮 五 味 子 痰 如 貝 母
 瓜 蒂 仁 遺 精 加 牡 蛎 龍 骨
 山 藥 蓮 子 白 湯 加 茯 苓 黃 芪

組咳血加萊白皮黃芩
 嗽痰血加萊白皮貝母黃連
 人參仁 ● 吐血加梔子黃
 連就萎薤黃韭汁姜汁 ● 咯
 唾血加桔梗玄參剉栢葉 ●
 外五臟寒症腰背足脛酸疼加
 杜仲牛膝烏梅 ● 只右生瘡
 驚惕加黃連胡黃連速志茯苓
 皮枳實塞聲沉加桔梗瓜蒌
 仁百部 ● 脇痛夢遺加龍胆
 草青皮青黛竹茹 ● 頸鼓加
 玄參杏附貝母 ● 腹痛飲食
 無味去知栢門冬生地倍白芍
 加白朮人參偏豆薏苡仁沢瀉
 ● 腹塊加蠶
 甲山查麥芽

△失血

失血諸症皆見於脈隨其上
下以候所出大凡失血脈宜
沉細或見浮○論血乃才氣之
大府心難治

於脾生息於心藏於肝候於肺施於腎脉絡臟腑耳目手足皆
爲運用然陰道易虧一有感傷
調理失宜以致陽盛陰虛錯經
妄行火載則上先提過則下行
失血之症非止下端有吐血有
咳血有唾血有咯血有衄血有
溺血有便血雖有各名之異本
榮俱足熱症但有新舊虛實之
不同耶衄衄衄衄之衄衄胃也
咳衄肺也痰帶血脾也咯衄
腎也溺血小腸膀胱也下血木
腸也牙宜胃或腎虛寒也又血
從毛孔出者謂之肌衄從舌出
者謂之舌衄心與肝也從委中
大出血者謂之胞衄腎與膀胱也
大咳逆行難治
治法
隨氣行氣行則行氣止則止
氣逆則清氣寒則凝故涼血必先
清氣如血出某經即用某經清
氣之藥氣凝則血自飲隊若有

為未章便調服此從治之法也
●一切失血惡寒者熱作渴煩
躁或口燥鼻喘自汗盜汗或氣
虛脈沉手足逆冷者用獨參湯
蓋血生干氣故血脫補氣陽生
脈長之理也●若大吐血母以
熱論喘急用獨參湯救之若潮
熱咳喘肺數乃元氣虛弱此等症
之脈尤當用人參溫補此等症
候無不由脾胃先損故脈洪大
察其有胃氣能受補則可救司
用寒涼止血之藥後傷脾胃不
不能損血之源是速其危也
●因酒者小調中湯●吐膿
血者名肺疽枯梗湯●大經
氣逆上衝吐血暴甚者四物湯
加蘇子陳皮沉香童便或茅根
煎湯磨沉香服之●因勞力
傷氣吐血鮮紅心腹絞痛自汗
者四君子湯加黃芪柴胡山藥
百合前胡●勞心過度不能

夢前心滿如脾陽
甚者十全大補湯●久者

興三黃○主加味犀角地黃湯

治上焦火盛口舌生瘡熱或

血熱妄行或吐血衄或下血及不

赤芍牡丹皮黃連黃芩

去參水煎服●二和

湯●血虛加黃芪●二和

承氣湯治吐血覺胸中氣塞吐

才草芒硝紫血者●桃仁

湯治吐血下服立已●清火涼血

百合貝母赤芍生草●當歸
桃仁麥門蒲黃阿膠

如生華 ○四生散 治吐血 壅出

皮、蔥、生艾、生栢葉 生

荷葉 生艾葉 生栢葉 生

各等分 取自然汁 入童便 略

入童便 溫服 治諸虛吐衄 略

便半盞 其效甚速 或單用 以厚

湯溫頻服 氣不逆 效蓋波瀾 降

火滋陰 又能消瘀血 也先賢有

言 諸失血服之 寒涼 無一生服

便者 百無一二死 斯言信矣 每用

童便一鐘 入姜汁二三點 攪勻

徐徐服之 此但 服輪廻湯法

要與飲食相遠 凡失血諸症初

起極要謹慎 戒房勞 戒酒 每夜

臨卧時 吃白湯一小盞 至半夜

小便解去 汚穢飲食 濁氣者 一

次至子時 尿一盞 生到天明 有

小便乃一盞 氣也 却解去 初

便一盞 尿一盞 盛一盞 有又解

此乃輪廻之或生 姜一小片 嚼之

此乃輪廻之或生 姜一小片 嚼之

吐血 衄血 服兩服 湯藥 右用大蒜

兩心少 兩心覺 胸中有熱 氣其

血立止 若下部出血 可以燉藥

兩心 止血 秘方 童便上

姜汁下 三味合和 又方 用

調百中 霜茶 溫服 又方 用

橘葉 陳年水 又方 治一切 吐

金酢飽 而吐血 至多 癰血 妄行

不效 血但聲未失者 按之 無

未飲 或井花水 調下 三服 即愈

若鼻衄 用一捻 吹入 鼻中 一

皮破出血 及灸瘡出血 百服 用

藥不止 按半錢 治吐血 如神

或一符 立止 治吐血 如神

生大黃末方寸匕用生干自然汁一盞調勻空心溫服日三服

血虛○定心湯喘咳血虛神亂

止●生干汁童便各等分合和重湯煮一二沸溫服立

効○栝參湯其症皆因內損或

因酒色勞損或心脾肺破血氣

妄行血如崩泉口鼻俱出而傾

更不救●側栝乘人參各

三錢為末每二錢飛羅麩二錢

新汲水調如餅○補血清痰湯

糊服之神効●生干●紫

治先吐血后見痰嗽●

川芎●天麻●生干●

門●水煎服入童便十滴

○清降湯●知母●見

生干●芍藥●色子

三黃補血湯治諸血不止自汗

生干●黃芩●當歸●白芍

柴胡●升麻●牡丹皮●川芎

服●止血立應散大黃五錢

鹿灰各一錢為末每三錢

有熱地●清熱解毒湯治

血虛●生干●牡丹皮●黃芩

黃芩●生干●牡丹皮●黃芩

黃芩●生干●牡丹皮●黃芩

黃芩●生干●牡丹皮●黃芩

黃芩●生干●牡丹皮●黃芩

清熱滋陰湯

治吐血血虛

●生干●黃芩●牡丹皮●黃芩

●生干●黃芩●牡丹皮●黃芩

●生干●黃芩●牡丹皮●黃芩

●生干●黃芩●牡丹皮●黃芩

地骨皮 哮喘 胡黃芩
炒乾 姜 栝 葶 根 太 小 薊
● 大便血 加 槐 花 地 榆 石 草 霜
● 溺血 加 色 子 車 前 子 小 薊 黃
● 連 四 病 血 俱 加 阿 膠 姜 汁
● 血 之 劑 也 同 服 按 此 方 止

△衄血

脉

沉細者生

○論

衄血 血 中 出

肺 熱 以 陽

○治法

大 抵 清 血 湯

不可 逆 止 去 多 恐 暈 急 用 止 血

藥 吐 衄 太 甚 不 止 防 其 血

難 用 茅 根 燒 烟 將 醋 酒 之 令 咳

不 效 者 古 方 散

○主清衄湯

升 麻

燉 者 天 門 冬 膏

○升麻

黃 芩

治 鼻 衄 因 肺 火 太 甚

生 平

黃 芩

人 乳 宜 便

○治鼻衄神方

好 酒 共 合

和 重 湯 煮 沸 飲 之 立 止

○又

石 草 霜 為 末 每 三 武 水

方 調 服 仍 取 一 擦 吹 鼻 中

○又

大 雄 剛 十 枚 餘 搗 爛 井 花 水

此 調 服 其 愈

○又方

其 豆 粉

久 不 復 飛

○又方

細 茶 各 等

分 為 末 冷

○又方

車 前 草 搗 汁

未 調 服

○又方

下 盧 入 蜜 三

已 重 湯 頓 熟

○治鼻衄法

患 人

知 以 花 水 忽 然

○又法

將 頭

分 關 百 會 穴 將 新 汲 泉

○又法

頂 後

水 一 七 滴 穴 上 即 止

○又法

用 小 兒 胎 髮

燒 灰 吹 入 止

○又法

用 色 子 吹

入 鼻 中

○又法

將 鼻 吹 入 止

諸茶不効者●用大熱

作八招或十招於水內置

虫以熱煎身乾至一○陳槐湯

宣或二重乾乾立止○吐血

治鼻中出血不止并吐血

黃芩 槐花 陳皮 烏茶 赤芍

通閉止血丸 治鼻衄

此香三分 半復四箇 共為末

十四粒 麝香一分 共為末

麝香丸 大豆大 每用二九

指法 治鼻衄不止 如左鼻

中指 出者以色線扎右手中指

兩孔俱出者扎二指根或白扎

中指 古莎膏散 香附四錢

中藥 川芎二錢 香附

其為木每二錢茶清下蓋香附

臘血吸火散其血立止

論咳血者嗽出痰內有血者此

咳也因熱蘊於肺久能嗽血

咳不止過勞之而已損肺者難治

已又成○治法 大抵清肺

益者金沸草散加阿膠

嗽有血者補肺湯加阿膠白芨

多而色鮮者並宜金沸草散

仁湯主之●嗽痰帶血為肺

八物湯或二陳湯加杜仲白

平危 ○主清補湯 治咳吐血 痰

●當歸 生芍 天花粉 貝母 桔梗

麥門 生芍 ○二陳芎 白湯 治

白茯苓 水煎服 〇二陳芎 白湯 治

草 步血 津液 內耗 心火 痰 肺 咳

嗽 咯血 及血 不榮 肌肉 瘦 毛 赤

寒 咳 嗽 〇半 復 陳 皮 五

茯苓 甘草 人參 阿膠 五

味 細辛 白芍 川 五

芎 當歸 姜 煎 溫 服

論 咯血 出於腎 不嗽 而咯 出血

者 治法 大抵 當歸 黃芩 湯 主

咯 不出 甚 略 則 有 之 者 此 指 血

為 也 四 物 湯 加 竹 瀝 姜 汁 童 便

青 黛 〇 蓄 血 在 上 圓 毒 〇 當

酸黃芩湯 芍藥 桃仁 貝母

白木 牡丹皮 梔子 黃芩

青皮 甘草 水煎服 〇 黃芩

方 魚 青 皮 黃 芩 有

如 股 黃 栢 麥 門 冬

論 咯血 吐血 無大異 成 盆 癰

喉 血 多 因 怒 氣 〇 治法 不 訖 厄

彈 甚 而 所 致 也 〇 治法 金 四 物

湯 之 熱 者 解 鬱 湯 重 者 保 命

散 〇 氣 虛 者 參 黃 芪 當 歸 地 黃 湯

結 湯 加 人 參 黃 芪 當 歸 地 黃 湯

金 黃 栢 水 煎 入 童 便 煎 汁 姜 汁

溫 服 〇 血 虛 熱 〇 主 厄 金 四

物 湯 治 呃 血 〇 當 歸 川 芎

金 芍 藥 生 芍 梔 子 薑 汁

汁 少 許 服 〇 有 痰 加 竹 瀝

○解鬱湯

治衄血、吐血、黃連、黃芩、

黃芩、地骨皮、生薑、當歸、

加減四物湯

芍藥、生薑、黃芩、

皮、白朮、甘草、

門、各等分、水煎服、

母、石、黃芩、

肉、桂、少、許、

姜、栝、樓、葉、

槐、花、地、榆、

止、加、車、前、

失、血、久、加、

參、入、童、便、

散、治、諸、失、

△唾血

脈、宜、沉、實、

出、於、腎、亦、

過、不、能、下、

肺、咳、

○麥天湯

結、梗、黃、

論、

不、流、純、

而、全、不、

者、四、物、

五、

帝傷精火動濁
○主生地當飯
血者腎氣丸
○常飲生草

湯治瀉血
○蒲黃小薊根
○治滑

石木通
○治尿
○治尿

暴熱尿血
○治尿
○治尿

血用井麻
○又方
○治尿

各等分
○治尿
○治尿

至七分
○治尿
○治尿

△便血
○治尿
○治尿

宜浮小
○治尿
○治尿

或各膠
○治尿
○治尿

所以色
○治尿
○治尿

久乃來
○治尿
○治尿

小腸血
○治尿
○治尿

左來者
○治尿
○治尿

六滴飲
○治尿
○治尿

肝濕地
○治尿
○治尿

寒火酒
○治尿
○治尿

而作也
○治尿
○治尿

風下血
○治尿
○治尿

脾虛浮
○治尿
○治尿

血其脾
○治尿
○治尿

榆湯
○治尿
○治尿

四物湯
○治尿
○治尿

槐角子
○治尿
○治尿

甚則寒痛脉洪數三黃丸或敗
毒散加黃連 ● 濕痹下血如
名血箭因其便血即出有九如
箭射之遠也又有如餅四散湯
下者初起濕熱或充當長夏者
當飯和血散涼血熱地湯加木
香檳榔久而色紫黑者濕毒甚
也升陽除濕和血湯升陽補胃
湯或補中益氣湯去柴陳加苓
連川芎槐角枳壳 ● 內傷飲
食腹必脹滿糟粕古血同來平
胃散加槐角枳壳當飯烏梅芽
草蘆薈六君子湯加川芎當飯
神效 ● 內傷勞役元氣下陷
者補中益氣湯脫肛者更加地
榆砂仁生甘草 ● 內傷中氣
虛弱者四君子湯或獨參湯加
乾姜少許 ● 內傷陰虛血弱
者四物湯加乾姜腎氣丸 ●
內傷脾絡下血者枳連丸聖者
十全大補湯主之 ● 內傷憂

或木香少許，
滋劑補劑補中益氣湯參苓白
朮散益精氣血皆生於穀氣胃
氣元復血自償誠不受補者宜
滋劑香梅丸
腸風黑散
○門暴腫用湯洗
血太腸痛

不可忌肝門腫起 ●大黃
黃連 黃芩 黃柏
連翹 赤芍 枳壳 梔子
甘草 水煎 寧心時溫服

滋陰清臟湯

治腸風下血

防風 枳殼 黃連 黃芩

槐花

四物槐榆湯

治臟毒下血

芍藥
防風
荊芥

黃連

榆白皮 烏梅 甘草 枳連

九 治 腸胃 閉悶 下血 積熱 膿毒

花 炒 過 去 槐 花 為 末 水 糊 九 梧

子 大 每 七 十 九 空 心 茶 清 送 下

○ 漸 紅 散 治 腸 風 膿 毒 下 血 五 倍

子 一 錢 槐 花 六 分 枳 殼 三

分 黃 連 六 分 地 榆 四 分 共 為

末 每 三 錢 空 心 酒 調 服 遠 年 者

亦 斷 ○ 漸 紅 九 治 腸 腫 臍 寒 下

黃 日 久 羸 瘦 側 柏 葉 鹿 茸 當 歸

續 斷 阿 膠 枯 礬 一 錢 共

附 子 各 二 錢 梧 子 大 每 七 十

為 末 醋 煮 糊 九 梧 子 大 每 七 十

丸 空 心 米 飲 送 下 神 效 ○ 卅

溪 云 下 血 久 不 愈 者 先 用 四 物

湯 加 乾 姜 半 斤 煎 服 ○ 滋 陰 臟

連 九 治 大 便 下 血 多 以 收 斂

腎 氣 丸 一 料 加 黃 連 槐 花 大

黃 各 三 錢 為 末 糯 米 糊 丸 梧 子

大 每 七 十 ○ 治 腸 風 膿 毒 奇 方

九 白 湯 五 錢 同 炒 別 研 血

在 黃 連 末 酒 調 服 血 在 黃

右 黃 連 末 ○ 枳 殼 散 治 大 便

酒 調 服 黃 連 槐 花 地 榆 白

生 半 防 風 下 血 如 流 水

○ 治 下 血 如 流 水

不 止 黃 連 金 銀

○ 當 歸 和 血 散

治 腸 胃 閉 悶 下 血 積 熱 膿 毒

外 麻 各 二 錢 槐 花 青 皮

煎 芎 四 分 為 末 每 二 錢 米 飲 下

○ 涼 血 熱 地 湯 治 血 崩 因 胃 水

真 陰 不 能 鎮 于

便 血

五 三

五 三

五 三

五 三

五 三

五 三

五 三

五 三

宜黃芪能中陽加海小麥或黃
蒼六一湯或玉屏風散
汗盜汗之症原由心腎不固
法當大補心腎以十全大補湯
加牡蠣麻黃根麥門冬小麥之
類不止或內傷虛症自汗如
面補中益氣湯加白芍桂枝
黃根神小麥附子
汗頭眩嘔逆宜川芎白木陳皮
耳草水煎服
四物湯加知柏黃芩厚朴加參
甚白木腎火動
甚者正氣湯
出如油二不治也汗
凝如珠三不治也
六黃湯治盜汗之聖藥也
黃連黃柏黃芩黃芪生薑
黃連黃柏黃芩黃芪生薑
中氣氣湯治內傷及中氣虛

在黃根海小麥但外來限
水拌炒以殺其外氣潮汗之性
又欲其引參芪等藥至其表故
不可缺也
自汗有心火炎也本方倍參芪
如夢門五味黃連
海弦而自汗者按風邪也本方
如桂枝湯
無功而自汗者水虧火盛也本
方如知柏熟地
洪而自汗只依本方倍參芪
○治夜出盜汗黃芪色子各等
分水煎服

○正氣湯

黃柏各等分
三分之一
散治自汗草汗
一法用何首烏為末

○鎮

津液調探中即止

丹

治自汗盜汗

●黃芪安

二錢半 白芍一錢半 酸棗仁

○

附子

白朮

煨去

皮脂 童便 浸

○

各一錢

共為末

酒送下

○

○

子

每五十九

空

心酒送下

○

玉屏風散

治自汗

●防風

丁五

○

黃芪

白朮

水煎

服

○

加

小麥

苓

牡蠣

○

草

○黃芪湯

治元氣

虛弱

○

生

天門

防風

麥門

○

五

白茯苓

麻黃根

○

○

淨

小麥

○黃芪建中湯

治外

○

水

煎服

○

○

○

厚

汗自出

●依本方

加

○

麥

水煎

去渣

入

○

湯

治

○

○

○

白芍

人參

熟干

生干

○

黃芪

白朮

知母

陳皮

○

耳草

淨小

○

○

○

麥

水煎

服

○

○

△

○

○

○

○

味

大

力

為

○

論

夫

○

○

○

熱

若

同

而

○

不

失

其

時

○

也

其

因

外

○

法

亦

異

○

○

邪

入

○

○

○

陽

氣

主

外

○

故為熱其脈緊而有力是外傷
寒邪傷衛也凡治主外傷
者熱是火邪傷心元氣耗散
而熱邪入客於中故發為熱汗
大泄其氣以動其脈虛而無
力是外傷之熱邪傷榮也治主內
●內傷發熱是陽氣自傷不
能外達降下陰分而為內熱乃
陽虛也故其脈大而無力自傷
肺也●陰虛是熱是陰血自傷
不能制火陽氣升騰內熱乃陽
旺也故其脈數而無力屬心腎
●內傷思慮神昏恍惚夜傷
者●胃脾湯●九●飢飽勞役傷
胃陽虛口中無味晝夜輕者
俱宜補中益氣湯甚加附子
●盛下虛者清心蓮子飲●九
房勞思慮傷腎陰虛口中有味
夜熱晝輕者俱宜四物湯如知
柏黃芩甚者加童便為極●陰
陽兩虛者桂枝湯加附子不止

●內傷生冷發熱者入胃丸
伏火只手足心熱肌膚不甚熱
自汗不食者外陽散火湯去蒼
活地活人參●婦人年四十
餘夜間發熱早晨退五心煩熱
無休止半年后六脈皆數伏而
身中浮取全不應手用外陽散
水湯●而熱甚大半胸中寬
清痰與舌下二點熱悉退后以
物湯如知柏少佐炒黑乾姜服
三十劑全安●虛勞發熱自
汗諸藥不能退其熱者當假前
血湯●虛勞發熱十全大補
湯如柴胡地骨皮秦艽●奇
虛勞發熱因氣虛不能化血七
則火自沸騰肉如針刺骨熱煩
或或五心俱熱或兩眼如火或
子午相應或晝夜微惡寒而夜
大熱雖胃經所主傳變不常
上則見喘咳痰血唇舌黑耳
鳴目眩等症蓋中則見腹脹助

虛火也用加減八味丸及

全太補湯加五味麥門主之

四物二連湯治血虛勞熱

靜夜則熱此熱在血分也

●當飯川芎白芍生芩

黃連胡黃○加減逍遙散

連水煎服○當飯白芍黃

午潮熱●當飯柴胡甘草黃

木白茯苓柴胡麥門地骨皮

芩胡黃連●木通車前子黃

秦艽●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

黃芩●木通車前子黃芩胡

凡 紫菀 人參 當歸 地半
 復 紫菀 烏梅 芩草 柴胡
 骨皮 加 大黃 黃芩 犀角 赤芍
 熟 勞 症 加 大黃 黃芩 犀角 諸
 青蒿 桃 五蒸湯 煩熱 瘧疾
 汗 等 症 人參 葛根 石黃 芩 梗
 母 地 黃 麥 門 各 等 分 車 草 殘
 米 麥 門 各 等 分 水 煎 服
 半 五蒸丸 治 男 婦 煩 熱 瘧 疾
 地 骨 皮 生 苳 石 黃 各 二 錢
 富 飯 一 錢 四 分 胡 黃 連 一 錢
 子 大 命 七 十 九 小 麥 煎 湯 下
 白 中 散 治 骨 蒸 內 熱 之 病 時 發
 盛 四 肢 微 瘦 足 趾 腫 者 其 病 在
 藏 腑 之 中 白 石 燕 煨 為 末

△惡熱

惡熱非熱明是虛在經曰陰虛
 則能熱陽在外為陰之衛陰在
 內為陽之守精神外散則欲無
 陳陳氣耗散陽無所附遂致浮
 散於肌表之間而惡熱也
 虛作陰虛火動治之也

△惡寒

惡寒非寒明是熱症亦有久服
 熱藥而得者河間謂火極似水
 無甚而又覺自發實非寒也
 熱藥而少愈者卒能發散鬱
 鬱開牛又曰火熱內燔相火濕
 故惡寒實非寒症
 惡寒甚者脉浮大而無力者陽
 虛也用參芪之類加附子少許

△厥

脉厥症數端沉細為寒沉伏為
 熱為熱沉伏為氣厥浮實為痰

微則為氣虛大則為血虛
厥口沉大而滑不知人
身冷為入臟即死身溫汗
自出為入腑而後自愈
論

夫厥者極也指其逆者曰厥
冷過膝足冷過膝曰逆其因症
不一不可概論審察見症而
治法不同但雜病多因酒色

陽厥大同但雜病多因酒色
七情痰火所致外感者少也
治法陽厥者初得病身熱頭痛

水或揚手擗足煩躁不得安臥
譫語昏憤蓋陽極則身厥也宜
六脈煩氣湯主之

初得病四肢逆冷
尾卒厥此即中惡也因犯胃不
正之氣忽然手足厥冷肌膚粟

起頭面青黑精神不守或錯言
妄語牙緊口噤或昏不知人
旋到此症急欲客件飛尸也

吉正氣散加南星木香有珠
二陳湯加竹瀝挾寒加生附
乾姜煨火加苓連芩子竹瀝

人知人參姜汁九厥症為類
物作為要見或腹脹不便不
或心腹疼痛皆厥火鬱氣病

有本藥卒然不省人事喉中
上引未吹入鼻中即竹瀝姜汁
之自醒或以香油下通入

汁少許灌入喉中頻更更
愈愈
寒厥不省人事因症
火氣鬱結寒心竅者清熱藥

湯有殊効
寒厥者乃胃寒
所生經曰蛇者長也胃中冷
即吐蛇理中湯加川椒振振
烏梅尤
氣厥者身中風相
偶但風中身溫氣中身冷以
味順氣藥有痰者以四七湯

導痰湯
●熱厥因醉飽入房
濕熱鬱於脾胃不能養榮四肢
湯氣滯於故手足心熱補中益
氣湯外湯散火湯
●寒厥因
多欲食精元陽大有所損不能
寒十金大補湯加附子或當歸
四逆湯
●尋常氣虛者四物
四君子湯血虛者加附子
湯有火加知柏鹿寒加附子

△虛煩

論夫虛煩者心胸煩擾而不寧
也多是陰虛生內熱所致
勞之人腎水有虧心火內蒸其
煩發躁吐瀉之後津液枯竭煩
而有渴惟傷寒大病之後虛煩
之症却宜霍亂臨病宜審之
治法
竹葉石燕湯八味元陽
竹葉石燕湯治大病後

石燕半復麥門冬
耳草竹葉
生薑梗米煎服
●主溫膽湯治
后虛煩不得眠及心膽虛怯
●事功驚起氣悸之或自汗
陳皮半復茯苓枳實
●耳草加炒酸連仁
氣脈
●丁方加炒酸連仁
志五味人參黃芩芍藥
方如人參黃芩芍藥
治氣鬱生痰變生諸症或
●情之或飲食
●八味元
能上心火素上不能既清心
燥煩渴小便頻數白濁陰痿
飲食不消肌瘦漸亡
●其胎先瘦小宜降心火生腎水

邪祟

脉九素脉無常作大乍小乍浮
不倫論夫邪祟之症似癩而
不倫論非癩有也此乃因氣
血虛極神光不足或邪思妄念
其虛而入也又有瘋迷心竅而
邪昏不定而見此症者非真有
妖邪鬼祟誤以邪治之其人必
害案治法太抵邪祟者灸鬼
血癰湯茅為使或茯神散照依氣
舊蒲為末猪心血為丸服桃
婦人夜夢鬼來交者疾神散桃
上屋歌唱無時看道遙散加遠
志桃仁紅花煎水服后病退用

灸鬼法

治一切驚狂譫妄踰垣

症定用艾炷於兩甲角及甲
肉四處着火下處不着即無功
灸七壯神驗

神仙油

治九男九女被狐狸精纏

精來先用口來擦戶其狐狸
人即昏迷或用桐油抹在陰戶
物上其怪即大驅而走効不可

茯神散

治妄有所見言語

熱●夜神赤小豆或加遠志
石菖蒲●桃仁丸治与鬼魅交通
服

柳高椒 桃仁各三錢 水
銀一錢 阿膠 煨 沉香各
五分 共為末 煉蜜丸 梧子大
每服十丸 治妖鬼病人不
心挑仁湯 用鹿角屑 細末 方
肯言鬼者 用七水調下 言實
婦人微諸精 效 怪 狹 狹 狹
成精 糲 糲 而 以 致 面 黃 肌 瘦
不似人形 用十全大補湯 加白
茯神 遠志 酸枣仁 麥門 葛蒲 服
至一月 全愈
半年 全愈

△中惡

中惡 脈緊 細 者 ○論中惡者
生 浮大 者 死 ○論中惡者

邪惡之氣也 其諸症 皆 暮夜或
登廁或出郊野或遊空冷屋室
或人所不到之地 忽然見鬼

亦死 飛尸者 遊走皮膚 穿
入臟腑 每發刺痛 變作無常

遺尿者 附脊入內 攻鑿血脈
每發不可近 見尸喪聞聲 便

作 風尸者 溺濕四肢 不知痛
之所在 每發昏沉 汗風雪 便

每發絞痛 遇寒 冷便作 心脇
尸者 舉身沉重 精神錯亂 骨疼

上 降 客 尸 曰 五 尸 惡 病 ○治法
大抵用 忍冬 葉 對 雞 子 大 日 三

次 煮 成 膏 每 服 雞 子 大 日 三
他 諸 方 臨 時 選 用 ○備急冊

治 胃 中 停 滯 寒 冷 之 物 及 腹 滿
不 利 心 腹 諸 痛 卒 暴 百 病

大 黃 巴 豆 去 皮 油 乾 姜 各
等 分 為 末 煉 蜜 丸 小 豆 大 每 服

三 丸 以 老 少 虛 實 加 減 九 數
中 惡 客 尸 心 腹 脹 滿 卒 痛 如

中 惡 客 尸 心 腹 脹 滿 卒 痛 如

中 惡 客 尸 心 腹 脹 滿 卒 痛 如

中 惡 客 尸 心 腹 脹 滿 卒 痛 如

門還○救產后暈死用半隻大

用大豆大納鼻乳中即愈仍○救

大痘依產后門治法選用○救

須照依其症四肢強直口緊只有

凍死微氣有且慢向火急用布

袋盛熱灰放在心頭冷即換熱

待眼開如溫酒或米飲灌之冬

月宜水凍

死亦宜之

△眼目

左右脉洪教心火炎也關弦

而洪肝火盛也○右寸關

俱弦洪肝木乘相火之勢而來

侮所不勝之金制已所勝之土

也○論眼有五輪八廓五輪者

輪屬肺鳥珠筋之精曰風輪屬

肝內外赤血之精曰血輪內腎

精氣之精曰精之精曰氣

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

精之精曰神之精曰神

凡癆眼疾頻流肝元火修肝木
肝乃腎之苗腎乃肝之本精流注
則神既得安和眼目自然明
精如神不得安和眼目自然明
藥大滋陰降火還睛丸是也
治眼大滋陰降火還睛丸是也
散光元氣虛弱或心腎虛弱或
脾血兩虛之症也兼心明目湯
滋腎明目丸九火外陽湯沖和
養胃湯腎氣丸十全大補湯大
補回光丸選用其他諸方亦可
鱗時選用●目能遠視不能
近視火盛而水虧也法當補腎
腎氣丸主之●目能近視而
不能遠視有水而無火也法當
補心定志丸加茯苓主之
兩眼出烟霧此肝火也以柴胡
黃連等分作大劑服之愈

白豆蔻●檀刺撲抄服疾內
服搖雲散外用周道散●小
兒雀目夜不見物灸手大指甲
后一寸內臍橫文頭白肉際各
一柱如小兒大內服肝砂丸給
藥肝外服眼白大初生時乳注
●婦人治血為主有孕忌用磨
香

○大明散治一切暴赤眼
開熱淚長流腫痛不可忍或
生翳障擊明勞肉內障奇蒙不
問新久並治●當設
黃柏 生芋 黃連 川芎
防風 梔子 連翹 黃芩
牛蒡子 荊芥 菊花 薄荷
草 燈心 煎食遠溫服●
●野障加木賊白蒺藜

秘方

荷 菊花 枸杞子 龍膽草 各
二錢 枳實 一錢 六分 龍胆草 水一鐘

酒 一鐘 煎至 一鐘 溫服 即愈
用 水 三鐘 煎至 一鐘 溫服 即愈

如 末 金 煎 至 一鐘 溫服 即愈
二 鐘 煎 至 一鐘 溫服 即愈

中 和 養 胃 湯 元 氣 虛 弱 心 火
與 三 焦 俱 虛 飲 食 失 節 形 體 勞

役 心 不 得 休 息 故 上 為 此 疾 人 參
一 錢 黃 芪 炒 一 錢 五 分 人 參

白 木 各 一 錢 五 分 白 芍 六 分
白 茯 三 分 柴 胡 七 分 外 府

葛 根 各 一 錢 黃 連 一 錢 五 分
各 七 分 防 風 五 分 黃 連 五 味 二

○ 按 右 方 治 一 切 眼 疾 屬 十
元 氣 虛 弱 宜 之 十

得 內 障 耳 鳴 之 患 或 多 年 眼 目
皆 屬 視 物 不 明 此 藥 能 令 廣 大

聰 明 久 服 無 內 障 外 障 之 患 耳
鳴 耳 聾 等 症 此 壯 腎 水 以 鉤 陽

光 久 患 眼 服 寒 涼 藥 過 多 氣 血
凝 滯 黑 脂 全 不 通 路 服 之 立 見

○ 大 補 回 光 丸 治 肝 腎 俱 虛
精 血 不 足 眼 目 不 明 或 腎 虛 風 毒 下 注 腰 沉

味 子 各 二 錢 白 茯苓 半 兩 肉
桂 各 一 錢 杜 仲 石 斛 杞 子 五

肉 桂 各 一 錢 杜 仲 石 斛 杞 子 五
共 為 末 煉 巴

蜜丸 梧子大 每五十丸 湯
酒任下 按方治一切眼疾 腎

氣丸 加當歸 蔓荊子 各一錢 治腎虛眼不赤 視神光

不足 益陰腎氣丸 治腎虛眼不赤 視神光

者 水之主 以制陽光 當歸 熟地 二

錢 生 山 藥 五 味 子 壯 腎 皮 荻 神 名

山 藥 五 分 共 為 末 煉 蜜 丸 梧 子 大 每 七 十 丸 空 心 湯 下

子 大 每 七 十 丸 空 心 湯 下 治 腎 虛 夜 光 丸 健 忘 補 血 潤 燥 久

育 神 夜 光 丸 健 忘 補 血 潤 燥 久 治 腎 虛 夜 光 丸 健 忘 補 血 潤 燥 久

眼 眼 目 光 明 神 字 通 泰 語 音 清 亮 燈 下 眼 力 愈 壯 並 不 昏 花 不

暗 達 且 亦 不 倦 服 三 月 後 愈 覺 神 清 目 明 志 強 力 盛 步 履 輕 快

修 氣 舒 暢 是 藥 之 功 也 治 餘 子

治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子

治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子 治 餘 子

納毛燕水刷○治眼癢多因

眼淚上致成爛眼風●白

拔破眼各等分同細研每用半

錢熱湯半盞泡澄清以指蘸如

法洗必洗不可拭乾但開目得

又洗一日洗四五次神效○驅

風散治風海上攻眼腫痒赤痛

不可忍者或上下臉皆赤

爛浮睛肉侵睛●五倍子

一錢蔓荊子一錢五分水二

盞煎丁蓋去渣熱淋洗○治翳

大能明目去淚止痒

膜赤眼腫痛芒硝置銅器中急

細研点○治赤眼翳障●熊膽下

許清水調開去冬第膜塵土入

片腦一二片或淚痒加生薑汁

此少息○薰目清涼散危子

芒硝 銅錢 白礬各等分

每用二錢水下盞八分入銅內

蓋定周圍封固勿泄氣於盞正

中成下孔先以紙覆孔煎沸

取出少時去覆紙待大氣消此

氣溫之際就患目孔上薰之氣

既散再薰即愈或用竹管接

乳薰○混元散治眼目百病可

亦可 呼石五錢 珍珠五分 琥珀二

分半 熊膽五分 先用好細嫩泥調

水調成餅別將泥團一土若

中將湖泥包泥丸在內破開二

塊取去中泥丸不用却將外包

皮二塊於前五某於內密封圓

得極圓外又將白礬末食鹽和

泥再包一重便火燒不破此名

混元散用硬炭四五十片一煨

地上用三箇鐵釘打在地上一

香如脂一般將餅放在釘上將

七十三

初四圓燒紅三炷香二文一武
 初一次將燒紅入好醋內取出
 第二次又燒紅如前將燒紅
 章便內取出第三次又燒紅
 紅將燒紅入眼科諸藥煎水
 內取出又將燒紅入明方退火
 以白取開內藥燒紅入熊膽
 一錢將藥末盛火入其內
 至藥又有二三錢重將前藥
 看有許多重每一錢入內每
 分以共為研細貯入內如
 用藥點眼自閉目良久開如
 雲開見日不問新久諸眼腫痛
 內外醫障攀睛努肉青育腫痛
 爛弦諸症○明寶丹
 治諸般眼疾
 五錢辰砂五分
 官粉二分半
 至二分半
 方去辰砂官粉加黃冊五
 分括藥二錢半
 赤眼腫痛

青黃冊各二分半
 未別放臨時加減和勻再研用
 磁器收貯密封口不可泄○撓
 氣或蜜水和勻點亦妙
 雲散治一切眼腫疼痛及暴
 赤眼風熱壅實等症
 當飯川芎赤芍生芩
 通翹黃芩梔子黃連
 防風荊芥羌活白芷
 枳殼桔梗石羔大黃
 甘草水煎食後服
 倍加白蒺藜●眼胞紅腫如
 爛未破作增寒壯熱或打重
 氣攻心或打撲傷損內重○周
 藥血不散並依本方効
 道散治撞刺撲損傷眼目神効
 加銀朱或黃冊或朱砂少許研
 勻用或以人乳汁和勻亦可

○肝砂丸

治雀目能早視不能

煮熱和夜明砂作丸服之外

蛤蠟丹

不拘多少溶化取出入

蛤粉相和得所成錢每用以刀

切下二錢以豬肝二兩批開

煮在內麻繩扎定承一碟入鍋

內煮熱取出乘熱薰眼至溫

食之日二次○明目流氣飲

以明為度內受風熱上攻眼目昏

暗視物不見常見黑花迎風冷

淚怕日羞明或赤腫隱澀難開

或生翳障拳毛倒睫眼眵赤爛

女人血風時行暴赤一切眼疾

防風 荆芥 菊花 牛

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

黃芩 玄參 細辛 川芎

○翳睛丸

治內外翳障眼目昏

肉爛眼風眼及年老眼目昏

多迎風冷淚視物昏花久成

肉障此藥最能降火非水可宜

久服夜能讀細字○天門

麥門 生草 熟草 各三錢

知每二錢 人參 枸杞子

肉蓯蓉 牛膝 杜仲 石斛

杏仁 各一錢半 當歸 白

茯苓 山茱萸 兔絲子 黃柏

枳殼 菊花 青箱子 草決

防風 白蒺藜 羚羊角 各一錢

五味子 犀角 各八分 川芎

分 共為末 煉蜜 丸 每

○神光散

治婦女

心虛湯下○神光散

治婦女

治婦女

治婦女

治婦女

索小苗 耳草 水煎食后
 溫服 產后 被烟 開閉 難
 加荊芥 防風 川芎 官桂
 日夜 痰痛 加烏 玄胡 索
 白睛 鮮血 有翳 膜加 荻藜 木賊
 戒小苗 倍蒲 黃 瘴厚 加荻 藜 常出 加酒
 黃芩 倍蒲 黃 瘴厚 加荻 藜 常出 加酒
 暗加 麥門 熱淚 常出 加酒
 妙黃 連生 芩 熱淚 常出 加酒
 當飯 熱羊 戒飯 尾 烏白 睛
 血脹 加石 燕 羌活 赤芍 茯苓 木
 賊 戒木 ○治眼出 冷淚 肝四物
 香蒲 黃 湯加 木賊 防風 羌活 川芎 耳草
 木白 蕤 藜 防風 羌活 川芎 耳草
 為末 米泔 水調下

△頭痛

頭痛 偏風 浮風 寒熱 必洪

易除 寸脉 或短 或○論 夫頭痛
 浮或 眩皆 主頭痛 有真厥

二症 真頭痛 者 痛引 腦 泥 九
 尺 痛 手足 冷至 節 灸 且 死 且

而作 痛甚 則 灸 厥 須 分 內 外 二
 因治 之 又 頭痛 久 則 爲 ○治法

太抵 脈風 綱痛 湯主 之 川芎
 茶調 散 追風 散 選用 ●外感

四氣 春太 乙散 去 乾葛 升 麻 赤
 芍 枳 壳 黃 五 苓 散 加 香 葛 厚 朴

扁豆 羌活 桂 金 沸 草 散 加 桔 梗
 石 燕 防風 羌活 冬太 乙散 去 枳
 壳 加 麻 黃 以 上 隨 時 治 法 也 俱
 倍 加 羚羊 羊角 脈 之 如 神 ●內
 因氣 虛 補中 益氣 湯 加 川芎 白
 止 細 辛 蔓 荊 子 半 鹿 四 物 湯

加防風 荊芥 藥本 黃芩 柴胡 蔓黃 氣血 俱虛 補中 益氣 湯
荊子 氣血 俱虛 補中 益氣 湯
加蒼朮 黃柏 川芎 蔓黃 子細辛 腎
痲瘋 半復 白朮 大麻 湯 不可 忍 脉
厥下 虛上 盛難 頂痛 不可 忍 脉
華之 則眩 按之 則堅 王盛 九
七情 氣厥 心腹 脹滿 嘔吐 酸水
古芎 烏散 枳 散 半復 白朮 天
湯調 下古 芎 烏散 頭與 心 枳 痛
者古 藥 蒼湯 積聚 頭痛 者大 黃
備急 冊 益 氣 湯 加 茯苓 半 復
心者 補中 益 氣 湯 數日 不食
蔓黃 不効 者二 氣 冊 斷 根
常服 點 頭 散 尋常 頭目 不
清似 痛非 痛者 參 藜 飲 主 之 沐
浴后 著 耳 目 口 鼻 眉 稜 之 間
都梁 丸 耳 目 口 鼻 眉 稜 之 間
有一 處 不 若 吾 體 皆 其 漸 也 有
頭皮 浮 腫 不 自 覺 者 有 口 舌 不
知 味 者 或 耳 聾 或 目 痛 或 眉 稜
其 則 宜 川 芎 茶 調 散 偏 左 痛
風也 宜 川 芎 茶 調 散 偏 左 痛
者多 血 虛 或 風 熱 血 虛 者 朝 輕
夕重 四 物 湯 加 荊 芥 防 風 白 芷
薄荷 風 熱 者 頭 痛 重 大 過 熱 則
飛 消 風 散 倍 荊 防 熱 甚 二 陳 湯
加 荊 防 薄 荷 便 閉 更 加 大 黃 散
利之 偏 右 痛 多 氣 虛 或 痰 或
風濕 氣 虛 者 朝 重 夕 輕 補 中 益
氣 湯 加 川 芎 細 辛 濕 痰 者 參 則
瀉 密 無 間 二 陳 湯 加 南 星 蒼 朮
川 芎 及 細 辛 少 許 風 濕 者 腫 痛
連 肩 背 或 遇 陰 雨 則 甚 羌 活 勝
濕 湯 頭 風 發 時 關 痛 必 欲 伸
怕 湯 包 者 熱 鬱 也 二 陳 湯 加 酒
炒 黃 芩 荊 芥 薄 荷 川 芎 石 菖 細
辛 或 消 風 百 解 散 防 風 通 聖 散
辛 或 消 風 百 解 散 防 風 通 聖 散
者 參 藜 飲 主 之 無 寒 熱 者 二 陳
湯 加 烏 朮 川 芎 眉 稜 骨 痛 痰
與 風 熱 也 痰 者 二 陳 湯 吞 青 州

白九子或導痰湯風熱者選奇
●頭項強急筋痛或挫枕
轉項不得者烏茶順氣○主區
散加羌活治諸般頭痛○方羌

風觸痛湯治諸般頭痛○防風
●蔓荊子 蒼木 黃芩
●麥門 羌活 生薑煎服

●細辛 生薑 川芎 白芷
●一方去羌活加菊花

●左偏痛加紅花柴胡草龍膽生
●右偏痛加黃芪乾葛

●地黃 正額上眉脊骨痛甚者食
●積癰壅加天麻半復山查子枳

●實 當歸 頂痛者加大黃
●本 風入腦髓而痛者加蒼

●耳子木瓜荊芥 氣血兩虛
●當有自汗加黃芪人參白朮生

地黃 川芎茶調散 治頭風偏正
●黃 荊芥各二

●香附各七分半 炙甘草五分
共為末二錢 ○追風散 治年深

食后茶調下 ○追風散 治年深
●正頭疼又治肝臟久虛血氣衰

●野風毒之氣上攻頭痛頭目
●昏心忪煩熱百節酸疼腦脊目

●面上逆風狀若魚行或一切頭
●風 荊芥 川芎 羌活 白芷 金鰱

●一錢 羌活 石羔 南星 川芎 各
●姜 荊芥 白芷 地龍 各五分

●各二分半 雄黃 乳香 沒藥
●為末每五分好茶調服食后服
●調下流頭目刺咽膈流風化

●○都梁丸 治偏正頭風一切
●味烏末煨蜜丸梧子大每
●五六十丸食遠茶清送下 ○治

頭風腫痛

南星

川芎

全蝎

白芷

茶本煎

○治

頭目昏痛

鼻塞

胃

革防風

人參

荊芥

羌活

陳皮

厚

朴

耳草

各等

分

牙痛

不可忍

頭風攻

者

生

牙痛

不可忍

外麻

柴胡

白芷

治

頭風攻

羌活

細辛

防風

連翹

羌活

當歸

貝母

赤芍

乾姜

羌活

耳草

酒浸

研爛

去渣

治

頭風

每遇

寒熱

服一

吹鼻散

治

頭

痛

為末

口噴

水男

又方

治

頭痛

左女

吹鼻

肉

又方

治

頭痛

杏仁

大用

時以

水化

開

用竹

吹入

男左

女右

鼻中

覺

至

少酸

又方

治

偏正

頭痛

水竹

管吹

於

鼻中

○

治

方

治

頭

風

○

治

偏

頭

風

右

如

抽

筋

○

治

偏

頭

風

服 古芎烏散 治因氣弱頭疼

及產后頭疼 治川芎烏散

各等分 治偏正頭痛常服除

○點頭散 治偏正頭痛常服除

川芎五錢 茶清調服

每二錢 茶清調服

△唇病 治唇病

論夫唇之為病 蓋風勝則乾 熱勝則

熱氣鬱則生瘡 血少則濡而無

色 唇腫起白皮 皸裂如蠶

未大如蘭 唇有赤細 治法

外也 諸方宜用 慈苡仁湯

特隨宜選用 生結枝或為

在脾唇口咽動或生結枝或為

淨腫 慈苡仁 防已 赤

小豆 天耳草各 柴胡清肝

散 製或蘭唇 柴胡 黃芩

黃連 廔子 當歸 川芎

生芩 外麻 壯丹皮 耳

草 水煎服 脾胃弱 補

去芩連加白朮白茯苓 補

陰地黃丸 治陳虛少燥唇裂如

山茱萸 麥門 五味 山茱萸

般巴乾 肉蓯蓉 枸杞子

菊花等分 為末 煉蜜 丸梧子

大每七八十丸 空心白湯送下

○腎氣丸 治兩唇燥裂 補中

益氣湯 治中氣傷損唇口生

治口唇 緊小不能開合 不脫

有作灯 照如指大 安刀 剪去

燒令刀上 汗出 拔取 敷唇上 日

二三度 或用 舊布 燒灰 為末

每二錢 酒調服 或和 傅唇 效

又以地盤燒灰○治口唇乾裂破

先拔膿敷之黃栢各一錢

●五倍子黃栢各一錢

木五分○黃栢散及口瘡

調敷唇上黃栢二錢五倍子

陀僧各二分耳草二分

末猪脂調敷之

口瘡水調敷之

△面病

治法面腫乃食后胃風所致能

搗外麻胃風湯不食者風熱面

唇黑心懸如飢飢飢防風通聖散

●九內傷氣促者外麻順氣湯

●風熱上衝則面獨熱外麻

黃連湯●寒熱上逆則面反

不能耐寒外麻附子湯

上生穀常敷有逆翹散肺風

治法亦宜選用

胃風湯驅風解毒散

食少者補中益氣湯

●背脊虛也背脊熱者八味通

●外麻胃風湯治風能食

●目內蠕動胃風而腫

●白芷當歸葛根

●耳草柴胡葉本羌活

●黃栢草豆蔻麻黃不

●蔓荊子○外麻順氣湯

●飲食失節面色黧黑

●防風白芷黃芪

●人參白芍耳草蒼朮

●外麻黃連湯治面熱

●牛麻葛根白芍

●川芎白芷薄荷荆芥

黃連 黃芩 犀角 ○
耳草 水煎服 治陽明經

外麻附子湯 治面寒 附子 炙甘草 人

參 白芷 草豆蔻 益智 灸耳草 清上焦

連翹 白芷 清上防風湯 治頭 防風

面生瘡 風毒腫痛 桔梗 黃芩

連翹 白芷 枳殼 芍藥 水煎服

入竹瀝 桑黃丸 治喉痺 共為

黃連 黃芩 大黃 一兩 每十五丸 共為

水入 車翹散 治面上 黃芩

治名 粉刺 連翹 黃芩 麥門

煎取汁 熬成膏 入蜜 一兩 再煎

以入 水中 一夜 去火毒 每服五

七湯 化開 食后服 搽藥方 附

子六分 枯礬 三分 黃丹 密

輕粉 各一分 麝香 二釐 密

治面 生瘡 黃連 黃芩 用官粉 二

錢 水調用 治面上 生瘡 黃連 黃芩

下水銀亦不佳，手攪百餘遍，自
然和勻，每用少許，臨臥搽在面
上來朝熱酒洗。○治面上粉刺
去以蠟爲度。生硫黃、白附子
白礬一錢，共爲末，津唾調臨晚
各二分。搽上。○治汗斑紫白色
目洗之。○一方用
硫黃各等分，爲末，以
蒜葉蘸醋粘末，擦之。
○驅風解毒散
洗敷次立効。
治疔腫腫痛，
羌活、連翹、牛蒡子、荆芥
草各等分，水煎，服外，用赤小
豆末醋調敷患處，恐毒氣入喉，
難治。又方：用石灰不拘多少，炒
過，塗患處，立愈。

△牙病

脈短而微或大而數皆屬陰虛
相火上炎其久必遺精而兩耳
蟬鳴○論夫耳者腎之竅也其
或聾言為病有數種有氣虛
而聾者有痰火而聾者有勞傷
而聾者有挾風而聾者有快濕
而聾者有熱氣乘虛隨脉入耳
而為膿耳若有耳出津液耳熱
痛之聲鼓塞耳赤令暴聾而為
腎耳者然又有左聾者有右聾
者有本右俱聾者不
可不分經而治之也 ○治法
走股心神復元湯后服千金補
腎丸 ●左耳聾者因有所余
怒過度則動少陽虛火故從左
起加減聾音九主之右耳聾者
因有所色欲過度則動太陽勝
脫火故從右起腎氣九主之本
右俱聾者因有所醇酒厚味過
度則動陽明胃火或痰火故從

濕○加戒龍膏丸 治耳聾 龍

膽草 危子 黃芩 青皮 各

一錢 大黃 蘆薈 三 木

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

朱神 各五分 麝香 五 共

中如至 治耳聾 治耳聾

治耳聾 治耳聾 治耳聾

治耳聾 治耳聾 治耳聾

前菜末，送下。腎氣丸。○治耳腫痛。

一百丸。治耳鳴。效。牙關緊急，飲食不下。作寒，作熱，死。

在頰史。●升麻。桔梗。水煎，熱服。此布。連翹。治面腫。牙痛。咽喉。

汗出。立愈。兼治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。●蔓荊子散。治。上熱。耳出膿。

○治諸血入耳
取貓屎法以

生姜擦鼻其尿自出
又方火

用非汁灌耳中即出
又方火

脫桃葉搗之塞耳中魚即出
又方火

治雙蛾入耳
地龍一條細

亦化
葱葉中化水滴耳中其涎螭

鳥水

△鼻病

論鼻竅於肺而能知香臭者
也人身水外火降榮衛調和

則鼻司呼吸往來不息而巳
或寒傷皮毛則鼻塞不利火熱

鬱清道則香臭不知久則或鼻
變紫黑因飲酒血熱入肺後或

風寒鬱久則血凝濁而色赤或
不飲者乃肺風血熱又鼻中生

名鼻
治法清金降火為主

服收功又平素原無鼻塞之病
一時偶感風寒而致鼻塞者重

或流涕者只作風寒治之
●鼻不知香臭在麗澤通氣湯

湯加當歸引芎細辛白芷防風
羌活枯梗薄荷久不止者蒼耳

散去薄荷加荊芥黃芩神曲兩
星半夏
●鼻淵鼻流濁涕熱

盛神愈散天竺黃
●鼻中
流涎鼻膿水各曰腦漏正矣湯

●鼻齋洗肺散外用
●鼻痔鼻癰防風通聖散加三

細辛一錢白芷五
湯合通聖散外

貼鹿膠散 ● 魚痛不通故痛

黃與正氣散有痰火併服者結

●男子面白灸
三年用補中益氣

湯加麥門子而愈。

水少宜心腎丸
○方主正夷湯

● 辛夷花
川芎

白芍 自芷 細辛 黃芩

方風通聖散加黃連薄荷水煎

曠穰於腦○麗澤通氣湯

黃芪 蒼朮

葛根 天耳草 蕨黃 白
川椒 養老 葱白 煎食 白

服藥後物屬
寒涼忌坐臥
神愈散
治痢

淨室不_{通上}通

川芎 桔梗 茯苓
陳皮 薄荷 姜煎服

竺黃治鼻淵
 川芎長流
 白芷

芥 薄荷 蒼耳子 附

錢 天竺黃 三合 共爲末

四十丸米湯下。蒼耳散。

子一錢二分半 白芷五錢
薄荷五錢 共為末

二錢葱茶煎湯調下

俗名控腸痧有虫食腸中

用餘以燕近根三足許治

燒性為末酒調服

貼脾心用熱上其生瘡黃芥

○洗肺散門五味門黃芥

半夏生薑煎食后溫服

久患鼻齋膿血臭者

草霜為末每三錢水調下

治肺風鼻赤以茄子汁調塗

又方爛敷鼻上○參散九

熱入肺成鼻齋○苦參四錢

當飯二錢共為末酒糊九梧

子大每七八十○金花九

九食后熱茶下○黃芩各二錢

●黃連枯梗黃芩各二錢

黃栢廐子大黃煨各一

錢共為末水九梧子○鹿

上隔火煨過髮灰五錢共為

末先用花椒湯洗涕擦茶於痔

上三四

次即愈

△口病

論口病有熱亦有虛其症或為

味原其所因未有不因七情

治法大抵清金藥赤散也

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

治

枯湯汚白散腎熱口鹹滋腎丸

●心勞味厚者氣出腥臭加桔

梗知母麥門黃芩五福化毒丹

者上清久不愈服涼藥反甚有

●口瘡久不愈服涼藥反甚有

乃虛火上攻中焦不足理中湯

甚若加附子中焦不足理中湯

厄子末吹入口中

乾○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

生五苓散○口瘡燒灰入輕粉少許

●舌出寸餘連日不收龍腦為

末敷舌上應手而收●古忽

伸出不入以草麻子末搗收

燒烟薰喉中有一外俗云是蜈蚣

毒用雄雞血一小盞浸之即縮

或咽喉作痛服清咽利咽散愈

甚以理中湯○方玄參麻湯

治心脾熱舌上生瘡重舌木

●玄參赤芍兩處非麻桔梗

各等分○霜鹽散治舌腫硬閉

百草霜青瑤或煨食鹽各

等分為末井花水調塗舌上○

治木舌陳茶巴豆燂半同搗成

滑薄荷水調刷口中得下咽○

治重舌合等分為末蜜調塗

之麻黃以安為度○治舌腫硬

●方用蒲黃粉舌上尤良○

治舌腫喉閉

朴硝白礬各等

七聖散

治古青黑有刺乃熱

磨上吃之方好

●赤茯苓連

胡麻子枳殼

木通治口

生瘡牙宣出血

●皂角燒灰

兒茶銅綠

雄黃我

為末先將米泔水洗其瘡后

●水蘊兒

砂各等分

黃柏薄荷

朱蜜凡搗子大每服四五丸

共為

化○薄荷安治古上生瘡或古胎
白蜜薄荷自然汁各等分相和
先以生薑蘸水揩淨然後敷之

牙齒

論夫牙齒乃骨之餘腎之標
也精氣完則齒堅衰則齒落
厚熱則齒動足陽明胃火入
馬去縫止而不動喜寒食河惡
熱飲手陽明大腸經脈入齒下
從動而不休喜熱飲而惡寒飲
多因飲食色欲過度以致濕熱
上攻口湧酸水則牙床不清而
為腫為痛或為出血牙疼有四
熱冷風血也熱者怕冷水冷者
怕熱湯不怕冷熱即風○治
牙有虫竅者即蟲牙
法本托加味清胃散主之其他
諸方及外治方臨時選用

草烏●取牙用雄黃石灰砂

腎元●大抵齒銀宜露動搖者

虎潛丸●八味丸三味安腎丸

力若補中益氣湯如生牛壯丹

皮●歷年齒痛黑爛脫落必

口●燥痛止者乃膏藥濕熱之

火也六●一噴氣湯如黃連下之

或用木麻自芷防風刺不薄荷

結便手草等分水煎服●痰

熱赤氣攻注滿痛者外症●痰

二陳湯加細辛枳殼姜汁●痰

仍以姜黃華撓等分煎●痰

漱之●牙縫流血者●宜風

熱者消風散加芒硝●宜風

腎虛者石四物湯加米麻皮牡

丹皮知母黃柏限虛氣鬱者四

物湯加香附側柏葉牛膝外

敷綠泡散或香堃散常擦○

主加味清胃散治牙痛腫痛之

方加味清胃散治牙痛腫痛之

總司也專治胃

火血燥唇裂或為齒齦或牙齦爛作痛

丹皮 當飯尾 黃連 水煎服

防風 荆芥 各等分 腫痛不可忍

白芷 風散 牙痛 治牙痛

散或六 一順氣湯 蜜丸 治牙痛

魚牙 加藿香 木香 砂仁 治牙痛

松方 生芩 赤芍 連翹 黃連 治牙痛

桔梗 玄參 耳草 竹茹 治牙痛

水煎服 清火祛風散 治牙痛

腫緊難 以開口 立止 治牙痛

黃芩 黃柏 梔子 連翹 黃連 治牙痛

金銀花 耳草 水煎服 治牙痛

保牙散 治牙痛

清胃補中湯 治虛弱人牙齦

痛不可忍 治牙齦

痛不可忍 治牙齦

痛不可忍 治牙齦

痛不可忍 治牙齦

白芷湯

治下片牙疼屬手陽明

赤芍

連翹 白芷 薄荷 水煎服

治牙疼

青鹽二錢 椒各四錢 川椒煎湯

以漱出水洗目末擦無疾

○又方

小麥黑豆各一升 許厚煎水

○又方

椒艾葉各少許厚煎水

○又方

銅青 礬砂 川椒各

○門笑散

治風冷齒痛 良姜 白

華桃

川椒 香附 笑去

散

治牙痛神效 雄黃 華桃

○又方

良姜各等分 末 每用少

○又方

巴豆一箇 入火

○又方

胡椒三粒 同丁

○又方

包菜入口上

○又方

若是一兩箇

○又方

塞耳方

○又方

胡椒末

○又方

漱牙止

○又方

香鹽散

○又方

王池

○又方

散

○又方

正

馬 櫻花 當飯 藥本

草各等分 煎湯熱漱 治牙齦宜露 網口中以

加獨 治牙齦宜露 網口中以

熱水含漱 百遍不 治牙宜出

過五日 萬即牢密 治牙宜出

血香附 石燕各一錢 牙宜膏

同炒為末 每清晨 牙宜膏

擦牙漱而吐去 牙宜膏

齒動搖不牢 疼痛不止 銀肉本

血 麝香一字 龍骨 官

粉各二錢半 先二味為末 右

入麝香 攪勻 用黃蠟 一兩 磁器

內化開 入某於內 又攪勻 為

膏 攤布上 封貼患處 宿

七寶散 治一切牙疳 宿

五分 青黛 三錢 輕粉 雄

以雞羽掃敷之 經効散 馬

五倍子 各等分 為末 先用米湯

水 漱口 治牙齒動搖 黑鉛不

錦化入 藥條灰 柳木 攪念 成砂

為末 每早擦牙 溫水 漱吐 命內

以水洗眼 能明 固齒散 龍

自噴牙齒 黑髮 固齒散 龍

當飯 川芎 荊芥 香附 白

芍 枸杞子 熟苧 各一錢半

破故紙 一錢半 牛 一錢

外麻 五分 細辛 三錢

為末 飯糊 名陰乾 入 罐內 封

固齒散 龍 固齒散 龍

為末 用鉛盒 盛貯 每早擦牙 牙

為末 夫年 至四十 者 能常用 深

益 擦牙固齒方 黑鉛 四錢

切碎 用

牙

牙

牙

牙

枝炒半日成灰 青鹽二錢半
當飯五分 細辛辰砂各

三分为末 ○取痛牙法 華撓各
擦牙漱口 細辛各一分共

五分 川椒 細辛各一分共

為末 每用少許 擦患牙上 其牙

落 ○治牙落 用雄鼠頭火煨為

落 每二十丸 臨臥水 ○生齒方

下半月 后郎生牙 用白

用末 開眼 椒鼠三四箇 外用白

芫白芷 青鹽 細辛 當飯熟 各

五錢 除地黃五味 為末 用地黃

搗爛 加泥和勻 下餅包 嫩鼠在

菜內外 用濕紙包裹 文或火燒

烟尽 取出 為末 擦上 即生牙

△咽喉

脉兩寸 浮洪而溢者 喉痺也

脉微而伏者 死 實滑者 生

論 夫咽喉之諸病 皆相火之所

單喉閉曰 雙喉閉曰 子舌喉閉

木舌喉閉曰 經喉閉曰 走馬喉閉

蓋因熱氣上行 轉於喉之兩傍

迫外腫作 以其形似 是謂乳蛾

一為單二為雙 其乳蛾蓋小者

名喉閉熱結于舌下 復生一小

舌子名子舌喉熱結於舌中 舌

為之腫名木舌喉木者強而不

柔與也 熱結於咽喉腫達於外

且腫且痛 腫而大者名纏喉風

喉閉暴發暴走者名走馬喉風

○治法 治喉之方 與治舌

或生瘡毒 先用清咽利膈散或

手拈湯服然此症須速治 患處

並為上着牙關已閉不可針 遂

刺少商二穴 在手大指內側去

血口即開 刺喉間仍用前湯

或用開關散而諸吹喉清腫牛

痛之諸方選用 ●咽喉作痛

午○后○花○甚○乃○犀○火○上○升○喉○痛○并
 喉○生○瘡○喉○閉○四○物○湯○加○知○栝○天
 花○粉○桔○梗○耳○草○玄○參○水○煎○入○竹
 淮○服○●咽○喉○痛○服○諸○涼○藥○愈
 痛○暗○氣○九○如○知○栝○玄○參○桔○梗○耳
 草○水○煎○服○●咽○喉○脾○痛○口○舌
 生○瘡○勞○而○甚○盛○補○中○氣○湯○加
 知○栝○玄○參○桔○梗○●喉○痺○腫○痛
 不○能○言○語○者○但○可○進○菜○●不○愈
 若○此○從○治○之○法○也○四○君○子○湯○加
 桔○梗○防○風○荆○芥○薄○荷○乾○●主○清
 美○或○加○附○子○餘○七○服○●方○防
 咽○利○膈○散○治○咽○喉○諸○病○●薄○荷
 金○銀○花○桔○梗○黃○芩○黃○連
 連○翹○●卮○子○玄○參○牛○蒡
 子○大○黃○朴○硝○耳○草○水
 煎○服○●加○山○豆○根○●
 效○●耳○桔○湯○治○咽○喉○諸○病○●
 耳○草○防○風○荆○

母貝母
●喉痛如神
●肺痿
●面自腫加茯苓
●少氣加
●咽痛加牛蒡子竹茹
●疫毒
●心胸
●酒毒加乾葛陳皮
●防風
●牽牛加
●關關散
●藥摘英噴嚏即止
●生肌此
●皮膚未吹藥中噴嚏為驗
●煎法
●治咽喉諸病牙關緊閉
●巴豆去壳布包壓出油
●在布上將此布作折點好味
●或以烟薰鼻中下重時口臭
●流涎
●治雙單乳蛾咽喉腫痛
●新茶子

梅核各等分同搗爛入好酒
調林用助綿果藥塗患處如

調用針○綿毯散治同前
胡椒

刺破華槐赤豆細辛牙皂
作

各等分為末用烏梅去核
之

餅包菜末在內仍以菜末
領管

以綿裹縛頸上先用鴉
開

針刺破將綿毯換淡
○

喉中患處支痰為度
腫痛

閉丸治喉閉雙單乳蛾
更

山豆根為末用熊膽和為
用

雞膽膽陰乾為末為衣丸
如

下徐已吞下立已○治
咽喉脾

須臾○蟾酥為末用快頭
○

急入即消散其效如神
○

奪命散治急喉風
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

吹喉治喉閉
○

者即時送治
●巴豆一粒打碎入黍藿壳內

雄黃

喉閉先胸膈

解毒凡氣緊暴然咽喉腫痛

足厥冷氣不通頃刻不治

巴豆七粒三錢生四熟生去壳

研熟者去壳燈上燒存性

黃四分 鬱金一錢 共為末

木人六釐小兒三釐小箇吹喉

內立如

●或半字茶調服

●通隘散 治喉痛生瘡

砂二錢 兒茶 滑石 寒水

石黃柏 青黛各一錢 蒲

黃芒硝 枯礬各六分 黃

連五分 龍腦二分 共為末

吹入喉內

●龍腦破毒散 治不

內即送

喉閉不通

●芒硝四

片胸

片胸

水半盞調細口

自能消腫諸般

以指蘸藥擦

一錢作四五服亦如前法用之

不拘

時候

△聲啞

論夫心者乃聲音之主肺為

治法

他諸方隨症選用

暑濕氣血癰熱邪氣有火於
肺者病在上脫隨症解之腎虛
嗽痰壅或喘或脹或噎足冷背
寒脚腹經絡俱為之牽制其嗽
愈重其氣愈乏其聲愈微矣

主滋腎湯

治声哑

白芍

白芍

當歸

熟地

陳皮

人參

白木

牛膝

益智

杜仲

破故

龜板

耳

子巴戟

葫蘆

益智

菖蒲

耳

耳

耳

耳

草炙

生切

生切

生切

生切

生切

生切

生切

音當歸

生切

生切

生切

生切

生切

生切

生切

知母

詞子

阿膠

各五

各五

各五

各五

各五

人參

烏梅

各三

各三

各三

各三

各三

各三

牛乳

梨汁

各一

各一

各一

各一

各一

各一

煉蜜

梧子

大

每

个

九

十

九

子湯

下

難

治

歌

謳

失

音

連翹

桔梗

耳

草

各

二

錢

半

百萊

煎

二

錢

川

芎

一

錢

砂仁

詞

子

清

和

丸

彈

子

共

為

米

鷄

子

清

和

丸

身

一

丸

治

痰

火

治

失

仁

木

通

治

痰

火

治

失

等

煎

食

后

溫

服

治

失

嘶

五

倍

子

槐

花

治

失

語

提

花

不

拘

多

少

瓦

熱

口

中

咀

嚼

吞

之

使

音

不

出

治

語

又

方

紫

蘇

子

百

萊

煎

三

錢

熱

酒

調

服

治

失

△心痛

脈

沉

強

細

動

皆

是

痛

在

胃

下

部

在

足

部

脈

沉

強

細

動

皆

是

痛

在

胃

下

部

堅實不大便者下之痛甚難治

○論夫心者易治

者難治

元曰飲食日食日風

情曰虫曰症曰去來

七情久不食亦不死

病日久不食亦不死

偶吃還痛必須三五

而少食處得全愈其

若因內外邪犯心君

心而痛極手足青過

而久死矣死而復生

治○治法大抵清熱

用九諸痛不可用補

不通而痛愈其故云

痛則不通也

附九胡三建湯三味

止者扶也二陳湯加

和之

續無價金丹

胃氣作飽承氣湯下

附九大散輕者四物

紅花

安湯熱者連附六

痛者必面赤白班

便而食時作時止

或黃或青唇紫目

下月與頭面下

苦練皮則引皮頭

化血丸最速

胃作痛得谷則止，則常惡心，嘔。此胃中有蟲也。或時常惡心，嘔。吐清水者，一陳湯加若練根。○
 皮史君子，生美，即胃底。主清熱解鬱湯，治氣鬱。方蘊積成熱而作痛，治氣鬱。止。● 厄子，枳殼，川芎。蒼木，陳皮，黃連，附。乾姜，耳草，姜煎，燕腹，口后戒。飲食大半日。○ 倉卒散，治心痛。厄。再煎清。子炒黑五錢，吳煎，即。清鬱散。如川芎一錢，尤易。治胃中有伏火，膈上有稠痰，胃口作痛及惡心，嘔吐清水，吐酸。● 蒼木，陳皮，半多。煩悶。● 蒼木，黃連，香附。茯苓，白木，乾姜，耳草。厄子，川芎，乾姜，耳草。姜煎，溫腹。● 一方加神。藿香。○ 正氣散，治心痛。厄子。

小柴胡湯

治胃熱，痰上心腹，作痛，發熱不止。

有塊加莖木。● 黃連六錢，炙耳草一錢。湯治胃脫，當心而痛，或嘔吐不。或瀉過之類，以致熱鬱，故作痛。

● 黃連六錢，炙耳草一錢。湯治胃脫，當心而痛，或嘔吐不。或瀉過之類，以致熱鬱，故作痛。

● 黃連六錢，炙耳草一錢。湯治胃脫，當心而痛，或嘔吐不。或瀉過之類，以致熱鬱，故作痛。

● 黃連六錢，炙耳草一錢。湯治胃脫，當心而痛，或嘔吐不。或瀉過之類，以致熱鬱，故作痛。

● 黃連六錢，炙耳草一錢。湯治胃脫，當心而痛，或嘔吐不。或瀉過之類，以致熱鬱，故作痛。

分 茯苓 安神各 ○宣氣散

戒半 水煎溫服立止 胸膈疼痛內

有實熱 脈數有力 錢 木香

大黃 共為末 每三錢 姜湯調

服或性 或 ○絳雪散 諸心氣

者 立止 枯礬五錢 共為末 每

錢五分 輕者下 ○二礬散 治心

錢白湯 調下 生礬各等分

如神 枯礬 生礬各等分

為末 搽 九 梧子 大 每 三 九 燒

酒送下 ○利氣丸 治心胃氣滯

立止 利氣保安湯 治氣痛已服

痛 後餘熱作痛或痛在小腹者

柴胡 青皮 枳殼 香附

鬱金 木通 赤芍 桃靈

為末 醋調下 九 菜豆 大 每

散 治急心 疼內有瘀血 錢塊有

散 治急心 疼內有瘀血 錢塊有

治氣心痛 五錢 脂一錢

治心痛 舒安下

丁胡 建湯

心疼面青唇黑手足

下香 良姜 官桂 各等分

水 下 煎 煎 七 分 用 湯 散 二 十 粒

桂附丸 治風濕 氣入心 經

柴手心 令 人 不 然 心 痛 或 引 背
 臂 甚 則 經 久 不 愈 以 手 緊 按 而
 痛 累 止 可 服 此 藥 有 神 効 附 子
 鹿 寒 者 宜 之 川 椒
 各 三 錢 乾 姜 常 桂
 赤 石 脂 各 二 錢 溫 水 下
 蜜 丸 梧 子 大 每 三 十 丸 溫 水 下
 覺 至 痛 即 止 若 不 止 至 五
 十 九 以 止 為 度 若 早 朝 無 所
 覺 至 午 后 再 進 二 十 九 若 久 心
 痛 每 三 十 九 至 五 十 九 神
 九 只 十 料 終 身 不 發
 仙 救 苦 丸 治 心 痛 四 聖 丸 治
 痛 肚 腹 痛 陰 症 絞 腸 沙 神 効
 五 灵 脂 炒 出 炷 桃 仁 麝 炒
 黃 色 去 皮 尖 草 烏 水 泡 一 日
 酒 浸 七 日 去 皮 尖 焙 各 二 錢
 青 黛 四 分 共 為 末 酒 糊 丸
 梧 子 大 每 十 五 丸 或 十 七 丸 甘
 酒 煎 湯 追 虫 丸 治 取 咬 心 痛
 乾 漆 五

錢
共為末，起餅，炆黍米，大每
十二三九，苦練。○無價金丹
根皮煎湯送下。

痰食積酒積茶積肉積在胃脘

人患胃脫漏經年者或一
月或三四月或半年或十餘月

實 蒼木 指苓 麥芽

如半隻各一錢
澤酒

黃芩 芍皮 薏苡 蔓荊 附子 乾

瓜萎仁 厚 煨 換

每七十斤多至一百斤清米
苳下

人參二分半，白扁豆，肉各五分，治一切腹痛。
時常吐清水，加五合，治一切腹痛。
石一錢，牡蛎五合，治一切腹痛。
陶腰背疼痛，加餅貼，治一切腹痛。
椒為末，醋和，為餅貼，治一切腹痛。
艾炷灸，治一切腹痛。
三味玄胡散，治一切腹痛。
玄胡索，肉桂，路之錢，共為末，每二錢姜湯或酒調服。

△腹痛

脉心腹痛不得息，脉大而疾者，死。

弦食消，痰尺脉伏者，小腹痛。

有疝瘕，腹下急，大論有寒有。

痛人中黑者，多死。

腹熱有死血，有食積，有濕痰，有。

腹脹，多積，熱痰，火小，腹。

腹及痰，與經云，腹滿。

之，不痛為虛，按治法，不抵開。

之，痛為實，用。

也，五積散，加其藥，更木瓜，主之。

●時痛時止者，積熱也，六一。

行，氣滿主之。

●每痛有起，不。

●痛甚，欲大便，利。

●痛而小，便不利，者。

●關，胃氣滿，湯。

●有，助者，血，痛也，難。

●老，如史，君子，飲，食，過，傷，傷。

●感，胃，又，氣，行，氣，香，散，主。

●腹，痛，刺，氣，九，主，七，情，痛，亦，宜。

●心，氣，飲，三，和，散。

●中，虛，脾，弱。

隱隱冷痛全不思食若人參
 胃湯加肉桂吳茱萸木香
 虛扶痰者六君子湯加蒼木
 凡腹痛甚飲凉水一盞其痛
 緣可者屬熱痛當用涼藥清之
 清之不巳如或逆膽硬痛大便
 閉實煩渴用寒藥下之利氣九
 之類若飲水愈加作痛或四
 用溫藥和之和不吐瀉痢急服
 腹厥冷腹痛嘔吐中湯類
 藥敷之附子理中湯類
 須臾脈來有力無中湯類
 總司
 神品芍藥湯 治腹中痛 芍藥 肉桂 耳草
 水煎服 有寒加紫蘇香
 有濕痰加半夏 白
 蒼木 陳皮 杏附 川芎
 白芷 茯苓 乾姜 滑石
 色子 神起 耳草 水
 煎服 有濕痰加半夏 白

大便閉加 枳殼大黃 如神散 治氣自
 急痛不可忍腹中水於自汗
 妙洗手足厥冷又治寒病入腹
 心腹卒痛及小腸膀胱氣痛刺
 腎氣攻毒急痛不可忍屈伸
 不能腹中冷重如石自汗出
 不能服中冷重如石自汗出
 少 共為末每三錢酒一盞
 入鹽少許煎八分食鹽溫服
 諸腹痛連于脇脇手足冷脈利
 伏匿者從地溫湯和服探吐
 已 神保丸 治諸氣痛
 氣痛脇下痛大便不通氣喘宿
 食不消 不香 胡蘇各二
 錢五分 全蠍全者七枚
 且十枚去油 共為末糊丸
 服 子大朱砂三錢為衣每旦七丸
 服 心腹痛 神起 耳草 水
 煎服 有濕痰加半夏 白
 血積痛 炒姜醋湯下 氣

糯米白皮糯米飲下
●腎氣

痛下痛炒茴香酒下
●木

便不通蜜調快轉末
●宿食不

氣壅木香湯下
●酒毒熱毒過

酒茶酒任下
●酒毒熱毒過

度痲飲致腎痛
●痛最難治

諸氣惟勝氣腫下
●有入病項

痛此藥能去之
●數月不

痛痛諸醫皆以風治之
●注右腿

急乃流入背脊久之
●四合飲

李痛甚苦乃製服之
●陳

一投而癒而腹脹者
●紫

治痲痲氣滯而腹脹者
●紫

皮半復扶苓
●耳草

藥厚朴香附
●枳

飲治瘰癧血腫痛
●消瘰

藥生芩桃仁
●雄精丸

芒硝水煎溫服
●雄精丸

治腹中乾痛有時者車痛也
●雄精丸

五分食遠下
●加味平胃

治食積腹痛其脈弦其痛在
●加味平胃

以手與按愈痛甚欲大便
●加味平胃

治其痛成者是也
●加味平胃

陳皮香附
●加味平胃

各一錢厚朴
●加味平胃

香八分乾姜七分
●加味平胃

厚朴各五分木香三分
●加味平胃

煎溫服或為末姜湯調服
●加味平胃

行氣香薷散
●治因氣感風寒傷

神仙救苦丸
●治氣

利氣丸
●治氣

治肚腹
●治氣

治肚腹
●治氣

治肚腹
●治氣

治肚腹
●治氣

痛散治腹中惡氣積冷氣攻胸
 攻作痛一切虛冷之症
 胡索肉桂砂仁香附
 三棱莪朮茯苓丁香
 薑黃五吳脂茵香良姜
 各三分木香乾姜丁香
 檀香沉香一分八釐桃仁乳
 各二分沒藥各三分半共為末
 香服二錢溫酒調服

△腰痛

腰痛之脈皆沉弦而緊
 者為寒沉弦而浮者為風沉
 弦而濡者為濕沉弦而實者
 為熱沉弦而虛者為虛
 論夫腰者腎之候
 腎開關然諸經其於腎而絡於
 外感內傷種種不同

○治法

腰痛之脈皆沉弦而緊者為寒
 沉弦而浮者為風沉弦而濡者為濕
 沉弦而實者為熱沉弦而虛者為虛
 腰痛之脈皆沉弦而緊者為寒
 沉弦而浮者為風沉弦而濡者為濕
 沉弦而實者為熱沉弦而虛者為虛
 腰痛之脈皆沉弦而緊者為寒
 沉弦而浮者為風沉弦而濡者為濕
 沉弦而實者為熱沉弦而虛者為虛

此方治一切虛弱之症，如氣血兩虧、精神不振、腰酸背痛、頭暈目眩、心跳失眠、食慾不振、消化不良、大便溏薄、小便頻數、遺精滑精、月經不調、赤白帶下、產後虛弱、病後虛弱、老人虛弱、婦人虛弱、小兒虛弱、一切虛弱之症，服之無不神效。此方乃家傳秘方，不可外傳。