小兒要方目録

香葛散 二丁メ
性生散 二丁メ
不換金 三丁メ
外葛根 四丁メ
浮白散 五丁メ
小柴胡 大柴胡加味柴胡 六丁
浮黄散 七丁メ
導赤散 八丁メ
桔校湯 八丁
茯苓半夏 九丁
香砂平胃 十丁
葛甦飲 一丁メ
甦腹散 二丁メ
九文 三丁メ
十神湯 五丁メ
蒼桔散 五丁メ
白虎湯 參化斑 六丁
浮心湯 七丁メ
阿膠散 八丁メ
人參平肺 九丁
平胃散 九丁
消食散 十丁

保和丸 十丁
消癖湯 十二丁
万億丸 十二丁
人参養胃 十三丁
銭氏白朮 十五丁
五苓散 十六丁
香連丸 十七丁
仙梅丸 十八丁
四神丸 十八丁
八物湯 十八丁
参砕湯 二十丁
銭氏安神 二十丁
消積丸 十二丁
紫霜丸 十二丁
醫王湯 十二丁
四君子湯 與功數十六君子四
参苓白朮 十八丁
消脹散 十七丁
胃風湯 十七丁
玉露散 十八丁
四物湯 猶医醇大 十八丁
七味清脾湯 九丁
地黄丸 参地黄 并地黄 九丁
益黄散 二十丁

大蕪荑 二十三丁
九味蘆薈 二十四丁
七味肥児 二十五丁
消痰飲 二十六丁
木香丸 二十六丁
立効散 二十七丁
蕪荑散 二十八丁
鼠粘散 二十八丁
澤瀉散 二十八丁
仙方活命 二十九丁
十六流気 三十丁
五香湯 小五香 加味五香 三十一丁
四味肥児 二十三丁
肥児丸 二十五丁
地黄清肺 二十六丁
胡黄連丸 二十六丁
如聖丸 二十七丁
雄黄散 二十七丁
追虫散 二十八丁
蔓荊子散 二十八丁
柏子清肺 二十九丁
防風通聖 二十九丁
赤小豆 三十丁
五香連翹 三十一丁

荊芥散 三十丁
甘露飲 三十二丁
龍膽瀉肝 三十三丁
枸肝散 三十四丁
秘旨補脾 三十四丁
五皮湯 三十五丁
鎖陽蓯蓉散 三十六丁
清心丸 三十七丁
紫金鎖子 三十七丁
人參安胃 三十八丁
烏藥順氣 三十八丁
五色丸 三十九丁
大連翹飲 三十二丁
乳香散 三十三丁
柴木參苓 三十三丁
秘旨安神 三十四丁
芩藥參苓 三十五丁
黃金丸 三十五丁
利膈丸 三十七丁
釣藤鉤飲 三十七丁
瀉青丸 枸青丸 木六丁
沉香天麻 三十九丁
消毒飲 肇前消毒 四十丁

犀角地黃 四十丁
快透散 四十丁
參蓋聖 四十丁
十二味異功 四丁
十奇散 四二丁
史明散 四三丁
八解散 四四丁
參附湯 四五丁
錢氏木瓜丸 四五丁
花火膏 四六丁
柏鬱散 四六丁
當歸連翹 四七丁
加聖湯 四下丁
紫草木香 四二丁
陳氏木香 四二丁
芎歸湯 四三丁
百祥丸 四三丁
化毒丹 四四丁
團參湯 四五丁
當歸六黃 四五丁
掌中散 四六丁
蟬蛻釣藤 四六丁
香螺膏 四六丁
調元散 四七丁

香葛散

治四時感冒傷寒或夾食夾驚及瘟疫並瘧疾

莎薤名二 貴 童 齊一名 各二兩半兩 甘半兩

右入生姜水煎按此方發散快氣劑也○惡寒加蒼發熱甚加柴芩○咳嗽鼻塞声重咽膈不和加桔會若不止加田德○胷痞塞加奴田○嘔吐惡心加喬田○食不化加砂○傷風自汗加枝○無汗加麻○寒慄加枝○或痘疹疑似之間去童加周

錢氏葛蒲 同 錢氏羚羊角 四十七丁

已上百二十方

葛麪飲
治感冒風寒發熱咳嗽喘促痰
涎或腹脹少食泄瀉嘔吐或手
足冷及急驚風初起牙關緊急
非熱手足搐搦上竄天吊角弓
反張口中氣熱頰赤唇紅二便
黃赤或閉結或有痰涎脉浮洪
數並痘疹疑似間最用之
皓 茯各一錢 麪田圓 平胃半
齊各一奴 九分甘五分 參
右入姜棗水一煎○初咳嗽加德
雪久嗽加貝母○口乾加愛瑞
○嘔逆藿砂○脾泄加蓮扁朮
○頭疼加細芎○或感冒惡寒
無汗咳嗽喘急鼻塞声重加德
華肺熱加德雪苓梅肺寒咳加
杏仁○胸滿咳多加棗○衄血
加梅門茅○心盛發熱加柴芩
○咳血加周王蚍○或有痰涎
而急驚風初發若虛弱加參若
甚發加蚯蚓錄可也○或痘疹
覺身熱傷寒疑似未明並冬寒
痘疹初見紅丹不能發起者亦
用之
本方合四物湯謂茯苓補心滅
之 治感冒傷寒潮熱諸病俱
至陰分病重
惺惺散

治外感風寒鼻塞痰嗽或時氣風熱痰壅或麥蕎發熱吐瀉或痘疹疑似之間宜用之

參　朮　茯苓　圖　細　枯

右入苦水煎〇吐甚加貴薑〇瀉甚倍朮去枯〇渴甚倍枯加門或加葛〇熱甚加薑

甘

甦腹散

治感四時不正或寒疫時氣山嵐瘴氣雨濕蒸氣或中寒腹痛吐利或霍乱或中暑冒風吐瀉中濕身重泄瀉或脾胃不和飲食停滯嘔逆惡心胸膈痞悶頭疼增寒發熱無汗者

蕾三　貴　朮　淡田圖　各二　腹　甦　並　苓　各一

甘半

右入姜棗水煎〇腹痛加餘〇若寒痛加官〇若冷甚加泳〇飲食不化心下痞悶加莎砂或加洞童〇米穀不化加曲芽〇肉食不化加査〇心腹絞痛加蜜〇大便不通加枳〇或時氣憎寒發熱加柴葛〇或中暑冒風加蕾扁〇或霍乱轉筋加薑

不換金

治感冒風濕頭目昏重時發壯

熱或四時傷寒瘟疫時氣山嵐瘴氣寒熱往來或霍乱吐瀉下痢赤白宜用之

痢赤白宜用之

精淡貴畔藿路

右入姜棗按此方平胃散加藿田是乃辟瘴劑也或瘟瘡冬月因寒氣難起發或瘟因寒邪痛佳也

九文

治傷風時氣寒熱咳嗽或傷寒瘟疫四行風濕風眩四肢痛憎寒壯熱項強睛疼並急驚風初發及瘟疹疑似依本方加味而可服

羌搗薰西奴芎

圖茯參各等并減半

右入姜水煎○傷風声重咳嗽吐痰加德田○傷寒頭疼身痛項強壯熱惡寒口乾心中蘊熱加芩○頭目眩暈屬風熱加蝉田○眼目腫痛因風寒加芎靜近蔘去參苓○或急驚風加蚕蛻○或急驚風初起及瘟痛欲出發攡加蝉蝎蚕附錄○或瘟疹疑似發熱加芎靜錄蝉去參苓○或瘟瘡序病甚發熱與升麻葛根湯不去其熱故此方加柴有奇効或啼則口眼喎斜

頗少腫此方得効

外葛湯

治傷寒傷風或疱疹疑似之間

宜用之

薑三 周 餘 蕗各二

右㕮咀水煎按治癮疹最上之

方也或癮疹者有紅點如蚤嚙

之狀○若瘡疹疑似冬月加甦

八〇四肢厥冷加枝一半○若疹一

見苗不可服愼之○或疱欲出

者當知腰痛時氣發熱大甚乃

毒氣盛加力一半○或傷風傷寒

身熱頭項強自汗表不和加荅

○師曰昔夏秋之間多人民患

紅斑摩之則當手不痛不痒頭

痛發熱惡寒合此方甦腹散二

湯三三貼而皆愈

十神湯

時冷不正瘟疫妄行或感冒發

熱憎寒頭痛身痛無汗或疹欲

出此藥不問陰陽兩感治之

葛 周 芎 赤芍藥

甦 貴 芷 甘

右㕮咀水煎按此方發表出汗

劑也不可多服或疹毒加官參

茶

瀉白散

治肺金實熱咳嗽痰喘或肺盛

復感風寒則胷滿氣急喘嗽上氣或壯熱飲水喘悶主之

雪羅 各一錢 蘇五錢

右或入粳米百粒水煎按清肺氣復散風寒方也若喘嗽面赤壯熱飲水者肺金乘心也宜用

蒼桔散

治感冒寒邪頭疼身痛項背拘急惡寒嘔吐或腹痛並傷風寒二感風寒及寒濕客于經絡腰脚酸疼

蒼二分 桔一分 草 奴 貴各六分 芎 芍各八分

並官田 苓各四分 芎三分

右入姜葱水煎按此方除寒濕一劑也或瘡疹嚴寒不能起發或紅斑初見者除官奴外十三味慢火炒令攤冷入二味煎則爲貫膿

小柴胡湯

治傷寒溫熱或身熱惡風頭痛項強四肢煩疼寒熱往來嘔噦痰實寒中暑瘧疾

薰二分半 芩 參各一分半 田 芎五分

右入姜棗水煎按此方傷寒和解之劑也或傷寒邪在半表裏而四五日往來寒熱心胷煩滿

嘔吐頭疼耳聾大便秘澁或炎後發熱煩悶加連丹得奇妙○

或瘡疹出不快身熱加蚯

本方加餘將各二洞一去參芎名大柴胡湯此方乃攻裏之劑故以利爲度

治傷寒或十餘日大便不通身熱煩燥譫言

本方加丹王而名加味小柴胡湯之

治乳母肝火發熱等症若致兒爲患予毋俱用之以下倣此

白虎湯

治傷暑煩躁身熱痰盛頭痛口燥甚渴

一兩 羔兩 粳米八錢 甘五錢 理五錢

右水煎按此方傷暑及傷寒之除熱劑也或傷寒汗吐下後心胸煩悶渴欲飲水而脉洪大宜用

本方加參一名人參化斑湯

一名加彭治脉虛而熱盛煩渴不止及發赤斑若大便不固不退加蒼若脉長汗出甚身如水石加官或虛弱兒脅胃譫語或小便澁起臥無度或煩而不眠加丹

瀉黃散

治因脾胃實熱作渴飲冷或卧不露睛手足甚熱或遍身發黃

者因胃實熱也
黃芩 各七錢 丹一兩 羔芸五兩
右水煎按或浸蜜酒乾微炒末服
或脾乘心合目昏睡泄瀉身熱
或發熱作渴喜冷飲食或泄瀉
黃色睡不露睛屬形病俱實用
之可瘥導之〇或木舌弄舌宜
若弄熱舌者脾土微熱令舌絡
牽緊時時舒熱少宜用若舌舒
長而收緩者名吐舌之心脾積
熱也少宜用去之若舌微露而
即收名弄舌之心脾虛損也用
張氏溫脾散宜補之

瀉心湯

治有心經實熱或喜仰臥者
連
右爲末每服五分臨卧溫水化
下或口瘡因實者蜜水調用或
叫哭發熱作渴飲水抽搐有力
仰面而睡者若此散不應導赤
散佳若因心經虛熱抽搐之力
驚竄咬牙合面睡者可用補心
劑

連赤散

治因小腸實熱小便赤澁或上
竄咬牙者
連 甘草
右入淡竹葉水煎按此方並瀉

心二十方者心小腸之實火瀉肺劑
也必其臟病則脹其子虛宜審之
餘准之或喜汗者屬心經血熱
用之

阿膠散

治肺虛咳嗽口乾作渴
膠 糯米各一兩 馬兜鈴五錢 鼠粘半
德七箇 甘一

右水煎按肺金性則唇白補之
若悶乱氣粗喘促哽氣者難治
肺甚虛也

桔梗湯

治咳嗽吐膿痰中有血已成肺
癰症

桔梗 貝母 知母 麥門冬 枳實 陳皮
雪百合各一錢半 甘草 甜葶藶
理 甘節 薤白 橘紅 藶 甘各五
會 青 天門冬各四分 茯苓 雪
分各七分 甘一錢

名公姜水煎

人參平肺散

治心火刻金咳嗽喘嘔痰涎壅
盛胸膈痞滿

參 橘紅 藶 甘各五分 茯苓 雪
會 青 天門冬各四分 甘一錢

名公姜水煎服

茯苓半夏湯

治胃氣虛弱痰涎惡心或飲食
不化嘔吐發搐或睡卧不寧口

流痰 麦門冬 各一 大麦
米 秋田 曲 各三銭 皓 五銭 亜鉛 各三銭
名水煎按此藥乳母脾胃虚弱
飲食不節以致兒患主之

平胃散
治脾胃不和飲食不進或生冷
或濕麵食傷脾腹中飽悶
精 八分 淡 貴 各五 丼
右入姜棗水煎按此方治脾濕
泄瀉胃消痰也 ○若食不消嘔
加曲芽奴田 ○若飲冷傷食
加光 ○滑泄加行 ○小便赤澁
加苓半 ○白朮加其 ○赤朮加
連 ○胃寒嘔吐加永苓喬

香砂平胃散
治脾胃不調宿食不消
精 貴 各一 奴 藿 各八分 砂七分 蜜 丼各五分
右入姜水煎按此方食滯主之
○若肉食不化加査果 ○若米
粉麵食不化加曲芽 ○若生冷
瓜果不化加永童 ○若傷飲酒
加連梅 ○吐瀉不止去奴加
茶苓田梅 ○若右脇下有塊作
痛飽悶者食積也去藿精加童
査芽永洗 ○腹痛甚而瀉後
痛減脉弦是食積也先用備急

圓或萬億丸之類而下後用此湯去滓加減查曲官永得數驗

消食散

治傷食腹痛或脹滿或宿食不消面色黃目無情此藥能調和胃氣乳哺消化

查 曲 砂 芽 朮 貴 童 蹄

右入姜水煎按此傷食之主方也若受寒作痛加藿吳有熱加芩

保和丸

治食積

查三兩 曲二兩 萊各一兩 貴軟各半

蔔火

右爲末粥糊丸梧桐子大每服一二十丸白湯下

消積丸

治食積大便酸臭發熱

砂簡十二箇 巴二粒 梅二箇

右爲細末麵糊丸黍米大每服五七丸溫水送下○若食積飢去而未熱退或作嘔少食宜異功散以補胃氣或用四君子湯加藿田以安中氣佳也○若兼泄瀉者用六君子湯如不應加厚薑以升補脾氣久瀉不已用補中益氣湯以升補陽氣如不

應用四神丸補脾腎○體瘦潮
熱口乾大便不調宜用肥兒丸
以消癖積

消癖湯

治癖疾潮熱口乾尿赤
參　朮　苓　田薰　芩
芋　猪胡連　愛消　茂
查　艹

右入姜棗水煎立效按此藥治癖
積主方也○如癖病日久元氣
虧損此方不効宜多以服醫王
湯養正積自除

紫霜丸

治因食止瀉腹痛不乳或嘔
疹疑似或秘結或驚積等症
赤石脂　代赭石各一兩　德五十粒
巴三十粒

右為細末丸黍米大三歲以下
兒二三粒四五歲五六粒兒輕
重見米飲或乳汁以用諸病俱
大便下為度後服止或語曰此
方斬關奪門起死回生之重劑
也必審形病俱實方施之

万應丸

治乳食生冷所傷發熱肚脹及
急驚肚腹脹
巴　寒食麵　於清明前
食用日麵不拘多少好酒和
麵一塊色細乾麵在內蒸熟

右各等分先辰巴二味研極細、聽用
少去寒食麵包皮取內細麵用
好酒打成糕蒸熟入藥內仍又
同研百餘下丸如黍米大每服
三五丸看兒大小用之○若傷
食者用之宜消導○或下痢赤
白腹痛初起者佳也痢者多腹
中食積也○癒者腑上痰結也
用之○或腎風炙中脫三壯並
此丸一二粒用以其胎毒泄佳
○諸病俱大便不通如神

醫王湯

治男元氣虛損感冒風寒留症

或乳母因勞役為兒患或中氣
不足清氣下陷或脾胃虛熱頭
疼四肢倦怠心煩肌瘦日漸羸
弱等

甚一參 木芹各七錢五分 貴
薰 周各二錢

右入姜棗水煎服按此湯能升
元氣退虛熱補脾土生氣血或
諸痒癖塊久治不愈多服最效
或瘡瘍結痂而誤犯風寒惡寒
發熱或面白喘嗽肢体倦怠者
肺乘脾也用之勿論因脾虛弱
而肺金虛咳或陰陽已分而小
便短少者加會是脾肺氣虛而

不能生水也○小兒因疳患瘧癉小便頻數兩目連瞤或作嘔小食泄瀉後重此肝經熱盛而脾土受邪也用此湯以並六味丸而痊○小兒腹內有一塊小便不調或以血痞久服行氣破成瘀症面黃兼青此乃肝脾疳症也用此方並送蘆薈丸亦此方加車送六味丸清肝生血而愈

人參養胃湯

外感風寒內傷生冷憎寒壯熱或頭目眩或吞酸嘔吐宜

用之

精淡田各一 貴七分 藿
半兩
果 參 茯各五分 甘三分 梅一個
參 朮 茯 甘

右入姜棗水煎若寒熱如瘧嘔逆惡心宜或亦瘧疾加減得奇妙

四君子湯

治因脾氣虛弱飲食不化腸鳴泄瀉或嘔穢吐逆不思飲食

參 朮 茯 甘

右水煎或入姜棗按此方能脾胃調一切補氣之本藥也○慢脾風加附厥冷亦然○或交精吐乳眼慢糞多穢氣乃父母交合時契乳所致加藿朮○或疹

出未成者加厚葛若痘疹欲出
未成間吐利者中焦停寒也○
或宿食加砂貴○小兒面色黃
耶胞微腫作渴腹脹飲食少思
腹中一塊有或後動小便澄白
不實此脾痒之患此湯加丹蔘
蔓兼用四味肥兒丸而愈○小
兒面黃頰赤發熱作渴睡中驚
悸此心經內痒症也用此湯加
連芎歸爲主佐以秘旨安神丸
而愈

本方加貴謂異攻散之　治脾胃
虛弱吐瀉生風或呵欠多睡而
湯即而露睛手足冷此方補脾
胃聖藥也或乳食失節寒凉失
宜或乳母六淫七情失調飲其
乳諸病頻起治之其應如響或
發熱口乾惡冷飲食或泄瀉色
白睡露睛屬形病俱虛宜或盜汗
者屬腎經虛熱宜之

本方加貴田謂六君子湯之治
脾胃虛弱體瘦面黃或久患癇
剌不思乳食或嘔吐泄瀉飲食
不化或時患飲食停滯並母有
此症致兒爲患者一小兒患
抽搐痰涎自流驚風之劑服益
甚視其面色黃白此湯並醫王

湯用疼一小兒傷食嘔吐發熱面赤故用消導之劑飲食已消熱未退是胃虛熱也加茵蔯薰疼若因脾胃虛損而緩慢驚者一小加附或加蚕蛹最佳一小兒嗜食泥土困睡泄瀉遍身如此肝經內外俱証用之多佐四味肥兒丸用以平疼

錢氏白术散 一名七味白术散

治因胃傷而上吐因脾傷而下瀉或病後津液不足口乾作渴等症

参 术 茯苓 甘草 葛根 各一錢二分

右入姜棗水煎○或嘔吐或頻瀉痢欲成慢驚加蕎麥及巳作慢驚加蝉蜕細白附○若冬月或四時俱吐蚘虫者多是胃寒所致加喬○或胃虛不能食而大渴不止者乃胃中元氣少故也加瑞必不可用淡滲之劑或中氣虛熱口舌生瘡不喜飲冷者有奇効但能食而渴者白虎湯用加参佳也

参苓白术散

治脾胃虛弱飲食不進多困少力中滿痞氣喘嘔吐泄瀉或大病後用之生津補助脾胃極妙

參　朮　茯　蕭　芎　錢各二
扁半　錢　蓮　億　砂　圖各二
錢

右爲末棗湯調下按此方中和不熱久服養氣育神醒脾悅色順正辟邪

五苓散

治霍乱吐瀉躁渴飲水或汗後中暍煩燥小便不利而渴

芋一半　朮　苓　猪各一
半　　　　　　　　　官
　　　　　　　　　　半
　　　　　　　　　　夕

右爲末清米飲調服或入姜棗煎用按此藥若津液偏滲於大腸大便瀉而小便少者宜用

暑煩渴身熱頭痛霍乱泄瀉小便少心神恍惚加滑甚妙也○或黄疸發熱加茵

消脹散

治因脾胃氣虚腹脹

蘿蔔　蘇梗　葛　貴　奴
　　　　　　　　　芎少

右剉水煎○若食少者加朮

香連丸

治赤白痢疾並水瀉暑瀉

連十兩　吳五兩　此二味用熱湯拌和入磁器置熱湯中頓一日同炒至黄連紫黄色去吳用連爲末

右每末四兩入蜜末一兩淡醋米飲爲丸如麻子大每服白清

胃風湯

治風冷乘虛客於腸胃水穀不化泄瀉腸鳴腹痛及腸胃濕毒下如豆汁或下瘀血

參 朮 茯 芎 餘 弓

右入粟米煎按此藥入物湯除入物湯心可察之○若腹痛加蜜○若湯下如豆汁腹痛身熱去官桂加薰芩○一小兒曉瀉二三行腹微痛脉緩加砂痊○或腹痛瀉剩如煤血後重窘迫朮減半加

仙梅丸

治痢疾發熱作渴者

細茶　梅

右爲末用生蜜搗丸彈子ノ大毎
一丸水冷熱隨意化下

玉露散

治傷熱而吐瀉黃色

石膏　寒水石各五錢　蕗二錢半

右末毎服五分白湯調下按此
藥飲食如常作渴飲水屬胃經
實熱用之　若善噫瀉黃此脾
虛色暗也用六君子湯加柴胡
炒

四神丸

禀毒ヲ含ンテ生ルニ

治脾腎稟虛五更泄瀉不食或
不時去後不實或乳母患此致
兒爲患
補骨四錢 會各二兩一錢
或除會吳加茴二錢蜜一錢
右爲末用水二碗姜八兩棗百
枚煮熟取棗肉和末丸麻子大
二三十丸空心白湯下
四物湯
治肝木血虛發熱或寒熱往來
或日晡發熱頭目不清或煩燥
不寐胸膈脹或脇痛
芎芍餘并

〇嬰兒生下遍体皆黃加古好母
倶服之
〇或齒久不生加漬沉茸
爲末擦齒根調下塩湯〇或血
熱生瘡遍身腫痒加芸苓
本方加泊濇名補陰降火湯
尾骨節痛治加官少爲引手或
西蜜少加爲引手佳如痛不止
加乳没

八物湯
治肝脾傷損血氣虛弱惡寒發
熱或大便不實或飲食少思小
腹脹痛或口舌生瘡或齒齦腫
潰或便血自汗盜汗或因失血
過多剋伐元氣以致內熱等症

參 朮 芎 芩 枳 餘

半 甘

右入姜棗水煎服按此劑合四君子四物湯之方也故非氣血兩虛者勿用之○或解顱者則有熱加連茅甘更以帛頭緊束及以白斂末貼之

本方加椹官名十全大補湯之治氣血兩損發熱惡寒自汗盜汗肢体倦怠或頭痛眼眩暈口乾作渴久病虛損二便見血小腹作痛或小便短少大便乾澁咳而不剎大凡汗多亡陽必多生者

七味清脾湯

治因與早飲食痰滯或因蟲咬或發寒熱

淡 梅 甲 童 光各二

果一露五分

右入姜棗水煎服按用此湯專脾癉食癉治加洗最可也○若因虫咳久不止加茂○若吐乳食加永

參椹湯

治身体瘦弱遺尿氣血兩虛者

菱 貴 椹 苓 泔 芍

朮各一 益八分 周 官各五分

露三分

右入姜棗水煎服欲用此方先灸關元二十壯此一穴有可用三十壯臍下三寸百中百劑也老少男女不限發

治腎痺肝痺並腎虛解顱或行遲語遲等症

地黃九 芍藥八 山茱萸各四 芋・王瓜各三 茯苓各

右爲末煉蜜丸桐子大每服四五歲兒二三十丸空心白湯送下按此藥爲天一生水之劑也或肝水血虛燥熱風客搖氣而患

潤動宜○或目畏明下簾者蓋骨重而身縮也○或右先生云下簾腎氣不足發熱故不蓋臍以下皆腎之所主緣心氣下行於腎部也宜用之壯水制火補腎○或咬牙者腎水虛而不能制心火用之○或腎經虛熱作渴小便淋秘上衝者或腎痺身極瘦瘡疥頭痛足冷塩湯下○或虛火上炎而小便赤少加會門是肺氣受傷而不能生水也○或肺金虛火咳嗽吐血頭目眩暈或咽喉糜痛口舌瘡裂或心火血虛有火自汗盜汗便血諸血或脾

虛濕熱下注於腎腰膝不利或
疥癬瘡毒等症用此丸爲主而
佐以各臟之藥可治○或肝腎
虛弱骨髓不充不能行加茸倍
肾神氣不足目無睛光面白是
皆不治雖育不壽○一小兒自
五加皮一○或解顱用之並墜未
脫胎即兩目赤腫或作癖或生
翳此胎稟肝火耳用此方並蘆
薈丸二方而愈○一小兒下痢
膿血久不愈遍身生疥此腎
潰爛爪黑面黧是肝經之虛火也故用此丸補
腎肝而愈此症原因肝經血少
而生風耳輪不可用瀉青之峻
劑若初患前症而病形俱實者
宜少與瀉青丸瀉之久病虛則
補其母實則瀉其子是則法也
○本方去芎加參而謂入參地
黃丸之　治解顱則用入參煎
湯以服之○本方加芎三錢茸倍
酒各二錢謂當歸地黃丸之　治鶴

節得教奇

錢氏安神丸

治心痒壯熱面黃頰赤或邪熱驚啼口舌生瘡

馬牙硝 茯 雲 寒水石 各半兩 腦 各一錢

右蜜丸芡實大每服半丸砂糖水化下按或語曰此方降火化痰辛散寒凉之劑不宜過服恐反傷脾胃耳驚啼者邪氣乘心也用之主之哭而不啼多泪是驚悸也若啼而無泪是痛有也

益黃散

貴 青 訶 各五錢 喬二 甘 三 炙

或參 朮 各一 加

右水煎○或吐清水者用之溫補脾虛○若四肢指冷者知是脾胃虛寒也加蜜炙○或唇黑泄瀉手足指冷者腎乘脾用之

○或汗出上至項下至臍者胃虛也用之或亦六君子佳○或因腹中冷痛夜啼者○或頻撮口者氣不和也主之若風入作瘡

酸臭並肺痒喘咳鼻捻口甲咬舌鼻生瘡及脾虛寒嘔吐泄瀉或面白腹痛口中氣冷不思飲食

邪傳脾而撮口者重七日內愚
其危速

大蕪荑湯

治脾疳少食發熱作渴大便不
調髮黃脫落面黑小便清鼻下
生瘡能乳嗜土等症

蕪荑丹 各五分 磨 連芸 各二 朴 各三分 苓 各四分 芣 各四分

右水煎按或兒面頰患瘡將蝕兩
目用清熱之藥久而不愈故用
此湯以清肝火而愈

四味肥兒丸

生瘡牙根腐爛發熱瘦弱遍身
生瘡或小便澄白腹大有青筋
而一切之疳症

連炒 蕪 曲 芽

右為末水糊丸桐子大每服四
五歲兒一二十丸空心白湯下
○或外疳鼻下赤爛宜○或兒
十歲餘已生白翳面黃浮腫口
乾便澁此肝脾之疳症用之而
痊○或兒鼻外生瘡不時搔擦
延及兩耳並小兒視物不明鼻
內生瘡疳用之漸愈○或兒面
黃頰赤發熱作渴睡中驚悸掌
心發熱遍身如疥此心經內外

之疳用之佐以秘青安神丸而
愈
九味蘆薈丸
治肝脾疳積體瘦熱渴大便不
調或瘰癧結核耳內生瘡等症
蘆薈 胡連 蜜 蕪連
青黛 雷丸 鶴蝨各一錢半
右為末蒸餅糊丸麻子大每服
歲數空心白湯下○或兒遍身
生瘡面色萎黃腹脹內熱大便
不調飲食少思倦怠口乾用之
治其肝脾而即愈○或兒耳內
出水並耳外生瘡腰水淋漓經
腎水全涸○或兒遍身口瘡疳
或痛而肌體消瘦月夜發熱口
乾作渴大便不調奔餘不愈用
之治肝兼五味異功散以補脾
而愈○或兒數歲腦後結二核
肉色如故而不畏膿正屬膀胱
經觀其形狀審其糞色兼肝脾
腎三經用之清肝脾佐用地黃
丸以補腎水形体漸健兩月內
而消○或兒膜內有塊小便不
調此肝經內有症用之佐用龍
膽瀉肝湯而消

肥兒丸
消疳化積磨疳清熱伐肝補脾

之痘用之佐以秘青安神丸而

進食殺虫潤肌膚養元氣

漫半木 茯苓三匁半 神麹 查肉 胡連 五味子 使君肉 甘草三匁 蠶砂三匁半

右為末黄米糊為餅米湯下或作丸黍米大每服二三十丸米湯下看兒大小丸数加減

七味肥兒丸

治因痘頸項結核髮稀成穗發熱口乾或食積

連翹 使君肉 蜜一、洗三匁 芫荽各五匁

異功散助胃氣或早乳飲因與食物難消脾胃虚泄瀉虫動身瘦腹大髮立発熱宜用

地黄清肺飲

治因肺痘咳嗽痰唾稠粘膠一錢 鼠粘二分 馬兜鈴 甘草各五分 徳七枚 糯米十粒

右水煎按咳嗽寒熱咽喉不利鼻上有瘡久不生痂是脾痘症用之並四味肥兒丸以愈

消痘飲

治因痘疾身熱面黄肚大青筋瘦弱

参 茯苓 胡連 曲 連

童貴　砂仁
右水煎〇若傷食加査〇若有蟲加使是諸痢症通治方也

胡黄連丸
治因熱痢下身熱肌黄痩弱大便結燥
胡連　連各半兩　蝦蟆六錢炙　麝二錢半
右飯糊丸麻子大每服一二十丸米飲送下

木香丸
治因冷痢症時時洩瀉汗出身冷或傷寒其外大病誤下後病者為熱痢久病者為冷痢
木香　檳榔　黄連　各一兩　蝦蟆三箇燒　麝一錢半
右為末蜜丸菜豆大每三五丸薄荷煎湯下按此方消痢清熱逐水破氣之劑也然云冷痢者乃陽氣虚而脾胃冷也洗續隨恐其損真陰剋伐陽氣治當審之

如聖丸
治因冷熱痢洩瀉
使一兩　胡連　蕪　連各二兩　鹿茸五錢炙　蝦蟆五箇煮杵膏
右為末以蝦蟆膏杵丸麻子大每服一二十丸空心參湯下按

此方治脾清熱之劑也若脾胃虛者當依六君子湯調補脾胃使邪氣退

立効散

治走馬牙疳

黛　犀　麝　各五倍

右研末用米泔先漱口中捻貼患處

雄黃散

治瘡後牙齦生疳蝕瘡

雄黃一分　銅綠二分

右研末量瘡大小乾摻其上按入凡疳熱上攻或瘡毒上升為患甚速名之為走馬疳輕則牙齦腐爛唇吻腮痛此方主之重則牙齦蝕落腮頰透爛不治症也

無羨散

治蟲動口內流涎

無　乾漆

右為末每五六分米飲下按此方化蟲之劑乃蟲動之因多依胃氣虛弱或聞食氣動有因脾胃虛弱者當調補中氣

追蟲散

治蟲積痛

使用肉二錢　先一錢

右剉為一劑水煎食遠服按凡腹疼口出清水虫積也

治蟲咬心痛欲絶　靈磨散

五靈芝　二錢　磨　五分

右共爲末每服二錢不拘時服即吐出蟲愈

治因上熱耳鳴或耳內痒出膿汁　蔓荊子散

露蜂房　翎　赤　蠍　雪　愛

蚯蚓　節　蔓　苓　各半

右入姜棗水煎用若膿汁出不止並末摻入耳內并可用此湯甚効

翠鳴散

治鼻瘡

芋　麝金　丹　蕗

右爲末每服一茶匙食後服

梔子清肝散

治三焦或足少陽經風熱耳內痒生瘡或出水痛

薫　丹　王　各一　茯苓　餘

芎　大力　各七分

右水煎服

仙方活命飲

治一切瘡毒未成內消或成已成潰

川山甲　芷　芸　沒　芎

赤　乳　瑞　貝　各一

金銀花　貴ネ　各三　皂刺一ネ

右每入酒水各半煎服按此方
消瘡毒排膿止痛之聖藥也若
膿出而痛不止者元氣虛也當
補之

防風通聖散

治一切風熱大便閉結小便赤
澁頭面生瘡眼目赤痛或熱極
生風舌強口噤或腸風而爲痔
漏及風熱瘡疥不痊最諸瘡腫
毒神効

芸芥芎　餘　將　芒
翹　苛　蒡　靜　朮　丹

各半錢　國　參　各一

二兩　滾三兩

右入姜水煎服一方去芒按此
方風熱之症春夏專用○或禿
瘡爲細末酒浸焙乾食後白湯
下則至頭而有汗効○或身常
發熱風疹及脚指紅腫去芒將
加大力連爲末服○或打撲者
加倍芥將加紅没

十六味流氣飲

治無名悪瘡或妙岩

芥芎　餘　芷　官　參
椹　蜜　婆　朴　奴　洗
甚　芸　圓　芽

右水煎服按此方善消無名腫

或痘後餘毒氣流於陰陽腑
毒或痘後餘毒氣流於陰陽腑
經則癰發四肢手脘並膝臗而
腫痛宜若氣血虛而自利加附
○若大便實加將
赤小豆湯
治血熱遂生瘡疥變爲腫滿或
煩或渴
赤豆 芐 商芋 翹
滌離 猪 雪
右入姜水煎食遠服按此方血
熱腫滿主之○熱甚加犀○或
小瘡多生手足至遍体太痒或
痛故以熱湯洗之則變爲腫滿
太府結爆加腹貴芩羌姜其得
效難勝計○或語曰痘後有此
症者加犀而安
五香湯
治毒氣入腹托裏若有異證於
內加減
丁香 蜜 沉 乳各一 麝
三分
右水煎空心服○若嘔去麝加
藿○若渴加參
本方去麝加藿翹各一名小五
香湯
本方去麝加藿蒯齊軟各一通
名加味五香 瘡癤無

名之膿物專治
右水煎服或觧包沸出熱湯而
服按此藥大小兒瘡毒入腹則
杜裡之方也壽法印加味五香
加連童丼而常與小兒則盛脾
胃止吐乳清心火治蟲積并瘡
癬疽疹

五香連翹湯

治一切惡瘡結核瘰癧癰疽惡
毒

消三兩 連翹 扇周 寄揩
通各三分 乳蜜 青丼
各一分 廚一半

右水煎空心服利下惡物爲度

荊芥散

因風濕丹毒一身赤治
靜　各半　水　通　各一　地　薤　艾

右水煎服

大連翹飲

治因積熱大小便不利或痘後
餘毒肢体出疹或瘡或丹瘤遊走
不止

連翹　夠　靜　通　薤　芎
芸薫　淋　蝉　甘各一　水
丹　芩各五　水煎服

同一方　治傷風感冒発熱痰
薙風熱丹毒腫痛頭項有核

赤癰瘑眼目赤腫口舌生瘡咽喉疼痛小便淋瀝胎毒或痘疹餘毒一切熱毒用之甚佳也

車前子 各八分　丹參 各四分　通草 各一分　薄荷 各一分　蟬蛻 五分　薏苡仁 各六分　木通 各一分　竹葉 十個　燈心 十莖

右剉入水煎服按此藥諸熱能清不拘時温服○若風痰熱變蒸加解之方也○若實熱丹毒加減○若胎熱痘疹餘毒加減○若癰瘑熱毒加減

治有胃中客熱牙宣口臭齒齦腫爛時出膿血飢煩不欲飲食及目赤腫痛不佳凉藥口舌生瘡咽喉腫痛及身面黄肢躰微腫大便不調小便赤澁

半夏 地骨皮 茵蔯 各等分　枇杷葉 貴甘草 各等分

右剉水煎食後臨卧服或嬰兒初生不限一七日內大小便有血出者用之地汁入蜜少許和勻温服此藥男女俱兼服尤効

乳香散

治盤腸氣痛

乳没
右共爲末木香煎湯調服
偏墜氣痛秘方
文蛤燒存性爲末
右以好酒調服汗出立愈陰腫
病氣者是寒氣所尝也
龍膽瀉肝湯
治肝經濕熱或瘡瘤便毒小便
澁滯
澤瀉五分酒 芒硝 通草 車前 各三分
右水煎服
柴朮參苓湯
治肝火血熱遍身瘙痒或起赤
筋攣或結核等症
參朮茯苓 甘草 薄荷 薰丹
芎藭 各五分 當歸 川芎 各八分
右水煎服按此藥八物湯加薰丹之方也故補氣血虛弱清肝火之劑也○或良醫一女子療其歲十餘善怒睡中驚擾遍身痒飲食少思此肝火風熱脾土侮故用此湯涼肝火血熱健脾胃平愈
抑肝散
治因肝經虛熱發擾或發熱咬牙呵欠或驚悸寒熱或肝木乘脾生而嘔吐痰涎腹脹小食睡

臥不安
薫五分　芎八分　朮　茯　釣藤各一錢五分　久

右水煎子母俱服按此方肝虛血燥而自病用宜

秘旨安神丸

治心血虛而睡中驚悸或受驚嚇而作

蓮田酸　神各一兩　滌各七錢　會五粒　甘三分

右爲末姜汁糊丸芡實大每服一丸姜湯下○若面赤驚悸身熱昏睡者心乘脾也宜用之

經旨補脾湯

治久病面黃肌瘦咬牙目劄髮稀少誤藥致

蓮　朮各一兩　滌　茯各八分　貴　芍各六分　藭　甚各四分

右入姜水煎按若木乘土而面青攪擾乳食少思者或目睛微動潮熱抽搐吐瀉不食者宜用芍藥參苓散

治因肝木尅脾土目劄面青食少躰倦

餘參　茯　朮　貴各七分　薫　丹　芎各五。

右入姜水煎按或目劄面青食少躰倦大便滑泄此肝木乘脾

土之症也用之痊

五皮湯

治四肢腫滿或陽水陰水俱用

之

腹苓皮　姜皮　蘚　五加皮

或加姜黃瓜佳也

右劉水煎一方加貫雪按此加去五加皮二味七味俱用而能風濕腫滿治

黃金丸

治吐血衄血下血俱

苓

右不拘多少為末煉蜜如雞頭實大三歲以下兒一丸鹽湯化

下

鎮驚散

治驚風搐搦痰嗽喘熱

星　芫　蝉　苛　蕗

右入姜水煎服按急驚風之主方也加減可隨其病因

瀉青丸

治因肝經實熱急驚風搐搦並面青目直視叫哭壯熱項急頰腮或有肝熱尋衣領及乱捻物或有肝風目連劄等症亦宜用

羌　蒡　芎　丹　游　芹

右為末煉蜜丸芡實大每半丸

服或竹葉煎湯入砂糖化下按
此方乃厥陰肝臟解散肌邪疎
通內蔵苦寒劑也大便秘煩渴
飲冷如常形病俱實用之可瀉
若依肝熱目赤或青並有心熱
兼發搐或筋脈牽掣而直視者
用之並導赤散宜○若身反張
強直者是肝風甚也先用地黄
丸以補腎用此丸可治肝○若
発熱抽搐口噤痰湧者急驚也
先用此丸次用六味丸
本方之內去將丹名抑青丸治
如前症大便調和煩渴飲冷病
氣實而形氣虎者

清心丸
治驚熱煩躁
浸神芸薫辰各
金箔三十
右為末煉蜜丸如桐子大每服
一二丸竹瀝調下

利驚丸
治急驚風痰抝盛
天竺黄二錢 軽粉各一
右末煉蜜丸如小豆大一丸以
苛煎湯乳食後用之按此藥必
審形病俱實可施之斬関奪門
起死回生之重剤也

紫金錠子

治急慢驚風涎潮発搐或吐或瀉不食神昏氣弱者

蓮米茯神薏乳赤石脂辰各三錢一

右爲末以糕一兩九如彈子大一金箔衣每一粒用苛煎湯研化服之

鉤藤鉤飲

治慢驚風上竄手足搐掤面色黃不渴肢体逆冷口鼻氣冷微欠便青小便白昏睡而露睛

鉤藤鉤五分蝎蝉芸蓮

草蚕鄒各二錢芍各

或加麝一豕

右水煎〇若虚寒者加附按此方辛温散表剤也上竄搐掤甚用之慢驚者因病後吐瀉或藥餌依傷損脾胃也故多以六君子湯等之藥加減消息而補脾胃可主

人參安胃散

治因嶮剤服脾胃虚損或成慢驚泄瀉嘔吐或腸胃有熱發此症

蓮米椹二錢炙同生各五分茯苓連二分餘七分

右每服二三錢水煎

醒脾散

治吐瀉不止作慢驚風脾困昏沉默々不食

參朮茯苓蜜蝎鄒
蚕白附各一方去鄒蚕
加星田陳米

右入姜棗氷煎按慢驚之主方也

烏藥順氣散

治卒中風手足不遂言語澁四肢骨節疼痛有膊痲痛筋脉拘攣及胸氣

草麻貴各二兮蚕

右入姜棗氷煎〇或因風邪經絡塞發風瘾手足痿或口喎宜用〇若口眼喎斜加連羌芎靜姜汁澼〇或治中風先服八味順氣散以順正氣次與此湯以可順表氣〇一小女五歲口喎不食此湯用十貼忽平愈

沉香天麻湯

治因恐懼發癎病搐擲痰涎有声多白睛項背強一時許脉沉微而急方醒後亦發或風癎俄發口噤身角弓反張不知人事筋急痰涎多全中風以

羌五揺四各
鄒芸田附

各三泉 益 北烏 各二并
水
蚕 茸 各一
水半
右入姜水煎〇一小兒頭面ノ
胸膈差込筋牽急右手差延上
寓口白沫出自漸醒如此毎日
発五三度或一兩度必亦発五
更時至四十餘諸醫用驚風峻
剤不應故予令視之其歳六其
面色如秋冷而多眼白睛予曰
驚癇也即用此湯而去附五六
十貼兼先師和方保童圓用而
自愈

五色丸

治五癇

辰 真珠 各五
黒鉛 三兩同 汞
結成砂
雄黄 各
兩

右爲末煉蜜丸麻子大毎服三
四丸金銀苛煎湯化下按此方
峻剤也形病俱不實者努々不
可施

消毒飲

痘初出癇容成時或疑似間用
之則解瘡毒

太力子三 静一 芸 路生各
水 半水
右水煎〇若熱甚加犀末

本方加苓一 犀五分 謂犀角
消毒飲之 治風毒赤紫丹癗
壯熱狂燥睡臥不安胸膈滿悶

咽喉腫痛九道有血妄行遍身
痘瘡既出倘甚大用之
犀　地　王　赤　各二　紫　通　各一
右水煎服若兼異症隨加病可有加減
如聖湯
痘出熱甚頭痛面赤治
赤　周　齊　各二　紫　通　各一
右入姜葱白水煎服○若皮膚肌厚熱甚痛倍餘○若心中煩悶加參茯苓
快透散
治痘且出猶皮層下線而不快
紫　蝉　參　通　芍　各一
右水煎服
紫草木香湯
痘出不快及出過半膿猶有紅點者毒氣難散故也宜用之
紫　蚕　茯　木　各一　甘草半錢
右入糯米二十粒水煎服
參茂四聖散
治痘瘡已出至六七日不起發不成膿

參 梗 术 茯 芎 餘
等 紫 通 芸 各 三 糯米
分
二百
粒

右作二十剂水煎服

陳氏木香散

痘已出而其瘡不光澤紅活不
起發或冷藥用過脾胃損出而
五七日之內泄瀉作渴或肚腹
脹氣促作喘或身雖熱而腹脹
足指冷或身熱作渴或驚悸腹脹
或汗出不止或寒戰咬牙瘡不
結痂此皆以因脾胃虛寒津液
衰少急此藥用治之

蜜 腹 參 官 苓 青

右入姜水煎按若誤而爲實熱
而用寒凉之剂及食蜜水生冷
瓜菓之類必不救慎之

十二味異功散

冬寒時痘瘡难起發及氣血虛
弱而痘白或脾胃虛冷吐瀉不
食宜用

芎 三 分 半 官 茯 术 各 二 蜜
參 貴 淡 田 喬 薏
各二分 附一分半

右入姜棗水煎〇九夏去附〇
若瘡不光澤不起發來紅活或
不結靨者表裡俱虛也若悶亂

小兒要訣 四三

煩渴吐瀉不食腹痛腹脹痰喘
氣急者表裡虛寒也急用此湯
若至十日十一日當膈不膈煩
渴吐瀉手足冷並飲沸湯而不
知熱者此陽虛脫陷也急用之
救之

芍飯湯

治心血不足瘡灰色不紅潤

芍 芹

右水煎加芍紫甲紅少而可也
○若不身熱而氣弱者加參朮
甚

十奇散

治肺金不足自汗声嗄瘡頂陷
腐肥及氣弱血氣不足痒

甚 參 芹各二 淡芍 芷
芸 圖各一 官 芎各三分

右水煎○若熱不可用○若多
汗倍甚○声嗄倍圖○食少及
瀉加朮○咽乾加麥○形氣俱
怯弱倍芹加蜜少

本方加蜜三分名內托散
治血氣虛損或風邪穢毒冲觸使
瘡毒內陷伏而不出或出而不勻快
按此方能治血氣調胃補虛
內托瘡毒使之盡出易收易靨
○若紅紫黑陷熱毒者去官
加紫紅芩○若淡白灰黑陷伏

屬虛寒者加喬救裡官救表當
要服○若不貫膿者倍參椹芍
臨服入乳汁好酒○若泄瀉加
喬永寇○痘不起發陷者表虛
也為椹參紫主加減○或瘡毒
少主之加減○若黑陷大便結
不出尽黑陷者紫通中奴小芽
黑牽大芽少細末而米飲調下
○氣弱者加蜜少

百祥丸

治痘黑陷及嗽而吐青綠水
紅牙大戟 先漿水以煮軟去骨復入元汁煮乾為末

右水丸如粟米大每服十丸赤
脂麻湯送下○或瘡黑陷耳骯冷
咬牙吐瀉者是乃脾土虛敗寒
水反侮歸腎之惡候也用之瀉
之急四君子湯以加喬貴淡永
温補脾土若身熱飲水黑陷者
復起十救一二

決明散

治痘瘡眼入而腫痛
草決明 蔌瑞 蕗

右末而食後茶清調用或菊苗
花煎服妙也

化毒丹

治胎毒及瘡後頭面生瘡眼目

腫痛
地 二門 各三錢
丹 砂 各一兩
硝 黃 各二兩
右為末煉蜜丸芡實大每服一
丸白湯化下按此方生血涼血
解毒寒中剉用之有良驗

八解散

治四時感冒傷寒傷風頭痛身
熱或嘔逆多汗者
蒼 术 貴 薑 淡
薄 荷
右入姜棗水煎服按此方諸病俱
甚發壯熱汗出不止諸藥不應
者可用此湯必有奇效或食熱

或發後發熱宜用

團參湯

治心血虛熱自汗盜汗
漫 汗
右用猪心一片水煎

參附湯

治稟賦不足上氣喘急自汗盜
汗或久病陽氣脫陷急宜用之
參五錢附一兩
右入羌水煎按六陽虛汗者上
至頭下至項難治乃稟賦不足
症若此湯用亦有生者

當歸六黃湯

治血氣不足虛火內動盜汗不

正芎 梔子 屠蘇 連翹 生地

右水煎服

木瓜丸

治生下吐

蜜 麝 臘粉 洗

右末麵糊丸黍米大每服十丸
井湯化下按此症多因雜娠
胃經有熱或欝痰所致當審其
母治

掌中散

治乳食吐

砂 各七粒 多 路半錢

右細末而服之

花火膏

治夜啼 燈花一味

右塗乳上令兒吮之夜啼者脾
臟冷而痛也當與温中劑或益
黃散之類宜

或因心熱有夜啼者 參 連 各
井少竹葉十片右生姜入水煎服

蟬蛻鈎藤散

治腹疾驚啼

鈎藤 蟬 各一錢 蚱 各一 芎 餘 各二

右每服一錢入燈心水煎服

枯礬散

因前腑帶外傷風邪以成腑瘡
不乾汨之
枯礬 龍骨
右共爲細末摻腑上
香螺膏
治腑風腫硬如盤
田螺三個搗爛麝少
右捨腑上須臾再易腫痛立消
令舌強唇青聚口噤
撮口者
聲不出齒齦上有小泡子如粟
米狀急以温水蘸青綿布裹揩
拭輕擦破即開口便安若不愈
者蚕炒末而去觜煉蜜調口中
塗若甚者用牛黄一分竹瀝調
入口中即愈
當歸連翹湯
治心脾有熱而生重舌
近 軟 芷各三 將 蕗各一錢
右剉水煎食後頻服
調元散
治稟受元氣不足顧顙開解肌
肉消瘦腹大而腫語遲行遲手
足如尫神色昏慢齒遲
蕷五錢 參 茯 神各二 木 餘
芹 芎 椹各二 陽一錢
半 一錢
名人姜東水煎不拘時嬰兒乳
母共服 或水浴顧陷黄衂頭

小兒要方　四字右

骨焙黃色末雞子汁調貼之或
水煮塡芸栢子白芨此三味末
乳汁調敷之

治心氣不足不能言語
菖蒲丸
陽赤石銭各三　參銭五　丹參二銭
二門兩各一

右爲末蜜丸菉豆大每服廿丸
若病後腎虛不語宜六味丸
○用

同一方　陽參　愛芍遠
芹乳硃

右丸如前方食遠米飲送下

羚羊角丸

茯各五銭　官芸　芹　椹各二銭半

右末煉蜜丸皂子大一粒白湯
化下

胎熱治

嬰兒生下而身熱面色赤眼
閉口中氣熱煩啼燥熱也胎
熱胎寒者稟受有病也

黑豆二銭　路一銭　竹葉五個

右剉一劑燈草七根水煎頻頻
少進乘令乳母多服之

胎寒治

母孕時受寒兒生下而面色

青白四肢厥冷大便青黑口
冷腹痛身起寒慄
并櫬官芩細龍骨
餘

右爲末每服一字乳汁調下
龜胃龜背者由兒生下風客
於脊入於骨髓成龜背若腑
熱腑滿攻於胸膈成龜胸者
用龜尿點其骨節自愈

右取尿法 青蓮葉上在龜用
鏡照之其尿自出

右全卷者古今出良
醫各各小兒醫自有其
効以來爲肝要用之
菜方以則編集而今
名小兒要方之畢

皆寛文四甲辰五月吉祥日新刊行
平田長左衛門