

傷寒論



滓濕服外。○太陽病發汗遂漏不止其人惡風小便難四肢微  
急難以屈伸者桂枝加附子湯主之。桂枝去芍藥甘草  
芍藥 生姜切太東十二枚 附子一枚 炮去皮破八片  
右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升。○太陽病下之後  
脈促芤滿者桂枝去芍藥湯主之。桂枝去芍藥  
生姜切太東十二枚 右四味以水七升煮取三升去滓溫  
服一升。○服桂枝湯或下之後微仍頭項強痛翕翕發熱無  
汗心下滿微小便不利者桂枝去桂枝加白朮茯苓湯主  
之。芍藥 甘草炙 生薑切 太東十二枚 芍藥切 白朮切 茯苓切  
右六味以水七升煮取三升去滓溫服一升。○服桂枝湯不出汗  
後太煩渴脈不解脈洪大者白虎加人參湯主之。

傷寒脈浮自汗出小便數心煩微惡寒脚痺身急反服桂枝湯  
得之便厥咽中乾煩躁吐逆者與甘草乾姜湯以復其陽若厥愈  
者與芍藥甘草湯以其脚伸若胃氣不和譫語者豈調胃承  
氣湯若重發汗者四逆湯主之。甘草 芍藥切 乾姜切  
右二味以水三升煮取一升二合去滓分溫再服。芍藥 甘草切  
芍藥切 甘草切 右二味以水五升煮取二升五合去滓分溫三服。  
○太陽病項背強几几無汗惡風者葛根湯主之。葛根  
麻黃切 芍藥切 桂枝切 甘草切 芍藥切 甘草切 生薑切  
太東十二枚 右七味以水一斗先煮麻黃根麻黃減二升  
去白沫內諸藥煮取三升去滓溫服一升。○太陽與陽明  
合病者心自下利葛根湯主之。○太陽與陽明合病不下

利但嘔者葛根加半夏湯主之 葛根四兩 麻黃三兩去節 生薑五兩

桂枝湯去皮芍藥三兩甘草二兩 右四味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去

半夏半升洗 右八味以水一斗先煮葛根麻黃減二升去 白沫內諸藥煮取一升

滓溫服一升 太陽病發熱身疼 腰痛骨節疼痛惡風無汗而喘者麻黃湯主之 麻黃三兩 芍藥三兩 甘草二兩 杏仁七十箇去皮尖

節桂枝三兩去皮 甘草二兩 杏仁七十箇去皮尖 右四味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取二升半去

滓溫服八合 太陽中風脈浮數發熱惡寒身疼痛不汗出而 煩躁者青龍湯主之 麻黃三兩 芍藥三兩 桂枝三兩去皮 甘草二兩 杏仁四十箇去皮尖 生薑三兩切 太棗十枚擘 石膏如鷄子大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫內諸藥煮取三升去

滓溫服一升 傷寒脈浮絛身不疼但重乍有輕時無小陰證者青

龍湯發之 發汗若下之後晝日煩躁不得眠夜而妄靜不嘔不

渴脈沉微身無大熱者乾姜附子湯主之 干姜三兩 附子一枚生用去皮

破片 右二味以水三升煮取一升分溫服再服 發汗後汗

出而喘無大熱者麻黃甘草杏仁石膏湯主之 麻黃四兩去節 甘草二兩 石膏半斤 碎 右四味以水九升先煮麻黃減二升去

上沫內諸藥煮取一升去滓溫服一升 發汗後臍下悸欲作

奔豚者茯苓桂枝甘草太棗湯主之 茯苓半斤 桂枝三兩 甘草二兩 太棗十枚擘 右四味以甘爛水一斗先煮茯苓

減二升內諸藥煮取一升去滓溫服一升 發汗若下之

後心下逆滿氣上衝胃起則頭眩者茯苓桂枝甘草白朮

湯主之 茯苓四兩桂枝三兩去皮甘草二兩炙白朮二兩

右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升○發汗若下之後

煩躁者茯苓四兩湯主之 茯苓四兩甘草二兩炙干姜二兩半

附子一枚生用去皮破八片人參三兩 右五味以水三升煮取一升

二合去滓分溫再服○發汗若下之後反惡寒者虛也芍藥甘

草附子湯主之但熱者實也應調胃承氣湯 芍藥三兩

甘竹三兩炙附子一枚炮去皮破八片 右三味以水五升煮取五

合去滓分溫三服 大黃四兩酒洗 甘草三兩炙芒消半升

右三味以水三升煮取一升去滓內芒消更煮兩沸頓服

○發汗若下之後虛煩不得眠若實劇者必反覆顛倒心中

懊懣梔子豉湯主之若少氣者梔子甘草豉湯主之若嘔者

梔子生薑豉湯主之 梔子十四箇擘 香豉四合綿裹

右二味以水四升先煮梔子得三升半內豉煮取一升半去滓分為

二服溫進一服 梔子十四箇擘 甘竹三兩 香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子甘竹得三升半內豉煮取一升半去滓

分為二服溫進一服 梔子十四箇擘生薑五兩香豉四合綿裹

右三味以水四升先煮梔子生薑得三升半內豉煮取一升半去

滓分為二服溫進一服○太陽病發汗汗出後其人仍發熱心下

悸頭眩身憊動振者欲擗地脉沈遲者真武湯主之

傷寒中風往來寒熱胃苦滿嘔不飲飲食心煩喜嘔

或胃中煩而不嘔或渴或腹中痛或脅下痞鞭或心下悸小便

不利或不渴身有微熱或欬者 小柴胡湯主之

柴胡半斤 黃芩二兩 芍藥二兩 甘草二兩 枳實二兩 大棗十二枚

黃芩三兩 半夏半升洗 生姜三兩切 人參三兩 甘草三兩炙  
太東十二枚擘 右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取  
三升溫服一升日三服 ○傷寒身熱惡風頸項強脊下滿手足  
溫而渴者小柴胡湯主之 ○傷寒陽脈滿陽脈弦法當腹中  
急言痛先與小建中湯不愈者小柴胡湯主之 桂枝三兩去皮  
芍藥三兩 甘草三兩炙 生姜三兩切 太東十二枚擘 膠飮一升  
右六味以水七升煮取三升去滓內飮更上微火消解溫服一升  
○傷寒心中悸而煩者建中湯主之 ○太陽病反二三下之後嘔不止  
心下急鬱鬱微煩者太柴胡湯主之 柴胡半斤 黃芩二兩  
半夏半升 生姜三兩 芍藥三兩 枳實四枚炙 太東十二枚擘  
右七味以水一斗二升煮取六升去滓再煎取三升溫服一升

日二服 ○太陽病熱結膀胱其人如狂血自下下者愈但少腹  
急結者與桃仁承氣湯 桃仁五十箇去皮尖 大黃四兩酒洗  
甘草三兩炙 芒硝三兩 桂枝三兩去皮 右五味以水七升煮取三  
升半去滓內芒硝更上微火一兩沸溫服五合 ○傷寒結胸  
熱實脈沉緊心下病按之石鞭者與陷胸湯主之  
大黃三兩酒洗 芒硝二升 甘草二兩 右三味以水六升先煮大黃  
取二升去滓內芒硝煮一兩沸內甘草未溫服一升 ○太陽病發  
汗而復下之後舌上燥渴日晡所發潮熱後心下至小腹鞭滿  
痛不可近者陷胸湯主之 ○傷寒發汗而復下之後旬月  
脇滿微結小便不利渴而不嘔但頭汗出往來寒熱心煩者  
柴胡湯桂枝湯姜湯主之 柴胡半斤 黃芩三兩 牡蠣三兩熬

括蕒根三兩 桂枝三兩 芍藥三兩 甘草三兩 炙 朝姜一兩 右七味  
 以水一斗二升 煮取六升 去滓 再煎 取三升 溫服一升 日三服  
 ○太陽病發汗而復下之後 心下滿 鞞痛者 為結胸 但滿而  
 不痛者 為痞 半夏瀉心湯主之 半夏半升 洗 黃連三兩  
 黃芩三兩 人參 乾薑各三兩 甘草二兩 炙 太東十二枚 擘  
 右七味 以水一斗 煮取六升 去滓 再煎 取三升 溫服一升 日三服  
 ○太陽中風下利 嘔逆 發作 有時 頭痛 心下痞 鞞滿 引脅下痛  
 乾嘔 短氣 汗出不惡風者 表解裏未和也 十棗湯主之  
 太東十二枚 擘 芫花熬末 甘遂末 大戟末 右四味 以水一升 半  
 先煮太東 取一升 去滓 內諸藥末 等分 二兩 溫服 ○傷寒汗  
 出 解之後 胃中不和 心下痞 鞞乾噎 食臭 膈下有水 心  
 腹中雷鳴 下利者 生姜瀉心湯主之 生姜四兩 切 黃連三兩

黃芩三兩 人參三兩 甘草三兩 炙 太東十二枚 擘 半夏半升 洗  
 右七味 以水一斗 煮取六升 去滓 再煎 取三升 溫服一升 日三服  
 ○傷寒中風 反二三下之後 其人下利 日數十行 穀不化 腹中  
 雷鳴 心下痞 鞞滿 乾嘔 心煩 不得安者 甘草瀉心湯主之  
 甘草四兩 炙 黃連 黃芩 乾薑各三兩 太東十二枚 擘  
 半夏半升 洗 右六味 以水一斗 煮取三升 去滓 再煎 取三升  
 溫服一升 日三服 ○傷寒 胃中有熱 胃中有邪氣 腹中痛  
 欲嘔吐者 黃連湯主之 黃連三兩 人參 乾薑各三兩  
 桂枝三兩 炙 甘草三兩 炙 太東十二枚 擘 半夏半升 洗  
 右七味 以水一斗 煮取三升 去滓 溫服一升 ○太陽與少

陽合病自下利者黃芩湯主之若嘔者黃芩加半夏  
生姜湯主之 黃芩 芍藥各四兩 甘草二兩炙 太東十二枚擘  
右四味以水一斗煮取三升去滓溫服一升 黃芩 芍藥  
各三兩 甘草二兩炙 太東十二枚擘 半夏半升洗 生姜五兩  
右六味以水一斗煮取三升去滓溫服一升 ○傷寒脈浮滑  
表有熱裏有寒者白虎湯主之 石膏一斤碎 知母六兩  
甘草二兩炙 粳米六合 右四味以水一斗煮粳米熟湯成去滓溫  
服一升 ○傷寒下後不解熱結有裏表裏但熱時令惡風  
本大渴舌上乾燥而煩欲飲水數升者白虎加人參湯  
石膏一斤碎 知母六兩 甘草二兩炙 粳米六合 人參二兩  
右五味以水一斗煮粳米熟湯成去滓溫服一升

○傷寒無大熱口煩渴心煩背微惡寒者白虎加人參湯主  
之

陽明之為病胃實也

○陽明病發熱汗出譫語者大承氣湯主之 大黃四兩酒洗  
厚朴半斤炙去皮 枳實五枚炙 芒硝三合 右四味以水一斗先  
煮厚朴枳實取五升內大黃更煮取三升去滓內芒硝更上微  
火而沸分溫再服 ○陽明病發熱但頭汗出渴少便不利者  
身必發黃茵陳蒿湯主之 茵陳蒿六兩 梔子十四箇擘  
大黃二兩酒洗 右三味以水一斗二升先煮茵陳蒿減六升內梔  
子大黃煮取三升去滓分溫三服 ○三陽合病腹滿身重難  
以轉側口不仁面垢遺尿發汗譫語下之額上生汗手足逆冷

若自汗出者白虎湯主之  
少陽之為病口苦咽乾目眩也

太陰之為病腹滿而吐自利也

太陰病腹滿而吐食不下自利益甚時腹自痛者桂枝加芍

藥湯主之大實痛者桂枝加芍藥大黃湯主之桂枝三兩去良

芍藥三兩甘竹二兩炙生薑二兩切太棗十二枚擘右五味以水

七升煮取三升去滓溫服一升桂枝三兩去良芍藥三兩甘草

二兩炙生薑二兩切太棗十二枚擘大黃二兩酒洗右六味以水七

升煮取三升去滓溫服一升

小陰之為病脈微細但欲寐也

小陰病心中煩不得眠者黃連阿膠湯主之黃連四兩黃芩

二兩芍藥三兩雞子黃二枚阿膠三兩右五味以水六升先

煮三物取二升去滓切肉膠解盡小冷內雞子黃攪令相得溫

服七合日三服○小陰病口中和其背惡寒者附子湯主之

附子二枚炮去皮破八片白朮茯苓芍藥各三兩人蔘二兩

右五味以水八升煮取三升去滓溫服八合日三服○小陰病

身體疼手足寒骨節痛脈沉者附子湯主之○小陰病下利

便膿血者桃花湯主之赤石脂一斤干姜一斤全用

粳米一升右三味以水七升煮取三升去滓溫服八合日三服○小陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

吳茱萸湯主之吳茱萸一升人蔘三兩太棗十二枚擘生薑六兩

右三味以水七升煮取三升去滓溫服八合日三服○小陰病吐利手足逆冷煩躁欲死者

吳茱萸湯主之吳茱萸一升人蔘三兩太棗十二枚擘生薑六兩

右四味以水七升煮取二升去滓温服七合日三服。○小陰  
病咽痛者甘草湯主之。甘草二兩。右一味以水三升煮取一  
升二合去滓温服七合日三服。○小陰病下利者白通湯主之  
葱白四莖 乾姜二兩半 附子生用去皮破八片。右三味以水三升  
煮取一升二合去滓分温再服。○小陰病腹痛少便利四肢沉  
重疼痛自下或欬或小便利或不下利嘔者真武湯主之  
白朮二兩 茯苓 芍藥 各三兩 生薑 五兩 切 附子一枚炮去皮破八片  
右五味以水八升煮取二升去滓温服七合日三服。○少陰病下  
利清穀裏寒外熱手足厥逆脈微欲絕身反不惡寒其人  
面赤色或腹痛或乾嘔或咽痛或利止脈不出者通脈四逆  
湯主之。甘草二兩炙 附子一枚生用去皮破八片 乾姜三兩。右三味

以水三升煮取一升二合去滓分温再服。○小陰病下利欬而嘔嘔  
嘔渴心煩不得眠者猪苓湯主之。猪苓二兩 澤瀉二兩 茯苓二兩  
阿膠二兩滑石二兩。右五味以水六升煮取二升去滓内阿膠烱  
盡温服七合日三服。○小陰病脈沉者宜四逆湯。甘草二兩炙  
乾姜二兩半 附子一枚生用去皮破八片。右三味以水三升煮取一升二  
合去滓分温再服。

厥陰之為病消渴氣上撞心中疼熱飢而不欲食食良則  
吐下之利不止。○發汗若下之後煩熱自中窒者梔子豉湯  
主之。○傷寒脈沉厥者裏有寒白虎湯主之。

四十五 五十五  
六十四 五十

唐貞元乙酉歲

康治二年亥九月書

沙門了絕


孫思邈曰悟唐同人也勝欲大而心欲小智欲圓而行欲方可以為

法矣

願擁肉蒲團溫柔解重衣

瘡哉禿顯況亢顏說煩惱





意齋書



完

松園意齋書

松園

意齋

書

卷一

一

二

三

四

松田意齋

松田意齋

以意齋仁ハ

大猷院極ノ御時代ノ診法ノ達人ニテ至極ヨリ  
合点シタル人ニテ凡人ニテモナク異人ナリ其上鍼ノ妙手  
ニテ日本ナク歩鍼ノヒナリ之依其時分ハ何荒者  
ニテモ意齋ノ弟子ニテラ子バナラヌ一ノ極ナリタル  
一ナリ我曾祖父道和ト云ハ  
公義ニ名ヲ置シ  
穿人ニテ本姓森ヲ不名ニ宗少田道和トテ云々  
門下ニ居テ鍼術モ少ハ終以シテ九ナリ依道和ノ子  
我祖父仲和ヲハ意齋ヘ委シテ門人ニシテラカレ  
タル之ヨツテ意齋ノ診法版行ハ仲和至極

合点シタルナリナリ多クノ月子ニテ其時分名アル漢卷  
ノ江月ノ甲斐及十トモヨク月子ニテ鍼法ヲ習授  
イタラレタリ其内俗ニテ我曾祖父ノ兄所田九郎高  
ト云人ニ意齊ノ弟子ノ中ニテハ能合点シタル人ニ意  
齊ノ門人ニテハ所田九郎高ノ道知奥田九郎高以テ人  
中子中ニテノ能人ト右所田九郎高ヲ小出伝澤ノ孫  
ニテ子名ニテノ家老ヲ召抱ルアル時

大藏院桶前 御前所云此世トモ其方ハ此交能キ  
家老ヲ召抱ル由彼ハカリニ蘇云ニ針ヲ至テ能治ハ  
以 上意齊ノ水者支ヨリ 御下城後右所田九郎  
ヲ召シテ方後ハカリニ能云有ク也我ニナリ只云云

致クシ水飲ニ作ル所所田氏振針ニタリケレハ殊ノ外  
ナル御持針ナリト云フアリ 本令ノ小出家ニ所田家ノ  
子孫アリ初ニ意齊ノ振治ノ法他家ニナキトシ  
先服治ハ我ホ家ヨリ外ニ必至ト無キトシ先心得  
ヲルヘキトシオテウキナリノ一モ初ノハ扇子ナトニテ  
ウタシタルナリトシ元トカク推ラカミラヘテト思ハレテエ  
丈致ラシケル其時分ハ推ノキツ所幅六分持ツ取  
長オ二寸五分ニノ推ラウツ所ハナリヲ入テ釋ニテ  
撰ミシハ六分ニ是カ推タル法ナリ 鍼ハ昔ハ龍頭可  
穂二寸ニテタテタルモノニ 倅意齊ノ之流儀ハ外ニ  
一人モ知タル人ナシ 及仙ニモ意齊ノ傳授ハナキナリナテ

コノ衰衰死キハ時ニアルトキ弟子トモツヨビ我ハモハヤ  
死ト云何ソ聞キトモアラハ可聞ト云フ弟子トモ不信  
食事ホモ然ククヘラレケルユヘ申ク死ヌル事ハアルコ  
キト思ヒ居ケルカ六七日モ過<sup>ス</sup>ル<sup>ル</sup>今日要事  
コアルアイト何用アワテモ申間敷由ニテ一間へ入盃  
過ニテ虫申オスユヘアラアケレシハ安座ニテ死ナシ  
ケルト云ミカクミシハ異人ナリナテ 鉄ハリハ能ク  
人ニキクモノナリシカレ下子ニバタテ、アヤウキモノ  
ユヘ金銀ノ鐵モ玄斎ハシメテ持ヘタルト之病人ヲ  
ニテ腎間ノ動氣ヲトクト合点セ子ハタシカオラス  
生死ハシレヌト之先意<sup>ス</sup>時分ハ人々ノ了<sup>ル</sup>管<sup>ヲ</sup>更<sup>テ</sup>

云ト之自己ノ精神ヲオサムル<sup>ト</sup>ガナラ子ハ人ノ生死病  
苦ハシレヌナリ入門ノ作者李誕<sup>ニ</sup>シ能念点イタサシト  
見ヘテ入内ノ初巻以我身大極驗人身大極トアリ是  
我身ノ大極トハ精神ノ胃間ノ動<sup>ノ</sup>ニサテ其ヲサシヤウ  
コシラヘルヤウニタタ<sup>ト</sup>年心<sup>ヲ</sup>截<sup>ク</sup>ニサテ此修<sup>ル</sup>行<sup>ハ</sup>致  
シラセサヘスレハ食傷時疫ナトニテ死ヌル<sup>ト</sup>ハナキ  
免<sup>ル</sup>免<sup>ル</sup>死ヌル<sup>ト</sup>ニテ修<sup>ル</sup>行<sup>ハ</sup>更<sup>ニ</sup>ヌル<sup>ト</sup>ト思ヘキ<sup>ト</sup>  
大極ト云ハ人々天ヨリ受得タル先天ノ元氣<sup>ニ</sup>  
道<sup>ノ</sup>氣<sup>ニ</sup> 一層一層<sup>ノ</sup>道<sup>ノ</sup>コレカ<sup>ニ</sup>意<sup>ヲ</sup>多<sup>ク</sup>取<sup>ル</sup>道<sup>ノ</sup>氣<sup>ニ</sup>原<sup>ハ</sup>此<sup>ニ</sup>  
剛火<sup>ハ</sup>水<sup>中</sup>ニ火<sup>アリ</sup>不<sup>消</sup>不<sup>滅</sup>水<sup>中</sup>ニ有<sup>ル</sup>光<sup>離</sup>也<sup>陽</sup>中<sup>ニ</sup>有<sup>ル</sup>陰<sup>也</sup>  
水<sup>中</sup>ニ有<sup>ル</sup>暗<sup>也</sup>坎<sup>ナリ</sup>

腎間動氣

難經八ノ難六十六難ニ始テ腎下腎間之動氣ト云リ  
虞天氏ハ腎間ノ動ハ氣海丹田ト云リコレモ其元キ一ノ  
崇越人ハ能ク攸得ラシタルニハ膝下腎間ノ動氣  
ト云リ膝下ノ下字膝ノ中左右下腎間之動氣ト云  
点スル一ニホテ此剛火生命ヲツナヒテラル火ナリ虚極  
雜病一氣逆上刺膺中屋脊之陷與下胸部脈張分巖、  
注下胸動脈ハ手大陰中府ノ穴ニトアリカテ膝下  
腎間ノ動氣アルヘキナリ右ヘヨリ動スル一ハ火ノヒタル  
タルト思フヘキナリ蓋在中曰日胸之  
動ヲ印留之下耳  
精神ヲホカサルニ危ニ終乃チ支スル一ナレト云

々疑ヒモルモノナリ其ウタカイノウチニモ煉熟スレハ脐

下ニ安在スル一モアルナリトカク多年終行スヘキ一也

大極 天ヨリ受得タル所大極ヨリ陰陽ヲ生シ陰

陽ヨリ氣血ヲ生スルト云々ヘキナリオテ人

間ノ軀内五内ニコレカ大極トキワケリタル形ハナキ

一ニオテ精神ヲホカサルト云一ハ何事モ

無キ一ニ素門精神内守病從何来ト云

一カ切ナリ

松園意齋

大猷院標 御時代ニ以テ日本歩鍼之祖也右金  
鍼銀鍼ニ意不之エ支ヨリ持ヌタル一也

意亦入門人 加茂甲斐強河十トモ門人 町田九郎 奥田九郎  
道和 大徳寺 江ノ智 澤庵和尚 腹診ヲ會得シラレ  
其外門人不知教アリケレトトク腹診ヲ會得シラレ  
人ニナリ

ノ家老ナリ

真田九郎 未詳

森道和

隨故森氏ニ  
改ハ京都ニ  
住ス中虛先生  
曾祖也

同 仲和

道和ノ子ニ仲和診法ヲ受ケテ  
診法計例ヲ撰

同 雲竹

仲和ノ子ニ雲竹診法ヲ受ケテ  
人ノ死生吉凶ヲ察シ五雲子門下ニ  
アツテ一人ナリ

同 養竹

又雲竹トモ云雲竹之子ニ初便仙  
養竹トモ云養竹トモ云

内ト改ハ自ら申虚ト号ス察生  
死吉凶恰如神是予カ師也

京都味田三伯ニモ腹診ノ傳アリ然レアラキナリ  
自分ノ家ニアル桶ニ思凡本ハ意ニ腎ノ傳ヲエタルモノナリ  
火有心君火也腎ニアレハ剛火ナリト思ヘ

腹 砭腎

内經ニ不見難經三十六難ニ初テ在ニカレトモ

右ノ命門ヲ相火ト云フハイワズ王叔和始テ

云又左腎右腎之ニ中ヲ命門ト赤水

玄珠バアリ此說真是ナリ 意亦ノ時

分未赤水玄珠ハ不渡ニカレトモ能ハ

云フハ自然ト同一ナル者ナリ

君火ハ心火ナリ相火ハ心包絡ニト云説先生子誥

腹動氣

右ハ心ハ惡シ、如何ナレハ術部ニ火剋金ニ  
脣上ハ心ノタカテリナリト知ルヘシ

夫動氣ハ押シテシシ又ミヨウニ袋ニ水ヲ入テ其ク  
ヲスカ知ク何モナク自然トシテ有動氣  
ノ有力無カバヨキニ鳩尾スキテ下フクナレ  
ヨシトスルナリ今ノ医ハ腹ノカタニ有ラフヨ  
シトスルナリ硬ハ賁豚モアリ又腎氣カ  
ワイテカタニリタルモノアリ又病氣ハ寸口  
人迎ニトシクウワラ上トス素門ニニニナク  
クトテトタシニ寸口ト人迎ト跣陽トナカクハ

ナリ道ニ道中ノ原カ吉原カノ宿ニ泊リテ寸  
口人迎ノ脈ノチカイヲ見テ其夜ノツヤニ  
知ル又兵法ニ寸口人迎齊ヲヨシトストクニ  
ナルヲ凶トスルナリアリコレニテ知ヘシ大實極  
虚ノ者ハ動氣ウコカスソウタイシツニリテ  
アルモノナリ

素少ノ詔ニ動<sup>氣</sup>冲和ニシテ助<sup>下</sup>成元氣アリ  
冲モ和ナリト動氣鳩尾先キ中院ニテ電リ凡  
ヨウニチラ<sup>く</sup>スルハ針ア<sup>シ</sup>ツイシスル者ナリ食  
傷霍乱ニハアルモノナリソレハヨシ上<sup>ニ</sup>痲痺風熱  
ニハ針シテモヨシ中院ヨリ上ニ痲痺アリ禁々然

タルハ脾胃ノ大虚ナリ死症ノ初気ヲ見タクハ一丁  
程カケサセテソノ人ノ動気ヲ見テ知ルヘシ意ニ  
タトヘナリ又塊ニツイテ動気ハ何方ニ有モヨシ  
又動気春夏ハ浮フモノヨシ春夏ハ脈ノヘリタ  
モノ故動気浮モノヨシ伏陰在內ノ語ノトナリナリ  
秋冬ハ脈フツクリトシタルヨシ動気在内而深  
針ニモ真心アリテ淺深ヲ分ニ茶ノ相應セヌラ脈  
ニテ知ハ兩脇ヨリ鳩ノ尾先キヒキアケタルヨウニナリ  
込ハナリ補薬ウケヌハコレ和柔ウケズハト了了ス  
ヘシ又ウチキナ死スヨウナ面色ナル又弱キモノ鳩  
尾ニテナリクヌル動気折々アツテ脈脊ニツキタルハ  
後カナラスキナカイニナルモノナリ耳ニテ可聞習事

診法之要

探道氣中病氣 探病氣中之道氣而以死生定吉凶  
臟府之部位

脈ニテ臟腑ヲ定ムル一文字盲不智ノ者意ニ始テ更  
シタルヤウニテナシ先人ハ南面スルモノナレト云ハ所ホ右  
ハ肺金心ノ下水方心小腸脈下丹田氣海モ腎  
膀胱水之脈ヲ中央ト見タルモノナリ又難終五  
十六難ニ五臟癩ヲ分テ論シタリ  
所ノ積名ニ曰肥氣<sup>在</sup>左掖下ニ如覆杯心ノ積名曰伏起  
脈上大ナリ如臂得之積名曰息責在右脇下ニイタリ

若豚状 内經刺禁論肝ハ生於左 肺ハ藏於右  
心部於表 腎治於裏 脾爲之便 胃爲之市 肝ハ木ニシテ發生スルニ生スト云 肺ハ金ナレハ藏ト云  
心ハ表シトハ表ハ上ト云 心ハ腎ハ裏ニハ下ト云 意ハ  
稀ハ使ナリ 便トハ肝ハ心腎ノ使ヒナリ 胃ハ市ナリ  
トハ物ヲイノアワセル市町ト同一之所ハ發生スル  
臟ナレハ隨分シワセリカニ肺ハ金ナレハヤハラカナル  
カヨキナリ

平人ノ脈ヲ診スルニ左ノ方必癆瘵ホアルハカハ  
ワヌトシ右ニアルハ大ニアシ、オテ右ノ方天樞胃經  
ヤハラカニテ左ニハ何カ有テコレヨキ脈ナリオテ又左

ノ方積或動氣ニテモ右ヘウワルト云ハ大ニ要症ニ  
オテ人ノ生先病若ク安ホセト思フニハ先我カ精  
神ヲオサスルヲトクトカテニセ子ハナラヌソ

内經四失論ニ所以石十全者精神不專 志意不  
理 外内相失 故時ニ疑 殆

可テ此專ト云ウ子衰ハモツハラソレハカリノトニ  
医者ノ精神定ムルトニ

易ニ專車ト云ハ鬼ノ骨ハカリ積ニクルヲ云トニ  
ソレハカリ云トニ精神トハ内ノモノハカリナリ 意  
ハ外ニ 外内相失 外ハ氣ナリ 内ハ精神ニ  
志意不理 スキメト見タルモノナリニカレモ我ハ

志意不治ト治ノ字見タリヲオヒラフト云方ヨ  
シコレ中虚ノ發明之又昂液醪醴論精神不  
治故病不可愈ス、ムト云モ專ト云モ根同ニ事之  
ヤウ成一之如是ヲオヒラフトアレハヲオヒラフト方ヨシ  
一常ノ脈ヲ見ニモ大小便ノツヅタリタルヲ見ニハ見ニク  
キモノナリ其外大ニ笑大ニ泣ワキ大ニ汗キ振シタル  
ハ見ニクキモノナリカヨウノ一モトクトフ年ヲ上ニテ  
診スヘキ一ニオテ脈ヲ先ニ我手ト彼ノ者ノ脈ノ皮  
ツクヲ浮ト云皮ト手ト、クトツクハ中ニ我カノ手ノ  
骨ニシカリトアタルヲ沈ト云オテ見振ハ鳩尾ノ先  
手ヲ口ニ其ヨリ天樞直リ九右共ニ診オテ脈ヲウ  
ウカノ一右上下左右ヲウカユウ之末ニ虚里ノ動ヲ  
診スヘシオテハラ肉モ皮モ骨キカヨシ脈ハ二ツリヤ  
ワラカニ脈中堅クアルカヨシ脈下ニワリヤワラカ、  
ヨシ順之コレ水ツウナレハ之腹ノ皮ヒタル人ハ脈弱  
カニ医ノ手ニアタルモノナリ針オラヌ膝固ノゲヤク  
トシタルハアミ、カタキハ脾虚ニヒツハツタルハ大ニアミ  
ヒツハルト云ハ細クヒツルナリ鳩尾隨分スキキ  
カヨシ鳩尾實シテ按コトノハアルハ熱火ノ起ルカ痰功  
ノ胃モヨハキカヨシカクキハ食傷脾胃ノ虚  
一人ノ大事ニスルハ臍下一寸四方ニ為ニ陰陽傷死生  
ノ源水火ノ根ニ

左腎ハ 為真陰至 右腎為元陽根

氣海天地造化之焦之源

脈ヲハ腹ノ中ト見テ脾胃ヲ診シテ事難經十六

難ニアリ 脾脈内證當齊有動氣ト云々

脐ハ一身之根蒂人ホツハ堅シテ四ミタルカ

ヨシ膝肉脉ヨリ一寸五分ヲ云

胃府 鳩尾ヨリ二寸五分下ヲ云

脾府 胃府ヨリ一寸五分ヲ云

三焦 脐ヨリ一寸五分下ヲ云氣海ノ鳥ナリ

元氣 三焦有餘ハ血塊之癥瘕トス不足無物虛ニ

根本 元氣ヨリ一寸五分下ヲ云根本有餘ハ

肺先 鳩尾ノ脈章門ニテ間ヲ云肺先有餘ハ

脾募 脾命而肺ヲ云脾募有餘ハ為虛疾

兩腎 脐ノ兩傍ヲ云

膝肉 鳩尾胃府ノ兩傍而腎ニテノ左右ノ取立筋ヲ云

鳩尾 有餘ハ熱咳虫トス鳩尾ノ兩傍有餘ハ血病

中虚先生發病人ノ腹ニ丸ニテモ右ニテモ腹下ニ海

死スル之ヲ年談ニシテ大カタハ死スル之トクト考ミル

ハキナナリ

脉下ハ總ニ焦ト云ハ才ノ根ノ如ク根本ニ入ニ焦ト云  
 難經六十三然五臟命者三焦所行氣所留止也三  
 焦所行之命為源者何也然所下腎門動氣  
 者生命也十三經ノ根本之故名曰原之焦ハ原氣  
 之別使也云コノ原ト上ノ留止ノ止字トニ意ヲ  
 付テミレハ脈ノこ中ハ脈ニ脾胃中央ト同美之  
 脉下ハ腎部之シカレニ傷寒論七卷霍乱門ニ理中  
 湯方後脉上築者ハ腎氣ノ動氣スル之云求加  
 桂枝四兩サテ以脉ノ上ト云ハ脉下脉上ノ上ニハア  
 夏ハ俗ニ云脉ノ上ト云ト之脉上ニ動氣ツキノホルハ  
 中ニ理中云求加桂湯トトニテハイカヌト之脉上  
 氣スルハ腎氣ノミタレ必死也然ハ脉ニテ腎部モ  
 伺又脾胃ノ事モ診スルト之脉下ノ動氣上ヘアカルハ  
 相火ノミタレナリ諸濟下ノ痰ハ脾胃ノ虛トアリ  
 東垣ノ云ヘルトアリ如脉下痛者加真熱地  
 黃其痛立止コレ益氣湯ニサ下ヲ加ルト之益氣  
 氣藥地黃腎茶ナレハナリ  
 脈ノ内ニ十二支ヲ立ル  
 右ノ内丑寅ノ方ハ脈ノ  
 左ノ脈上ノ脈ノ方之是曆ノ家ニモ鬼門ト云ソノ如ク  
 人モ左ノ方ハアシキモノト之諸時々脉下痛ハ脾  
 胃虛也コレニ脉氣出ルハ死証ニ  
 證準水腫五不治門ニ脉出ル者ハ脾胃ノ虛也

脈ノウハバリノシテ底ノクワノクシタモノハ實々々虚々々頌死ナリ

尤ノ淺肉ノヤウナルモノカクフワノクスルモノハ中風ヲ發スルモノナリ

脈ノ肉モ脈ヲナクモ形肉ノ脱シタル者ハ死症ナリ素門雖九候調形肉大脱者死症云々

ハカリニテ形肉ノ説スルニハアラス脱シタルト云コルハ形ノ虚シタルト云テ其證批ハ

篇ニ若夫度之人病瘦而形肉脱者要可ニ次度量刺云カクアレハ病瘦ハタヤマタルウヘニ

形肉カ脱シタルト云テ然ハ只瘦タルト形肉ノ脱シタルト云ハ別アルナリ

家之秘事 合谷ノ内脱者死ト愚然先生中虚口傳何病ニテモ肉脱ハ死也

意齊流ノ刺法 有大極有無極有神浮無俞穴無分量無禁穴 無ニノ刺無ノ而

出ス不拘經穴刺法ノ大極ト云ハ人ノ生付タル大極ト云ハ違フ也此大極五臟ノ内何ニテモ病所ヲ

大極ト云之タトハ脾胃虚ナレハ脾胃部ヲ亦ス之是レ大極也

無極ト云病人ニヨツテ見ルニ病ト云テイワレト云極ノナキヲ發作有時是無極

外科正惡薛己云ル也

岐伯曰按摩

素問調經論 帝曰刺微如何 不足神氣乃

勿釋著鍼 勿作移氣於

得復

可テ意多クノ平日刺シタルハ鍼灸取衣英ノ三

鍼ノ内ノ毫鍼ニ神留ノ法トテイクツモ唐

ニアシモヤクニタヌ一ノ意齊流ニテハ上ニ言如

散鍼ナリ 素問刺法論 全真糧真我カ

真ラ全フモテ唐ニテモ大極ノ鍼トテ元氣ノ薄

者ニ膝下一本スル一有ルニ 素問宝命論并

千金方イトニアリ 可テ意交流テ用ル所ノ

神留ノ法ト云ハ呼吸神留ヲ為互呼吸神留

ノ一ハ 素問離合神部篇ニ詳ナリ平常ハト

カノ散鍼ナリ千金方イトニアセノ穴ト云一モ散

鍼ノ一ニ然モ經穴ヲ捨ル一ニテハアラヌ意齊ノ

門人ニ十畜經ニ通シタルニ

氣付鍼ノ一古ヨリ人中或ハ湧泉刺也此ハ家々

秘傳ニスルトモサホト秘受スル一テナシ疼所刺ス

一之病人ノ氣ノ附ヤウニスル一ニ

鍼灸取衣英古金鍼ト云ハ尊之ニ金鍼ハ今ノ鉄

針ニ可テ春夏ハ針ヲカリク、又モノナリ 灸カハ

深刺モカナリ

難經七十難曰春夏刺淺秋冬刺深者何  
謂之也然春夏陽氣在上人氣亦在上  
故當淺取秋多陰陽氣在下人氣亦在  
下故當深取之

針トカノハ指ノ先ヘ故麻油ヲ骨痛所ヲオスト治  
スルナリ鉄針岐ノ内ニ折タル時ハ三散一貼ニテ  
立ニ消散スルナリ此方針家ニ不治アルヘカラス

右岐診命院本草

松田意齋岐診之傳在木林家

越候命之飲血傳茂樹所聞直記之不  
參澤思重僕之及子孫傳者也亦門生  
青雲志者略傳全不傳所以貴乎之師  
傳也

岐診之傳

是意齋之傳書テナシ

膝

ハヒキミテ後ヘツリノ強ヲ能シトス前ヘ出テ柔  
ナルハアシ

膝ハ人ノ身ノ根元也故腎間ノ元氣何

則膝中ヲ押テ見ルニタモ今有テシツカリトスルハ

無病人也膝押無カ底ニテクバクスルハ難治元

氣ノ絶也先腹見ハ才一踏ヲ見

人腎癯ヲ侵則二日ニ日モ膝中ニ動氣アリ有

餘ノ人侵則明日ニテ動氣有リ



ナリシテクハトノ無力此人必ニ二年ノ内中風ヲ  
病下キ人ナレハ必ナリ左服如是則右半身不遂  
右服如是則右半身不遂也且右服如是則易治  
氣行故也左服此則難治氣行兼故也治療ノ法  
頻氣劑 神氣ノ系可リ兼ニ三年前ヨリ知テ如是  
治レハ偏枯中風可免又服ノ横筋有トイヘトモ左右  
ノ内トナシトモ不遂ハ痿症也最中風ヨリモ難治  
○抱テ年少人ノ腹脐ヨリ以上張テ堅ク脐下押テカ  
ナリヨハキハ腎虚ノ人ノ脐下ニ氣ノモチアリテ上ホト  
少シワヤワラカナルハ一段能キ也年ヨリタル人ハ下虚上  
實ナル故 脐下ノ氣弱ク柔ク脐ヨリ上鳩尾ノアタリ  
ニテ脹ルモノハ是年少ノ子又年ヨリテ脐下ノ氣タ  
モチアルハナルホト毎病ノ人ナリ  
○上院ノ所ヨウキ少ノ間ツカヘアルハ食ハナシヒ食後ニツカ  
ヘル者ナリ上院ノアタリヨリ左右廣クツカヘタルハ食ニ味  
毎者之右ノ痞タルハ食滯之積實ニ宜シ左へ痞タルハ  
疝氣類ニ青皮ヨロシ  
下ヲ押シルニ妊娠ナレハコレモリト高クアガルトイヘヒ動  
氣毎者也男子ナレハ右ノ方女子ナラハ左當ラ有モク  
捻テツカヘノタゲヒ朝トクハ必上ニ浮ラモノ之腹診之儀  
自身ノ腹ヲ以テ試之候ヒ見ヘシ自身ノエヌナクシ  
テハ成カタキモノ也懷妊枯血ノ候脈ニテモ神門

ニテモ伺難量者之懷性テモ血塊ニテモ夜明方ニ  
浮モノ也然レ之朝伺也聊以不可有他見者也  
支腎間ノ動氣イカシテモ在トイハ萬物虫生之  
始、天一之水ニ次之、地ニ火因而生、腎左ノ腎右ノ命門  
腎水也命門火也左腎ノ水ハ下行セトシ右腎ノ火上  
行セトス因之陰陽升降ノ生氣ヲ以腎間之動  
氣ト云也然レ溫和ノ動氣有レテ以平人目トスル也動氣  
甚ハ火動之病也非常ノ腎虛之候中焦ヨリ降下ニテ  
中行通ニ著ラバ伏タルヤウニ筋立ハ必死ノ証也腎衰ハ  
中焦隨ニ不足スルヲ可知 ○丸諸病ニ通シテ腹ノ  
見ヤウニ右ノ中腕ヨリ降ニテ接ラ見ニクワクトノ底ニテ

且テカラナキハ難治ノ症又腹ヲミルニスノコノ如ク  
盡ク筋ハリタルアリ何ノ症ナリ且難治ト可心得  
又腹ヲ見ニ右大抵脹滿ノ如クニハリテ腹ノ上ヲ見ニ油  
紙ノ如クニキラケトスルハ惡症ト知ヘシ傷寒ノ裏症  
ナトニ如是方ニ一生者ニ時役ノ症ナリ此法ニ同シ傷  
寒時疫トモニ右腹診ハ第一所要トスヘシ  
○虛里ノ動ノ候内經ニ有ト云トモ自己ノ考毎テハ用ニ  
達難キ者シ支平人ノ常右ノ方ニハ動氣不見左ニハ  
必動氣有モノナリ左ノ脈ヨリ左ノ乳ノ下動氣アリ  
温ニシテ手ニ應スルヲ靜ハ平人ノ常コレヲ宜トス若惣ラ  
支ノ候是動氣ハ甚充テ空手實ナルモ必死症

ナリ按テ吉凶ヲ分コト腹診鍛鍊アルヘキ事ナリ按テ  
反ノ証虚里ノ候ニユルナリ喘息ノ吉凶ヲ分フトモ  
コノ法ニ宜シ。○疾ニ形氣不足病氣不足アリ正氣  
盡衰形肉脱者久病愈モ盡シ骨咳ノ證四花ニ  
宜シ雖形肉脱者特肩ノ肉落タル者ハ治ル者ナリ  
未嘗咳ト名有ル前早ク灸治アルヘシ取分患門  
ノ切四花ニ勝タリト知ヘシ壯類古人ノ法有ト雖病人  
ノ元氣虚實ヲ見合灸治スヘシ大抵六穴ノ壯數六  
七百壯ヲ以宜トス四花傳習アル事也是ヲ可受  
。陽症ノ事中院ヨリ上院ノアタリ返板ヲ伏タル如ク  
灸者ナリ大抵四十以上是ヲ煩ク且白沫ヲ吐セルモ  
ノ十三生盡シ葉カラヨヒカタシ若シ早ケレハ諛語之穴  
二十四壯スルナリ妙ナリ逢ケレハ難及  
。頭死ノ候生有ラ見ニ底力且テ益ノ腹ノ上ヲ  
見ニ強ク張タルモノ陽實陰虚トテ生有者也  
然トイヘ死ニ平生美良生宜シテ老年ニ至ルモノアリ  
多ハ不幸ニメ心氣鬱結アフモノ頭死ヲ不道者ニ  
。小兒疱疹ノ候毒氣甚多疮色惡トイヘ疔疔下ヲ  
此ルニ相火ノ動者ハ治スヘシ假令疱疹外ヨリハ宜  
トイヘトモ疔下ノ動氣甚者ハ難治ノ症ト知ヘシ

