金匱正文

金匱正文

山陽医隠　江寛仁卿撰

痙濕暍病篇

太陽病其証備身体強几々然脈反沈遅此為痓湿

桂枝加葛根湯主之

太陽病無汗而小便反少気上衝胸口噤不得語欲

佐藤安司蔵書

御剛痙葛根湯主之

痙為病胸滿口噤臥不著席脚攣急必齒可噤大

桃仁系云

湯注之
葛氣湯

病
溫家身煩疾可與麻黃加朮湯發其汗為宜慎不可

以火攻之

病有一身盡疼發熱日晡所劇者名風濕此傷於

汗出當風或久傷取冷所致也可與麻黃薏苡甘草

湯

傷寒八九日風濕相搏身体疼煩不能自轉側不呕

不渴脉浮虛而濇有柱枝附子湯主之若大便堅小

便自利者去桂加白术湯主之

風湿相搏骨節疼煩掣痛不得屈伸近之則痛剣出冠氣小便不利惡風不欲去衣或身微腫者甚

附子湯主之

太陽中熱者是也汗出惡寒身熱而渴白虎加人

蒼湯主之

太陽中暍身熱疼重而脈微弱此以夏月傷冷水水

行皮中所致也一物瓜蒂湯主之

瘧病篇

瘧者有似傷寒者有似中風者有似温病者有似熱病者各隨其人而名之

而合狐惑陰陽毒病篇

温瘧者其脈如平身無寒但熱骨節疼煩時嘔白虎
加桂枝湯主之

瘧多寒者名曰牝瘧蜀漆散主之

牡蠣湯治牡瘧

柴胡桂姜湯治瘧寒多微有熱或但寒不熱
歷節痛煩

諸肢節疼痛身体怔羸脚腫如脫頭眩短気温温欲
吐桂枝芍藥知母湯主之

病歴節不可屈伸疼痛烏頭湯主之

血痺虛勞病篇

脈浮而緊浮則爲風緊則爲寒風寒相搏邪在皮毛故使身體痛

尺中亦微而緊者宜針引陰陽以和榮衛則愈宜黃耆桂枝五物湯主之

黃耆桂枝五物湯方

黃耆三兩　桂枝三兩　芍藥三兩　生薑六兩　大棗十二枚

右五味以水六升煮取二升温服七合日三服

一方加人參三兩新加湯主之

脈浮緊發熱身體疼痛不汗出而煩躁者大青龍湯主之若脈微弱汗出惡風者不可服之服之則厥逆筋惕肉瞤此爲逆也

大青龍湯方

麻黃六兩　桂枝二兩　甘草二兩　杏仁四十枚　生薑三兩　大棗十二枚　石膏如雞子大碎

右七味以水九升先煮麻黃減二升去上沫内諸藥煮取三升去滓温服一升須臾飲熱粥一升以助藥力温覆令一時許遍身漐漐微似有汗者益服至三升若服一升多汗者勿復服

脈浮緊者法當身體痛當發其汗不汗出而重者名曰傷寒

脈浮緊者法當身體痛當發其汗不汗出而重者名曰傷寒

近効方本附湯治風虛頭重眩若極不知食味寒氣

補中益氣

崔氏八味丸治腰痛小腹不仁

越婢加朮湯治肉極熱則身体津脫腠理開汗大出

風氣下焦病

血痺脈陰阳俱微寸口関上微尺中小緊外証身体
不仁如風痺状黄耆桂枝五物湯主之
夫失精家小腹弦急陰頭寒目眩髮落脈極虚芤遺
精清穀亡血失精桂枝加龍骨牡蛎湯主之
男子失精女子夢交天雄散

虚労裏急悸衄腹中痛夢失精四肢痠疼手足煩熱
咽乾口燥小建中湯主之
虚労裏急諸不足黄耆建中湯主之
虚労腰痛少腹拘急小便不利八味丸主之
虚労虚煩不得眠酸棗湯主之

五勞虛極羸瘦腹滿不能飲食傷憂傷飲傷房
傷飢傷勞傷經絡榮衛氣傷內有乾血肌膚甲錯兩
目黯黑經中補虛大黃䗪蟲丸主之
千金䗪蟲丸中湯治虛勞不足汗出而悶脈結悸行
動如常不出百日危急者十一日死

肺痿肺癰肺脹咳而上氣病篇

肺痿吐涎沫而不欬者其人不渴必遺尿小便數所
以然者以上虛不能制下故也此為肺中冷必眩多
涎唾甘中乾姜湯以温之若服湯已渴者屬消渴
欬而上氣喉中水雞聲射干麻黃湯主之

款逆上氣時々唾濁但坐不得眠皂莢丸主之

大逆上氣咽喉不利止逆下氣麥門冬湯主之

肺癰 是無表證常劇故不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之

款而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久之

肺癰喘不得臥葶藶大棗瀉肺湯主之

吐膿如米粥者爲肺癰桔梗湯主之

凡肺癰喘不得臥葶藶瀉肺湯主之義自明也

款而上氣此爲肺脹其人喘目如脫狀脈浮大者越

婢加半夏湯主之

肺脹款而上氣煩躁而喘脈浮者心下有水小青龍

加石膏湯主之

外臺茯苓甘草湯治肺痿涎唾多心中溫々液々

千金生姜甘草湯治肺痿咳唾涎沫不止甚煩而渴

千金杜支去芍藥加皂莢湯治肺痿吐涎沫

外臺吉更白散治咳而胸滿振寒脈數咽乾不渴時出濁唾腥臭久久吐膿如米粥者為肺癰

千金葦莖湯治咳有微熱煩滿胸中甲錯是為肺癰

肺癰胸滿煩一身面目浮腫鼻塞清涕出不聞香臭

咳逆上氣喘鳴迫塞短氣葶藶大棗瀉肺湯主之

奔豚氣病第

奔豚氣上衝胸腹痛往來寒熱奔豚湯主之

發汗後燒針令其汗針處被寒核起而赤者名桑奢

腸氣從少腹上衝心 桂枝上各下此桂枝加桂湯

主之

桀汗後腑下悸而欲飲水者 茯苓桂枝甘中大棗湯

主之

有胸痺之病肺痺者胸滿氣喘而欲吐痰唾涎沫而不渴或有寒熱而氣不得心胸痛者皆痺之類也痛或有定處或有移動或痛而引背或痛而不能俯仰或痛而不能轉側或痛而不能飲食或痛而不能呼吸或痛而不能言語或痛而不能動搖或痛而不能睡臥或痛而不能坐立或痛而不能行走或痛而不能屈伸或痛而不能舉手或痛而不能舉足或痛而不能舉頭或痛而不能舉目或痛而不能舉耳或痛而不能舉鼻或痛而不能舉口或痛而不能舉舌或痛而不能舉齒或痛而不能舉唇或痛而不能舉頤或痛而不能舉頰或痛而不能舉額或痛而不能舉髮或痛而不能舉眉或痛而不能舉睫或痛而不能舉瞳或痛而不能舉眸或痛而不能舉睛或痛而不能舉眶或痛而不能舉顴或痛而不能舉顳或痛而不能舉顬或痛而不能舉頤或痛而不能舉頷或痛而不能舉頸或痛而不能舉項或痛而不能舉肩或痛而不能舉臂或痛而不能舉肘或痛而不能舉腕或痛而不能舉手或痛而不能舉指或痛而不能舉爪或痛而不能舉甲或痛而不能舉掌或痛而不能舉拳或痛而不能舉握或痛而不能舉持或痛而不能舉執或痛而不能舉操或痛而不能舉作或痛而不能舉為或痛而不能舉事或痛而不能舉業或痛而不能舉職或痛而不能舉官或痛而不能舉爵或痛而不能舉祿或痛而不能舉位或痛而不能舉名或痛而不能舉譽或痛而不能舉稱或痛而不能舉頌或痛而不能舉德或痛而不能舉功或痛而不能舉勳或痛而不能舉績或痛而不能舉業或痛而不能舉事或痛而不能舉為或痛而不能舉作或痛而不能舉操或痛而不能舉執或痛而不能舉持或痛而不能舉握或痛而不能舉拳或痛而不能舉掌或痛而不能舉甲或痛而不能舉爪或痛而不能舉指或痛而不能舉手或痛而不能舉腕或痛而不能舉肘或痛而不能舉臂或痛而不能舉肩或痛而不能舉背或痛而不能舉脊或痛而不能舉腰或痛而不能舉臀或痛而不能舉胯或痛而不能舉股或痛而不能舉膝或痛而不能舉脛或痛而不能舉踝或痛而不能舉足或痛而不能舉趾或痛而不能舉爪或痛而不能舉甲或痛而不能舉掌或痛而不能舉拳或痛而不能舉握或痛而不能舉持或痛而不能舉執或痛而不能舉操或痛而不能舉作或痛而不能舉為或痛而不能舉事或痛而不能舉業或痛而不能舉職或痛而不能舉官或痛而不能舉爵或痛而不能舉祿或痛而不能舉位或痛而不能舉名或痛而不能舉譽或痛而不能舉稱或痛而不能舉頌或痛而不能舉德或痛而不能舉功或痛而不能舉勳或痛而不能舉績

胸痺之病喘息咳唾胸背痛短氣 甘口服汁而愈

上氣喘急者宜薤白白酒湯主之

胸痺不得臥心痛徹背者宜栝蔞薤白半夏湯主之

胸痺心中痞留氣結在胸胸滿脇下逆搶心枳實薤

白桂枝湯主之

胸痺胸中氣塞短氣茯苓杏仁甘草湯主之橘枳姜

湯亦主之

胸痺緩急者薏苡附子散主之

心中痞諸逆心懸痛桂枝生姜枳實湯主之

心痛徹背背痛徹心烏頭赤石脂丸主之

一方用薤白栝蔞白酒湯亦主之

心痛短氣不能食茯苓杏仁生薑甘草湯主之

若其人胸中痞氣氣上衝咽喉不得息者此為胸痺

九痛丸治九種心痛

腹滿寒疝宿食病

腹滿發熱十日脈浮而數飲食如故厚朴七物湯主之

痛而閉者厚朴三物湯主之

按之心下滿痛者此爲實也當下之宜大陷胸湯主
之

腹滿不減減不足言當須下之宜大承氣湯

心胸中大寒痛嘔不能飲食腹中寒上衝皮起出見
有頭足上下痛而不可觸近大建中湯主之

腹中寒氣雷鳴切痛胸脇逆滿嘔吐附子粳米湯主
之

腸下偏痛發熱其脈緊弦此寒也以温藥和之宜大
黃附子湯

寒氣厥逆赤丸主之

腹痛脈弦而緊弦則衛氣不行即惡寒緊則不欲食

邪正相搏即為寒而寒過脈痛若發則自汗出牛

足附冷其脈沉弦者大烏頭煎主之

寒疝腹中痛逆冷手足不仁若身疼痛灸刺諸法不

能治桂枝當烏頭湯主之

外臺烏頭湯治寒疝腹中絞痛賊風入攻五臟拘急

不得轉側發作有時使人陰縮手足厥逆

外臺柴胡桂枝湯治心腹卒中痛者

外臺走馬湯治中惡心痛腹脹大便不通通治卒

鬼撃病

下利不飲食有病食也當下之宜大承氣湯

病食在上院當吐之宜瓜蒂散

跌陽脉浮而遲浮則胃氣強遲則小便數浮遲相搏

五臟風寒積聚病篇

大便則堅其脾為約麻子仁丸主之

腎著之病其人身体重腰中冷如坐水中形如水狀

反不渇小便自利飲食如故病屬下焦身勞汗出衣

裏冷濕久久得腰以下冷痛腰重如帶五千錢甘姜

苓朮湯主之

痰澼飲中水氣盛者宜從小便去之苓桂朮甘湯主之

留飲欬嗽病第二

問曰夫飲有四何謂也師曰有痰飲有懸飲有溢飲有支飲問曰四飲何以為異師曰其人素盛今瘦水走腸間瀝瀝有聲謂之痰飲飲後水流在脇下欬唾引痛謂之懸飲飲水流行歸於四肢當汗出而不汗出身体疼重謂之溢飲欬逆倚息不得臥其形如腫謂之支飲

心下有痰飲胸脇支滿目眩苓桂朮甘湯主之

夫短氣有微飲當從小便去之苓桂朮甘湯主之

氣先治主之

病者脈伏其人欲自利利反快雖利心下續堅滿此
為留飲欲去故也甘遂半夏湯主之

病悬飲者十枣湯主之

病溢飲者當発其汗大青竜湯主之小青竜湯亦主
之

腸間支飲其人喘滿心下痞堅面色黧黑脈沉緊
得之數十日医吐下之不愈木防已湯主之虚者即
愈実者三日復発復与不愈者宜木防已湯去石膏
加茯苓芒硝湯主之

心下有支飲其人若冒眩沉沉欲吐而復不能吐

支飲胸滿者以厚朴大黄湯主之

支飲不得息葶藶大棗瀉肺湯主之

咳家本渴渴者為欲解今反不渴心下有支飲故也

小半夏湯主之

腹滿口舌乾燥此腸間有水氣已葅者從黄先主之

卒呕吐心下痞膈間有水眩悸者小半夏湯主之

假令瘦人脐下有悸吐涎沫而癲眩此水也五苓散主之

外臺茯苓飲治心胸中有停痰宿水自吐出水後心

胸間虛氣滿不能食消痰氣令除

欬家無肺疾為有水十棗湯主之

夫有支飲家欬煩胸中痛者不卒死至十二日或六

歲亘十棗湯

欬逆倚息不得臥小青龍湯主之

青龍湯下已多唾口燥寸胸忡忡足腫氣

從女腹上衝胸咽手足痺其面翕熱如醉狀因復下

流陰股小便難時復冒者與茯苓桂枝五味甘草湯

治其氣衝

衝氣即低而反更欬胸滿者用桂苓五味甘草湯去

柱加乾姜細辛以治其欬滿

欬滿即止而更復渴衝気復発者以細辛乾姜為故

苓也服之当間適而渴availと止為

当昌昌有水也吧有復内半夏以去其水

水去也止其人形腫有加杏仁主之若面熱欬加大黄以利之

消渇小便利不利淋病篇

男子消渇小便反多以飲一斗小便一斗腎気丸主

之

淋之為病小便如粟状小腹弦急痛引陰中

小便不利有水気其人若渇拍苔蜜煮先主之

小便不利蒲灰散茯苓猪苓白鱼散茯苓茵陳

主之

脈浮発熱渇欲飲水小便不利石葫荽湯主之

水気病篇

師曰病有風水有皮水有正水有石水有黄汗風水

其脈自浮外証骨節疼悪風皮水其脈亦浮外証附

腫按之没指不悪風其脈如故不渇当発黄汗正水

其脈沈遅外証自喘石水其脈自沈外証腹満不喘

黄汗其脈沈遅身発熱胸満四肢頭面腫久不愈必

致癰膿

風水脈浮身重汗出惡風
如前法
風水惡風一身悉腫脈浮不渴續自汗出為異
婢陽主之
皮水為病四肢腫水気在皮膚中四肢聶々動者防
已茯苓湯主之
裏水者一身面目黃腫其脈沉小便不利故令病水
假如小便自利此亡津液故令渴也越婢加朮湯主
之
水之為病其脈沉小屬女除漏者為風無水虛脹者

為[illegible]水発真汗即已脈必有宜麻黄湯子陽法有可
者不陽
厥而皮水者蒲灰散主之
黄汗之病両脛自冷假令発熱此属歴節食已汗出
又身常暮盗汗出者此労気也若汗出已反発熱者
久久其身必甲錯発熱不止有必生悪瘡若身重汗
出已輒軽者久久必身腫即胸中痛又従腰以上必
汗出下当汗腰髖弛痛如有物在皮中状剖有不能
食身疼重煩躁小便不利此為黄汗桂枝加黄芪湯
主之

問曰寒汗之為病身体重発汗出而陽狀如風水

汗出衣色正黄如蘗汁脈自沉何從得之師曰以汗

出入水中浴水從汗孔入得之宜桂枝加黄耆湯主之

師曰寸口脈遅而滑遅則為寒滑則為熱血不足陽脈

微而遅微則為気遅則為寒寒気不足則手足逆冷

則栄衛不利栄衛不利則腹満腸鳴相逐気轉膀胱

栄衛共労陽気不通即身冷陰気不通即骨痛陽前

通則陰竅陰前通則糞不仁陰陽相得其乃気行大

気一轉其気乃散実則失気虚則遺尿名曰気分

気分心下堅大如盤辺如旋杯水飲所作桂枝去芍

藥如前辛附子湯主之

心下堅大如盤邊如旋杯水飲許作枳朮湯主之

外臺防己黃蓍湯治風水脈浮為在表五六日頭

出表無他病病名但下重從腰以上為和腰以下當

腫及陰雜以屬伸

黃疸病篇

黃穀疸之為病寒熱不食食即頭眩心胸不安

久久發黃為穀疸茵蔯蒿湯主之

黃家病

日晡所發熱而反惡寒此為女勞得之膀胱急

小腹滿身盡黃額上黑足下熱因作黑疸。其腹滿

水狀大便必里時痛此水當之痛水也腹滿者難

治消石攀石散主之

黃疸心中懊憹或若熱痛梔子大黃湯主之

黃疸病面諸五苓散主之

黃疸腹滿小便不利而赤自汗出此為表和裏實當

下之宜大黃消石湯

黃疸病小便色不變欲自利腹滿而喘不可除此

除必噦噦者小半夏湯主之

諸黃腹痛而嘔者宜柴胡湯

男子黃小便自利當與虛勞小建中湯

瓜蒂湯治病黃疸

千金療黃疸病湯治黃疸

驚悸吐血下血胸滿瘀血病者

病人胸滿唇痿舌青口燥但欲嗽水不欲飲無寒熱

脈微弱大遲腹不滿其人言我滿當有瘀血

病者如燃狀煩滿口乾燥而渴其脈反無熱此為陰

伏是瘀血也當下之

火邪者桂枝去芍藥加蜀漆牡蠣龍骨救逆湯主之

吐血不止者柏葉湯主之

下血先便後血此遠血也黃土湯主之

下血先便後便此近血也黄土湯主之

心氣不足吐血衄血瀉心湯主之

吐噦下利病者

夫吐家有癰膿不可治吐膿尽自愈

數而應手者膿未成可消息和解散之

脈洪大者膿已成不可下當排膿破血

排膿湯

桔梗一兩 甘草二兩

上二味以水三升煮取一升分温再服

排膿破血湯

薏苡仁十分 敗醬五分 牡丹皮一分

上三味以水五升煮取二升半服一升

排膿散

枳實十六枚 芍藥六分 桔梗二分

上三味杵為散取雞子黄一枚以酪和散一方寸匕

排膿湯

甘草二兩 桔梗三兩 生薑一兩 大棗十枚

上四味以水三升煮取一升温服五合日再服

吐吐而病在陽止後思水有解急與之思水有解急與之思水有解急與之

病人胸中似喘不喘似呕不呕似噎不噎似喘徹心中憒々

然無奈有生姜半夏湯主之

乾呕吐涎沫头痛者吳茱萸湯主之

干嘔吐涎沫頭痛者吳茱萸湯主之

下利腹滿身体疼痛者先温其裏乃攻其表温裏

宜四逆湯攻表宜桂枝湯

下利清穀裏寒外熱汗出而厥者通脉四逆湯主之

下利脈沉弦者下重也四逆散主之

陽

下利已愈至其年月日時復発者以病不尽故也当

下之宜大承気湯

下利讝語者有燥屎也小承氣湯主之

下利便膿血者桃花湯主之

下利下重者白頭翁湯主之

下利後更煩按之心下濡者為虛煩也梔子豉湯主

下利腹脹滿身體疼痛者先温其裏乃攻其表温裏四逆湯攻表桂枝湯主之

下利清穀裏外並病先治其裏四逆湯主之

下利肺痛紫參湯主之

千金翼小柴胡湯治大便不通嘔數讝語

外臺黃芩湯治乾嘔下利

痛寒腸癰浸淫瘡

腸癰之者白切割可之化膿者多復自潰或因手術而受感染
加重患者痛苦

諸淳數脈應当発熱而反悪寒若有痛処当発

其癰

師曰諸癰腫欲知有膿無膿以手按腫上熱有為有

膿不熱有為無膿（以手按之手熱者不可針刺針出膿難止也）

腸癰之為病身甲錯腹皮急按之濡如腫状腹無

積聚身無熱脈数此為腸内有癰膿薏苡附子敗醤

主之

腸癰為内復腫痛按之痛如淋小便自調時々発

熱自汗出復悪寒其脈遅緊者有膿未成可下之者有

血脈洪数有膿已成不可下也大黄牡丹皮主之

桃膿散方

桃膿湯方

浸淫瘡從口流向四肢者可治從四肢流來入口者
不可治

浸淫瘡黃連粉主之

跌蹶手指臂腫轉筋陰狐疝蚘蟲病苦菊

夫跌蹶損人但能前不能却刺陽入二寸此太
陽經傷也

病人常以手指臂腫動此人身体瞤瞤者藜芦甘草
湯主之

轉筋之為病其人臂脇[illegible]痛上下行微弦聶筋入腹

有雖屬內虛

陰狐疝氣有偏有大小時々上下蛔蟲攻主之

蛔蟲之為病令人吐涎心痛發作有時毒藥不止甘

中藥當湯主之

婦人姙娠病篇

婦人姙娠病經斷未及三月而得漏下不止胎動

在臍上有為癥痼害姙娠小有動有前三月經水利

時服也下血有後斷之月而血也所以血不止有瘀

不去故也當下其瘀桂枝茯苓丸主之

婦人懷娠六七月胎孩發熱煩悶腹痛兩寒不
安腹如扇所以然者子藏開故也當以防子湯固其
藏

師曰婦人有痛下為有半產後因續下血都不絕名
有娠漏下血者假令娠腹中痛為胞阻胸支滿主
之

婦人懷娠腹中疼痛當歸芍藥散主之

娠嘔吐不止乾姜人參半夏丸主之

娠小便難飲食如故歸奇若參丸主之

娠有水氣身重小便不利洒淅惡寒起即頭眩葵

子發冬瓜主之

婦人產後病篇

問曰新產婦人有三病一名病產二名病痙三名病鬱冒三病大便難何謂也師曰新產血虛多汗出喜中風故令大便難病痙亡血復汗寒多故令鬱冒亡津液胃燥故大便難雖產婦鬱冒亦除微弱呃不能食大便反堅但頭汗出所以然者血虛而陰氣和必冒冒家欲解必大汗出以血虛下厥孤陽上出故頭汗出所以產婦喜汗出者亡陰血虛陽氣獨盛故當汗出陰陽乃復大便堅吧不能食小柴胡湯主之病解能食七八日更發

塊而此為胃実大黄甘湯主之

産後腹中有痛当歸生姜羊肉湯主之

産後腹痛煩滿不得卧者実也當歸散主之

師曰産婦腹痛法當以枳実芍薬散假令不愈有此

為腹中有乾血著脇下宜下瘀血湯主之亦主經水

不利

産後七八日無太陽証之腹堅痛此惡露不尽不大

便煩躁発熱切脈微実再倍発熱日晡所煩躁者不

食食則譫語至夜即愈宜大黄甘草湯主之亦主產後

在腸胃也

產後風續之數十日不解頭微痛惡寒時々有
心下痞惡吐所出[金]久陽且[征]續在[耳]可與陽[桂]旦[枝]湯
產後下痢虛極白頭翁加甘[草]阿膠陽主之
千金三物黃芩陽治婦人在[草]蓐自發露得風四肢
苦煩熱頭痛者與小柴胡湯頭不痛但煩者此陽主
之
千金內補當歸建中陽治婦人產後虛羸不足腹中
刺痛不止吸々少氣或苦少腹拘急痛引腰背不能
食飲產後一月日得服四五劑者令人強壯

婦人雜病第

婦人中風七八日續来寒热発作有時経水適断此為热入血室其血必結故使如瘧状発作有時小柴胡湯主之

婦人咽中如有炙臠半夏厚朴湯主之

婦人藏躁喜悲傷欲哭象如神霊所作数欠伸甘麥大棗湯主之

婦人吐涎沫医反下之心下即痞当先治其吐涎沫小青龍湯主之

婦人吐涎沫止乃治痞瀉心湯主之

向曰婦人年五十所病下利数十日不止暮即発熱

又復発熱両手掌煩熱唇口乾燥何也師曰此病

属帯下何以故曽経半産瘀血在少腹不去何以知
之其証唇口乾燥故知之当以温経湯主之

帯下経水不利少腹満痛経一月再見不去血根散
主之

婦人少腹満如敦状小便微難而不渇生後有此為
水無血但結在血室也大黄甘遂湯主之

婦人経水不利下抵当湯主之

婦人経水閉不利藏堅癖不止中有乾血下白物礬
石丸主之

婦人腹中諸疾痛当帰芍薬散主之

婦人腹中痛小建中湯主之

問曰婦人病飲食如故煩熱不得臥而反倚息者何

也師曰此名轉胞不得溺也以胞系了戻故致此病

但利小便則愈宜腎気丸主之

蛇床子散方温陰中坐藥

女子陰傷而数有陰中即生瘡陰中蝕瘡爛有狼牙

湯洗之

胃気下泄陰吹而正喧此言気之実也宜葛根湯之

小兒疳気蝕鼻方

三物備急方

問曰病有霍乱者何答曰吐而利名曰霍乱

霍乱頭痛發熱身疼痛欲飲水者五苓散主之寒多不用水者理中丸主之

吐利止而身痛不休者宜桂枝湯小和之

霍乱病篇

嘔家之人胸間不化吐復不出速下除之久成癰

病治之方

吐利汗出發热悪寒四肢拘急手足厥冷者四逆湯
主之

悪寒脈微而復利利止亦四逆加人尊湯主之

既吐且利小便復利而大汗出下利清穀裏寒外証
脈微欲絶者通四脈四逆湯主之

吐已下斷汗出而厥四肢拘急不解脈微欲絶者通
脈四逆加猪胆汁湯主之